

FLORA

ODER

ALLGEMEINE BOTANISCHE ZEITUNG.

FRÜHER HERAUSGEGEBEN

VON DER

KGL. BAYER. BOTANISCHEN GESELLSCHAFT IN REGENSBURG.

NEUE REIHE 48. JAHRGANG

ODER

DER GANZEN REIHE 73. JAHRGANG.

HERAUSGEBER: PROF. Dr. K. GOEBEL.

Mit 17 Tafeln und 2 Holzschnitten.

VERLAG
BOTANISCHER
GARTEN

MARBURG.

N. G. ELWERT'SCHE VERLAGSBUCHHANDLUNG.

1890.

GR
01-4115
1890
73

SHOUT
SHARE **IT**



Inhaltsverzeichniss.

I. Abhandlungen.

	Seite
Arbeiten aus dem botanischen Institut zu Marburg VI, VI, VIII	S. 62, 155, 411
BÜSGEN, M., Untersuchungen über normale und abnormale Marsilienfrüchte	169
GIESENHAGEN, C., Das Wachsthum der Cystolithen von <i>Ficus elastica</i>	1
„ Die Hymenophyllaceen	411
HEGLER, R., Histochemische Untersuchungen verholzter Membranen	31
HOLFERT, J., Die Nährschicht der Samenschalen	279
KLEBS, G., Ueber die Vermehrung von <i>Hydrodictyon utriculatum</i>	351
KRONFELD, M., Zur Präparation der Agrumen-Früchte	183
KÜHN, R., Ueber den anatomischen Bau von <i>Danaea</i>	147
MÜLLER, F., Frucht in Frucht von <i>Carica Papaya</i>	332
MÜLLER, J., Lichenologische Beiträge	187
„ <i>Lichenes Africae tropico-orientalis</i>	334
MÜLLER, K., Die Moose von vier Kilimandscharo-Expeditionen	465
PALLA, E., Beobachtungen über Zellhautbildung an des Zellkerns beraubten Protoplasten	314
ROSENTHAL, O., Zur Kenntniss von <i>Macrocystis</i> und <i>Thalassiophyllum</i>	105
ROSTOWZEW, S., Beiträge zur Kenntniss der Gefässkryptogamen I	155
SCHAEFER, B., Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Fruchtknotens und der Placenten	62
SCHIMPER, E., Zur Frage der Assimilation der Mineralsalze durch die grüne Pflanze	207
STIZENBERGER, E., Die Lichenen der Insel Ascension	184

II. Abbildungen.

A. Tafeln.

- Tafel I zu Giesenhagen, Das Wachsthum der Cystolithen von *Ficus elastica*.
Tafel II zu Hegler, Histochemische Untersuchungen.
Tafel III, IV, V und VI zu Schaefer, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Fruchtknotens und der Placenten.
Tafel VII und VIII zu Rosenthal, Zur Kenntniss von *Macrocystis* und *Thalassio-phyllum*.
Tafel IX zu Rostowzew, Beiträge zur Kenntniss der Gefässkryptogamen I.
Tafel X zu Büsgen, Untersuchungen über normale und abnormale Marsilienfrüchte.
Tafel XI und XII zu Holfert, Die Nährschicht der Samenschalen.
Tafel XIII zu Palla, Beobachtungen über Zellhautbildung an des Zellkerns beraubten Protoplasten.
Tafel XIV, XV, XVI und XVII zu Giesenhagen, Die Hymenophyllaceen.

II

B. Holzschnitte.

Fig. 1 zu Kronfeld, Zur Präparation der Agrumen-Früchte.

Fig. 2 zu Müller, Frucht in Frucht von *Cacarica Papaya*.


III. Litteratur.

BOERLAGE, Handleiding tot de Kennis der Flora van nederlandsch Indie	202
BOKORNY, Die Wege des Transpirationsstromes in der Pflanze	270
BURCK, Eenige bedenkingen tegen de theorie van Weismann	499
Erwiderung auf die Besprechung von Glasers Taschenwörterbuch	502
GLASER, Taschenwörterbuch für Botaniker	350
GOEBEL, Morphologische und biologische Studien	262
HEMPEL und WILHELM, Die Bäume und Sträucher des Waldes	272
HÖCK, Nährpflanzen Mitteleuropas	500
JANSE, Die Bewegungen des Protoplasma von <i>Caulerpa prolifera</i>	347
KOHL, Anatomisch-physiologische Untersuchungen der Kalksalze und Kiesel- säure in der Pflanze	150
MAYR, Die Waldungen von Nordamerika, ihre Anbaufähigkeit und forstlicher Werth	203
MÜLLER, F. v., records of observations on Dr. William Max Gregor's High- land-Plants from New-Guinea	153
MÜLLER, K., Medicinalflora	276
PAX, Allgemeine Morphologie der Pflanzen	274
PETRY, Die Vegetationsverhältnisse des Kyffhäuser Gebirges	203
WARMING, Handbuch der systematischen Botanik	273
WOJINOWIC, Beiträge zur Morphologie, Anatomie und Biologie der <i>Selaginella</i> <i>lepidophylla</i> Spring.	501

IV. Eingegangene Litteratur.

S. 153, 205, 276, 503.

Heft I	(S. 1—154)	erschien am 20. Januar 1890.
„ II	(S. 155—206)	„ „ 22. April.
„ III	(S. 307—278)	„ „ 5. Juli.
„ IV	(S. 279—350)	„ „ 1. September.
„ V	(S. 351—505)	„ „ 23. October.



Das Wachsthum der Cystolithen von *Ficus elastica*, ein Beitrag zur Kenntnis des Dickenwachstums vegetabilischer Zellhäute.

Von
C. Giesenhagen.

(Hierzu Tafel I.)

I. Einleitung.

Die Frage nach der Art, in welcher die vegetabilischen Membranen in die Dicke wachsen, hat seit langer Zeit die Botaniker beschäftigt. Bis gegen das Ende der fünfziger Jahre war unter den Gelehrten fast allgemein die Vorstellung verbreitet, dass die Membranen durch Apposition d. h. Auflagerung kleinster Theilchen eine Dickenzunahme erführen, dass also die Verdickung in ähnlicher Weise, wie das Metall im galvanoplastischen Apparat, Molekül für Molekül auf die bereits vorhandene Membranelle niedergeschlagen würde. Nägeli glaubte im Jahre 1847 That- sachen gefunden zu haben, welche mit der bisherigen Anschauung nicht in Einklang zu bringen wären. Er studirte in der Folge die Wachsthumsvorgänge eingehend an den Stärkekörnern der Pflanzenzellen und kam zu dem Resultat, dass diese Gebilde nicht durch Apposition, sondern durch Intussusception, d. h. durch Einlagerung kleinster Theilchen zwischen die Molekelgruppen der ursprünglichen Anlage wachsen. Die Theorie des Wachstums durch Intussusception, welche Nägeli auf molekular-physi- kalischen Grundlagen aufbaute und durch ein ausserordentlich reiches Beobachtungsmaterial gestützt in seinem Werk über die Stärkekörner der Gelehrtenwelt vorlegte, hat dann zeitweilig für das Wachsthum der Stärke- körner sowohl als der Zellhäute unumschränkte Geltung gehabt, bis end- lich in den letzten Jahrzehnten infolge der verbesserten Beobachtungs- mittel und Methoden gewisse Erscheinungen bekannt wurden, welche durch die Nägeli'sche Anschauung keine genügende Erklärung finden konnten. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass eine Verdickung von Zell- wänden in einigen Fällen dadurch zu Stande kommt, dass fertige Membran- lamellen auf die vorhandene Zellwand aufgelagert werden. Diese That- sache zeigte, ohne den Werth und die Bedeutung der Intussusceptions- theorie zu vermindern, dass die Wandverdickungen nicht immer lediglich auf Substanzeinlagerung beruhen, sondern auch noch in andern Vorgängen ihren Ursprung haben können. Ein weiterer Schluss war zunächst nicht abzuleiten. Wie es aber in ähnlichen Fällen zu gehen pflegt, glaubten einige Botaniker der neu gefundenen Thatsache generelle Bedeutung bei- messen zu dürfen; es sollte überhaupt jede Verdickung von Zellhäuten einzig durch Auflagerung neuer Substanz vor sich gehen. Dass diese Generalisirung nicht zulässig ist, dass überhaupt die Vorgänge bei der Verdickung der Zellhäute nicht so einfacher Natur sind, ist in neuester Zeit durch Arbeiten von Schmitz, Krabbe, Strasburger u. a. gezeigt

worden. Man hat Grund anzunehmen, dass die Dickenzunahme der Zellwände weder lediglich auf Substanzeinlagerung, noch ausschliesslich auf Neubildung von Lamellen vom Plasma aus beruht, dass vielmehr die verschiedenen Vorgänge nebeneinander wirkend die Erscheinungen zu Stande bringen.

Bevor indes die Frage endgültig entschieden werden kann, wird es nöthig sein, an einzelnen Objekten die Vorgänge eingehend zu studieren, um so das Material zu beschaffen, welches erforderlich ist zur Begründung einer Theorie des Wachstums der Membranen, die der von Nägeli gegebenen Intussusceptionstheorie als gleichwerthig an die Seite gestellt werden könnte.

Die vorliegende Arbeit soll in dem angegebenen Sinne einen Beitrag zur Lösung der Frage nach dem Wachstum der Zellhäute liefern. Als Gegenstand der Untersuchung wurden die Cystolithen von *Ficus elastica* gewählt. Was die Zulässigkeit dieses Objectes beim Studium des Dickenwachstums der Zellhäute anbetrifft, so darf wohl als bekannt vorausgesetzt werden, dass die Cystolithen ein Gebilde der Zellwand, eine lokale, ganz enorme Membranverdickung darstellen, welche sich von andern Wandverdickungen wesentlich nur dadurch unterscheidet, dass zwischen die organisirten Bestandtheile anorganische Substanzen, vornehmlich kohlensaurer Kalk und Kieselsäure eingelagert sind. Die Cystolithen sind seit ihrer Entdeckung schon sehr häufig von Forschern nach den verschiedensten Gesichtspunkten geprüft worden; die Fragestellung, welche der vorliegenden Arbeit zu Grunde liegt, ist indes bisher hinsichtlich der Cystolithen noch nicht zum Ausgangspunkt einer Untersuchung gewählt worden.

Der Gang unserer Darlegung wird kurz folgender sein: Wir werden zunächst die Morphologie und Anatomie der Cystolithen von *Ficus elastica* eingehend studieren und dann die dabei gewonnenen Resultate zur Entscheidung über die Wachstumsweise zu verwerthen suchen.

Ich will hier noch eine Bemerkung anfügen über die Bedeutung einiger Ausdrücke, welche im Folgenden häufig Verwendung finden. In der Terminologie der bei dem Wachstum und der Neubildung von Zellhäuten auftretenden Erscheinungen ist einige Verwirrung dadurch entstanden, dass neuere Autoren entsprechend ihrer veränderten Auffassung Ausdrücke, die in der vorhandenen Literatur schon eine ganz specielle Bedeutung besaßen, in ganz anderem Sinne verwendeten, ohne dass die Auffassung, welche der ursprünglichen Bedeutung der Worte zu Grunde lag, im Geringsten an Berechtigung verloren hätte. Strasburger bezeichnet z. B. als Schicht einen Complex gleichartiger dünner Häutchen, während man vorher nach Nägelis Vorgang die abwechselnden weichen und dichten annähernd parallel zur Oberfläche verlaufenden Partien eines vegetabilischen Gebildes als Schichten bezeichnete. Ich habe in meiner

Arbeit, um Missverständniss zu verhüten, die Worte Lamelle, Schichtung, Schicht, geschichtet u. s. f. nur im allgemeinsten Sinne gebraucht, d. h. ich bezeichne als Schichtung jede annähernd zur Oberfläche parallel verlaufende Strukturverschiedenheit eines organisirten Körpers, gleichviel, ob die einzelnen hautartigen Strukturelemente von verschiedener Dichtigkeit sind oder nicht, ob dieselben als aus einer Vielheit dünnster Häutchen bestehend zu denken sind oder nicht, ob sie durch Wachsthum oder durch successive Neubildung entstanden sind. Wo von einer Schichtung im Sinne Nägeli's die Rede ist, da setze ich ausdrücklich hinzu, dass die Schichten oder Lamellen abwechselnd weich und dicht seien, wo von Lamellen im Sinne Strasburgers gesprochen wird, da verwende ich die Worte »gleichartige Schichten« oder »Lamellen von gleicher Dichtigkeit« oder einen ähnlichen leichtverständlichen Terminus.

In der Literatur über die Cystolithen wird allgemein eine im optischen Durschnitt des Cystolithenkörpers sich zeigende radiale Zeichnung als Streifung bezeichnet. Da die Worte Streifen und Streifung in der pflanzlichen Histologie eine ganz specielle Bedeutung haben, welche für die radialen Strukturelemente im Cystolithen nicht zutrifft, so habe ich dieselben durchweg vermieden; ich bezeichne die radialen Streifen der Autoren ihrer Natur nach als radiale Stränge.

II. Morphologie, chemische Beschaffenheit und Entwicklungsgeschichte der Cystolithen von *Ficus elastica*.

Die in besonders ausgebildeten Epidermiszellen von *Ficus elastica* vorkommenden Cystolithen bestehen aus zwei Theilen, welche in der Mehrzahl der Fälle scharf von einander geschieden sind, dem Stiel und dem Körper.

Der Stiel hat einen kreisförmigen Querschnitt und ist in seiner ganzen Länge von annähernd gleichem Durchmesser, so dass er in dem Jugendstadium eine ziemlich regelmässige Walzenform zeigt (Taf. I. Fig. 1, 4 u. 10). Nur sieht man an demselben hin und wieder ringsherumlaufende wulstige Anschwellungen von geringer Dicke, und ausserdem ist das freie Ende des Stieles knopf- oder tropfenförmig abgerundet und um wenig dicker als der übrige Theil. Meistens erscheint abgesehen von den optischen Effekten, welche durch die ringwulstigen Anschwellungen hervorgebracht werden, der Stiel ganz homogen. Schacht¹⁾ behauptet, dass man im Stiel deutlich eine Schichtung erkennen könne, spätere Autoren bestreiten das. Da es für die Frage nach der Wachstumsart von Bedeutung ist, zu wissen, ob der Stiel aus Schichten aufgebaut ist oder nicht, so werden wir genöthigt sein, uns späterhin über diesen Punkt ein eigenes Urtheil zu bilden.

1) Abhandlg. der Senkenb. Gesellsch. I. p. 133.

Der Körper des Cystolithen hat im groben Umriss gewöhnlich eine länglich eiförmige Gestalt. Seine Oberfläche ist mit paraboloiden Papillen besetzt. Seiner Struktur nach besteht der Körper des Cystolithen aus übereinanderliegenden dünnen Membranlamellen. Diese annähernd concentrische Schichtung wird von radialen Strängen durchsetzt, welche im Innern des Körpers beginnend stets senkrecht zum Verlauf der Schichten nach der Peripherie sich hinziehen und je in der Spitze einer Papille endigen. Über die Natur der Stränge sind die Autoren verschiedener Ansicht. Kny ¹⁾ hält dieselben für Cellulosebalken, während Richter ²⁾ annimmt, dass die Erscheinung auf einem Abwechseln wasserarmer und wasserreicher Partien beruhe. Auch die Entscheidung dieser Frage ist für unsere Untersuchung über das Wachsthum der Cystolithen von Wichtigkeit und bedarf daher noch einer eingehenderen Behandlung.

Was nun die chemische Beschaffenheit der Cystolithen von *Ficus elastica* betrifft, so steht zunächst fest, dass sich darin Stiel und Körper wesentlich von einander unterscheiden. Beide bestehen zwar der Hauptsache nach aus Cellulose, aber der Körper enthält kohlensauren Kalk, welcher dem Stiel fehlt. Ob der Stiel, wie es heute in den meisten Lehrbüchern steht, verkieselt ist, das wird noch zu beweisen sein; Richter ³⁾ stellt es ganz entschieden in Abrede. Es scheint, als ob bei den Untersuchungen über diesen Punkt nicht die nöthige Rücksicht auf das Alter der Stiele genommen worden ist. Junge Cystolithenstiele sind sicher anders zusammengesetzt als diejenigen, welche schon einen völlig ausgewachsenen Körper tragen. Die ersteren erscheinen straff und sind gegen Säuren äusserst resistent, letztere sind verkrümmt und verbogen und widerstehen der Einwirkung von Schwefelsäure nicht dauernd. Diese Thatsachen gestatten eine Parallele zwischen den Cystolithen von *Ficus* und denjenigen der *Acanthaceen*, bei denen die substantielle Umwandlung des Stieles bei zunehmendem Alter sogar bis zur völligen Auflösung fortschreitet. Wenn man bedenkt, wie leicht gerade die Kieselsäure im Pflanzenkörper wandert, und ferner in Betracht zieht, dass die ausgewachsenen Cystolithenkörper bei *Ficus* mit einer Schale von Kieselsäure umkleidet werden, so liegt der Gedanke nahe, dass die Stiele gemäss der Angabe Luerssens im Jugendstadium verkieselt sein mögen, dass ihr Kieselgehalt im Alter aber schwindet und zum Aufbau der das Wachsthum des Cystolithen beschliessenden Kieselschale verbraucht wird. Richters Behauptung hätte dann für die Stiele ausgewachsener Cystolithen ihre Geltung.

Die Menge des kohlensauren Kalkes in dem Körper der Cystolithen von *Ficus elastica* ist ziemlich beträchtlich, wie aus der Menge der an-

1) Kny, Wandtafeln zur Pflanzenkunde II. Tfl. XI.

2) Sitzungsber. d. Wiener Akad. Bd. LXXVI. 1. p. 145.

3) a. a. O.

schiessenden Gipsnadeln bei Zusatz von Schwefelsäure geschlossen werden kann. In welcher Form das Mineral eingelagert ist, ob krystallinisch oder amorph, ob zwischen den Membranlamellen, oder intramolekular in denselben, das steht vorläufig noch dahin. Wir werden hernach Gelegenheit haben, dieser Frage näher zu treten.

Die Entwicklungsgeschichte der Cystolithen von *Ficus elastica* ist aus den Lehrbüchern allgemein bekannt. Es genügt ihren Verlauf hier in groben Zügen anzudeuten. Schon in der Knospe zeigen gewisse Epidermiszellen der *Ficus*-Blätter eine differente Ausbildung gegenüber den sie umgebenden dadurch, dass ihre nach aussen gelegene Wand mehrmals so stark verdickt erscheint als diejenige der angrenzenden Zellen. Im Laufe der Entwicklung wölbt sich die verdickte Wand zapfenartig in das Lumen der Zelle vor und die Hervorragung wächst dann immerfort vorwiegend in die Länge zugleich mit der Zelle, welche stets ungetheilt bleibt, während ihre Nachbarinnen verschiedene Theilungen erfahren. Hat endlich die Zelle ihre definitive Grösse erreicht, so ragt die zapfenförmige Wandverdickung, der nachmalige Stiel des Cystolithen etwa bis in die Mitte ihres Lumens hinein. Nun erst, nachdem das Blatt sich längst ausgebreitet hat, beginnt die Anlage der ersten optisch differenten Schichten, die den Anfang des Cystolithenkörpers bilden. Zunächst sind die Schichten einigermassen regelmässig und glatt; bald sieht man in denselben die radialen Stränge angedeutet, und es bilden sich die Papillen an der Oberfläche aus. In diesem Stadium tritt zuerst der kohlensaure Kalk auf, um mit dem wachsenden Cystolithen an Menge zuzunehmen. Indem die Zahl der Schichten sich beständig vergrössert, schwillt der Körper des Cystolithen mehr und mehr und erfüllt endlich fast die ganze Zelle.

Das ist in Kürze die Darstellung des Entwicklungsganges der Cystolithen von *Ficus elastica*, wie sie leicht aus der Beobachtung einer Reihe von aufeinanderfolgenden Entwicklungsstadien abgeleitet werden kann. In welcher Weise aber aus dem einen Entwicklungsstadium das nächste hervorgeht, welche Entwicklungsvorgänge vom einen zum andern hinüberführen, das bleibt noch zu erklären. Nach Schacht ¹⁾, überhaupt nach der Ansicht der meisten ältern Botaniker, wären die äussern Theile des wachsenden Cystolithen auf die nächstinnern niedergeschlagen, wie etwa die Tropfsteinschichten eines Stalaktiten, oder wie ein Metallüberzug im galvanoplastischen Apparat. Wollte man Nägeli's Theorie auf die Gebilde anwenden, so müsste man annehmen, dass die Grössenzunahme der Cystolithen zurückzuführen sei auf eine Einwanderung von Baustoffen zwischen die Molekularkomplexe der ursprünglichen Anlage, wobei die Schichtung durch auftretende Spaltungen zur erklären wäre. Eine von

1) a. a. O.

neueren Autoren verfochtene Hypothese vom Wachsthum der Zellhäute geht dahin, dass alle Substanzzunahme der Membranen hauptsächlich durch Auflagerung fertiger Celluloselamellen zu Stande kommt. Eine direkte Beobachtung des Wachstums, welche jeden Zweifel beseitigen könnte, ist unmöglich. Es handelt sich für uns also darum, in dem Bau und der Beschaffenheit der Cystolithen Thatsachen zu finden, welche in objektiver und eindeutiger Weise die Frage nach der Art der Wachsthumsvorgänge entscheiden, gleichviel ob dabei die eine oder die andere der soeben erwähnten Ansichten vom Wachsthum der Membranen bestätigt wird oder nicht.

Wir wenden uns zunächst zur Erörterung der vorhin angedeuteten morphologischen Fragen, welche durch die bisherige Forschung keine endgültige Erledigung gefunden haben, und welche gerade bei der Beurtheilung der Wachsthumerscheinungen von Bedeutung sind.

III. Ergänzende Untersuchungen über die Morphologie der Cystolithen von *Ficus elastica*.

a) Struktur des Stieles.

Es ist vorhin schon erwähnt worden, dass die Forscher, welche diesen Punkt berührt haben, über die feinere Struktur des Cystolithenstieles bei *Ficus elastica* verschiedener Ansicht sind. Schon Meyen¹⁾ wurde durch das Vorhandensein der mehr oder minder deutlichen Ringelungen am Stiel zu der Annahme geführt, dass der Stiel aus über einander gelagerten Schichten bestände. Schacht²⁾ glaubte bei genauer Einstellung die Schichtung des Stieles in jedem Falle zu sehen und gab bei seiner Arbeit Abbildungen von deutlich geschichteten Cystolithenstielen. Von den andern Autoren behauptete vor allen Weddel³⁾ gerade im Gegensatz zu der ihm bekannten Beobachtung von Meyen und Schacht, dass eine solche Schichtung nicht sichtbar sei. Richter⁴⁾ spricht von »scheinbar ungeschichteten« Stielen und drückt damit jedenfalls aus, dass nach seiner Meinung eine Schichtung nicht direkt zu beobachten sei, wenn auch die vorsichtig gewählten Worte die Frage nach dem Vorhandensein einer Schichtung überhaupt unentschieden lassen.

Man sieht, es stehen sich hier die Beobachtungen diametral gegenüber. Schacht stützt seine Annahme einer Schichtung im Stiel auf gewisse Beobachtungsbilder. Weddel und Richter constatiren, dass solche Bilder in Wirklichkeit nirgends vorhanden sind und entziehen damit der Behauptung, dass der Stiel geschichtet sei, den Halt. Es ist eine

1) Müllers Archiv für Anatomie und Physiologie 1839. p. 255. — 2) a. a. O. — 3) Ann. des sciences nat. Bot. S. IV. t. II. p. 267. — 4) a. a. O.

heikle Frage, welchem der Beobachter man die grössere Objektivität zu-
trauen darf, auf welcher Seite man die Thatsache zu suchen hat. Klar
ist, dass in diesem Falle nichts gewonnen wird, wenn ein einzelner neuer
Beobachter seine direkte Beobachtung über einen solchen streitigen Punkt
mittheilt. Wenn man denselben Weg einschlägt, der die älteren Forscher
zu den widersprechenden Angaben geführt hat, so ist man einmal den-
selben Fehlerquellen ausgesetzt; und ferner, wenn man wirklich mit
äusserster Sorgfalt die Beobachtung ausführt, das Resultat kann dann
doch nur für den Beobachter selbst überzeugend sein. Im übrigen ver-
leiht es höchstens der einen von den ältern Ansichten einen etwas höheren
Grad von Wahrscheinlichkeit. Um wirklich zu allgemein gültiger objek-
tiver Gewissheit, — soweit überall von einer solchen gesprochen werden
kann, — über den Punkt zu gelangen, müssen Beweise erbracht werden,
welche sich auf Thatsachen stützen, deren Beobachtung weniger zweifel-
haft und von dem subjektiven Beobachtungsvermögen weniger abhängig
ist, als das direkte Erkennen einer zarten nur schwach angedeuteten
Schichtung. Immerhin wird es sich trotzdem empfehlen, zunächst zur
eigenen vorläufigen Orientirung auch der direkten Beobachtung einen
Platz einzuräumen.

Es ist schon angedeutet worden, dass die schwachen Ringelungen des
Stieles bei der mikroskopischen Beobachtung optische Effekte erzeugen,
welche wohl geeignet sind, einem oberflächlichen Beobachter quer durch
den Stiel verlaufende Schichten vorzutäuschen. Sollte Schacht einer
so groben Sinnestäuschung zum Opfer gefallen sein? — Sicherlich nicht!
Schachts gewissenhafte Art zu beobachten hätte das nicht zugelassen,
und die Abbildungen geschichteter Cystolithenstiele, welche Schacht bei
seiner Arbeit giebt, zeigen deutlich, dass er etwas anderes beobachtet hat,
als die Schatten und Interferenzlinien, welche den Unregelmässigkeiten
des Stieles ihre Entstehung verdanken. Schacht behauptet, dass man
an jedem Cystolithenstiel bei *Ficus elastica* und *australis* die Schichtung
deutlich wahrnehmen könne, wenn nur die Einstellung des Mikroskopes
die richtige sei. Ich muss gestehen, dass mir das nicht in dem Maasse
gelungen ist. Immerhin habe ich aber doch in einer Anzahl von Fällen
in völlig normalen Cystolithenstielen ohne Anwendung von Reagentien
eine Schichtung durch zarte Linien angedeutet gesehen. Die Linien ver-
liefen in einer Curve quer durch den Stiel und entzogen sich nahe der
Seitenfläche in die Längsrichtung des Stieles einbiegend der Beobachtung.

Es fragt sich nun, woran mag es liegen, dass die etwa vorhandene
Schichtung nicht überall deutlich sichtbar ist. Die Ursachen werden so-
wohl in der äussern Form als in der innern Beschaffenheit der Stiele zu
suchen sein. Die Stiele sind annähernd cylindrische Gebilde mit einem
im Verhältniss zur Länge nur geringen Querdurchmesser. Wenn nun, wie
aus der soeben mitgetheilten direkten Beobachtung und aus der Analogie

mit andern geschichteten vegetabilischen Körpern als wahrscheinlich gefolgert werden darf, die etwa vorhandenen Schichten nicht scheibenförmig den cylindrischen Stiel aufbauen, sondern der Oberfläche des Gebildes annähern, parallel auch seitlich übereinander hinweg verlaufen, so müssen dieselben entgegen dem querverlaufenden Abschnitt in ihrem Längsverlaufe ausserordentlich zart sein, vielleicht so zart, dass die optische Auflösung des Schichtencomplexes in einzelne Linien auch unter übrigens günstigen Bedingungen überhaupt unmöglich ist, weil der Durchmesser der einzelnen Lamellen unterhalb der Grenze des Sichtbaren bleibt. Hinzu kommt dann noch, dass durch die an den Längsseiten cylindrischer Gebilde auftretenden Brechungs- und Interferenzerscheinungen die Beobachtung gestört wird.

Aber diese Hindernisse haben keine Bedeutung für denjenigen Theil der einzelnen Schichten, welcher quer zur Längsachse des Stieles verläuft. Dort müssen die Schichten eine gewisse messbare Dicke besitzen, und die störenden optischen Einflüsse der Randpartieen des Stieles fallen fort; man müsste also von etwaigen anderen Beobachtungsstörungen abgesehen bei mittlerer Einstellung eine Reihe gekrümmter Querlinien durch den Stiel verlaufen sehen. Und in der That, wo ich überhaupt in normal gebildeten Stielen eine Schichtung direkt beobachten konnte (Taf. I. Fig. 4), dort waren, wie vorhin erwähnt, die Schichten ausschliesslich in ihrem Querverlaufe erkennbar. Die sichtbaren Kontaktlinien lassen sich in einer Kurve gegen die Längswand des Stieles hin verfolgen, wo sie dann aus den oben angegebenen Gründen verschwinden. Dass nun auch der Querverlauf der Schichten nur in wenigen Fällen und dort nur undeutlich zu erkennen ist, das mag zum Theil in den äusseren Unregelmässigkeiten des Stieles seinen Grund haben, vielleicht liegt es auch an den besonderen physikalischen Eigenschaften des den Stiel zusammensetzenden Materials, welche dem ganzen Gebilde das eigenthümliche, glänzende Aussehen verleihen.

Um die Schichtung des Stieles auch im Längsverlaufe direkt beobachten zu können, wäre es erwünscht, Fälle zu finden, in denen der Querdurchmesser des Stieles nicht so weit hinter der Länge des Gebildes zurückbleibt, in denen also die einzelnen Lamellen der Schichtung auch seitlich eine der Beobachtung zugängliche Dicke haben und theilweise von den durch die Stielränder hervorgerufenen optischen Effekten nicht mehr verdeckt werden. Solche Fälle sind nun nicht gerade schwer zu finden.

Die Cystolithen von *Ficus elastica* sind ausserordentlich empfindlich gegen Verletzungen, welche das sie führende Blatt erfährt, während sie sich noch in der Entwicklung befinden. Wird ein Blatt in der Jugend angeschnitten, eingerissen oder auch nur durch Insektenstiche verwundet, so wird dadurch die normale Ausbildung seiner Cystolithen gehemmt; es bilden sich allerlei von der gewöhnlichen Form abweichende Gestalten heraus, die dann bisweilen für die Beobachtung der innern Struktur

günstigere Bedingungen bieten als die normalen. Verschiedentlich fand ich in Blättern, die frühzeitig verletzt waren, alle Cystolithenstiele unten zwiebelartig verdickt, so dass der Querdurchmesser derselben der Länge fast gleichkam (Taf. I. Fig. 2). In allen diesen Fällen, in denen ja die vorhin angedeuteten der Beobachtung günstigen Bedingungen vorlagen, war stets die Schichtung im Längs- wie im Querverlauf deutlich zu verfolgen.

Sehr instruktiv ist auch eine zweite ziemlich häufige Form abnormer Ausbildung, bei welcher sich der Stiel in ungewöhnlicher Weise verlängert (Taf. I. Fig. 3). Dabei werden die dem freien Stielende zunächst liegenden Schichten in ihrer querverlaufenden Partie in dem Grade different ausgebildet, dass über das Vorhandensein einer Schichtung gar kein Zweifel bestehen kann. Am Rande sieht man die Lamellen alle in eine gleichmässig den Stiel überkleidende Schicht verschmelzen, die auch mit den besten mir zu Gebote stehenden optischen Hilfsmitteln ¹⁾ nicht in einzelne Lamellen aufgelöst werden konnte. Nach dem Ende des Stieles zu, welches an der Zellwand befestigt ist, verliert sich die sichtbare Schichtung ganz allmählich; die Linien werden nach und nach immer undeutlicher, bis endlich nichts mehr mit Bestimmtheit zu unterscheiden ist. Dieses allmähliche Übergehen der mit Schichtung versehenen Partien in denjenigen Theil des Stieles, der vollständig homogen erscheint, legt die Vermuthung nahe, dass auch dieser letztere aus einzelnen Membranlamellen aufgebaut sei, die nur aus irgend welchem Grunde optisch nicht unterschieden sind.

Die geschilderten Stielformen geben uns über zwei Dinge Aufschluss. Einmal zeigen sie, dass wenigstens in gewissen Fällen der Stiel aus einzelnen Lamellen besteht, und ferner bestätigen sie den vorhin gemachten Analogieschluss, dass die Lamellen auch seitlich übereinander hinweg laufen. Ausserdem ist es durch die Beobachtung wahrscheinlich gemacht, dass die Theile des Stiels, welche homogen erscheinen, ebenfalls aus Lamellen aufgebaut sind, und dass also auch die normalen Stiele eine lamellöse Struktur besitzen.

Gegen die letzte Schlussfolgerung lässt sich freilich ein triftiger Einwand geltend machen. Die beschriebenen Formen sind pathologische Missbildungen, und es ist nicht angebracht, aus der Analogie von solchen direkt auf normale Fälle zu schliessen. Es liegt freilich auf der Hand, dass auch bei pathologischen Bildungen die chemischen und physikalischen Gesetze, welche der normalen Bildung zu Grunde liegen, nicht aufgehoben sein können, dass nur die veränderten Bedingungen die Wirksamkeit dieser Bildungsgesetze in veränderter Form an dem Gebilde zum Ausdruck bringen: — Ein deformirter Hutpilz wird noch immer über das Wesen des Pseudoparenchyms der Pilze Aufschluss geben. — Aber es hält oft

1) Es wurden bei den Untersuchungen neben andern leistungsfähigen Objektiven die neuen apochromatischen Systeme von Zeiss benutzt.

schwer zu bestimmen, wie weit im einzelnen Falle pathologischer Wachstumserscheinung der Einfluss der veränderten Umstände reicht. Unsere Erwägung im Anschluss an die Schilderung der Missbildungen hat also insofern Berechtigung und Werth, als sie uns über die Richtung orientirt, die wir bei der weiteren Untersuchung einzuschlagen haben. Wir dürfen nur nicht bei dem bisherigen Ergebnisse stehen bleiben, sondern müssen suchen, auch an den normal ausgebildeten Stielen das Vorhandensein der Schichtung zu erweisen.

Es könnte jemand der Ansicht sein: wo keine Schichten zu sehen sind, da darf auch nicht von Schichtung gesprochen werden; mag auch das Gebilde ursprünglich aus einer Anzahl von einzelnen Schichten hervorgegangen sein, wenn es homogen aussieht, so sind dann eben die Schichten zu einer gleichmässigen Masse mit einander verschmolzen. Diese Ansicht ist nicht zu billigen. Man muss bei den vegetabilischen Zellhäuten sehr wohl zwei Arten der Schichtung unterscheiden. Bei der ersten Art sind die aneinandergrenzenden Membranlamellen ihrer Natur nach verschieden, sei es, dass substanzärmere Schichten mit dichteren abwechseln, wie etwa bei den Stärkekörnern, sei es, dass die chemische Beschaffenheit der Lamellen different ist, wie bei den Cutikularschichten der Epidermis höherer Pflanzen, oder sei es endlich, dass die Anordnung der Molekular-complexe in den benachbarten Schichten verschiedenen Richtungen folgt, wie das z. B. bei den Bastzellen von *Nerium*¹⁾ der Fall ist und durch den oft entgegengesetzten Verlauf der Streifung zum Ausdruck kommt. In allen diesen Fällen wird es nicht schwer sein, durch direkte Beobachtung das Vorhandensein der Schichtung festzustellen. Anders ist es bei der zweiten Art der Schichtung, bei welcher physikalisch und chemisch gleich gebaute Lamellen aneinander gelagert sind. Hier sind es eben nur die Kontaktlinien, welche die Schichtung sichtbar machen. Es lässt sich sehr wohl denken, dass in einem solchen Falle die Kontaktlinien auch bei der besten Vergrösserung nicht erkennbar sind; man braucht nur anzunehmen, dass die Molekularstruktur der Lamellen an den Kontaktflächen ebenso beschaffen ist wie im Innern, und dass die Interstitien zwischen den Micellen in den Kontaktflächen der sich berührenden Lamellen nur wenig weiter sind als die Intermicellarräume innerhalb der Lamellen. Es ist nicht ersichtlich, wie unter diesen Umständen zwischen den Lamellen und den Kontaktlinien eine optische Differenz entstehen sollte. Wären freilich die Grenzmicelle der benachbarten Lamellen so angeordnet und einander soweit genähert, dass sie auf einander die gleiche Wechselwirkung ausüben, wie die Micelle im Innern einer einzelnen Lamelle, so könnte man mit Recht von einem Verschmelzen der Schichten zu einer homogenen Masse sprechen; aber so lange das nicht der Fall ist, so lange

1) cf. G. Krabbe in Pringsheims Jahrb. XVIII.

sei es gegen chemische oder mechanische Einwirkungen die Berührungsstelle zweier Lamellen sich anders verhält als eine beliebige Stelle innerhalb der Lamellen, so lange muss auch der Aufbau des Gebildes als geschichtet bezeichnet werden.

Beim Anfertigen von Querschnitten aus dem *Ficus*blatt geschieht es nicht selten, dass ein Cystolith vom Messer erfasst und losgerissen wird. Gewöhnlich reisst dabei der Stiel nicht an seiner Anheftungsstelle, sondern weiter nach der Mitte zu, und man findet dann, dass die Bruchstelle immer eine ganz bestimmte Form aufweist, die nicht zufällig hervorgerufen sein kann. Wäre der Stiel ein homogenes Gebilde, so müsste das Zerreißen in ähnlicher Weise erfolgen wie etwa das Zerreißen eines auf Zug geprüften cylindrischen Stabes aus irgend einem wenig dehnbaren Metall oder aus einem andern homogenen Material. Versuche mit Glas, Siegellack, Stearin, Guttapercha und Kautschuk zeigten, wie zu erwarten war, dass die Bruchfläche beim Zerreißen eine senkrecht zur Längsachse des Versuchsstabes gelegene Ebene ist, die je nach der Eigenart des Materials glatt oder körnig rauh erscheint. Die Sammlungen der technischen Reichsversuchsanstalt gaben mir Gelegenheit auch die Bruchflächen von zerrissenen Metallstäben zu studieren. Dehnbare Metalle wie Schmiedeeisen zeigen insofern eine Abweichung von den spröden Materialien, als der auf Zug geprüfte Stab vor dem Zerreißen an der spätern Bruchstelle etwas ausgezogen wird, also eine Verminderung des Durchmessers erfährt. Die endliche Bruchfläche ist auch dort eine senkrecht zur Längsachse des Stabes liegende Ebene von körniger Fläche. Die spröden Metalle, z. B. Gusseisen, zeigen ein ähnliches Verhalten wie etwa eine Siegellackstange; indes fanden sich in der Sammlung eine Anzahl von Gusseisenstäben, deren Bruchflächen eine als Trichterbildung bezeichnete Unregelmässigkeit aufwiesen. Es war an dem einen Stück eine unregelmässige flach kegelförmige Erhöhung vorhanden, der natürlich am andern Stück eine flache trichterförmige Vertiefung entsprach. Abgesehen von dieser geringen Abweichung, die nur selten vorkommt und auf einer Ungleichmässigkeit des Materials zu beruhen scheint, zeigen alle homogenen Stäbe beim Zerreißen eine ebene Bruchfläche senkrecht zur Längsachse. Homogenität vorausgesetzt müssen wir von dem Stiel der Cystolithen von *Ficus elastica* das Gleiche erwarten. Der Zug erfolgt bei dem zerreisenden Cystolithenstiel, da das Messer den Körper des Cystolithen an seinem Umfange fasst, freilich nicht ganz genau in der Richtung der Längsachse, sondern unter einem spitzen Winkel, so dass der Stiel neben dem Zug zugleich eine geringe Biegung erfährt. Dadurch kann indes keine abweichende Gestalt des Bruches herbeigeführt werden, wenn nicht die Biegungsfestigkeit des Stieles so gering ist, dass Zersplittern eintritt. Sehen wir nun, wie sich der Stiel der Cystolithen von *Ficus elastica* in Wirklichkeit verhält.

In allen Fällen, in denen ein Cystolithenstiel in der oben beschriebenen Weise zerrissen ist, zeigt das abgerissene Bruchstück an der Bruchstelle eine halbkugelige Aushöhlung, welcher an dem an der Zellwand befestigten Stück eine ebenso gestaltete Erhöhung entspricht (Taf. I. Fig. 5 u. 6). Diese Erhöhung verläuft in vielen Fällen nicht ganz bis an den äussern Rand des Stieles, sondern sie wird meist noch von einem häutigen Rande umgeben (Fig. 5); es kommt aber auch vor, dass der häutige Rand an dem abgerissenen Stielende hängen geblieben ist (Fig. 6). Man sieht, dass hier von der Ähnlichkeit der Bruchfläche des Stieles mit derjenigen eines zerrissenen homogenen Stabes nicht entfernt die Rede sein kann.

Wenn wir uns nun vergegenwärtigen, was uns vorhin die abnorm gebildeten Cystolithenstiele über den muthmasslichen Verlauf der Schichten im Stiel gelehrt haben, so werden wir eine völlig befriedigende Erklärung für die beschriebene Form der Bruchflächen gewinnen. Wir hatten gesehen, dass die Stiele der Cystolithen von *Ficus elastica* wahrscheinlich aus Schichten aufgebaut sind, welche in ihrem querlaufenden Theil uhr-glasähnlich über einander gelagert sind und ausserdem auch noch seitlich über einander hinweg verlaufen. Denken wir uns nun ein solches Gebilde, welches mit der Elasticität der Cellulosehäute ausgestattet ist, auf Zug geprüft, so werden, wenn die angewendete Kraft stark genug ist, zunächst an einer beliebigen Stelle, wo gerade die Verbindung am lockersten war, die uhrglasförmigen quer zur Längsachse des Gebildes liegenden Partien zweier Schichten auseinander weichen. Wir können jetzt von der so entstandenen Spalte an gerechnet einen äusseren und einen inneren Schichtencomplex unterscheiden. Die Längswandung des äussern Complexes wird durch den Zug eine Dehnung erfahren und dadurch wenigstens auf einer kurzen Strecke aus der Berührung mit der Längswandung des innern Complexes gelöst werden. Ist die Elasticitätsgrenze erreicht, so tritt Zerreißen der äussern Längswandung ein, und zwar braucht der Riss nicht gerade dort zu entstehen, wo die Bodenpartie des innern Lamellencomplexes gegen die Längswand hin verläuft. Je nachdem der Riss höher oder tiefer liegt, kommt der häutige Rand an dem der Zellwand aufsitzenden oder an dem freien Stück des zerrissenen Stieles zu Stande.

Wir sehen also, dass das Verhalten der Cystolithenstiele beim Zerreißen durchaus mit der Annahme einer Schichtung übereinstimmt und durch dieselbe eine vollkommen befriedigende Erklärung findet. Wäre diese Erklärung die einzige mögliche, so wäre hiermit der Beweis für das Vorhandensein der Schichtung im Stiel der Cystolithen von *Ficus elastica* vollgültig erbracht. Indes fragt es sich, ob nicht etwa aus der Lagerung der kleinsten Theile des Stieles, aus der Anordnung der Micellarreihen die Form der Bruchfläche beim Zerreißen resultiren könnte. Diese Frage hat ihre volle Berechtigung. Wenn man aus der Spaltbarkeit eines

Krystalles nach einer bestimmten Richtung eine Schichtung parallel zu dieser Spaltungsfläche folgern wollte, so wäre das sicher gefehlt; denn viele Krystalle sind nach zwei oder drei, die Zinkblende gar nach sechs Richtungen im Raume spaltbar. Das kann nur darauf beruhen, dass in den Krystallen gleich geformte und gleich grosse Moleküle in regelmässigen Reihen angeordnet sind. In derselben Weise könnte es sehr wohl gedacht werden, dass die Micelle im Cystolithenstiel in uhrglasähnlich gekrümmten Flächen angeordnet seien, und dass die Bruchfläche beim Zerreißen des Stiels den Punkten geringerer Cohärenz zwischen den Micellarreihen folgte.

Es ist ausserordentlich schwer, wenn nicht unmöglich, über die Lagerung der kleinsten Theile eines organischen Gebildes unzweifelhaften Aufschluss zu bekommen, zumal bei cylindrischen Objekten von geringem Durchmesser, welche selten eine eindeutige Beobachtung im polarisirten Lichte zulassen. Wir können aber auch ohne die direkte Untersuchung dieses Punktes zur Entscheidung unserer Frage gelangen. Die Chromsäure hat die Eigenschaft, eine Quellung der Zellhäute hervorzurufen und den Brechungsindex derselben zu ändern, worauf es jedenfalls beruht, dass sie zur Sichtbarmachung des histologischen Aufbaues vegetabilischer Membranen so vorzügliche Dienste leistet. Das Reagens versagt auch in unserm Falle seine Wirkung nicht. Zum Versuche wählt man am besten solche Stiele aus jungen *Ficus*blättern, welche eben die ersten optisch differenten Schichten an ihrem Ende zeigen. Legt man Blattquerschnitte, die solche Cystolithenstiele enthalten, für einige Minuten in Chromsäure, wäscht mit Wasser aus und untersucht in Glycerin, so sieht man schon bei verhältnissmässig geringer Vergrösserung, dass der Stiel in eine sehr grosse Anzahl von Schichten aufgelöst ist. Bei Anwendung einer guten Immersion zeigt sich, dass die Schichten in dem querverlaufenden Theile eine gewisse annähernd gleiche Dicke haben; in ihrem Längsverlaufe sind sie wegen ihrer Zartheit nicht einzeln zu verfolgen. Wir dürfen aber aus der Bildung des häutigen Randes an den Bruchflächen zerrissener Stiele mit einiger Sicherheit folgern, dass auch im Längsverlaufe die zarten Schichten nicht völlig mit einander verschmolzen sind.

Wollte man gegenüber diesem Befunde den vorhin erhobenen Einwurf auch jetzt noch wieder aufnehmen und auch das durch die Einwirkung der Säure erzeugte Bild auf die Lagerung der Micelle zurückführen, so müsste man, da ja die sichtbar gemachten Schichten in ihrem Querverlauf eine gewisse messbare annähernd gleiche Dicke zeigen, annehmen, dass immer eine ganze Anzahl benachbarter Micellarreihen sich gegen das Reagens gleichverhalten. Solche sich gleichverhaltende Complexe von benachbarten Micellarreihen sind aber eben nichts anderes als Schichten.

Wir wollen nun kurz den bis hierher zurückgelegten Weg noch einmal überschauen. Da die Angaben älterer Autoren über die Sichtbarkeit

einer Schichtung in den Cystolithenstielen bei *Ficus elastica* in direktem Widerspruch mit einander stehen, so war es nicht möglich, aus der unmittelbaren Beobachtung an normalen Stielen einen allgemeingültigen Schluss über die Struktur der Gebilde abzuleiten. Die Betrachtung einiger abnormer Stielformen zeigte, dass wenigstens diese abnormen Bildungen aus Schichten zusammengesetzt sind. Da in einigen Fällen die deutlich geschichteten Stieltheile allmählich in die homogen erscheinenden übergingen, so wurde es wahrscheinlich, dass auch die letzteren und ebenso auch alle normalen Cystolithenstiele eine lamellöse Struktur haben. Die beim Zerreißen entstehende regelmässige Bruchfläche der normalen Stiele liess dasselbe schliessen; es blieb indes noch unentschieden, ob nicht etwa die Form der Bruchfläche nur durch die Anordnung der kleinsten Theilchen in dem übrigens homogenen Stiele bedingt sei. Durch das Verhalten der Cystolithenstiele bei der Einwirkung von Chlorsäure aber wurde auch dieser Zweifel heseitigt, so dass wir zu dem Schluss gelangen: Die Stiele der Cystolithen von *Ficus elastica* sind aus kappenförmigen Membranlamellen aufgebaut, welche auch seitlich über einander hinweg verlaufen.

b) Natur der radialen Stränge im Körper der Cystolithen.

Wir kommen jetzt zur Erörterung der zweiten für unsere Betrachtung wichtigen Frage, über welche unter den früheren Autoren verschiedene Ansichten herrschen. Es handelt sich dabei um die Natur der radialen Stränge, welche den Körper der Cystolithen von seinem Innern bis zu der Spitze jeder Papille durchziehen. Vergewärtigen wir uns kurz, welche Ansichten bisher über diesen Punkt geäußert worden sind. Von den älteren Autoren, welche die radialen Stränge erwähnen, hat nur Payen ¹⁾ eine Meinung über die Bedeutung derselben ausgesprochen. Er bildet ein Bruchstück eines Cystolithenkörpers ab, auf welchem eine ganze Anzahl der radialen Stränge im Querschnitt sichtbar ist und erklärt diese für die Lumina der kleinen kalkerfüllten Zellen, aus denen nach seiner Auffassung der ganze Körper des Cystolithen zusammengesetzt ist. Offenbar müssen ihm diese Querschnittsbilder als Hohlräume respective als kalkerfüllte Räume erschienen sein. Schacht ²⁾ giebt an, dass die strahlenförmige Zeichnung im Innern der Cystolithenkörper bei der Entfernung der Kalksalze nicht verschwindet, und also den Zellstoffschichten selbst angehören müsse. Über die Ursache der Erscheinung weiss er nichts anzugeben. In neuerer Zeit hat Kny ³⁾ eine Behauptung über die Natur der Stränge aufgestellt. Er sieht im direkten Gegensatz zu Payen die radialen Stränge als substanzreiche Zellstoffbalken an, die den Cystolithenkörper durchziehen und für denselben gewissermassen ein festes Grundgerüst bilden. Kny stützt seine

1) Mém. prés. p. div. savants 1846 t. IX. p. 77. — 2) a. a. O. — 3) a. a. O.

Ansicht auf die Erscheinung, dass sich die Stränge mit Chlorzinkjod stärker färben als ihre Umgebung. Richter¹⁾ glaubt beweisen zu können, dass Kny's Ansicht irrig sei, da die radialen Stränge durch Kochen der Cystolithen in Kalilauge verschwinden. Aus diesem Verhalten ist Richter geneigt zu schliessen, dass es sich hier um ein Abwechseln von wasserreichen und wasserarmen Partien handelt. Dieser Meinung schliesst sich auch Penzig²⁾ an.

Man sieht, es sind bisher lediglich Vermuthungen über die Natur der radialen Stränge geäussert worden, die durch einige Experimente mehr oder weniger wahrscheinlich gemacht wurden. Wenn die Stränge sich mit Chlorzinkjod stärker färben, so ist damit zunächst nur gezeigt, dass dort Cellulose in anderer Anordnung und Vertheilung vorhanden ist, dass aber die Cellulose dort continuirliche, massive Stützbalken bildet, geht daraus keineswegs hervor und erscheint äusserst problematisch, wenn man bedenkt, dass die radialen Stränge sehr häufig im optischen Durchschnitt der Cystolithen perlschnurartig, wie aus einzelnen knopfigen Anschwellungen bestehend erscheinen. Ebenso wenig vermag das Richter'sche Experiment, das Kochen in Kalilauge, die daraufhin geäusserte Meinung genügend zu stützen, da ja bei der erwähnten Manipulation noch andere Veränderungen in dem pflanzlichen Gebilde veranlasst werden, als nur ein Ausgleich der Wasservertheilung innerhalb der Cellulose. Payen, der lediglich aus direkter anatomischer Beobachtung seinen Schluss über das Wesen der Stränge ableitete, musste nothwendig zu einer falschen Deutung des Beobachteten kommen, da seine ganze Auffassung von der Beschaffenheit des Cystolithenkörpers irrig war und für seine Schlussfolgerung falsche Voraussetzungen ergab. Fast könnte es scheinen, als ob Payens Beobachtung eine Stütze für die von Richter aufgestellte Meinung abgeben könnte. Die von ihm als Zelllumen gedeuteten Stellen des Bruchstückes wären die von Richter angenommenen wasserreichen also substanzarmen Partien, die bei ihrem geringen Durchmesser im Gegensatz zu ihrer Umgebung im mikroskopischen Bilde des Querschnittes sehr wohl den Eindruck eines Hohlraums hervorrufen könnten. Damit ist aber wiederum die von Kny beobachtete Thatsache unvereinbar, dass gerade diese Stränge sich mit Chlorzinkjod intensiver färben als alles Übrige. Wir müssen uns an das Objekt selber halten, um Aufschluss zu bekommen. Was aus dem Studium der optischen Durchschnitte von Cystolithen gefolgert werden konnte, das ist sicher auch den früheren Autoren bekannt gewesen und hat eben nicht zu einer einheitlichen Deutung der Erscheinung geführt. Bei der Untersuchung handelte es sich also darum, die Cystolithen zu zerlegen, so dass eine nähere Prüfung der Erscheinung vorgenommen werden konnte.

1) a. a. O. — 2) Bot. Centralbl. 1881. No. 52.

Es ist ein äusserst seltener Fall, dass beim Schneiden des Blattgewebes von *Ficus elastica* ein Cystolith angeschnitten wird, da meistens, wenn ein Cystolith vom Messer gefasst wird, wie wir gesehen haben, der Stiel den nöthigen Zug nicht auszuhalten vermag und zerreisst. Das Zerdrücken der Cystolithen unter dem Deckglase ist ebenso eine wenig zuverlässige Methode, um günstige Präparate zu bekommen. Der gewöhnliche Fall dabei ist, dass alles zerquetscht wird, oder dass die eventuell vorhandenen grösseren Bruchstücke in dem gleichfalls zerquetschten umgebenden Zellgewebe verschwinden. Nach verschiedenen vergeblichen Versuchen gelang es mir endlich, eine Methode aufzufinden, die es ermöglicht, die Cystolithen in beliebiger Richtung zu schneiden und die Schnitte der Beobachtung zugänglich zu machen.

Von dem *Ficus*blatte — es war meist frisches Material, das ich bei dieser Untersuchung benutzte, — wurde zunächst mit dem Rasiermesser die oberste Schicht der Epidesmiszellen abgeschält und darauf ein Flächenschnitt von dem freigelegten Gewebe hergestellt, so dick, dass ausser den innern Schichten der mächtigen Epidermis auch noch etwas von dem Pallisadenparenchym mit gefasst war. Solcher Schnitte wurden eine Anzahl neben und übereinander in der gewöhnlichen Weise auf Hollundermark in Gummi arabicum eingebettet, dem einige Tropfen Glycerin zugesetzt waren. Nachdem das Einbettungsmittel genügend fest geworden war, wurden sehr zarte Querschnitte angefertigt und zunächst im Wassertropfen unter Deckglas untersucht. Es ist klar, welche Vortheile das geschilderte Verfahren bietet. Durch das Abschälen der oberen Zellschicht der Epidermis werden die Zellen der Cystolithen geöffnet. Hebt man nun das die Cystolithen enthaltende Gewebe ab und bringt es in die Gummilösung, so dringt die Flüssigkeit in die grossen Zellen ein und klebt erhärtend die Cystolithen in dem Gewebe fest, so dass sie vor dem Messer nicht ausweichen können.

Fast in jedem auf diese Weise hergestellten Präparat fand sich eine Anzahl Theilstücke oder Schnitte von Cystolithen, deren Schnittflächen für die Untersuchung verwendbar waren. Lag ein abgeschnittenes Stück eines Cystolithen, was aus leicht erkennbarem Grunde sehr häufig der Fall war, auf der Schnittfläche, so war es leicht, das Theilstück durch Verschieben des Deckglases umzudrehen, da das wieder gelöste Einbettungsmedium den Tropfen ein wenig zähflüssig machte. Zunächst sah man auf den Schnittflächen den Verlauf der Schichtung nur hin und wieder schwach angedeutet. Nachdem aber das Präparat einige Minuten in dem Tropfen gelegen hatte, traten die Kontaktlinien deutlich hervor, und man konnte jede einzelne Lamelle scharf erkennen. Diese Veränderung der Schnitte beruht auf dem langsamen Einwirken einer schwachen Säure. Es wird nöthig sein, auf diese Erscheinung später noch einmal zurückzukommen. Sobald das Bild die nöthige Schärfe erlangt hatte, wurde,

um weiterer Veränderung möglichst vorzubeugen, ein Tropfen Ammoniak und um zu schnelles Austrocknen zu verhüten, ein wenig Glycerin am Deckglasrande zugesetzt. So behandelt hielten die Präparate sich mehrere Tage hindurch. Wirkliche Dauerpräparate von wohl gelungenen Schnitten herzustellen, ist mir trotz vieler Versuche nicht gelungen. Stets traten in dem Präparate nachträgliche Veränderungen ein, die es werthlos machten.

Wenden wir uns jetzt zur Betrachtung der Quer- und Längsschnitte von radialen Strängen. Quergeschnittene Stränge sind fast auf jeder Schnittfläche zu finden, wenn dieselbe nicht zufällig genau median durch den Körper des Cystolithen hindurchgeht. Die Querschnittsbilder der Stränge sind kreisrund. Hinsichtlich ihrer substantziellen Zusammensetzung zeigen dieselben auffallender Weise nicht überall die gleiche Beschaffenheit. In einer Reihe von Fällen sieht man den centralen Theil der Stränge von einer dichten Substanz gebildet (Taf. I. Fig. 8 b), in andern Fällen ist die innerste Partie entsprechend der schon von Payen gemachten Beobachtung ein Hohlraum (Taf. I. Fig. 8 a). Wir müssen die Erklärung dieses Umstandes noch ein wenig verschieben, um erst über die Struktur der Stränge Aufschluss zu suchen. Da, wie die Betrachtung der optischen Durchschnitte lehrt, die Stränge senkrecht zum Verlauf der Schichten den Cystolithenkörper durchsetzen so wäre eigentlich zu erwarten, dass ein direkt rechtwinklig durchschnittener Strang eine einfache kreisförmige Figur in der parallel zu ihrer Oberfläche getroffenen Schicht darstellte. Das ist nun aber nicht der Fall. Das Bild zeigt mehrere concentrische Kreise (Taf. I. Fig. 8 a u. b). Man könnte aus der Vergleichung der Querschnittsbilder und der Erscheinung der Stränge im optischen Durchschnitt geneigt sein zu folgern, die Stränge seien massive oder hohle Cylinder, die aus concentrischen Lamellen zusammengesetzt sind. Die Betrachtung der Längsschnitte lehrt etwas anderes.

Die Längsschnitte der radialen Stränge sind auf Schnitten durch den Cystolithenkörper äusserst selten zu finden. Es mag das in der Consistenz der Stränge liegen, welche vielleicht das Messer beim Schneiden parallel zur Längsrichtung abgleiten lässt; und so wird es kommen, dass die Schnittflächen sehr häufig in der Nähe solcher Stränge parallel zu deren Richtung verlaufen. Falls der Schnitt nur der Oberfläche des Stranges nahe genug kommt, geben auch solche Bilder einige Anhaltspunkte für die Deutung (Taf. I. Fig. 3 c). Man sieht nämlich, dass die Schichten des Cystolithen an der Stelle, wo sie von dem radialen Strang durchdrungen werden, nicht continuirlich in der vorhin eingeschlagenen Richtung verlaufen, sondern an dem Strang ein wenig trichterförmig nach dem Innern des Cystolithen zu eingezogen erscheinen. Noch deutlicher zeigten das allerdings die wenigen Fälle, in denen ein Strang wirklich median aufgeschnitten war (Taf. I. Fig. 9). Im Innern des Cystolithenkörpers ist rings um die Stränge jede Schicht kraterförmig eingesenkt, so dass sie dieselben auf eine kurze Strecke über-

kleidet. Nun erklärt sich leicht der Umstand, dass auf den Querschnittsbildern der radialen Stränge der hohle oder massive Mittelraum von concentrischen Schichten umgeben ist; die letzteren sind die quergeschnittenen kraterförmigen Partien der nächstäusseren Membranlamellen.

Wir müssen jetzt der Frage näher treten: Wie kommt es, dass die radialen Stränge bisweilen einen massiven Kern haben, bisweilen einen deutlichen centralen Hohlraum zeigen? Sehen wir zunächst, welche Beschaffenheit der bisweilen vorhandene dichtere axile Theil der Stränge besitzt. Aus dem Umstande, dass das schneidende Messer so leicht an der Oberfläche der Stränge dahin gleitet, während es schwer hält, den Strang selber der Länge nach zu spalten, hatten wir oben die Vermuthung geschöpft, dass der axile Theil der Streifen härter sein möge als die umgebende Cellulose. Damit stimmt es sehr schön überein, dass in den Fällen, in denen das Messer den Strang wirklich median getroffen hatte, immer ein Hohlraum die mittlere Partie des Stranges einnahm; mag man nun annehmen, dass hier überhaupt kein harter Innentheil vorhanden war, oder dass derselbe infolge seiner Sprödigkeit von dem Messer beim Schneiden herausgesprengt worden ist. Wenn aber wirklich die innere Partie eine andere Beschaffenheit hat als die Cellulose, so liegt der Gedanke nahe, dass sie aus dem Material besteht, welches ausser der Cellulose noch in Menge in dem Cystolithen vorhanden ist, aus kohlensaurem Kalk. Sehen wir, ob diese Vermuthung begründet ist.

Wir müssen uns zuerst darüber Klarheit verschaffen, in welcher Weise überhaupt der Kalk in dem Cystolithenkörper vertheilt ist. Wenn man von Payen absehen will, der den Cystolithenkörper für ein Gewebe kleiner kalkerfüllter Zellen hält, und von Schleiden, der die Papillen auf dem Cystolithen für Kalkkrystalle erklärt, so findet man bei den früheren Autoren zwei Ansichten vorzugsweise vertreten. Nach der einen ist der kohlensaure Kalk zwischen die Cellulosemicelle in den einzelnen Lamellen molekular eingelagert, nach der andern befindet sich der Kalk, sei es in Krystallform, wie Hofmeister ¹⁾ will, sei es amorph, zwischen den einzelnen Cellulosehäuten des Cystolithen angesammelt. Keine dieser Ansichten ist meiner Meinung nach im Stande, die Erscheinungen zu erklären, welche beim Einwirken von Säuren auf Cystolithen, besonders auf Schnittflächen derselben zu beobachten sind.

Wir haben vorhin gesehen, dass, wenn man Schnitte von Cystolithen, die nach der oben beschriebenen Methode hergestellt sind, in Wasser untersucht, die Schnittfläche zunächst ziemlich gleichmässig gelblich getönt erscheint; nur hin und wieder glaubt man die Andeutung einer Linie zu erkennen. Nach wenigen Minuten hat sich die Sache vollständig geändert. Die Lamellen treten gelblich gefärbt deutlich hervor, während die Kontakt-

1) Lehre von der Pflanzenzelle 1867. p. 180.

linien zwischen ihnen als schwarze Streifen erscheinen. Überlässt man nun den Schnitt sich selber, ohne der weiteren Veränderung durch Zusatz von Ammoniak vorzubeugen, so sieht man im Lauf weniger Stunden den Schnitt völlig glasartig durchsichtig werden, so dass sowohl die Schichtung als die radiale Zeichnung kaum noch undeutlich zu erkennen sind. Dabei bemerkt man deutlich, dass die Veränderung vom Umfange des Objektes ausgeht und allmählich weiter nach innen vordringt. Dasselbe Schauspiel mit gleichem Ausgange kann man im Verlauf weniger Sekunden beobachten, wenn man gleich anfangs den Tropfen, in welchem der Schnitt liegt, etwas Essigsäure zusetzt vorausgesetzt, dass nicht stürmische Gasentwicklung die Beobachtung stört. Es ist also klar, dass die Veränderung, die der Schnitt erleidet auf Entziehung des Kalkes beruht, fraglich bleibt nur, durch welches Mittel im ersteren Falle die Entkalkung herbeigeführt wird. Da Zusatz von Ammoniak zum Tropfen den Prozess für einige Tage sistirt, so ergibt sich, dass auch dort irgend eine Säure wirksam ist. Dieselbe muss aber sehr verdünnt sein, da ihre Wirkung ausserordentlich viel langsamer ist als die der geringsten dem Tropfen beigefügten Menge irgend einer Säure. Woher die Säure in dem Präparate stammt, das kann unerörtert bleiben; vielleicht kommt sie aus dem Gewebe des *Ficus*blattes, vielleicht aus dem Einbettungsmittel.

Wie erklärt sich nun die Erscheinung, dass auf Schnittflächen die Einwirkung dieser verdünnten Säure zuerst die Kontaktlinien deutlich hervortreten lässt? Die Säure hat offenbar zunächst den frei zwischen den Lamellen liegenden Kalk aufgelöst und dadurch einen optischen Unterschied zwischen den gelblich gefärbten Schichten und den nunmehr substanzfreien, dunkel oder röthlich erscheinenden Spalten hervorgerufen. Die Lamellen selber sind aber keineswegs kalkfrei; schon ihre gelbliche Färbung lässt auf das Vorhandensein einer Einlagerung schliessen. Der zwischen den Cellulosemicellen eingelagerte Kalk in den Membranen ist der Säure schwerer zugänglich und wird also langsamer aufgelöst; dass er aber vorhanden ist und endlich auch angegriffen wird, ist durch die Thatsache bewiesen, dass nach einigen Tagen die gelbliche Färbung der Lamellen verschwunden und der ganze Schnitt fast glasartig durchsichtig geworden ist. Wir kommen also zu der Ansicht, dass der kohlensaure Kalk sowohl an die Cellulose gebunden als auch frei zwischen den Kontaktflächen vorkommt. Die vorhin geäusserte Vernuthung, dass auch die radialen Stränge in ihrem centralen Hohlraum Kalk enthalten, gewinnt dadurch an Wahrscheinlichkeit. Zur Gewissheit wird dieselbe durch eine Beobachtung, die sicher und wiederholt an den Schnitten von Cystolithen gemacht wurde. Zu einem Schnitt, der auf seiner Fläche eine Anzahl von Querschnitten radialer Stränge zeigte, wurde Chlorzinkjod zugesetzt. Die darin enthaltene geringe Menge freier Säure wirkte vom Rande aus langsam ein und entzog dem Schnitt seinen Kalk. Das allmähliche Fort-

schreiten der Einwirkung konnte deutlich beobachtet werden. Wenn nun die stetig weiterrückende Grenze zwischen dem entkalkten und dem kalkhaltigen Theil des Schnittes an einen Strangquerschnitt heranrückte, so blieb dieselbe nicht geradlinig, wie es hätte geschehen müssen, wenn dort Kalk und Cellulose in gleicher Weise vertheilt waren wie an den andern Punkten; ihr Fortschreiten erlitt auch nicht etwa an dem Querschnitt eine Verzögerung, wie es zu erwarten war, wenn sich dort ein mit Kalk durchsetzter dichter Cellulosebalken befand: vielmehr schritt die Einwirkung der Säure über den Strangquerschnitt deutlich viel schneller fort als an den andern Stellen, so dass in der Grenze zwischen kalkfreiem und kalkhaltigem Theil eine Einbuchtung nach dem Schnittinnern zu entstand (Taf. I. Fig. 7). Dies Verhalten zeigt deutlich, dass die Säure dort nicht wie in der Umgebung erst die Cellulose zu durchtränken brauchte, um den Kalk zu lösen, dass dort freier Kalk vorhanden war, der leicht gelöst dem Vordringen der Säure geringeren Widerstand entgegensetzte als die Celluloseschichten. Die einander widersprechenden Querschnittsbilder, welche bald die Stränge innen hohl, bald massiv zeigten, sind jetzt leicht zu erklären, wenn man annimmt, dass im ersteren Falle vom Messer beim Schneiden ein Endchen der spröden Kalkmasse herausgesprengt worden ist, während im anderen Falle der Kalk noch vorhanden ist und sich als massiven Inhalt darstellt.

Wir können das nunmehr über die Natur der radialen Stränge gewonnene Resultat in den Satz zusammenfassen: Die radialen Stränge im Körper der Cystolithen von *Ficus elastica* sind sehr enge, cylindrische, kalkerfüllte Hohlräume, welche die Lamellen rechtwinklig zu ihrem Verlauf durchsetzen, doch in der Weise, dass jede Lamelle um die Stränge ein wenig kraterförmig nach innen herabgezogen ist und dieselben so auf eine kurze Strecke umkleidet. Als Einschränkung müssen wir hinzufügen, dass die kraterförmige Einsenkung der Lamellen um die Hohlräume in den Papillen und äussersten Schichten junger noch nicht ausgewachsener Cystolithen nicht ausgeprägt vorhanden ist, ein Umstand, der für die spätere Betrachtung seine Bedeutung hat.

Sehen wir nun, ob die von den älteren Autoren über die radialen Stränge gesammelten Erfahrungen mit unserm Resultat in Einklang stehen. Dass Payen den Strangquerschnitt für einen kalkerfüllten Hohlraum angesehen hat, wurde schon erwähnt und ergiebt eine neue Stütze für unsern Befund. Schachts Ansicht, dass die radialen Stränge dem Cellulosekörper angehören, ist nur theilweise bestätigt. Beim Entziehen des Kalkes verschwindet der Kern der Stränge, die trichterförmigen Einsenkungen der Lamellen, welche den centralen Hohlraum umkleiden, bleiben im optischen Durchschnitt des Cystolithen als radiale Stränge sichtbar. Knys Färbeversuch lässt sich ungezwungen erklären. Die um den Hohlraum

verhältnissmässig dichten und kraterförmig herabgezogenen Partien der Membranlamellen bilden um denselben einen continuirlichen Cellulosemantel, welcher den Farbstoff speichert. Richters Versuch, bei welchem durch längeres Kochen in Kalilauge die radialen Stränge im Cystolithen verschwinden, widerspricht gleichfalls unserm Resultate nicht. Durch die Manipulation wird der Cellulose nach Entziehung des Kalkes viel Wasser zugeführt und also starke Quellung hervorgerufen; dass solche Quellung im Stande ist einen Hohlraum, etwa einen Porus in einer Membran der Sichtbarkeit zu entziehen, ist nicht zu leugnen. Sieht man doch auf Holzelementen, welche in Schulze'scher Mischung macerirt sind, die Tüpfelkanäle auch nur in den wenigsten Fällen, und Kabsch¹⁾ schreibt in seinen Untersuchungen über die chemische Beschaffenheit der Pflanzengewebe, wo er von der Quellung von Holzgeweben in Chromsäure handelt, ausdrücklich: »Die Porenkanäle werden dabei immer kleiner und verschwinden endlich ganz«.

Uebrigens bietet das von uns gefundene Resultat, nach welchem die radialen Stränge der Cystolithen von *Ficus elastica* mit Kalk erfüllte Kanäle sind, durchaus nichts neues und im Pflanzenreich unerhörtes dar. Richter²⁾ stellt den Cystolithen der *Urticineen*, bei denen nach seiner Ansicht die radialen Stränge auf einem Unterschied in der Wasservertheilung beruhen, diejenigen der *Acanthaceen* und der *Pilea*-, *Elatostemma*- und *Myriocarpa*-Arten als eine zweite Gruppe gegenüber, und führt aus, dass bei den letzteren statt der radialen Stränge radial angeordnete Hohlräume vorhanden sind, welche kohlensauren Kalk enthalten.

Aus der Analogie kann nichts neues bewiesen werden, aber ein einmal Bewiesenes gewinnt sicher an Bedeutung, wenn sich zeigt, dass es mit ähnlichen, bekannten Erscheinungen übereinstimmt, und sich zwangslos in den Kreis des als feststehend Anerkannten einreihet.

IV. Untersuchungen über das Wachsthum der Cystolithen von *Ficus elastica*.

a) Entstehung der Schichtung.

Nachdem wir in den vorhergehenden Abschnitten den Boden für die weiteren Untersuchungen geebnet haben, können wir an die Erörterung der Hauptfrage gehen: Was lehren uns die anatomischen Befunde über die Entstehung und das Wachsthum der Cystolithen? Der springende Punkt wird dabei zuerst die Frage nach der Entstehung der Schichtung sein.

Im Allgemeinen kann man sich die Schichtung eines vegetabilischen Körpers auf zwei verschiedene Weisen entstanden denken; entweder

1) Pringsheims Jahrb. III. p. 390. — 2) a. a. O.

können die Schichten durch innere Differenzirung hervorgebracht worden sein, oder sie sind Neubildungen, welche successive von aussen her aufgelagert worden sind. Um zu entscheiden, welcher Fall bei unserm Objekt zutrifft, müssen wir die verschiedenen Entstehungsweisen näher ins Auge fassen.

Wenn bei einem vegetabilischen Körper eine innere Differenzirung zur Ausbildung der Schichten geführt hat, so muss der Körper seine endliche Grösse durch Wachsthum, entweder Intussusception oder Apposition, erreicht haben. Dass bei einem ausgiebigen Intussusceptionswachsthum frei ausdehnbarer Gebilde Spannungen und infolge derselben Spaltung und Schichtenbildung eintreten müssen, hat Nägeli¹⁾ gezeigt. Bei einem Wachsthum durch Apposition kleinster Theilchen kann eine Schichtung nicht direkt entstehen, immerhin aber könnten sekundäre Vorgänge, Quellung oder Auslaugung, nachträglich eine Schichtenbildung hervorrufen. Da nun die Cystolithen von *Ficus elastica* in allen Entwicklungsstadien bis in die äussersten Lagen geschichtet sind, die Schichtenbildung also mit der Grössenzunahme des Objectes gleichen Schritt hält, so ist an eine nachträgliche Ausbildung der Schichten durch Quellung oder Auslaugung nicht zu denken; wir können diesen Fall daher bei der weiteren Betrachtung ausser Acht lassen. Wir haben also nunmehr nur noch zwei Möglichkeiten einander gegenüber zu stellen: Entweder entsteht die Schichtung in den Cystolithen von *Ficus elastica* durch die Spaltungen und die Substanzeinlagerung, welche gemäss den von Nägeli gefundenen Gesetzen das Intussusceptionswachsthum begleiten, oder die Schichten, aus welchen die Cystolithen bestehen, sind successive vom Plasma aus aufgelagerte Membranlamellen. Wir können den Gegensatz auch so aussprechen: Die Cystolithen von *Ficus elastica* sind entweder einheitliche Cellulosekörper, welche lediglich durch Intussusceptionswachsthum aus der ursprünglichen Anlage hervorgegangen und dabei innerlich differenzirt worden sind, oder sie stellen Complexe von Neubildungen dar, deren einzelne hautähnliche Elemente nach einander vom Plasma angelegt worden sind, wobei es zunächst dahin gestellt bleibt, ob etwa die einzelnen Lamellen nach ihrer Anlage noch ein Wachsthum erfahren oder nicht.

Es fragt sich, ob aus der Beschaffenheit einer Schichtung überhaupt mit Sicherheit ersehen werden kann, ob dieselbe durch Auflagerung neuer Lamellen vom Plasma aus, oder durch Intussusception entstanden ist; ob charakteristische Unterschiede zwischen den auf verschiedenen Wegen entstandenen Schichtungen existiren. In seiner Arbeit über Struktur und Wachsthum vegetabilischer Zellhäute ist es Krabbe gelungen, an den benachbarten Verdickungsschichten der Zellwände in den Bastzellen von *Nerium* gewisse Verschiedenheiten im molekularen Aufbau nachzuweisen,

1) Stärkekörner — pag. 309 flgde.

welche einen direkten Schluss auf die Entstehungsweise der Schichtung zulassen. Solche sicheren Merkmale habe ich bei den Schichten der Cystolithen trotz sorgfältigen Suchens nicht entdecken können, wir müssen uns deshalb nach allgemeineren Anzeichen umsehen.

Über die Natur der durch Intussusception entstandenen Schichtung können wir uns bei Nägeli eingehend unterrichten. Mit sicheren Schritten von Punkt zu Punkt vorwärtsgehend hat Nägeli die molekularen Vorgänge beim Wachstum der Stärkekörner theoretisch erschlossen und darauf die Theorie der Intussusception begründet. Aus seiner Darstellung geht ohne Zweifel hervor, dass in einem durch Intussusception wachsenden, frei dehnbaren Gebilde die Schichtung dadurch zu Stande kommt, dass weichere Schichten im Innern der vorhandenen dichteren ausgebildet werden. Die Schichten in einem solchen Körper müssen also von verschiedener Dichtigkeit sein. Ferner muss auch die Dicke der einzelnen Schichten verschieden sein. Da nämlich in dem wachsenden Körper die Spannungen in der Nähe des organischen Mittelpunktes am grössten sind wegen der Kleinheit des Krümmungsradius der Schichten, so müssen sich dort die weichen Schichten am mächtigsten ausbilden, und da ausserdem die zur Schichtenbildung führenden Spaltungen von einander in gewissem Grade unabhängig vor sich gehen, so werden in dem durch Intussusception wachsenden Gebilde gleichzeitig neben soeben gespaltenen Schichten auch solche vorhanden sein, denen die Spaltung kurz bevorsteht, deren Dicke also etwa das Doppelte beträgt. Wenn also die Cystolithen von *Ficus elastica* durch die Intussusception aus der ursprünglichen Anlage hervorgegangen wären, so müssten wir erwarten, dass die Schichten, aus welchen dieselben bestehen, abwechselnd weich und dicht seien, dass die weichen Schichten im Innern der Cystolithen viel dicker seien als nach dem Rande zu, und dass auch sonst in der relativen Dicke der Schichten beträchtliche Unterschiede vorhanden seien.

Wir haben zunächst die Frage zu entscheiden: Beruht die Schichtung der Cystolithen von *Ficus elastica* auf dem Abwechseln weicher und dichter Schichten, oder sind die Schichten gleichartig? Die meisten früheren Autoren sind der Ansicht, dass die Cystolithen von *Ficus elastica* aus abwechselnden wasserarmen und wasserreichen Schichten aufgebaut sind; ich bin besonders durch das Studium der Querschnitte durch Cystolithen zu dem Resultate gekommen, dass die Schichten nicht substantiell verschieden sind. Schichten von verschiedener Dichtigkeit müssten optisch verschieden wirken. Schon der Umstand, dass die Stiele, welche, wie gezeigt wurde, ebenfalls aus Celluloseschichten bestehen, in der Mehrzahl der Fälle fast völlig homogen erscheinen, lässt schliessen, dass die Schichten nicht different ausgebildet sind. Es ist in einem vorhergehenden Abschnitte gesagt worden, dass die Schnitte von Cystolithen, wenn sie gleich in Wasser untersucht werden, anfänglich auf ihrer Fläche kaum die Spur

einer Schichtung erkennen lassen; bringt man die Schnitte gleich zu Anfang schnell in Ammoniak, so erscheint die Schnittfläche gleichmässig gelb gefärbt, ohne jede Andeutung des Schichtenverlaufes, ein Verhalten, welches wohl nicht zu Stande kommen könnte, wenn ein Unterschied im Substanzreichthum der einzelnen Partieen vorhanden wäre. Sobald der Schnitt kurze Zeit der Einwirkung einer schwachen Säure ausgesetzt gewesen ist, erscheint auf der Fläche eine Zeichnung dunkler Linien, die durch Substanzlamellen von völlig gleichem Aussehen getrennt sind. Man könnte nun glauben, dass die dunklen Linien, welche ich nach ihrem Aussehen für Kontaktlinien oder Spalten erkläre, weichere Schichten seien. Dagegen spricht mit aller Entschiedenheit der Umstand, dass die dunklen Linien in ihrer Dicke hinter den zwischen ihnen liegenden Substanzlamellen weit zurückbleiben und nach dem Innern des Cystolithen zu meist zarter niemals breiter sind als weiter aussen, während doch nach Nägelis Darstellung¹⁾ die durch Intussusception entstandenen weichen Schichten schnell in die Dicke wachsen und in der Nähe des Centrum am stärksten sein müssen. Die dichten Lamellen in den Cystolithen zeigen, wenn sie rechtwinklig durchschnitten wurden, einen annähernd gleichen Durchmesser, niemals fand ich vom Schnitttrande entfernt zartere Schichten, wie sie beim Intussusceptionswachsthum auftreten müssen, wenn sich innerhalb einer weichen Schicht die mittlere Partie durch vorwiegende Ernährung zu einer dichteren Schicht umbildet. Es kann kein Zweifel sein, die Schichtung der Cystolithen von *Ficus elastica* kann nicht aus den bei der Intussusception auftretenden Spaltungen hervorgegangen sein. Die Schichten der Cystolithen von *Ficus elastica* entstehen durch successive Auflagerung neuer Lamellen.

Es erübrigt zu zeigen, dass dieses Resultat geeignet ist, für die anatomischen Befunde an den Cystolithen hinreichende Erklärungen zu geben. Im Innern der in einem frühern Abschnitt schon beschriebenen abnorm verdickten Cystolithen (Taf. I. Fig. 2) ist ein fester, scheinbar nicht mehr geschichteter Kern sichtbar, der nach Form und Aussehen ganz einem jungen Cystolithenstiel gleicht. Ueber diesem Kern liegen dann eine Anzahl von Schichten, welche sich zunächst seinem äussern Umriss anschmiegen, weiter nach aussen zu aber alle Vorsprünge und Unregelmässigkeiten des Kernes ausgleichen und mehr und mehr verschwinden lassen. Dieses Verhalten zeigten alle Fälle, in denen eine ähnliche Stielverdickung vorlag. Es scheint mir auch abgesehen von der vorausgehenden Beweisführung nicht zweifelhaft, wo in diesen Fällen die jüngste Schicht zu suchen sei. Wollte man annehmen, dass der jugendliche Stiel vom Zeitpunkte der die Abnormität veranlassenden Verwundung des Blattes an durch Intussusception gewachsen sei, so wäre es überaus wunderbar, dass der äussere Umfang

1) a. a. O. p. 311.

des Stieles jetzt gar keine oder doch nur geringe Unebenheiten zeigt, während im Innern Spaltungen in der Weise erfolgt sein müssten, dass als innerer Kern ein Gebilde resultirt, welches einem jungen noch unentwickelten Cystolithenstiel aufs Haar ähnlich sieht. Gemäss den Gesetzen der Intussusception müssten der ziemlich regelmässigen Oberfläche entsprechend die Spalten und Schichten im Innern gleichmässig dem Umfange annähernd parallel verlaufen. Die Erkenntnis, dass die Cystolithen durch Auflagerung entstehen, lässt eine sehr einfache Erklärung der That-sachen zu. Der Kern repräsentirt den jungen Cystolithenstiel in dem Moment, wo die Verletzung des Blattes erfolgte. Er besteht, wie ja vorhin für alle Stiele nachgewiesen wurde, aus einzelnen Schichten, die im Querverlauf eine gewisse Dicke haben, im Längsverlauf ausserordentlich zart sind. Von der Verwundung des Blattes an wurden Schichten von durchweg gleichmässiger Dicke über das Stielchen gelagert, welche allmählich die unregelmässigen Contouren desselben nach aussen hin mehr und mehr ausglich.

Um auch an dem Verlauf der Schichtung im Körper des Cystolithen unser Resultat prüfen zu können, wenden wir uns zunächst wieder an die auf den Schnittflächen von Cystolithen gegebenen Bilder. Es ist nicht leicht, aus irgend einem beliebigen Schnitt, dessen Lage man nicht genau kennt, den Verlauf der Schichten zu construiren, da man ja aus dem Bilde der Schnittfläche nicht mit Sicherheit ersehen kann, ob eine Schicht rechtwinklig durchschnitten ist oder nicht. Wir werden am sichersten gehen, wenn wir unsere Betrachtung auf solche Schnitte beschränken, die einen Cystolithen median getroffen haben. In dem Falle sind alle Schichten annähernd rechtwinklig geschnitten, und wir können ihren räumlichen Verlauf leicht beurtheilen. Wie in den abnorm verdickten Cystolithenstielen der Kern einem jungen Stiele ähnlich war, so müssen auch die inneren Schichtencomplexe eines ausgewachsenen Cystolithen den jungen Entwicklungsstadien ähnlich sein. Bei der Vergleichung eines jungen mit den innern Schichtencomplexen eines älteren Cystolithen er-giebt sich nun ein Übelstand. Die Jugendformen sind nicht einander gleich, es zeigen sich mancherlei individuelle Verschiedenheiten, welche die Einfachheit der Erscheinung stören und zu Trugschlüssen Anlass werden können. Wir wollen deshalb unser Augenmerk, um sicher zu gehen, nur auf einen ganz allgemeinen Punkt richten.

Die jungen Cystolithen zeigen meist, sobald nur erst einige optisch differente Schichten um das Stielende vorhanden sind, Papillenbildung. Wenn nun die Cystolithen durch fortwährende Auflagerung von Schichten sich vergrössern, so müssen in alten Cystolithen die innern Schichten papillenähnliche Vorwölbungen besitzen. In der That ist das der Fall; manche Schnitte zeigen es mit grosser Deutlichkeit (Taf. I. Fig. 10). Oft sind aber die Querschnitte der Schichten im Innern nur schwach gewellt, so dass zwar

auch hier noch um jeden radialen Strang die Papillenbildung der Jugendstadien zu verfolgen ist, aber die papillösen Vorwölbungen erscheinen ihrer Form nach wesentlich anders als die Papillen junger Cystolithen. Es ist das eine Erscheinung, die noch besonderer Würdigung bedarf, wir werden im nächsten Abschnitt darauf zurückkommen. Hier genügt es, gezeigt zu haben, dass sich die Ausbildung der Papillen im Innern älterer Cystolithen zurückverfolgen lässt, dass die inneren Schichtencomplexe den früheren Entwicklungsstadien entsprechen.

Eine sichere Bestätigung dafür, dass die Schichtung durch Auflagerung neuer Lamellen vom Plasma aus zu Stande kommt, geben die Doppelcystolithen, die sich zuweilen in Blättern von ganz normalem Aussehen finden (Taf. I. Fig. 11). Es haben sich dort, durch Gabelung des Stieles hervorgerufen, zwei Centren für die Schichtenablagerung des Cystolithenkörpers gebildet, die ursprünglich getrennt neben einander bestehen; später aber, wenn dieselben durch die Umhüllung mit Schichten soviel an Ausdehnung gewonnen haben, dass sie sich berühren, so werden sie von gemeinschaftlichen Membranlamellen umkleidet.

b) Nachträgliche Veränderungen.

In den vorhergehenden Abschnitten sind uns einige Thatsachen aufgestossen, für welche wir vorläufig keine ausreichende Erklärung geben konnten. Wir haben gesehen, dass die Schichten in ausgewachsenen und im Innern von jungen Cystolithen um jeden radialen Streifen trichterförmig eingezogen sind, während diese Einsenkung sich an den äusseren Schichten junger noch wachsender Cystolithen nicht findet. Ferner hat sich gezeigt, dass die den Papillen entsprechenden Vorwölbungen der inneren Schichten auch äusserlich ganz anders geformt sind als die Papillen an der Oberfläche junger Cystolithen. Es sind das Erscheinungen, welche unzweifelhaft darauf hinweisen, dass an den vom Plasma ausgebildeten Membranlamellen nach ihrer Auflagerung noch sekundäre Veränderungen stattfinden. Es ist zu untersuchen, welcher Art diese nachträglichen Vorgänge sind.

Fassen wir zunächst die Unterschiede zwischen den jüngeren und älteren Schichten der Cystolithen näher ins Auge. Die Oberfläche der jungen Cystolithen ist zum grossen Theil mit Papillen bedeckt, welche Kuppelform haben und meist höher als breit sind. Bei oberflächlicher Betrachtung scheinen dieselben nur aus dem radialen Strang und einer äusseren Hautschicht zu bestehen, während das Innere wie ein (mit Flüssigkeit erfüllter Hohlraum sich darstellt. Bei Anwendung von Immersion erkennt man bei günstiger Beleuchtung, dass auch der Innenraum von Membranlamellen eingenommen wird, welche äusserst zart und substanzarm sind. Dieselben verlaufen quer durch die Papille; in der Nähe der Seitenwand biegen sie in die Längsrichtung ein und verschmelzen dort scheinbar mit einander zu einer stärkeren peripherischen Hautschicht,

welche bei schwacher Vergrößerung als die einzige Celluloseschicht der Papille erscheint. Um den radialen Strang behalten die zarten Schichten ihre Richtung senkrecht zu demselben bei, sie scheinen in unmittelbarer Nähe des Stranges substanzreicher und mit einander verwachsen zu sein und so eine continuirliche Umhüllung desselben zu bilden. Die den Papillen entsprechenden Vorwölbungen der älteren Schichten eines Cystolithen sind meistens nur flach, selten so hoch als breit. Alle älteren Schichten erscheinen substanzreich und haben einen annähernd gleichen Durchmesser, welcher denjenigen der zarten Schichten in jungen Papillen vielmals übertrifft. Nur ausnahmsweise ist es im Innern der Cystolithen zu beobachten, dass zwei Schichten scheinbar in eine verschmelzen, während doch in den jungen Papillen alle Schichten zu der einen Hautschicht zusammenlaufen. Endlich zeigt jede ältere Schicht in Gegensatz zu den jüngeren die kraterförmige Einziehung um die radialen Stränge.

So verschiedener Art auch die Differenzen sind, welche wir zwischen den jüngeren und älteren Schichten aufgefunden haben, es scheint mir nicht unmöglich, sie alle auf dieselbe Ursache zurückzuführen. Zunächst giebt der Umstand, dass die äusseren Schichten zart und substanzarm, die innern verhältnismässig dick und substanzreich sind, einige Aufklärung über die Natur der nachträglichen Veränderung. Es liegen offenbar nur zwei Möglichkeiten vor: Entweder haben sich von den zarten Lamellen, die in den jungen Papillen wahrnehmbar sind, nachträglich je mehrere zu einer einzigen stärkeren Schicht vereinigt, oder die einzelnen Lamellen haben eine Substanzzunahme erfahren. Beide Vorgänge könnten auch neben einander hergehen. Da von den zarten Schichten in den Papillen zu den dichteren und dickeren Schichten im Innern ein allmählicher Übergang stattfindet, so ist nicht anzunehmen, dass eine Verschmelzung der Schichten vor sich geht. Es ist also eine nachträgliche Substanzeinlagerung vorhanden. Dieselbe erklärt auch in der That alle Unterschiede, welche zwischen den älteren und jüngeren Schichten der Cystolithen bestehen.

Wir haben gesehen, dass die zarten Schichten in den Papillen nach dem Rande zu scheinbar in eine einzige Hautschicht zusammenlaufen. Offenbar liegt hier derselbe Fall vor wie bei den Schichten des Cystolithenstiels, d. h. die einzelnen feinen Schichten der Papille sind aus verschiedenen Gründen in der Randpartie optisch nicht unterscheidbar, ohne dass indessen eine wirkliche Verschmelzung stattgefunden hätte. Verdicken sich nun die einzelnen Schichten durch Substanzaufnahme, so werden die anscheinend verschmolzenen Lamellen infolge der Verbreiterung ihres Querschnittes optisch unterscheidbar. Da haben wir dann im Innern des Cystolithen continuirliche annähernd parallel zur Oberfläche verlaufende Schichten von fast gleichmässiger Dicke.

Bei der Einlagerung von Substanz in einen organisirten Körper müssen, wenn eine Grössenzunahme des Gebildes zu Stande kommen soll,

die Molekularkräfte im Innern desselben, welche den Zusammenhang des Körpers bedingen, soweit überwunden werden, dass die eingelagerte Substanz zwischen den Micellen der Grundsubstanz Raum hat. Da nun die Celluloselamellen, aus denen die Cystolithen bestehen, sowohl während ihrer Ausbildung als auch nach der Auflagerung unter dem Einfluss des hydrostatischen Druckes stehen, so ist es erklärlich, dass die Intensität der bei der Substanzeinlagerung zu überwindenden Kräfte nicht nach allen Richtungen hin dieselbe ist, dass die Micelle in tangentialer Richtung leichter auseinander gerückt werden können als in radialer. Die Beobachtung im polarisirten Licht liefert eine Bestätigung für die Annahme einer derartig heterogenen Ausbildung der Molekularstruktur in den Lamellen. Die Schichten der Cystolithen von *Ficus elastica* sind, wie sich an Schnitten leicht constatiren lässt, doppelbrechend, und zwar wird diese Wirkung der Hauptsache nach durch die Cellulose erzeugt. Wenn man bei gekreuzten Nicols dem Schnitt seinen Kalk entzieht, so ändern sich die Farben so wenig, dass sich nicht entscheiden lässt, ob lediglich eine Schwankung der Intensität vorliegt, oder ob auch eine Nüancirung der Farben stattgefunden hat. Die kleine Achse des Elasticitätselipsoids, im Sinne von Nägeli und Schwendener verstanden, liegt in Beziehung auf den Körper des Cystolithen stets radial, d. h. die Lamellen verhalten sich optisch so, als ob sie in radialer Richtung zusammengepresst wären. Entsprechend der grösseren Elasticität wird die Substanzeinlagerung in den einzelnen Schichten in tangentialer Richtung etwas grösser sein als in radialer, die Dickenzunahme bleibt im Verhältnis hinter der Flächenvergrösserung zurück. Es müssen also Spannungen entstehen ¹⁾, welche die Schichten in radialer Richtung von einander zu entfernen streben. Die Kontaktflächen der Lamellen werden sich ein wenig von einander entfernen und die so entstehenden schmalen Spalten werden sich mit der einwandernden Substanz füllen. Rings um die radialen Stränge sind die Schichten mit einander verwachsen, sie können dort dem centrifugalen Zuge nicht folgen. Es müssen also dort die trichterförmigen Einsenkungen entstehen, welche wir auf den Längsschnitten durch radiale Stränge beobachteten. Sowohl durch die Verdickung der einzelnen Lamellen und durch das Auseinanderrücken der Kontaktflächen, als auch durch die Entstehung der trichterförmigen Einsenkungen wird, wie leicht zu ersehen ist, die äussere Form der Papillen bedeutend verändert; die Vorwölbungen werden flacher und breiter, bis sie auf dem Querschnitt fast nur noch als wellige Verkrümmungen der Lamellen erscheinen.

Ich muss hier noch kurz eines Umstandes gedenken, der zu einem Missverständnisse Anlass geben könnte. In einem früheren Abschnitte ist gesagt worden, dass auf der Schnittfläche eines Cystolithen die dunkeln

1) Nägeli, Stärkekörner p. 304.

Linien zwischen den Lamellen in der Nähe des Centrum am schmalsten sind. Da bei gleichmässiger Substanzeinlagerung die Spannung der Lamellen in der Nähe des Mittelpunktes wegen der kleinen Krümmungsradien am grössten sein muss, so könnte man erwarten, dass auch die Spalten dort am weitesten klaffen. Das ist aber nicht der Fall aus dem Grunde, weil die sekundären Vergrösserungen der Lamellen nicht erst an dem ausgewachsenen Gebilde auftreten, sondern successive mit der Auflagerung neuer Lamellen fortschreiten. Mag nun anfangs die Auflagerung so schnell vor sich gehen, dass die innersten Schichten bald von der sekundären Substanzeinlagerung abgeschlossen sind, oder mag überhaupt die Menge der eingelagerten Substanz im Anfang geringer sein; die ersten Schichten werden nicht so stark verdickt und infolge dessen sind auch die Spannungen schwächer und die Spalten zwischen den Kontaktflächen nicht so weit geöffnet.

Nachdem wir gezeigt haben, dass alle Unterschiede zwischen den jungen und älteren Schichten eines Cystolithen von *Ficus elastica* folgerichtig aus der nachträglichen Vergrösserung der Lamellen durch Substanzeinlagerung erklärt werden können, wollen wir versuchen über das Wesen der Substanzeinlagerung eine Ansicht zu gewinnen. Leider lässt unser Objekt uns dabei im Stiche. Wir wissen zwar, dass die Celluloseschichten der Cystolithen nach ihrer Anlage mit kohlsaurem Kalk inkrustirt werden und dass die Menge des eingelagerten Kalkes im ausgewachsenen Cystolithen sehr beträchtlich ist; aber es ist nichts darüber bekannt, ob überhaupt durch Inkrustation eine Vergrösserung eines Cellulosekörpers herbeigeführt werden kann. Strasburger vermuthet freilich, dass in einigen Fällen durch Verkorkung Dickenzunahme einer Membran bewirkt werde, indes fehlt der Vermuthung die zureichende Begründung, da ja der Dickenzuwachs, wenn wirklich vorhanden, durch einwandernde Cellulose ohne aktive Betheiligung der Suberinsubstanz erfolgen könnte. Die theoretische Erörterung dieser Frage würde hier zu weit und vorläufig kaum zum Ziele führen, da erst sehr wenig Beobachtungsmaterial über den Gegenstand vorliegt. Ich behalte mir die eingehende Behandlung dieser Frage für eine spätere Arbeit vor.

Zum Schluss will ich noch auf eine Thatsache hinweisen, welche vielleicht später für die Beurtheilung der sekundären molekularen Vorgänge in den Cystolithen einen Anhalt geben kann. Wenn man erwachsenen Cystolithen von *Ficus elastica* den Kalk entzieht, so verlieren die Celluloselamellen sehr stark an Substanz, sie erscheinen endlich etwa ebenso substanzarm, wie die noch nicht verkalkten äussersten Schichten eines jungen Cystolithen. Form und Ausdehnung aber, welche die Lamellen durch die sekundären Veränderungen gewonnen haben, bleiben bei der Entkalkung unverändert erhalten. Daraus geht ohne Zweifel hervor, dass die Vermehrung der Dichtigkeit der Lamellen ausschliesslich oder fast aus-

schliesslich auf die Einwanderung des Kalkes zurückzuführen ist. Ob aber die Veränderung von Form und Ausdehnung der Celluloseschichten auch lediglich auf der Inkrustation beruht, oder ob etwa auch eine Intussusception von Cellulose stattfindet, das muss vor der Hand unentschieden bleiben.

V. Schluss.

Die Hauptergebnisse der vorliegenden Arbeit glaube ich in folgende Sätze zusammenfassen zu dürfen:

- 1) Der Stiel der Cystolithen von *Ficus elastica* besteht aus kappenförmigen auch seitlich übereinander verlaufenden Membranlamellen von gleicher Beschaffenheit.
- 2) Der Körper dieser Cystolithen ist aus gleichartigen annähernd concentrischen Celluloselamellen aufgebaut, in und zwischen denen kohlen-saurer Kalk eingelagert ist.
- 3) Die radialen Stränge im Körper der Cystolithen von *Ficus elastica* sind kalkerfüllte, röhrenförmige Hohlräume.
- 4) Die Schichtung in Stiel und Körper entsteht durch successive Auflagerung gleichartiger, vom Zellplasma aus gebildeter Celluloselamellen.
- 5) Die Celluloselamellen im Körper der Cystolithen von *Ficus elastica* gewinnen nach ihrer Auflagerung noch beträchtlich an Dichtigkeit und Ausdehnung. Die Vermehrung der Dichtigkeit beruht ausschliesslich oder fast ausschliesslich auf der nachträglichen Einwanderung von kohlensaurem Kalk; ob auch die Zunahme an Dicke und Fläche ebenfalls auf die Kalk-einlagerung zurückgeführt werden muss, oder ob eine Intussusception von Cellulose stattfindet, das bleibt unentschieden.

Erklärung der Figuren auf Tafel I.

Alle Figuren beziehen sich auf die Cystolithen von *Ficus elastica*.

Fig. 8 und 9 sind etwa 1200 mal, alle übrigen 650 mal vergrössert.

Fig. 1. Normaler Cystolithenstiel.

Fig. 2. Abnorm verdickter Stiel.

Fig. 3. Abnorm verlängerter Stiel.

Fig. 4. Junger Cystolith im optischen Durchschnitt.

Fig. 5 und 6. Bruchstellen zerrissener Stiele.

Fig. 7. Schnittstück eines Cystolithen bei Einwirkung von Chlorzinkjod.

Fig. 8. Partie von der Schnittfläche eines Cystolithen. Bei *a* und *b* geht der Schnitt quer durch radiale Stränge, bei *c* verläuft er oberflächlich längs eines solchen.

Fig. 9. Partie von der Schnittfläche eines Cystolithen. Längsschnitt durch einen radialen Strang.

Fig. 10. Längsschnitt durch den Körper eines erwachsenen Cystolithen.

Fig. 11. Querschnitt durch einen Doppelcystolithen.

Histochemische Untersuchungen verholzter Membranen.

Ein Beitrag zur Physiologie der Gewebe-Metamorphose

von

Robert Hegler.

(Hierzu Tafel II.)

Von chemischer sowohl als physiologischer Seite versuchte man des Oefteren der Frage über das Wesen der Verholzung pflanzlicher Gewebe näher zu treten, ohne dass es bis jetzt gelungen wäre, eine auch nur einigermaßen befriedigende Erklärung des Verholzungsprocesses zu geben.

Bei dem heutigen Stand der Frage bilden, insbesondere für den Physiologen, die histochemischen Reactionen, soweit solche bei verholzten Membranen in Betracht kommen, das wichtigste Moment, und es bedarf wohl nur dieses Hinweises, um eine kurze Wiederholung der verschiedenen, allerdings schon öfter besprochenen Reactionen zu rechtfertigen, ehe ich zu einigen neuen specifisch verschiedenen übergehe.

I. Schon Hugo v. Mohl¹⁾ hatte aus dem Ausbleiben der Cellulose-reaction mit Jod und Schwefelsäure oder Chlorzinkjod geschlossen, dass neben Cellulose noch verschiedene andere organischen Stoffe im pflanzlichen Gewebe vorkommen, welche die genannte Cellulosereaction sowie die Löslichkeit in Kupferoxydamoniak aufheben und die dann später von Payen als »inkrustirende Substanz«, als »Holzsubstanz« bezeichnet wurden. Der Nachweis eines verholzten Gewebes wurde also einerseits durch das negative Resultat der Cellulose-Reaktionen, andererseits durch Gelbfärbung mit dem aus der Praxis der Papierfabrikation herübergekommenen Kaliumhydroxyd geliefert. Da letzteres jedoch die Eigenschaft besitzt noch andere als verholzte Membranen gelb zu färben, so ist es als ein grosses Verdienst Wiesner's zu verzeichnen, in den Salzen des Anilins, Naphtalidins, Toluidins u. a., deren Eigenschaft einen Fichtenspahn gelb zu färben schon Runge und Hoffmann zur Identitätsreaktion auf dieselben benützten, und speciell im schwefelsauren Anilin vorzügliche positive Holzreagentien gefunden zu haben.

Im Jahre 1877 machte dann v. Höhnelt die interessante Beobachtung, dass sich verholzte Membranen mit Phenol und Salzsäure oder mit Kirschholzextractlösung und Salzsäure in charakteristischer Weise stark färben, und zwar in ersterem Falle blau, in letzterem rothviolett. Er bezeichnete die im Kirschholzextracte wirksame Substanz, deren

1) Bezüglich der älteren Litteratur verweise ich auf Sachsse, die Chemie und Physiologie der Farbstoffe etc., Leipzig 1877, und Behrens, Hilfsbuch z. Ausführ. Mikroskop. Untersuch., Braunschweig 1883.

chemische Identificirung ihm nicht gelang, Xylophilin. Wiederum war es Wiesner, der zeigte, dass das Xylophilin Höhnel's ein Gemenge von Phloroglucin und Brenzkatechin sei, und der dann das Phloroglucin in Verbindung mit Salzsäure als sehr empfindliches Holzreagens in die botanische Mikrochemie einführte. Ausserdem wurden dann noch im Pyrrol, Scatol¹⁾ und Indol²⁾ spezifische Holzreagentien entdeckt, die sich aber, abgesehen vom hohen Preise, ihrer leichten Zersetzlichkeit und ihres schlechten Geruchs halber nicht empfehlen. Im Orcin³⁾, Resorcin⁴⁾ und Carbazol¹⁾ fand man ebenfalls brauchbare Holzreagentien, die weiter unten vergleichend besprochen werden.

Was die Hand in Hand gehende Förderung der rein chemischen Seite⁵⁾ der Frage betrifft, so ist hier in erster Linie die Arbeit Singer's⁶⁾ zu erwähnen, der den Nachweis von Vanillin und Coniferin in der Membran als zweier constanter Begleiter verholzter Gewebe führte⁷⁾.

Mit dem Auffinden dieser beiden Stoffe in den verholzten Membranen hatte man den Schlüssel zu den verschiedenen Reactionen auf »verholzte Gewebe«, die nicht Reagentien auf das hypothetische Lignin, sondern auf die beiden oben erwähnten, constant in sämtlichen verholzten Membranen vorkommenden Verbindungen sind, und bei deren Eintreten man rückwärts auf Vorliegen eines verholzten Gewebes zu schliessen berechtigt ist.

Während meiner im vergangenen Winter im botanischen Institute zu München ausgeführten Untersuchungen über die Verholzung pflanzlicher

1) O. Mattiolo; in Zeitschrift f. wiss. Mikroskop. II. p. 354 ff.

2) Ueber Indol vgl. auch Behrens l. c. p. 290.

3) cf. A. Ihl, Ueber neue empfindliche Holzstoff- u. Cellulose-Reactionen (Chem.-Ztg. 1885 p. 266); cf. hiezu auch Zeitschrift f. wiss. Microscop. II. p. 359.

4) Wiesner in Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. 77. Jg. 1878.

5) F. Tiemann, Ber. d. Deutsch. chem. Gesellschaft Bd. VII p. 608, Bd. VIII p. 1115, 1123, 1127, 1140, Bd. IX S. 52. — F. Bente, Ber. d. d. chem. Gesellsch. Bd. VIII p. 476. — E. Fremy, in Compt. rend. Bd. 83 p. 1136. — A. Stakmann, Studien über die Zusammensetzung des Holzes. Inaug.-Diss. Dorpat. — Th. Thomsen, in Journ. f. pract. Chem., N. F., Bd. 19 S. 146—168. — E. O. v. Lippmann, Ber. d. d. chem. Ges. Bd. XVIII p. 3335; ferner Jahrg. 1883 p. 44—48. — W. Gardiner, in Proceedings Cambridge Phil. Soc., Vol. V Part II p. 87—107. — E. Bevan, Pharm. Journ. Transact. III. p. 570—573. — N. Schuppe, Beiträge zur Chemie des Holzgewebes. Inaug.-Diss. Dorpat. — Seliwanoff, in Ber. d. russ. phys.-chem. Ges. 1887 u. 1889. — R. Sachsse, Chemie u. Physiol. d. Kohlehydrate etc. Leipzig 1877. — Kabsch, in Pringsheims Jahrbüchern Bd. III.

6) Max Singer, Beiträge zur näheren Kenntniss der Holzsubstanz etc. Sitz.-Ber. d. Wiener Akad. Bd. 85.

7) In neuester Zeit hat E. Nickel in Botan. Centralbl. Bd. XXXVIII p. 753 ff. das Vorhandensein von Vanillin in der verholzten Membran bestritten. Auf die Arbeit selbst komme ich unten zu sprechen.

Gewebe fand ich im Thallin ¹⁾ ein neues specifisch eigenthümliches Reagens. Auf Grund dieser Untersuchungen, die sich neben der Beobachtung der Entstehungsart metamorphosirter Gewebe hauptsächlich auch auf vergleichende Erhebungen über die Art der Einwirkung der verschiedenen Reagentien sowohl auf verholzte Membranen, als auch auf Vanillin und Coniferin und Mischungen beider erstreckten, kam ich zu dem Resultate, dass die bekannten Reagentien sich in drei Hauptgruppen theilen lassen, und zwar

- I. in solche, die nur mit Vanillin, nicht mit Coniferin reagiren:
Thallin.
- II. in solche, die nur mit Coniferin, nicht mit Vanillin reagiren:
Phenolsalzsäure; Thymolsalzsäure.
- III. in solche, die sowohl mit Vanillin als auch mit Coniferin
Farbenreactionen liefern: sämmtliche andern Holzreagentien.

Der Umstand, dass Thallin nur mit Vanillin allein reagirt, dürfte für die entwicklungsgeschichtliche Seite der Verholzungsfrage von Bedeutung sein und ich möchte desshalb über diesen Körper sowie über die Reaction einiges vorausschicken, ehe ich zur vergleichenden Besprechung der andern Holzreactionen übergehe.

II. Thallin ²⁾ ein Holzreagens. Zum Nachweis verholzter Gewebe benutze ich eine conc. Lösung des schwefelsauren Salzes dieser Base in einer Mischung aus gleichen Theilen Alkohol und Wasser; die Schnitte werden zuerst in reinen Alkohol gebracht und dann in einem Uhrsälchen mit der Reagenslösung einige Zeit in Berührung gelassen. Je länger diese Einwirkung des Reagenses dauert, desto schöner und intensiver tritt die dunkelorange-gelbe Färbung der verholzten Zellwände hervor, während die Cellulose- und Korkmembranen völlig ungefärbt bleiben. Hierbei ist zu bemerken, dass schon Scraup in seiner Arbeit über das Thallin ³⁾ sagt: » Durch Belichtung wird dieses sowie die andern Thallinsalze — wenn sie nicht absolut rein sind — schwach rosa gefärbt.« Diese Färbung nimmt in der wässrigen Lösung noch zu und es empfiehlt sich desshalb wenig Lösung (die ja bei der leichten Löslichkeit des Thallins rasch bereitet ist) vorrätzig zu halten ⁴⁾, sowie dieselbe in rauchbraunen Gläsern vor Licht geschützt aufzubewahren. Der Holz-

1) R. Hegler »Thallin ein neues Holzreagens« (Vorläuf. Mitth.) in Sitzungsber. des bot. Vereins in München. Bot. Centralblatt, Bd. XXXVIII, S. 616 ff.

2) Thallin (Tetrahydro-*p*-chinanol) = $C_9H_8NOCH_3H_4$, das schwefelsaure Salz = $(C_{10}H_{13}NO)_2 \cdot H_2SO_4 + 2H_2O$. Ueber die chemische Litteratur desselben siehe Scraup, Wiener Akad. Ber., II. Abth., Bd. 92, S. 789 ff.

3) H. Scraup l. c. p. 791.

4) Bei seltenerem Gebrauch des Reagenses empfiehlt es sich, die Reagenslösung durch Auflösen einiger Körnchen Thallins in einigen Tropfen wässrigen Alkohols in einem Uhrsälchen frisch zu bereiten, und in dieses dann die zu untersuchenden Schnitte einzutragen.

reaction thut ein derartiges Präparat keinen Eintrag, sondern es besitzt nur die Eigenschaft, die Cellulose- und Korkpartien ebenfalls schwach rosa zu färben, wogegen die verholzten Membranen sich ebenso intensiv orange-gelb tingiren, wie zuvor. Bei dem Gebrauch des Thallinsulfats ist die lästige Anwendung einer freien Säure umgangen. Die mit dem Reagens behandelten Schnitte, deren verholzte Theile wie gesagt orange-gelb gefärbt sind ¹⁾, verblassen selbst bei mehrmonatlicher Aufbewahrung nicht merklich, ein Vorzug, der den andern Reactionen, zum Theil sogar vollständig, abgeht. Die tingirten Schnitte lassen sich entweder im Reagens selbst oder in Glycerin betrachten; behufs Herstellung von Dauerpräparaten benützt man am zweckmässigsten Glyceringelatine.

Das Verhalten des Thallins zu Kork- und Cellulose-Membranen wurde schon oben als ein negatives bezeichnet, und es blieb zu weiterer Untersuchung übrig, das Verhalten desselben zu andern reagirfähigen im pflanzlichen Organismus vorkommenden Körpern wie z. B. organischen Säuren, Glycosiden, Gerbstoffen etc. und insbesondere gegenüber Phloroglucin zu studiren, eine Untersuchung, deren Ergebniss zu Gunsten der Thallinreaction ausfiel, welche durch die genannten Stoffe in keiner Weise beeinträchtigt wird.

Was nun den chemischen Verlauf der Thallinreaction anlangt, so möchte ich zunächst nochmals auf das oben erwähnte, schon von Singer als constanter Bestandtheil aller verholzten Membranen angesprochene Vanillin zurückkommen. Es fragte sich nun, ob dieser im Pflanzenreiche so ausserordentlich verbreitete aromatische Aldehyd ebenso, wie von Singer rücksichtlich der Phloroglucinreaction nachgewiesen war, auch die Reaction mit Thallin bedinge und welche Einwirkung das ebenfalls in der verholzten Zellwand vorkommende Coniferin auf diese Reaction auszuüben vermag.

Zu diesem Zwecke stellte ich Versuche mit festem Vanillin und Coniferin sowie mit Lösungen beider und ausserdem mit Baumwolle an, die ich mit der betreffenden Lösung imprägnirt und getrocknet hatte ²⁾. Löst man krystallisirtes Vanillin in etwas verdünntem Alkohol, versetzt mit einer wässrigen Thallinsulfatlösung und schüttelt dann mit Chloroform aus, so erhält man beim Verdunsten der Chloroformschicht einen gold-orangegelben ölartigen Körper, der nach einiger Zeit in krystallinischen Schüppchen erstarrt ³⁾. Dieselben Krystalle erhält man auch mikrochemisch durch Zusammenbringen kleiner Vanillinkryställchen, wie dieselben durch

1) cf. Tafel: Fig. 6.

2) Bei verdünnten Lösungen bewährt sich das Verfahren, die Reaction auf Baumwolle oder holzfreiem Filtrirpapier vorzunehmen, sehr gut und ich werde unten hierauf zurückkommen.

3) Ueber das auf andere Weise rein dargestellte Reactionsproduct sowie über den optischen Vergleich desselben und der mit Thallin behandelten Holzmembran behalte ich mir vor nach Vollendung der diesbezüglichen Arbeiten a. a. O. zu berichten.

Verdunsten eines Tropfens einer conc. alkoholischen Lösung auf dem Objectträger erzeugt werden, mit einem Tropfen einer Lösung von Thallinsulfat in wasserhaltigem Alkohol, und man sieht hierbei ganz deutlich, wie die Vanillinkrystalle zuerst von einer goldgelben Schicht umgeben werden, die dann beim Verdunsten des Lösungsmittels krystallinisch erstarrt. Mit Coniferin lässt sich dagegen weder auf makro- noch mikrochemischem Wege, weder in fester Form noch in Lösung oder auf Baumwollfaser eine Farbenreaction durch Thallin erzielen und es besitzt demnach das Thallin die Eigenschaft wohl mit Vanillin, nicht aber mit Coniferin zu reagiren.

Bei der Bestimmung der Schärfe und Intensität der Reaction folgte ich einem andern Princip als Wiesner und Singer¹⁾ bei der Phloroglucinreaction, da es meinen Erfahrungen nach bei mikrochemischen Reactionen nicht nur auf den procentischen Gehalt der betreffenden Lösung an Reagens als vielmehr auf den absoluten ankommt; beispielsweise ist es nicht gleich, ob zu einer Reaction 10 cc einer 0,1 procentigen Lösung mit einem Gehalte von 0,01 gr Reagens verwendet werden oder 1 cc derselben Lösung mit einem Gehalte von 0,001 gr. Aus diesem Grunde wurde 1 cc einer 0,1 procentigen Lösung enthaltend 0,001 gr Thallinsulfat in einem Uhrschildchen mit einigen Quer- und Längsschnitten von Fichtenholz zusammengebracht, die sofort die Reaction zeigten und zwar um so stärker, je länger die Einwirkung dauerte. Hiermit war aber die äusserste Grenze der Reaction keineswegs erreicht, es zeigten vielmehr 0,5 cc einer 0,01 procentigen Lösung einem Thallingehalte von 0,00005 gr entsprechend noch deutliche Reaction.

Das Thallin ist somit ein ausserordentlich empfindliches Reagens auf verholzte Gewebe, deren Membranen sich zufolge ihres Vanillin-Gehaltes intensiv* orangegelb färben. Das Reagens hat den Vorzug leichter Herstellung und Haltbarkeit mikroskopischer Präparate ohne Anwendung einer Säure und ist durch die Eigenschaft, mit Coniferin keine Farbenreaction zu geben, ausgezeichnet, eine Eigenschaft, die, wie sich unten zeigen wird, von hervorragender Bedeutung ist für die entwicklungsgeschichtliche Forschung auf dem Gebiete der Verholzung pflanzlicher Gewebe.

III. Toluilendiamin ein zweites neues Reagens. Anlässlich meiner Holzuntersuchungen suchte ich durch Vergleich der verschiedenen Reagentien neue Anhaltspunkte über den Gang der Holzreactionen, insbesondere theoretischer Art, zu gewinnen; dass ich hierbei nicht bei den bisher gekannten Reactionen stehen blieb, sondern auch noch andere Stoffe, von denen ich voraussetzte, dass dieselben mit gewissen Atomcom-

1) Wiesner, Ueber das Verhalten des Phloroglucins etc. l. c. S. 5. — Singer, l. c. S. 358 (S. 14 des S.-A.)

plexen in Reaction treten, mit in die Untersuchung hineinzog, war nahelegend. So waren die Versuche insofern von Erfolg gekrönt, als eben im Thallin ein neues, von den bisher gekannten specifisch verschiedenes Reagens gefunden wurde. Wenn ich nun ein zweites Reagens zu mikrochemischen Zwecken empfehle, so gehe ich dabei nicht von dem Gesichtspunkte aus, als ob eine numerische Bereicherung der ohnedies zahlreichen Holzreagentien ein besonderes Verdienst wäre, sondern werde hierbei vielmehr von der Anschauung geleitet, dass jedes neue Holzreagens durch sein Verhalten zu chemischen Individuen ausserhalb der Membran Rückschlüsse auf den Vorgang innerhalb der Membran und die Zusammensetzung der Membranbestandtheile und Zellhauteinschlüsse erlaubt und dass hieraus für weitere Untersuchungen Vortheile praktischer wie theoretischer Art gewonnen werden.

Schon Wiesner hat auf die Salze des Naphtalidins und Toluidins aufmerksam gemacht, und es wurden, was ersteres anlangt, im α - und β -Naphtylamin ¹⁾ zwei Reagentien gefunden, von denen insbesondere die β -Verbindung ein ausgezeichnetes, schon öfter angewandtes ²⁾ Reagens bildet; als Repräsentant des letzteren und zugleich der Diamine möchte ich dem Toluilendiamin $[C_6H_3(CH_3)(NH_2)_2]$ einen Platz unter den Ligninreagentien eingeräumt wissen. Das Reagens ³⁾ wird in conc. wässriger Lösung mit etwas Salzsäure versetzt angewandt. Es färbt die verholzte Membran dunkelorange, eine Reaction, die diejenige des Anilins und Naphtylamins an Farbenintensität und Haltbarkeit weit übertrifft. Die Reaction tritt auch bei ganz schwacher Verholzung mit Sicherheit auf und hält sich auch bei längerer Belichtung sehr gut. Bei Anfertigung von Dauerpräparaten verwendet man hier ebenfalls am zweckmässigsten Glyceringelatine oder Glycerin, doch muss man die Schnitte vorher längere Zeit mit dem Reagens in einem Uherschälchen in Berührung lassen und dann vor dem Einlegen in Glycerin oder die Gelatine durch Betupfen mit Fliesspapier von dem anhängenden Reagens befreien. Das Toluilendiamin reagirt sowohl mit Vanillin als mit Coniferin.

IV. Behufs Erproben der beiden neuen Reactionen wurde eine Anzahl Schnitte aus verschiedenen Pflanzenfamilien mit den Reagentien behandelt, von denen einige auszugsweise folgen; hauptsächlich handelte es sich dabei um Feststellung eines etwaigen Unterschiedes zwischen den mit Thallin und den mit Toluilendiamin oder Phloroglucin und Salzsäure hergestellten Präparaten.

1) $C_{10}H_7.NH_2$.

2) C. O. Harz (Bot. Centralblatt Bd. XXIV. 1885): »Ueber das Vorkommen von Lignin in Pilzen etc.

3) Die gewöhnlich käufliche μ -Verbindung.

A. Pteridophyta ¹⁾:

1. *Polypod. crassifol.* Sw.: Hypoderm, Xylem, äusserster Theil des Grundgewebes verholzt ²⁾.
2. *Polypod. aureum*: Hypoderm, Xylem, Grundgewebe (nach innen abnehmend) verholzt.
3. *Aspidium molle* Sw.: Epiderm ³⁾, Hypoderm verh., Xylem stark verh.
4. *Aspidium trifoliat.* Sw.: Hypoderm verh., Grundgewebe sehr schwach, Xylem stark verh.
5. *Davallia canariens.* Sw.: (Rhizom) nur Xylem verh.

B. Gymnospermae:

6. *Cycas revoluta*: Epiderm mit Hypoderm ⁴⁾, sclerenchymatische Elemente, Xylem stark verh., Grundgewebe schwach verh. ⁵⁾.
7. *Dioon edule* Ldl.: Epiderm, Sclerenchym, Hypoderm, Xylem stark, Grundgewebe schwach verh.
8. *Ceratozamia robusta*: wie 6 und 7, nur schwächer.
9. *Pinus Pinea* L. 5jähr.: Xylem mit Ausnahme der um die Harzgänge liegenden Zellschichten verh., Mark sehr stark verh. ⁶⁾.
10. *Pinus Mughus* Scop. 3jähr.: wie Nr. 9, nur Mark schwächer, stellenweise sogar gar nicht verholzt.
11. *Pinus excelsa* Wall. 8jähr.: wie Nr. 9. Mark überall verholzt.
12. *Pinus Cedrus* L. 9jähr.: im Phloëm zerstreut grosse runde stark verholzte Sclerenchymzellen, deren Verdickungsschichten mit Thallin sehr deutlich sind ⁷⁾, Xylem stark verh., Mark nicht, stellenweise schwach verh. (äusserste Borkenlage mit Phlorogl. stellenweise deutlich verholzt).

1) Es sind im Folgenden, wenn nicht ausdrücklich anders bemerkt, stets Quer- und Längsschnitte von Stamm resp. Stengel oder Zweig verstanden, die je mit Thallin, Toluilendiamin und Phloroglucin-Salzsäure behandelt wurden.

2) cf. Burgerstein, Untersuch. über das Vorkommen und die Entstehung des Holzstoffes etc. Sitzungsber. der Wiener Akad. Bd. LXX. I. Abth. (S. 14 des S.-A.)

3) Burgerstein gibt an, dass nach Dippel (das Mikroskop. Bd. II. S. 168 u. 169) das Hautgewebe »niemals« verholze. Dippel spricht an der citirten Stelle nur von Epiblem und Epithel, nicht aber von Epidermis, von welcher auch Niggel eine Verholzung nachweist. S. 175 sagt Dippel: »Bei denjenigen Pflanzen, wo die Zellstoffhüllen der Oberhautzellen zwar alle oder theilweise verholzen (Monocotylen, Cycadeen, Farn.), aber nicht alle vollständig verkorken, lässt man etc. . . .«

4) Cf. hierüber auch M. Niggel »Indol ein Reagens auf verholzte Membranen« in Flora Jahrg. 1881 (S. 10 des S.-A.).

5) Dippel (Das Mikroskop etc. 1869 II. Bd. S. 107) fand das Markparenchym der Cycasarten ebenfalls verholzt.

6) Dippel l. c. S. 107 fand das Holzparenchym und Mark der Gymnospermen und mehrjährigen Dicotyledonen ebenfalls verholzt.

7) Durch Thallin wird die Mittellamelle sowie die secundäre und tertiäre Membran sehr deutlich. cf. Tafel Fig. 6.

13. *Pinus Cembra* L. 10 jähr.: Die im Rindenparenchym liegenden Balsamgänge nicht verholzt, ebenso die im Xylem liegenden Harzgänge. Xylem und Mark stark verh.
14. *Pinus Pumilio* Hahnke 5jähr.: Holz und Mark, nebst Bastfasern ¹⁾ stark verholzt.
15. *Abies Engelmanni* Parr. 3jähr.: Holz und Mark sehr stark verholzt.
16. *Taxus baccata* 6jähr.: die unterhalb des äussersten Korkringes liegende Zelllage stellenweise deutlich verholzt, Xylem stark, Mark nicht verholzt.
17. *Taxus adpressa* Knight 5jähr.: Xylem stark, Mark nicht verholzt.
18. *Sciadopitys verticillata* Veitsch. 4jähr.: subepidermiale Rinde deutlich verholzt, Verdickungsring radial plattgedrückter ziemlich stark verholzter Zellen. Xylem stark, Mark nicht oder nur spurenweise verholzt.
19. *Wellingtonia gigantea* Lindl. 5jähr.: Verholzte Epidermis mit gleichfalls verholzter subepidermialer Sclerenchymsschicht, Rindenparenchym nicht verholzt, aber mit stellenweise eingestreuten stark verholzten Sclerenchymzellen. Verdickungsring radial zusammengedrückter Zellen und Xylem verholzt. Mark sehr stark verholzt und ausserdem sehr verdickt.
20. *Thuja gigantea* 6jähr.: Verholzt primäre Rinde, im Phloëm die charakteristischen tangential gestreckten Zellen, Xylem und Mark sehr stark.
21. *Juniperus Sabina* L. 5jähr.: Verholzt sind Aussenrinde schwach, dann die reihenweise angeordneten verdickten Elemente sowie die Sclerenchymringe, Xylem und Mark stark.

C. Monocotyledones.

22. *Cyperus Papyrus* L.: verholzt Epidermis, Hypoderm ²⁾, Xylem, Hartbast, Schwammparenchym (insbesondere an den zusammenstossenden Ecken).
23. *Bambusa Simonii* Willd.: Grund- und Stranggewebe verholzt (Gefässe und Sclerenchym sehr stark).
24. *Chamaerops humilis* L. (Blattstiel quer): In allen Theilen mit Ausnahme des Weichbastes schwach, Xylem stark verholzt.
25. *Sobralia macrantha* Lindl.: Alles verholzt mit Ausnahme des Weichbastes und der Epidermis.

1) Cf. Schacht, Lehrb. der Anatomie etc. Bd. II. S. 73.

2) Schacht sagt l. c. Bd. II. p. 43: »Die Rinde der Monocotyledonen besteht in der Regel aus Parenchym, das bisweilen hie und da, oft regelmässig, einen Kreis bildend oder in Gruppen geordnet, verholzt ist.«

26. *Dendrobium chrysanthum* Wallich: Epidermis stark verholzt, dann nach innen abnehmend. Gefässbündel mit Ausnahme des Weichbastes stark verholzt.

D. Dicotyledones.

27. *Salix daphnoides* Will. 1 jähr.: Hypoderm schwach, Sclerenchymzellen, Xylem mit stark verholzter Markscheide ¹⁾ und Mark ²⁾ stark verholzt.
28. *Quercus robur* L. 3 jähr.: Sclerenchym ³⁾, Bastfasern ⁴⁾, Xylem, Mark verholzt.
29. *Querc. penduncul.* Willd. 4 jähr.: wie *Querc. robur*.
30. *Corylus Avellana* L. 2 jähr.: Sclerenchym, Xylem, Mark verholzt ⁵⁾.
31. *Betula Alba* L. 7 jähr.: Sclerenchym ³⁾, Xylem, Mark verholzt.
32. *Betula pubescens* Ehrh. 2 jähr.: Sclerenchym und Xylem stark verh.
33. *Betula acuminata* 5 jähr.: Sclerenchym und Mark stark, Xylem schwach verholzt.
34. *Alnus glutinosa* L. × *incana* L. 2 jähr.: Sclerenchymring stark, Xylem und Mark schwach verholzt.
35. *Casuarina equisetifol.* Forst. 6 jähr. Zweig: Sclerenchymat. Elemente stark, Holz schwach, Markparenchym schwach verholzt. — Blatt: schwach verholzte Epidermis, primäres Rindenparenchym schwach, Sclerenchym und Xylem stark verholzt.
36. *Maclura aurantiaca* Nutt. 2 jähr.: Mark, Xylem stark verholzt.
37. *Buxus sempervirens* L. *arborescens* 4 jähr.: Aussenrinde, Xylem, Mark stark verholzt.
38. *Phyllanthus epiphyllanthus* L.: Xylem stark verholzt, Bast nicht oder nur spurenweise (primäre Zellwand).
39. *Tetranthera javanica* Sw. 3 jähr.: Sclerenchymring stark, Xylem und Mark schwach, die mehrzelligen Haare ⁶⁾ ebenfalls stark verholzt.
40. *Syringa vulgaris* var. *albiflor.* L. 2 jähr.: Sclerenchym, Xylem stark, Mark schwach verholzt.
41. *Sambucus racemos.* L. 2 jähr.: Aussenrinde schwach, Xylem, Hartbast, Mark stark verholzt.
42. *Sambucus niger* L. 2 jähr.: wie *racemosus*.

1) Der Theil des Xylems, welcher das centrale Mark umgibt und welchen man als Markscheide bezeichnet, ist in vielen Fällen auffallend stark verholzt.

2) Schacht sagt l. c. p. 51: »Die Parenchymzellen des Mark sind nicht selten in älteren Pflanzentheilen dickwandig und verholzt.

3) Cf. Dippel l. c. Bd. II. p. 111 und Burgerstein l. c. S. 14.

4) Cf. ibidem p. 120 ff.; Burgerstein l. c. p. 11 u. 12.

5) Cf. Burgerstein l. c. p. 13.

6) Ueber die Verholzung von Trichomen siehe Niggli l. c. S. 8 ff.

43. *Eucalyptus globulus* 1 jähr.: Xylem und die innerhalb desselben liegenden sclerenchymatösen Partien mit deutlich verholzten Mittellamellen, Hartbast verholzt, Epidermis schwach verholzt.
44. *Ribes rubrum* L. 2jähr.: Nur Xylem verholzt, Mark nicht verholzt.
45. *Prunus spinosa* L. 5jähr.: Sclerenchymatische Elemente und Xylem stark, Mark schwach verholzt.
46. *Prunus sibirica* L. 6jähr.: wie *Prunus spinosa*, nur das Sclerenchym schwach verholzt.
47. *Acacia falcata* Willd. 4jähr.: Verholzt der im Rindenparenchym liegende Sclerenchymmantel, Xylem und Mark stark.
48. *Acacia longifolia* Willd. 5jähr.: ebenso, nur in allen Theilen schwächer.
49. *Serjania cuspidata*: Sclerenchymring schwach, Xylem stark, Mark nicht verholzt, die an drei Ecken stehenden Trichome¹⁾ stark verholzt.
50. *Serjania grammatophora* Rdlk.: Sclerenchym, Xylem, Mark stark verholzt, Trichome stellenweise schwach.

Aus dem Umstande, dass Toluilendiamin sowie Phloroglucin HCl mit Coniferin und Vanillin, das Thallin hingegen nur mit letzterem reagirt, erklären sich auch verschiedene Unterschiede zwischen Schnitten gleicher Stammhöhe, die einerseits mit Phloroglucin und Toluilendiamin, andererseits mit Thallin behandelt wurden. Der Unterschied kommt dadurch zu Stande, dass Zellpartien, welche Coniferin in hervorragender Menge enthalten, bei der Thallinreaction zufolge ihres relativ geringeren Vanillingehaltes als »schwach verholzt« angesprochen werden müssen, während man bei der Phloroglucin- oder Toluilendiamin-Reaction, bei der sich zur Reaction des Vanillins noch die des Coniferins addirt, gezwungen sein wird, die betreffende Gewebepartie als mehr oder weniger »stark verholzt« zu bezeichnen. Bei denjenigen Pflanzen, deren Gewebe eine relativ grössere Quantität Vanillin enthält, ist die Reaction mit Thallin so intensiv, dass ein Unterschied zwischen diesem und den anderen Reagentien, die ausserdem noch mit dem vorhandenen Coniferin reagiren, nicht mehr so stark auffällt.

Auf die Unterschiede im Speciellen, von denen ich als besonders deutlich ausser den Coniferen, *Betula pubescens*, *Bet. alba*, *Quercus robur*, *Querc. pedunculata*, *Corylus Avellana* aufführen möchte, komme ich nach Abschluss der diesbezüglichen Untersuchungen a. a. O. zurück und gehe nun über zur

V. Vergleichung der Holzreagentien. Schon oben wurde der Beweis erbracht, dass das krystallisirte Vanillin die Fähigkeit besitzt, mit Thallin eine Reaction hervorzurufen, die mit der durch dasselbe Reagens innerhalb der Membran erzielten, was Farbe anlangt, vollständig

1) Cf. Anmerk. zu Nr. 39.

übereinstimmt, wobei also ein Unterschied, wie er in der That von Singer rücksichtlich der Reaction mit Phloroglucin resp. Resorcin H_2SO_4 beobachtet worden ist, nicht zu bemerken war. Singer¹⁾ sagt darüber: »Doch kann nicht verschwiegen werden, dass die Färbungen, welche die Vereinigung des reinen Vanillins mit den Holzstoffreagentien zur Folge hat, nicht immer genau mit jenen übereinstimmen, welche diese Reagentien in der verholzten Membran, oder in dem wässerigen Holzextracte erzeugen. So gibt Vanillin mit Phloroglucin und Schwefelsäure eine ziegelrothe, mit Resorcin und derselben Säure eine zinnoberrothe Färbung, während verholzte Gewebe von dem ersteren Reagens roth bis violett von dem letzteren, je nach dem die Säure in geringerer oder grösserer Menge vorhanden, bald violett, bald violettroth gefärbt werden. Die Reactionen aber, welche Phloroglucin und Salzsäure, Anilin, Pyrol, Indol unter Assistenz der zugehörigen Säuren hervorrufen, sind sowohl beim reinen Vanillin als in den verholzten Geweben identisch.« Aus dem Umstande, dass die Färbungen derjenigen Reactionen, die für Vanillin und Coniferin ähnlich oder gleich sind, wie Phloroglucin HCl , Anilin, Pyrol und Indol, auch bei Vanillin und verholzten Membranen gleich ausfallen, sowie aus der Thatsache, dass die Färbungen des nur mit Vanillin reagirenden Thallins bei der Reaction mit krystallisirtem Vanillin und Holzmembranen ebenfalls gleich sind, glaubte ich ableiten zu dürfen, dass, abgesehen von andern Zellhauteinschlüssen, insbesondere das Coniferin es ist, das die Färbungen der betreffenden Reactionen zu modificiren vermag. Gestützt wird diese Anschauung, dass das Coniferin die wesentliche Ursache der Veränderung beider Reactionen sei, durch zwei einfache Versuche, die aus folgender Tabelle ersichtlich sind:

	Vanillin-Watte.	Vanillin-Coniferin-Watte ²⁾ .	Coniferin-Watte.	Verholzte Membranen.
Phloroglucin + H_2SO_4	orangeroth mit schwachem Stich ins roth- violett.	rothviolett bis violett purpur.	violett bis violett purpur.	roth bis violett.
Resorcin + H_2SO_4	zinnoberroth.	rothviolett bis violettroth.	violett bis violettroth.	violettroth bis violett ³⁾ .

1) Sitzungsber. der Wiener Akademie Bd. LXXXV. p. 351 (S. 7 des S.-A.).

2) Baumwolle, die mit einer Mischung gleicher Theile Coniferin und Vanillin getränkt und getrocknet wurde (im folgenden als »Normalwatte« bezeichnet).

3) Bei der Bezeichnungsweise der Mischfarben setze ich denjenigen Theil voran, welcher die Art der Färbung mehr bestimmt, z. B. heisst »rothviolett bis violettroth«, dass die Färbung von einem »roth«, das einige »violette Strahlen besitzt, zu einem »violett« mit einigen »rothen« Strahlen, also von einem »rothviolett« (mit vorherrschend rother Farbennuance) zu einem »violettroth« (mit vorherrschend violetter Färbung) geht.

Wie man sieht, entspricht also die Färbung der Coniferin - Vanillin-Watte derjenigen, wie sie die verholzte Membran zeigt. Bezüglich der letzteren ist es ja bekannt, dass die Farbennuance nicht nur bei verschiedenen Pflanzen verschieden ist, sondern dass selbst an ein und derselben Pflanze Schnitte verschiedener Stammhöhe und Verholzungsgrades auch untereinander abweichende Reactionen liefern, die allerdings nur innerhalb gewisser Grenzen variiren, was wiederum ein Wahrscheinlichkeitsbeweis für den Einfluss des Coniferins auf die Ligninreactionen sein dürfte ¹⁾. Ausserdem ist nicht ausgeschlossen, dass neben Coniferin auch noch andere Bestandtheile verholzter Membranen eine Modification der Farbenreactionen des Vanillins herbeiführen können; ob diese Substanzen nun ihrerseits mit Vanillin in einem gewissen Verwandtschaftsgrade stehen ²⁾, oder etwa zufolge ihrer Natur als aromatische Aldehyde ähnliche Beziehungen ergeben, bleibt bis jetzt noch dahingestellt.

Jedenfalls scheint es mir nicht gerechtfertigt, wegen verschiedener Färbung der Reactionen mit krystallisirtem Vanillin und mit verholzter Membran bei zwei Reagentien überhaupt an der Identität beider Reactionen und dem Vorkommen von Vanillin in der verholzten Membran zu zweifeln und aus den Ligninreactionen nur das Vorhandensein eines aromatischen Aldehyd's im Allgemeinen ableiten zu wollen. Nickel sagt hierüber ³⁾: »Ich glaube, ich bin der Erste gewesen⁴⁾, welcher auf Grund umfassender Studien über die Farbenreactionen der organischen Verbindungen die Ansicht ausgesprochen hat, dass es gegenwärtig noch nicht gerechtfertigt sei, die sog. Ligninreactionen einer bestimmten chemischen Verbindung zuzuschreiben, dass man sie aber bereits sehr wohl allgemein auf aldehydartige Bestandtheile des Holzes beziehen dürfe. Meine Auffassung unterscheidet sich eben dadurch von der älteren, von Singer ausgesprochenen Anschauung, nach welcher bekanntlich die Ligninreactionen mit Hülfe von Anilinsulfat, Phloroglucin, Indol u. s. w. auf einem Vanillingehalt des Holzes beruhen sollen.«

Eine Hauptstütze für seine Anschauung findet Nickel ausser in dem von mir schon oben klar gelegten Punkte von der Verschiedenheit der Reactionen innerhalb und ausserhalb der Membran, in der »geringen Empfindlichkeit des Vanillins gegen die Ligninreagentien im Gegensatz zu

1) Hierbei ist von dem Umstande noch ganz abgesehen, dass bei jeder Farbenreaction das Substrat, auf welchem dieselbe vorgenommen wird, immerhin einen Einfluss auf den Ton der Farbe ausübt und denselben beispielsweise durch theilweise Absorption von Strahlen bestimmter Brechbarkeit zu modificiren vermag.

2) In neuerer Zeit will Ihl (Chemiker-Ztg. 1889, Nr. 27 p. 432) das Eugenol als Bestandtheil verholzter Zellmembranen angenommen wissen, da dasselbe mit Phloroglucin und Anilin ähnliche Reactionen liefert.

3) E. Nickel, l. c. S. 754.

4) Nickel, Chemiker-Ztg. 1887. IX. 1520.

der Singer'schen Deutung der Ligninreactionen, die gerade das Gegentheil vermuthen liesse.« Nickel fand als Empfindlichkeitsgrenze zwischen Vanillin und Anilin eine Lösung von $\frac{1}{8}$ ‰ Vanillin, während Phenole (Phloroglucin etc.) noch weniger empfindlich seien.

Nach meinen Versuchsergebnissen lässt sich Vanillin in einer Lösung von $\frac{1}{12}$ ‰ durch Phloroglucin noch mit aller Bestimmtheit nachweisen. Hiermit ist aber die Reactionsgrenze keineswegs erreicht und ich werde zeigen, dass es nur auf die eingeschlagene Methode ankommt. Einen Hauptpunkt bildet die Herstellung solcher oder wenigstens möglichst ähnlicher Reaktionsbedingungen, wie sie die verholzte Membran zeigt. Vorgreifend habe ich schon oben bemerkt, dass ich mich bei histochemischen Reactionen zu diesem Zwecke der Substrate bediene. Als solche benützte ich früher Wolle, Seide und besonders Baumwolle, später verschaffte ich mir jedoch sog. »Holzstoff« aus verschiedenen Fabriken und in verschiedenen Graden der Verarbeitung mit genauem Nachweis der betreffenden Stammpflanze. Einige Sorten zeigten noch die intensivste Vanillinreaction, andere nur noch ganz schwach und fünf Sorten derselben, dünne, durch hydraulische Pressen hergestellte, verfilzte Platten, zeigten keine Spur einer Vanillinreaction mehr.

Bringt man nun auf eine Probe jeder dieser fünf Sorten einen Tropfen einer 1 ‰igen Vanillinlösung (= 0,0004 gr Vanillin cr.), lässt abtrocknen, fügt einen Tropfen Phloroglucinlösung und nach dem Verdunsten einen Tropfen Salzsäure zu und vergleicht dann diese Reaction mit einer solchen ohne Substrat oder einer solchen auf Baumwolle ausgeführten, so findet man, dass die Reaction auf Holzstoff um ein mehrfaches intensiver auftritt. Besonders geeignet hierzu waren zwei Sorten, die eine mit der Fabrikbezeichnung »Natron-Cellulose« von Weiss- und Rothtanne abstammend, die andere sog. »Leinen« von Hanf und Flachs. Erstere Sorte zeigte mit einer Mischung gleicher Theile Vanillin und Coniferin gekocht nach Zusatz von Phloroglucin und Salzsäure eine Farbennuance, die vollständig mit der durch Phloroglucin an Stammquerschnitten hervorgebrachten übereinstimmt.

Auf diese Weise lassen sich, wenn der Versuch mit aller Vorsicht auf möglichst wenig Substrat im Uherschälchen ausgeführt wird, sogar Hundertstelsmilligramme noch mit Sicherheit nachweisen¹⁾, während es sich an den einzelnen Punkten, wo die Reaction noch mikroskopisch sichtbar ist, ja nur um die geringsten Spuren handeln kann.

Ob die Verstärkung der Reaction durch die pflanzliche Faser und die Anhäufung des Farbstoffes auf Flächenattraction, wie z. B. beim Ent-

1) Ein mit zwei Tropfen einer $\frac{1}{10}$ procentigen Lösung [= $\frac{2}{100}$ Milligramme Vanillin] imprägnirter Holzstoff zeigt mit Phloroglucin-Salzsäure eine rosenrothe, mit einem Körnchen Anilinsulfat und einem Tropfen derselben Säure eine gelbe Farbe.

färben gefärbter Flüssigkeiten durch poröse Holzkohle, oder auf eigenthümliche capillare Spannungsverhältnisse innerhalb derselben zurückzuführen ist, bleibt dahingestellt; jedenfalls besitzen, wie dies schon Wigand¹⁾ und v. Höhnel²⁾ beobachtet haben, unter den pflanzlichen Membranen gerade die verholzten die stärkste Anziehung zu gelösten Stoffen aller Art, die ihnen höchst schwer wieder entzogen werden können, wovon man sich durch ein einfaches Experiment überzeugen kann:

Bringt man einige Längs- oder Querschnitte eines beliebigen Zweiges in einem Reagensrohr mit einigen Tropfen einer conc. Lösung eines Anilinfarbstoffes³⁾ zusammen, fügt nun viel Wasser zu und kocht einige Male auf, so löst sich der Farbstoff, der zuvor von dem Schnitt ganz gleichmässig aufgenommen war, in den nicht verholzten Gewebetheilen heraus und nur die verholzten sowie die verkorkten Partien bleiben intensiv gefärbt, während die Cellulosemembranen völlig farblos erscheinen. Das gleiche Verhalten der Kork- und Holzmembranen gegen Pigmentlösungen ist um so bemerkenswerther, als sich auch beide gegen Jod gleich verhalten. Da durch Prozesse der erneuten Ein- und Zwischenlagerung die Abstände der einzelnen die ursprüngliche, nicht metamorphosirte Cellulosemembran zusammensetzenden Molekülgruppen (Tagmen)⁴⁾ von einander bedeutend verringert werden, so muss auch nothwendig eine der geringeren Entfernung entsprechende stärkere Attractionskraft auf alle diese Zwischenräume passirenden Körper ausgeübt werden. Vielleicht liesse sich durch diese Erwägung das eigenthümliche Verhalten metamorphosirter Gewebe zu Stoffen wie Jod oder Anilinfarben, die mit so bedeutender Kraft eingelagert und festgehalten werden, erklären. Ein weiteres Beispiel für das Aufspeicherungsvermögen der Holzmembranen ist die grosse Kraft, mit welcher das in der Membran eingeschlossene Coniferin und Vanillin⁵⁾ von derselben beim Kochen mit Wasser festgehalten werden, so dass dieselben sogar bei der Papierfabrikation durch den umständlichen Process des Kochens, Aufschlämmens, Waschens und Mahlens nicht vollständig herausgelöst werden.

An der Hand der beistehenden Tabelle kann man sich ein Bild von der Einwirkung der gebräuchlichsten Holzreagentien auf Vanillin und Coniferin machen; bezüglich der Farbe der Reaction ist zu bemerken, dass

1) Wigand »Ueber das Verhalten der Zellmembranen zu Pigmenten« (Bot. Ztg. 1862, Jg. 20, Nr. 17 p. 129 ff.) sagt: »Es ergibt sich, dass von allen Geweben die Bastzellen das stärkste Färbungsvermögen besitzen.

2) v. Höhnel, Histochemische Untersuchungen über das Xylophilin und das Coniferin. Wiener Berichte Bd. LXXVI, Jg. 1877 (S. 49 des S.-A.).

3) Am besten wird der Farbstoff in einer Mischung gleicher Theile Alkohol und Glycerin gelöst.

4) cf. Pfeffer, Osmotische Untersuchungen. p. 32 ff.

5) v. Höhnel l. c. p. 47 ff.; Singer l. c. p. 354.

Coniferin.			Vanillin.			
a. trocken.	b. in Lösung.	c. trocken (krystall.)	d. in 1% Lösung (alkoh.) ¹⁾ .	e. in 10% Lösung.	f. Baumwolle mit 1% Lös. getränkt.	g. Baumwolle mit 10% Lös. getränkt.
1. Phloroglucin + HCl	roth gefärbt und sofort pur- purroth gelöst.	weinroth.	schwach gelb- roth.	hellroth mit Stich ins Vio- lette.	schwach gelb- roth.	violettroth mit Stich ins Roth- gelbe.
2. Phloroglucin + H ₂ SO ₄	violett bis vio- lett purpur.	violett purpur.	rothviolett.	rothviolett.	rothviolett.	rothviolett.
3. Anilinsulfat + HCl	sattgelb.	dunkelgelb.	goldgelb.	sattes goldgelb.	gelb.	goldgelb.
4. α-Naphtyla- min HCl	schwach gelb.	schmutzig grau- gelb.	hellgelb (nach einiger Zeit).	goldgelb.	gelb.	goldgelb.
5. β-Naphtyla- min HCl	gelb.	hellgelb.	hellgelb.	goldgelb.	gelb.	goldgelb.
6. Resorcin + H ₂ SO ₄	violett bis vio- lettroth.	violettroth.	gelbroth.	hellroth.	gelbroth.	hellroth.
7. Resorcin + HCl	nach 24 St. ganz schwach rosa.	violettroth.	schwachrosa.	violettroth.	schwach rosa.	violettroth.
8. Toluilendia- min HCl	hellgelb.	sattgelb.	hellgelb.	hellgelb.	gelb.	sattgelb.
9. Carbazol + HCl	nach 15 St. auf Watten nach dem Eintrocknen rein hellblau.	beim Eintrock- nen grün bis schiefergrau.	fleischrosa.	violettrosa.	hellrosa.	violettroth.
10. Orcin + HCl	nach 24 Stunden schwach rosa.	—	schwachrosa.	stark violett- roth.	rosa.	violettroth.
11. Phenol + HCl (Sonnenlicht)	blau bis grün- blau.	keine Reaction, dagegen mit Lösung auf Watte: blau.	keine React.	keine React.	keine React.	keine React.
12. Thymol + HCl (Sonnenlicht)	blau bis blau- grün.	auf Watte blau bis grünblau.	keine React.	keine React.	keine React.	keine React.
13. Thallinsulfat	keine React.	keine React.	orangegeb.	orangegeb.	orangegeb.	orangegeb.

¹⁾ Zu den Versuchen d, e, f, g wurden stets 8 Tropfen einer alkoholischen 1- resp. 10-proc. Lösung mit einem Gehalte von ca. 0,0028 resp. 0,028 gr Vanillin verwendet.

dieselbe häufig von der Art und Menge der assistirenden Säure innerhalb der angegebenen kleinen Grenzen abhängig ist. Aus der Tabelle ist ferner ersichtlich, dass auf Baumwolle (Versuchsreihe *f* und *g*) die Reactionen durchweg stärker auftreten, als wenn nur Lösungen auf einander wirken; besonders deutlich sind die Unterschiede von *1g*, *8g*, *9f* und *g*, *10f*; und der zugehörigen Lösungen ohne Substrat *1e*, *8e*, *9d* und *e*, *10d*. Dass vanillinfreier Holzstoff sich hierzu noch besser eignet, wurde schon oben gezeigt.

Was die Reaction mit Thymol anlangt, so ist hier entgegen den Versuchen Molisch's¹⁾ zu bemerken, dass es bei chemisch reinem Vanillin selbst bei Zuhilfenahme des directen Sonnenlichtes nicht gelingt, eine Reaction zu erhalten.

Bezüglich des Phenols ist es interessant, dass die Nitrophenole (*o*- und *p*-Verbindung) keine Reaction geben.²⁾

VI. Coniferin als constanter Begleiter verholzter Membranen. Was das Vorkommen von Coniferin in verholzten Membranen anlangt, so kann darüber nach den Untersuchungen von Thiemann und Haarmann³⁾ kein Zweifel mehr herrschen. Diese beiden Forscher haben gezeigt, dass die Reaction auf Phenol mittelst eines mit Salzsäure benetzten Fichtenspahnens durch das Vorkommen des schon von Hartig⁴⁾ aus dem Cambialsafte der Coniferen gewonnenen Coniferins im Fichtenholze bedingt sei. Sie zeigten, dass das rein dargestellte Coniferin beim Befeuchten mit Phenol und Salzsäure im directen Sonnenlicht sich blau färbt. E. Tangl⁵⁾, der die Reaction an anderen pflanzlichen Objecten versuchte, fand, dass dem Coniferin eine weit grössere Verbreitung zukomme. v. Höhnelt⁶⁾ vervollständigte dann diese Untersuchungen noch und gelangte zu dem Resultate, dass sich verholzte Membranen mit Phenol und Salzsäure unter Beihilfe des directen Sonnenlichtes stets blau oder blaugrün färben. Singer⁷⁾ hat schliesslich gezeigt, dass durch achtzehn-

1) H. Molisch, Ein neues Coniferinreagens (Ber. der deutsch. bot. Ges. Bd. IV. S. 302) sagt: »Es zeigt, soweit meine Erfahrungen reichen, nur das Coniferin diese merkwürdige Beziehung zum Thymol, andere verwandte oder dem Coniferin fernstehende Körper aber nicht. Um nur ein Beispiel zu nennen, giebt das dem Coniferin so nahe stehende Vanillin die Reaction nicht, wohl aber giebt das letztere mit Thymol-HCl eine prachtvoll karminrothe Färbung.« cf. dagegen Tabelle Reihe 12.

2) Zum Zwecke mikrochemischer Reactionen untersuchte ich Ende des vorigen Jahres (1888) das Verhalten einer Reihe von Körpern zu verholzten Membranen, von denen anzunehmen war, dass sie mit gewissen Atomcomplexen in Reaction treten würden (Hydrochinon, Chinon, Chinolin, Nitrophenol, Phenylhydrazin, Antipyrin, Methyloxychinizin, Amarin, Chloranilin), ohne jedoch zu einem abgeschlossenen Resultate zu kommen.

3) Ueber diese Arbeiten siehe die Aufzählung der chemischen Literatur (S. 32.).

4) Hartig, Jahrbuch f. Förster. Jg. 1861, p. 264.

5) Vorläufige Mittheilung über das Coniferin. Flora 1874, p. 239.

6) v. Höhnelt, l. c.

7) Singer, l. c. p. 354 und 360.

tägiges Kochen aus feingehobelten Fichtenspähnen alles Coniferin aus der Membran herausgelöst wird und in dem durch Abdampfen der Lösungen gewonnenen Extracte nachgewiesen werden kann.

Zwei Punkte allerdings fehlen in der Kette des strikten Beweises für das Vorkommen von Coniferin in der Membran; einmal, dass gerade das Cambium, diejenige Gewebepartie, aus welchem das Coniferin gewonnen wird und welches mithin dasselbe nachgewiesenermassen in grösserer Menge enthält, die so charakteristische Reaction mit Phenol- oder Thymol-Salzsäure nicht eingeht, und zweitens, dass es bis jetzt nicht gelang (oder vielleicht auch nicht versucht wurde), das Coniferin aus dem Holzgewebe chemisch rein darzustellen.

Bezüglich des ersteren Punktes ist zu bemerken, dass die analytische Chemie für das Verhalten des Cambiums eine zahlreiche Anzahl Analogien zeigt, alles Fälle, in denen ein Nachweis durch gleichzeitig vorhandene andere Körper unmöglich gemacht wird und speciell die verholzte Membran, deren bekanntermassen etwa die Hälfte betragender Celluloseantheil durch Jodreagentien erst nach Wegschaffung des verholzenden Principes, der »inkrustirenden Substanzen« Payen's, nachgewiesen werden kann, ist hierfür das schlagendste Beispiel ¹⁾.

Es wird also die Reaction des im Cambialgewebe aufgespeicherten Coniferins entweder durch andere Körper (Eiweiss) verhindert oder aber könnte als zweite Möglichkeit das Coniferin im Bildungsgewebe, das höchstwahrscheinlich auch die Entstehungsstätte desselben ist, in anderer, die charakteristischen Reactionen des gewöhnlichen Coniferins nicht besitzender etwa polymerisirter Form vorhanden sein.

Für beide Anschauungsweisen sprechen eine Reihe von Versuchen, die ich im folgenden Abschnitte kritisch beleuchten möchte.

VII. Einfluss infiltrirter Stoffe auf die Reactionen normaler Zellwandbestandtheile. Versuch 1: Kocht man reine Baumwolle mit einer conc. Lösung gleicher Theile Vanillin und Coniferin und trocknet dieselbe, so färbt sich die so präparirte Watté auf dem Objectträger mit Jod und Schwefelsäure ²⁾ benetzt gelb bis hellbräunlich (an manchen Stellen sogar gar nicht) und verändert diese Farbe selbst nach viermal 24 Stunden nicht (Fig. VII a.), wogegen gewöhnliche Baumwolle, mit demselben Reagens ebenso behandelt, anfangs eine rothbraune bis violette Farbe annimmt, die später in Violettroth und nach

1) Cf. auch Sachsse l. c. p. 147.

2) Da es hier darauf ankommt, alle Objecte mit gleichen Mengen Jod und Schwefelsäure zu behandeln, so habe ich hier wie bei den folgenden Versuchen eine Reagenslösung angewandt, die durch Vermischen von 3 Vol. einer schwachen, hellbraunen Jodjodkaliumlösung mit 1 Vol. Schwefelsäure unter Abkühlen frisch hergestellt wurde. Gewöhnliche Baumwolle wird durch dieses Reagens anfangs tiefrothbraun, mit Stich ins rothviolett, später rothviolett, zuletzt violett gefärbt (Fig. VII e, f, g).

Verlauf von 24 Stunden in Violett mit Stich in Rothviolett übergeht. (Fig. VII *e, f, g*).

Versuch 2: Tränkt man Baumwolle mit 1%iger Vanillinlösung, kocht auf, trocknet und infiltrirt dieselbe dann mit Eiweisslösung¹⁾, so zeigt die so behandelte Watte auf Zusatz von wässriger Phloroglucinlösung und Salzsäure, gegenüber einer gleichbehandelten Watte ohne Eiweiss, die charakteristische Vanillinreaction in schwächerem Maasse. Manche Fäden bleiben sogar farblos oder färben sich nur gelblich. Roth färbt sich meist nur das herausgelöste Vanillin; zu bemerken ist, dass der Farbenton sich von dem reiner Vanillinwatte unterscheidet, indem derselbe in Violettroth überspielt.

Mit Jod und Schwefelsäure färbt sich die so präparirte Vanillin-Eiweiss-Watte hellgelblich bis gelbbraunlich (Fig. VII *b*).

Versuch 3: Baumwolle mit kaltgesättigter Coniferinlösung (0,51 %) getränkt, aufgeköcht und getrocknet und dann mit Eiweisslösung imbibirt²⁾, zeigt nach abermaligem Trocknen auf Zusatz von Thymol-Salzsäure eine violette bis blaue Farbe, doch schienen die einzelnen Fäden unter dem Mikroskope an vielen Stellen farblos, was bei gewöhnlicher mit Coniferin getränkter Baumwolle nicht der Fall war. Mit Jodschwefelsäure färbte sich dieselbe gelbbraunlich bis hellbraun. (Fig. VII *c*).

Versuch 4: Baumwolle mit Eiweiss getränkt und ohne Anwendung von Wärme getrocknet, färbt sich durch Jodschwefelsäure dunkelbraun (Fig. VII *d*), während gewöhnliche Baumwolle sich sofort tief rothbraun bis violettroth, zuletzt violett färbt (Fig. VII *e, f, g*).

Versuch 5: Chlorzinkjod färbte die mit Eiweisslösung infiltrirte und getrocknete Normalwatte sofort gelb bis bräunlich-gelb (Fig. VII *b*), nach Verlauf von 4 Stunden gelbbraun, stellenweise rothbraun, wogegen gewöhnliche Baumwolle durch das gleiche Reagens sofort schwarzbraun mit Stich in Violett, nach 4 Stunden intensiv violett gefärbt wurde.

Diese Versuche wurden zu dem Zwecke angestellt, den Einfluss von Körpern, wie Vanillin, Coniferin, Eiweiss auf die Cellulosereaction mit Jodpräparaten kennen zu lernen. Auf dem Wege des Experiments ergab sich der Beweis, dass in der That die genannten Körper, welche mehr oder weniger ja auch als Attribute der Zellwände angesehen werden müssen, die Eigenschaft der Cellulose, sich mit Jodreagentien violett oder blau zu färben, aufheben, so dass sich diese Membranen nur gelb bis braun zu färben vermögen, eine Färbung, die auch dem metamorphosirten Cellulosegewebe, der verholzten Membran, zukommt. Es soll damit jedoch nicht gesagt sein, dass es gerade nur diese Stoffe seien, welche das veränderte Verhalten der bekanntermassen annähernd zur Hälfte aus gewöhn-

1) Hühnereiweiss im doppelten Volum Wasser gelöst und filtrirt.

2) Das Imprägniren der Membranen ist bei allen Versuchen äusserst sorgfältig auszuführen.

licher Cellulose bestehenden verholzten Membranen zu Jodpräparaten und Lösungsmitteln ¹⁾ bedingen, vielmehr mag der die andere Hälfte der Faser ausmachende kohlenstoffreichere und sauerstoffärmere Körper auch dazu beitragen. Was nun die Reaction des reichlich Proteinstoffe enthaltenden Cambiumgewebes mit den Jodreagentien anlangt, so existiren über diesen Punkt in der Literatur verschiedentlich widersprechende Angaben.

Dippel sagt ²⁾: »Bringt man ganz junge, sog. cambiale Zellhüllen geschlossener Gewebe mit Chlorzinkjodlösung oder Jod und Schwefelsäure in Berührung, so bleibt dieselbe ungefärbt« und an anderer Stelle ³⁾: »In der Regel sind es nur wenige, oft nur eine oder zwei Zellreihen, welche im Cambialzustande verharren, während die diesen zunächst gelegenen Zellreihen eine Umbildung erleiden, die in Bezug auf die Verdickung der Zellstoffhülle, sowie auf die räumliche Ausdehnung des Lumens meistens nur unbedeutend ist. So gleichen die dem Cambium zunächst gelegenen Zellen diesem noch fast vollkommen, zeichnen sich aber nach der Anwendung von Chlorzinkjodlösung sofort vor ihnen aus, indem ihre jüngsten Ablagerungsschichten Zellstoffreaction zeigen, während die wahren Cambiumzellen ungefärbt bleiben« ⁴⁾. Schacht ⁵⁾ dagegen bemerkt: »Die Zellen des Cambiums bestehen in allen Fällen aus Zellstoff, Jod und Schwefelsäure färben sie hellblau.« Vom Cambium von *Pinus Pumilio* und anderen Coniferen sagt er: »Chlorzinkjodlösung, sowie Jod und Schwefelsäure färben die Cambiumzellen der Coniferen violett oder blau«, und an anderer Stelle (l. c. p. 353): »Das Cambium der dicotylen Gefässbündel bleibt in allen Fällen gleich den Zellen des Cambiumringes unverholzt (Jod und Schwefelsäure bewirken jederzeit eine blaue Färbung, beide sind reich an stickstoffhaltigen Substanzen, (Zucker und H_2SO_4 erzeugen eine rosenrothe Färbung«).

Dennoch finden sich auch bei Schacht einige Angaben, die den Schluss gestatten, dass auch Schacht in gewissen Fällen bei Cambiumzellen die Jodreaction schwach oder gar nicht auftreten sah; wenigstens kann dies l. c. p. 439 aus Tafel II Figur 11 und deren Erklärung geschlossen werden. Ebenso ist schon von anderen Autoren insbesondere von Wiesner ⁶⁾ nachgewiesen, dass die stark eiweisshaltigen, aber bereits Cellulose enthaltenden meristematischen Zellhäute die Cellulosereaction mit Chlorzinkjod erst nach langer Einwirkung des Reagenses geben.

Das beste Beispiel dürfte jedoch die Pilzmembran bieten, von welcher durch die Untersuchungen Richters nachgewiesen ist, dass keine besondere,

1) vergl. hierüber Kabsch l. c.

2) l. c. Bd. II p. 8.

3) l. c. Bd. II p. 230.

4) Vergleiche auch Dippel l. c. p. 49 und Tafel V Fig. 32 und 33 mit Erklärung.

5) Schacht, l. c. Bd. I p. 210, 213, 353.

6) Wiesner, l. c. p. 42 des S. A.

die Reactionen der gewöhnlichen Cellulose nicht besitzende »Pilzcellulose« existirt, sondern dass nach dem Kochen der Hyphen mit Kali auf Zusatz von Chlorzinkjod die charakteristische Cellulosereaction auftritt und dass es speciell Eiweisskörper sind, welche die Cellulosereaction der Pilzmembran verhindern. Schacht sagt (l. c. p. 230) von den Cambiumzellen der Coniferen: »Zucker und Schwefelsäure bewirken eine rosenrothe Färbung ihres Inhalts; auch die Verdickungsmasse der jungen Holzzellen färbt sich bisweilen rosenroth (Pinus Pumilio), es scheint demnach, als ob der stickstoffhaltige Inhalt der Cambiumzellen in die Wandung der jungen Holzzellen aufgenommen wird; ob er jedoch darin verbleibt, ist eine andere Frage«.

Im Laufe der vorliegenden Untersuchungen war mir nun ebenfalls des Oeftern Gelegenheit geboten, das Verhalten des Cambiums zu den Jodreagentien zu prüfen. Wählt man hierzu ganz dünne Schnitte, so lässt sich thatsächlich constatiren, dass die jüngste in Theilung begriffene Partie des Cambiums die Chlorzinkjodreaction sehr schwer und erst nach sehr langer Einwirkungsdauer oder überhaupt nicht zeigt; hierbei glaubte ich beobachtet zu haben, dass die Jahreszeit einen gewissen Einfluss auf die Reaction ausübe, derart, dass die geringste Cellulosereaction mit der grössten Vegetationsperiode (Frühjahr) zusammenfällt. Der sich nicht blau färbende Theil des cambialen Gewebes betrug in allen Fällen nur 1 bis 2, höchstens 3 Zelllagen, während die übrigen Cambiumzellen je nach der Schnittdicke und der Menge des angewandten Reagenses mehr oder weniger stark blau oder blauviolett gefärbt wurden. Es wäre dies also ein mit den Versuchsergebnissen Dippels und Wiesners übereinstimmendes Resultat, aus dem abgeleitet werden darf, dass unter den Bedingungen, wie sie die cambiale Zellwand zeigt, eben mikrochemische Reactionen mit besonderen Schwierigkeiten zu kämpfen haben.

Wie es sich bei den Versuchen 1, 4, 5 um die Frage handelte, ob Körper, wie Vanillin, Coniferin, Eiweiss, in eine Cellulosemembran infiltrirt, das charakteristische Verhalten zu Jodreagentien zu alteriren vermögen¹⁾, so beschäftigen sich die Versuche 2 und 3 mit der Frage: Welchen Einfluss übt infiltrirtes Eiweiss auf den Nachweis von Vanillin und Coniferin mittelst Phloroglucin resp. Thymol und Salzsäure aus?

Es existirt nun thatsächlich unter den Bedingungen, mit denen die genannten Versuche ausgeführt wurden, ein solcher Einfluss; derselbe ist jedoch viel geringer, als bei den Jodreactionen, bei denen auch makro-

1) Vielleicht liesse sich auf Grund weiterer Experimente entscheiden, dass nicht nur den genannten Stoffen diese Eigenschaften zukommen, sondern dass auch noch andere Körper bei der Infiltration in eine Membran die mikrochemischen Reactionen derselben in mehr oder weniger starkem Grade zu beeinflussen vermögen oder inwieweit von der Menge und Art dieser Substanzen diese Reactionen, sowie die Löslichkeit der Membran in Kupferoxydamoniak abhängig sind.

skopisch ein Unterschied sofort auffällt; jedenfalls aber ist unter den Versuchsbedingungen der Einfluss nicht so gross, dass Coniferin und Vanillin in der mit Eiweiss imbibirten Membran nicht mehr hätten nachgewiesen werden können. Da nun aber der Versuch mit thierischem Eiweiss ausgeführt wurde, so bleibt allerdings noch die Annahme übrig, dass pflanzliche Proteinstoffe, wie sie z. B. im Cambium vorkommen, in dieser Beziehung energischer sind und einen Nachweis der genannten Stoffe in eiweissführendem Gewebe schlechtweg verhindern.

Würde sich durch Versuche in dieser Richtung herausstellen, dass den pflanzlichen Proteinstoffen eine solche Fähigkeit nicht zukommt, so würde allerdings die zweite oben erwähnte Annahme an Wahrscheinlichkeit gewinnen, dass das Coniferin im Cambium in anderer die charakteristische Coniferinreaction nicht besitzender (polymerisirter) Form vorhanden sei.

Jedenfalls muss aus allen angeführten Gründen, insbesondere durch das gleiche Verhalten der verholzten Membran und des reinen Coniferins gegen Phenol und Thymol, aus der Förderung beider Reactionen durch directes Sonnenlicht und Kaliumchlorat, sowie auf Grund der Thatsache, dass chemisch reines Coniferin aus gewissen pflanzlichen Geweben dargestellt wird, das Vorkommen von Coniferin in der verholzten Membran als erwiesen erachtet werden.

VIII. Die Bildung des Vanillin aus Coniferin, das Product einer protoplasmatischen Thätigkeit. Mit dem Existenzbeweise des Coniferins, als eines constanten Bestandtheiles verholzter Membranen, sind auch gleichzeitig alle Vorbedingungen für das Vorkommen des so leicht aus diesem Glycosid abspaltbaren und demselben so nahe verwandten Vanillin gegeben. Da nun die verholzte Membran die Reactionen eines aromatischen Aldehyds zeigt, so ist wirklich nicht einzusehen, warum gerade der dem Coniferin nächst verwandte Aldehyd sich nicht bilden soll, sondern nach Ansicht Nickel's ein anderer; denn auch Nickel kann sich der Thatsache nicht entschlagen, dass die verschiedenen Holzreactionen durch »aldehydartige Bestandtheile« der Membranen bedingt sind¹⁾. Einerseits stellt Nickel nun zwar die Behauptung auf, der in der Holzmembran vorkommende aromatische Aldehyd sei nicht identisch mit Vanillin, vermag aber andererseits nicht, denselben mit einem andern von bekannter chemischer Constitution zu identifiziren.

Ich glaube deshalb, dass man, solange dieser Beweis für die Anschauung Nickels nicht geliefert ist, berechtigt ist, auf Grund der früheren Untersuchungen das Vorkommen von Vanillin in den verholzten Membranen anzunehmen. v. Lippmann²⁾ ist es in der That auch gelungen,

1) cf. das Citat aus Nickel p. 42.

2) Edm. v. Lippmann. Vorkommen von Vanillin und Coniferin im Spargel. Ber. d. d. Chem. Ges. z. Berlin. XVIII. Bd. p. 3335 ff.

nach einer schon vorher von ihm eingeschlagenen Methode¹⁾ geringe Mengen Vanillin neben beträchtlichen Quantitäten Coniferin aus dem Spargel darzustellen.

Abgesehen von dem bei der Holzstofffabrikation auftretenden intensiven Vanillingeruch bildet ja auch das oben ausgeführte Verhältniss von Coniferin zu den sog. Ligninreactionen und die Zurückführung der mit dem Vanillin nicht übereinstimmenden Reactionen auf den Einfluss des Coniferins wiederum eine weitere Stütze entgegen den Behauptungen Nickel's für die Annahme des Vorkommens von Vanillin in der verholzten Membran.

Was nun die Umsetzung des Coniferins in Vanillin anlangt, so fand schon Thiemann²⁾ bei seinen Untersuchungen, dass Coniferin auch durch Digestion mit Enzymen wie, z. B. Emulsin bei 30° in Zucker und Coniferylalcohol gespalten werde; durch Oxydation des letzteren erhielt Thiemann als zweites Product Vanillin.

Da nun für diese Frage von höchster Wichtigkeit sein musste, ob Eiweisskörpern von so unzweifelhaft protoplasmatischer Abstammung, wie die ungeformten Fermente es sind, in der That dieses Spaltungsvermögen zukomme, oder ob es sich bei den Versuchen Thiemanns, was mir nicht ausgeschlossen schien (es digerirte 6 Tage lang bei 30°), um das Resultat gleichzeitiger Spaltpilzwirkung handle, so wiederholte ich die Versuche im Sinne Thiemanns und ausserdem so, dass eine Entwicklung geformter Fermente in der Versuchsflüssigkeit unmöglich gemacht war. Zu diesem Zwecke wurden 100 cc einer 0,51 %igen wässrigen Coniferinlösung mit Emulsin versetzt und darauf ungefähr 2 cc Chloroform zugegeben, das bekanntermassen für geformte Fermente ein absolutes Gift ist, ohne jedoch die Wirkung der ungeformten zu hindern. Durch diesen Versuch, bei dem somit durch Zusatz von Chloroform den geformten Fermenten die Existenzbedingungen entzogen und eine Spaltpilzwirkung absolut ausgeschlossen war, musste entschieden werden, ob den Enzymen eine glycosidspaltende Wirkung zukomme. Schon ohne Anwendung einer erhöhten Temperatur, insbesondere aber bei 40 °C., liess sich nach 24stündigem Stehen durch Fehling'sche Lösung ein beträchtlicher Gehalt der Versuchsflüssigkeit an Zucker nachweisen³⁾. Der Versuch beweist also die Richtigkeit von Thiemanns Behauptung, dass ungeformte Fermente die Fähigkeit besitzen, Coniferin zu spalten. Die gleiche Fähigkeit

1) id. Ueber das Vorkommen von Coniferin in den verholzten Geweben der Zuckerrübe. Bericht. d. d. Chem. Ges. Jg. 1883. p. 44—48.


2) Thiemann l. c.

3) Die Zuckerprüfung muss in der Weise vorgenommen werden, dass zuerst die Fehling'sche Lösung für sich allein zum Kochen erhitzt und dann die Versuchsflüssigkeit zugegeben wird; hierbei muss, wenn Zucker vorhanden, momentan ein ziegelrother Niederschlag entstehen; ein Kochen der Versuchsflüssigkeit mit der alkalischen Kupferlösung ist des *KOH* halber unstatthaft.

kommt den Spaltpilzen allerdings ebenfalls zu. Bei Wiederholung des Versuchs mit Sprosspilzen (*Saccharomyces*) findet man dasselbe Spaltungsvermögen, wenn auch in beschränkterem Maasse¹⁾.

Bei der Gummi- und Schleimbildung aus Cellulosemembranen ist von Wiesner bekanntermassen ein diastatisches (der Klasse der Stärke umbildenden Enzyme angehöriges) ungeformtes Ferment als wirksames Princip erkannt worden. Ein Hauptergebniss der Untersuchungen Wiesner's ist es, durch eine diesem Ferment eigenthümliche Reaction mit Orcin und Salzsäure zu zeigen, dass das Gummiferment im Protoplasma entsteht, aus diesem in die Zellwände übertritt und hier die Umwandlung von Cellulose in Gummi oder Schleim bewirkt.

Durch die Thatsache, dass diese chemische Veränderung der Gewebe auf einen aus dem Protoplasma entstandenen Eiweisskörper zurückzuführen ist, sowie aus dem Umstande, dass auch bei andersartiger Metamorphose, wie der Verholzung als constante Bestandtheile der entstehenden Membranen, Gummiarten nachgewiesen sind (Singer, Thomson), glaube ich schliessen zu dürfen, dass, insbesondere bei diesem Process, die Mitwirkung des Protoplasmas oder der aus diesem, nach dem Principe der Arbeitheilung entstehenden, mit ganz bestimmten Funktionen begabten Eiweisskörper hoher chemischer Energie, der »Enzyme«, eine weit ausgedehntere sei, als bisher angenommen wurde, und dass auch die Entstehung des Vanillins aus Coniferin innerhalb der verholzenden, noch eiweissführenden Membran auf einen fermentativen Spaltungsprocess, auf Beihilfe ungeformter Eiweisskörper protoplasmatischer Abstammung und secundäre Oxydation des entstehenden Productes zu Vanillin zurückzuführen sei:




Es ist also ausserordentlich wahrscheinlich, dass das Coniferin durch ein ungeformtes Ferment unter Wasseraufnahme in Coniferylalkohol und Zucker zerfällt, ersterer wird dann durch Oxydation glatt in Vanillin und Kohlensäure²⁾ übergeführt. Wie man sich also die Bildung von Holzgummi und Vanillin unter Beihilfe von Eiweisskörpern (Protoplasma, Enzymen) erklären kann, so könnte auch der aromatische Kern selbst protoplasmatischer Abstammung sein.

1) Bei diesem Versuche muss selbstverständlich eine spaltpilzfreie Hefe-reinkultur verwandt werden; besitzt man keine solche, so kann die Nährlösung durch Zusatz von 1 % salzsaurem Chinolin oder von Hopfenbitter, beides für Spaltpilze starke Gifte, ohne Sprosspilze in ihrer Vegetation zu hindern, für die Entwicklung von Spaltpilzen untauglich gemacht werden.

2) cf. Chem. Centralblatt. Jg. 1866. p. 40.

Dass die Coniferinbildung in der verholzenden Membran in einem bestimmten Zusammenhang mit der Veränderung der Cellulosemembran und den hiebei statthabenden chemischen Vorgängen steht, dürfte für Niemand bei näherer Beobachtung der Thatsachen, insbesondere des constanten Vorkommens dieses Körpers überall da, wo eine solche Metamorphose stattgefunden hat, ein Zweifel sein. Für diese Beziehungen zum gesammten Verholzungsprocess findet man zwei Erklärungen, indem man entweder die Entstehung desselben als ein Nebenproduct aus Cellulose annimmt, oder indem man seine Existenz als Resultat protoplasmatischer, der lebenden die Metamorphose eingehenden Zellwand angehöriger Proteinstoffe ansieht. Bekanntermassen ist diese Metamorphose der Cellulosemembranen keine vollständige, sondern es bleibt stets, nach Entfernung aller fremdartiger Körper, ein zwischen 48 und 58% schwankender Rest reiner Cellulose zurück. Diese ist in der von allen Beimengungen befreiten verholzten Faser mit der sog. »Ligninsubstanz« verbunden. Bei der Verbrennung der gereinigten Holzfaser fand man, nach Abzug der Cellulose 55,55% C; 5,83% H; 38,62% O, Werthe, die sich etwa durch die Formel $C_{18} H_{24} O_{10}$ ausdrücken lassen. Sachsse¹⁾ vergleicht diese für das »Lignin« aufgestellte Formel mit der der Cellulose, er sagt darüber: »Um also Cellulose in Lignin überzuführen, müssen Reduction und Wasseraustritt erfolgen. So leicht nun auch im Protoplasma reine Reductionsprocesse verlaufen können, so schwer hält es doch, sich in einer fertig gebildeten verholzten Membran, die mit Sauerstoff in Berührung sein kann, sich einen solchen zu denken und vorzustellen. Um diese Schwierigkeiten zu beseitigen, bleibt nur die Annahme einer durch Abspaltung einer sauerstoffreicheren Atomgruppe erfolgenden Reduction übrig, wobei der Uebergang von Cellulose in Lignin etwa durch folgende Gleichung sich ausdrücken liesse:




Die abgespaltene sauerstoffreichere Verbindung könnte dann durch den Sauerstoff der Luft vollständig zu Kohlensäure und Wasser verbrennen oder in andere Verbindungen (Gerbsäuren) übergehen«.


Würde man Coniferin als Nebenproduct aus der Cellulose entstehend auffassen, so wäre der von Sachsse angenommene Austritt einer sauerstoffreicheren Atomgruppe nicht nöthig²⁾.

1) Sachsse l. c. p. 145. f.

2) Ohne Annahme einer Beihilfe des Plasmas ist diese Entstehungsweise mit dem heutigen Stande der Chemie, wenn auch nicht unmöglich, so doch ziemlich schwer vereinbar, demnach wäre der Process etwa folgender:



oder



Der bei dieser Umsetzung frei werdende Sauerstoff könnte zur theilweisen Oxydation des Coniferylalkohols zu Vanillin verwandt werden.

Die zweite Erklärungsweise, das in der Membran vorkommende Coniferin sei protoplasmatischen Ursprungs, findet in den Untersuchungen Wiesners¹⁾ eine Hauptstütze, die das Vorkommen von Protoplasma in der lebenden Zellwand höchstwahrscheinlich erscheinen lassen. Dieser Forscher kommt zu dem Resultate, dass sich durch die Annahme eines konstanten Vorkommens von Eiweisskörpern in der lebenden Membran die statthabenden chemischen Vorgänge am leichtesten erklären lassen. Das Vorkommen von Verbindungen mit aromatischem Kern in der Zellwand lässt sich jedenfalls durch diese Annahme weit leichter erklären, als wenn man dieselben als Umwandlungsproducte der Cellulosemembran auffasst. Wiesner sagt über diesen Punkt: »Ich glaube, dass die hier vorgetragene Ansicht, dass stets Protoplasma in der lebenden Zellwand vorhanden ist, das Verständniss der in der Zellwand statthabenden chemischen Vorgänge mehr fördern wird, als die bisherige Lehre, derzufolge alle sogenannten Umwandlungsproducte der Zellwand aus Cellulose sich ableiten sollen«. Bezüglich des Nachweises eines solchen Vorkommens von Eiweiss in den verholzenden und verholzten Zellhäuten ist zu bemerken, dass Krasser²⁾ zu dem Ergebniss kam, es lasse sich mittelst Millon'schem Reagens unter Zuziehung der Alloxan-Reaction in den verholzten Membranen des Hypoderms, in Xylem und Bastzellen verschiedener Pflanzen ein Eiweissgehalt mit Sicherheit constatiren.

Immerhin bemerkenswerth ist, dass mehr oder weniger die meisten Forscher, die sich mit dieser Aufgabe beschäftigt haben, immer zu derselben Ueberzeugung gekommen sind, dass die mit dem Namen der »Verholzung« bezeichnete Metamorphose der Cellulosemembran in gewissem Verhältniss zu protoplasmatischer Thätigkeit stehen müsse.

Schon 1874 gelangte Burgerstein³⁾ zu dem Resultate, dass der »Holzstoff« stets zuerst in den Gefässwänden und zwar überraschend früh, gewöhnlich schon am dritten Tage nach dem Sichtbarwerden des Keimes auftritt. Wenn Burgerstein am Schlusse seiner Abhandlung sagt: »Freilich bleibt es noch fraglich, ob die Holzsubstanz ein einfaches Spaltungsproduct der Cellulose ist, oder ob nicht zur Entstehung des Holzstoffes aus der Cellulose auf letztere chemische Individuen einwirken müssen, welche im Zellinhalte auftreten. Dieses bleibt um so mehr fraglich, als ich eine Verholzung niemals an Geweben constatiren konnte, welche keinen Zellsaft mehr führten«, so glaube ich, dass schon er hier sicher an protoplasmatische Einwirkungen dachte.

Untersucht man statt der Keimlinge Vegetationsspitzen entwickelter Pflanzen vom Scheitel rückwärts mit Phloroglucin oder Indol-Salzsäure,

1) Wiesner l. c. p. 40 ff. des S. A.

2) Fr. Krasser im Sitzungsber. d. K. Acad. d. Wiss. z. Wien Bd. XCIV., Jg. 1886, p. 118.

3) Burgerstein ibidem Bd. LXX, Jg. 1874.

z. B. *Coleus*, so findet man auf den Längsschnitten zuoberst die ring- und spiralförmig verdickten länglichen Zellen, während sie noch von einander durch Zwischenwände getrennt sind, bereits verholzt, wobei die obersten Zellen noch deutlich Zellkern und Plasma enthalten, die beide an den weiter rückwärts gelegenen mit gleichzeitiger weiterer Ausbildung der Spiralen und Resorption der Querwände¹⁾ also mit Bildung des eigentlichen Spiralgefäßes unter Zunahme der Verholzung verschwinden. Es ist dies ein Beispiel, welches zeigt, dass die Verholzung der Membran an Vegetationsspitzen Hand in Hand mit der Bildung der Gefäße geht, und dass mit dem Schwinden des protoplasmatischen Inhalts der Zellzüge eine Zunahme des »Verholzungsgrades« verbunden ist. In vielen Fällen schien mir das eben angelegte Spiralband junger Zellen auch bei Berücksichtigung der relativen Dickenverhältnisse stärker verholzt, als die anliegende Zellmembran.

IX. Das Verhältniss von Coniferin zu Vanillin. Werden Querschnitte²⁾ verschiedener Stammhöhen derselben Pflanze vom Vegetationspunkte rückwärts mit Thallin untersucht, so findet man, dass die Reaktion um so schwächer auftritt, je näher die untersuchten Partien dem Sprossende liegen, je jünger also die metamorphosirten Gewebe sind. Es erhellt aus diesem Verhalten, dass die Menge des Vanillins nach oben geringer wird und dass diese Abnahme in bestimmtem Verhältniss zum Alter dieses Gewebes steht.

Behandelt man zur Vergleichung Schnitte der entsprechenden Stammhöhen mit Thymol-Salzsäure, so findet man, dass da, wo die Thallinreaktion nur noch schwach vorhanden war, also bei ganz jungen dem Vegetationsgipfel nahe liegenden Querschnitten, nichts desto weniger die Thymol-Reaktion noch mit ziemlicher Stärke auftritt, dass mithin in diesen eben verholzenden Membranen ein ungleich grösserer Procentsatz Coniferin als Vanillin enthalten oder dass mit andern Worten nur ein geringer Theil des beim Verholzungsprocess der Membran entstandenen Coniferins in Vanillin umgebildet ist. Ist nun die Ansicht richtig, dass je jünger die verholzte Zelle sei, um so weniger enthalte dieselbe Vanillin, um so mehr Coniferin, so müssen nothwendigerweise nicht nur die den Vegetationsgipfeln zunächstliegenden, sondern auch die dem Cambium, dem Bildungsgewebe benachbarten verholzenden Zellen schwache Vanillinreaction mit Thallin, starke Coniferinreaction mit Thymol geben, es müsste also, wenn die oben aufgestellte Behauptung richtig wäre, die Thallinreaction einmal nach oben und ausserdem dann auch nach der Peripherie, d. h. nach dem Cambium zu ab-, die Thymol-Reaction nach den beiden Richtungen dagegen zunehmen. Fig. II der angehefteten Tafel, ein Querschnitt 1 cm

1) Die später der Resorption anheimfallenden Querwände schienen mir in allen Fällen nur schwach, meistens aber gar nicht verholzt.

2) Zu diesem und allen folgenden Versuchen wurden stets mit dem Mikrotom hergestellte Querschnitte von constanter Dicke benutzt.

unterhalb des Vegetationsgipfels von Nerium Oleander, zeigt auf der linken Seite die entstehenden Holzgefässe nach Behandlung mit Thymol-Salzsäure, auf der rechten Seite der Figur nach Behandlung mit Thallinsulfat. Die dem Cambium *cb* zunächst liegenden eben verholzenden Zellen *y* und *y*¹ färben sich, wie dies selbstverständlich ist, mit beiden Reactionen nur schwach, da eben erst während des Verlaufs des Verholzungsprocesses successive Coniferin gebildet wird. Die darauf folgende Schichte *z* zeigt bei der Thymol-Reaction die stärkste Färbung, es ist also hier der Höhepunkt für dieselbe erreicht, indem einerseits die Verholzung unter reichlicher Coniferinbildung soweit vorgeschritten ist, um die intensivste Blaufärbung zu zeigen, andererseits aber, wie dies aus der rechtsseitigen Figur bei *z*¹ erhellt, relativ noch wenig Vanillin abgespalten ist. Die ältesten, dem Marke zunächstliegenden Zellen *r* sind durch Thymol weniger intensiv blau gefärbt, da hier mit der zunehmenden Verholzung ein grosser Theil des gebildeten Coniferins in Vanillin umgewandelt ist, wie dies die Reaction mit Thallin bei *r*¹ zeigt, deren intensives Eintreten einen relativ hohen Gehalt der Membran an Vanillin bekundet. Da nun die Wirkung der beiden Reagentien, wie schon oben erwähnt wurde, in der Art verschieden ist, dass Thallin nur mit Vanillin, Thymol nur mit Coniferin reagirt, das Vanillin aber gleichzeitig mit der Zunahme der Verholzung der Membran successive aus Coniferin entsteht, so erlaubt eine Combination dieser zwei Reagentien eine Bestimmung der relativen Mengenverhältnisse beider Stoffe und zeigt mithin gewisse Grade der Verholzung an. Da reine Coniferinwatte mit Thymol-Salzsäure blau, Vanillinwatte mit Thallin goldgelb reagirt, so muss bei gleichzeitiger Anwendung beider Reagentien die Reactionsfarbe einer mit einer Mischung von Coniferin und Vanillin imprägnirten Watte umsomehr gelb erscheinen, je mehr sie Vanillin enthält, um so mehr blau, je grösser ihr Coniferingehalt ist, d. h. es werden verschiedene Deckfarben zwischen gelb und blau entstehen, die sich vom dunkelsten blaugrün bis zum hellsten gelbgrün bewegen. Da nun die Thymolreaction von einer Summe nicht absolut bestimmbarer Factoren abhängig ist, so wählt man, um die Reaction mehr zu beherrschen, am besten ein bestimmtes Verhältniss beider Reagentien, das bei richtiger Anwendung und einiger Uebung eine bequeme Anschauung der Verholzungsgrade liefert.

X. Thymol-Thallin. Wie jede auf einer Farbenreaction beruhende quantitative Bestimmungsmethode der analytischen Chemie und Mikrochemie mehr oder weniger schon durch den einen Umstand ungenau ist, dass die Art der Färbung und deren Bezeichnungsweise an sich in hohem Grade dem subjectiven Ermessen anheimgegeben werden muss, und wie durch diese bekannte Thatsache der theilweisen Farbenblindheit jede derartige auf Farbenunterschieden beruhende Reaction mehr oder weniger zu leiden hat, so soll und kann auch die jetzt zu beschreibende

Methode keine absoluten Zahlenwerthe für Verholzungsgrade geben, sondern bietet allgemeine Anhaltspunkte, die hauptsächlich nur da von Werth sind, wo es sich um entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen der bezeichneten Gewebemetamorphose handelt. Ausser den genannten für die absolute Genauigkeit hinderlichen Factoren kommen bei der Thymol-Thallinreaction auch noch zwei andere hinzu, nämlich die Abhängigkeit der Färbungsintensität bei Thymol von der direkten Beleuchtung und der Dauer der Einwirkung, von denen allerdings der erstere Umstand durch Zusatz von chlorsaurem Kali nahezu vollständig vermieden ist. Als Reagenz von constanter Zusammensetzung benutze ich folgende Lösung:

5% Thymol-Thallin¹⁾:

0,5 gr Thallinsulfat
1,0 gr Thymol
2 cc destill. Wasser
26,5 cc Alkohol.

Dieser Lösung fügt man noch 0,5 gr. Kaliumchlorat hinzu. Beim Gebrauche mischt man entweder 1 cc dieser Lösung mit 1 cc Salzsäure vom sp. G. 1,124 und behandelt die Schnitte je mit gleichen Mengen dieser Mischung, oder man lässt obige Lösung auf die unter einem Deckglase auf dem Objektträger befindlichen Schnitte 1 bis 2 Minuten einwirken, saugt mittelst Löschpapier die Lösung ab und fügt nun vom Rande her ebensoviel Salzsäure zu.

Von der Art der Reaction kann man sich eine Vorstellung verschaffen, wenn man den schon oben angeführten vanillinfreien Holzstoff mit Mischungen von Vanillin und Coniferin in wechselnden Mengen etwa in folgenden Verhältnissen imprägnirt:

	Vanillin.	Coniferin.	
Lösung α	0,05	0,45	= 1 : 9
» β	0,10	0,40	= 2 : 8
» γ	0,15	0,35	= 3 : 7
» δ	0,20	0,30	= 4 : 6
» ε	0,25	0,25	= 5 : 5 (Normallösung)
» ζ	0,30	0,20	= 6 : 4
» η	0,35	0,15	= 7 : 3
» θ	0,40	0,10	= 8 : 2
» ι	0,45	0,05	= 9 : 1

1) Bei jungen sehr Coniferinreichen Gewebspartien empfiehlt es sich manchmal, um die Unterschiede in den einzelnen Zellschichten zu vergrößern, die folgende Thallinreichere Mischung zu verwenden:

1,0 gr Thymol
1,0 gr Thallin
30 cc Alkohol
8 cc Wasser
0,5 gr Kaliumchlorat.

[Die betreffenden Vanillin- und Coniferin-Mengen werden in einer Mischung aus 1 cc Alkohol und 1 cc Wasser durch Erwärmen gelöst und in dieser Lösung der Holzstoff gekocht, dann leicht ausgepresst und getrocknet. Diese Operation wird so oft wiederholt, bis ein ganz gleichmässig durchtränktes Product erhalten wird].

Bei gleichen Mengen des angewandten Reagenses schwankt dann die Farbennuance der Proben zwischen blau und gelb, bewegt sich also vom dunkelsten blaugrün bis zum hellsten gelbgrün.

Befeuchtet man einen an einem ganz jungen Spross von Nerium Oleander 1 cm unterhalb des Vegetationsgipfels ausgeführten Querschnitt mit Phloroglucin-Salzsäure (Fig. I), so findet man den Xylemtheil x ziemlich gleichmässig gefärbt, mit Ausnahme der eben aus dem Cambium cb entstandenen äussersten Holzzellen y , die noch ganz wenig Coniferin und Vanillin enthalten, und sich braungelb bis ziegelroth färben. Behandelt man einen gleichen Schnitt mit Thallin (s. Fig. II rechts), so findet man, dass ausser den erwähnten eben entstehenden Holzzellen y^1 auch die jüngeren dem Cambium nahe liegenden Zellen z^1 überhaupt schwach gefärbt sind, während die innern dem Marke zu gelegenen r^1 intensiv goldgelb erscheinen. Da nach dem oben Gesagten Vanillin die Vorbedingung für das Eintreten der Thallin-Reaction ist, so muss in diesem Falle in den jüngeren Zellen weniger von diesem Stoffe gebildet sein. Behandelt man endlich einen dritten Schnitt aus gleicher Stammhöhe (Fig. II links) mit Thymol-Salzsäure, so färben sich hier diejenigen Zellen z am intensivsten, die mit Thallin sich schwach färbten, während die älteren Zellen r nur wenig tingirt sind. Daraus! geht hervor, dass die eben aus dem Cambium entstehenden Zellen y und y^1 sehr wenig Vanillin und Coniferin enthalten, dass die jüngeren Xylemzellen z und z^1 mehr Coniferin als Vanillin besitzen und dass die älteren Holzzellen r und r^1 reich an Vanillin und weniger reich an Coniferin sind.

Behandelt man nun einen ebensolchen Schnitt mit Thymol-Thallin (Fig. III), so findet man wiederum die aus dem Cambium eben entstehenden Xylemzellen y schwach blau gefärbt, also schwach verholzend, die darauf folgenden Zellpartien z sind stark blau bis blaugrün, es ist also hier viel Coniferin neben wenig Vanillin, endlich sind die dem Marke zunächst befindlichen Zellen r grün mit Stich in grüngelb und deuten neben Coniferin auf grössere Mengen Vanillin hin.

Untersucht man jetzt einen Querschnitt, der 2 cm weiter rückwärts als der letzte durch denselben Spross geführt wird (Fig. IV), so findet man auch hier ganz genau wieder dasselbe Bild. Fig. V zeigt dann einen mit Thymol-Thallin behandelten Querschnitt 6 cm rückwärts der Vegetationspitze; wiederum tingirt sich die dem Cambium zunächst liegende, eben den Verholzungsprocess eingehende Holzschicht y nur schwach, während

die darauf folgenden Partien x^1 stark und zwar dunkel- grünblau gefärbt sind, die also mehr Coniferin enthält als Vanillin; auf diese folgt dann x^2 eine dunkelgrüne Zellschicht, bei der die Vanillin- und Coniferinreaction etwa gleich ist, und zuletzt x^3 , die dem Marke zunächst liegenden Zellen, die sich durch auffallend gelbgrüne bis grüngelbe Farbe auszeichnen und bei denen die Vanillinreaction somit vorherrscht.

Wie bei den verschiedenen Zellpartien eines einjährigen Triebes eine Verschiedenheit des gegenseitigen Verhältnisses von Vanillin und Coniferin je nach dem Alter der betreffenden Zellen zu constatiren ist, so bietet auch wieder jede einzelne Zelle ein Beispiel hierfür, ein Umstand, auf den schon Dippel, Schacht u. a. beim Studium der Intercellularsubstanz, der primären, secundären und tertiären Membran aufmerksam gemacht haben. Schliesslich seien noch einige weitere Beispiele angeführt.

Der Holztheil eines Ende Juli durch einen jungen Spross von *Vitis vinifera* 5 cm unterhalb des Vegetationsgipfels ausgeführten Querschnitt nahm auf Zusatz von Thymol-Thallin eine blaugrünliche Färbung an. 5 cm rückwärts dieses Schnittes war die Färbung blaugrün, 10 cm weiter zurück trat der Vanillingehalt schon derart hervor, dass die Färbung eine dunkelgrüne mit Stich ins blaugüne war und 10 cm von diesem färbte sich die Holzmembran vollständig grün.

Ein 3 cm unterhalb der Vegetationsspitze von *Prunus domestica* ausgeführter Querschnitt zeigte bei Behandlung mit Thymol-Thallin eine rein blaue Farbe der verholzten Membran. 3 cm rückwärts dieses Schnittes färbte sich ein gleichbehandelter Schnitt hellblau mit Stich in grünblau, während die Holzmembran eines um weitere 10 cm entfernten Schnittes eine grünblaue Färbung annahm. Für die Beobachtung etwas störend ist der Phloroglucingehalt mancher Querschnitte, indem derselbe an und für sich mit der Salzsäure des Reagenses eine schwach violettrote Färbung der Holzmembran bewirkt.

Dieser Umstand wirkt, wie schon Molisch angibt, auch bei der Thymolreaction störend, kann jedoch durch Entfernen der den Hauptsitz des Phloroglucins bildenden Rinde des betreffenden Querschnittes aufgehoben werden, abgesehen davon, dass er bei einiger Uebung die Reaction kaum beeinflusst, so dass mit derselben die verschiedenen Verholzungsstufen mit Sicherheit unterschieden werden können. Beispiele hierfür bilden z. B. *Ampelopsis hederac.*, *Betula alb.*, *Rubus*, *Prunus* u. a., bei denen durch gleichzeitige Untersuchung mit Salzsäure die Stärke der durch Phloroglucin bewirkten schwachen Rothviolett-färbung genau bekannt wird.

Bevor ich zum zusammenfassenden Ergebnisse der combinirten Reaction gehe, möchte ich an dieser Stelle Herrn Professor Dr. Dingler,

durch dessen lebenswürdige wie hilfreiche Unterstützung mir ein grosses Versuchsmaterial zugänglich wurde, meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Durch die Thatsache, dass bei den dem Marke zu liegenden Partien, also den ältesten Holzzellen, die Coniferinreaction ab, die Vanillinreaction dagegen zunimmt, dürfte noch ein letzter Beweis dafür erbracht sein, dass das Vanillin aus dem Coniferin entsteht. Bemerkenswerth ist nun, dass aber nicht etwa die ganze in der verholzenden Membran vorhandene Coniferinmenge in Vanillin umgewandelt wird, sondern dass immer nur ein bestimmter Theil desselben in den aromatischen Aldehyd übergeht, so dass selbst die ältesten Holzzellen noch die Coniferinreaction mit Phenol- oder Thymolsalzsäure in schönster Weise zeigen, was ein Beweis dafür ist, dass in einer gewissen Altersperiode bei der Verholzung die Abspaltung von Vanillin aus Coniferin aufhört und der dann noch restirende Coniferingehalt der Membran constant bleibt.

Erklärung der Abbildungen.

- Fig. I. Querschnitt 1 cm unterhalb der Vegetationsspitze von Nerium Oleander nach Behandlung mit Phloroglucin. *ph* = Phloëm, *cb* = Cambium, *x* = Xylem, *m* = Mark. *y* = die eben verholzenden Zellen. Vergr. = 240/1.
- Fig. II. Querschnitt durch Nerium Oleander 1 cm unterhalb des Gipfels, auf der linken Seite mit Thymol-Salzsäure, auf der rechten mit Thallin behandelt. Bezeichnung wie bei Fig. I.
- Fig. III. Querschnitt durch Nerium Oleander 1 cm unterhalb des Gipfels, mit Thymol-Thallin behandelt. Bezeichnungsweise wie bei Fig. I.
- Fig. IV. Querschnitt durch Nerium 3 cm unterhalb des Gipfels, links mit Thymol-Thallin, rechts mit Thymolsalzsäure (schematisch).
- Fig. V. Querschnitt durch Nerium Oleander 6 cm rückwärts der Vegetationsspitze mit Thymol-Thallin.
- Fig. VI. Querschnitt durch Nerium Oleander 1jähr. Trieb, mit Thallinsulfat behandelt. *b* = Bastfasern. Figurenbezeichnung wie bei Fig. I (schematisch).
- Fig. VII. Baumwollfäden nach Behandlung mit Jod und Schwefelsäure. *a, b, c, d* nach Infiltration von Vanillin resp. Coniferin und Eiweiss. *e, f, g* ohne Infiltration. cf. S. 47.
-

Arbeiten aus dem botanischen Institut zu Marburg.

VI. B. Schaefer: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Fruchtknotens und der Placenten.

(Hierzu Taf. III, IV, V u. IV.)

Vorliegende Arbeit soll einen kleinen Beitrag liefern zum besseren Verständniss des Aufbaues von Fruchtknoten und der Entwicklung von Placenten einiger Angiospermen.

Seitdem durch Hofmeisters »Vergleichende Untersuchungen«¹⁾ bewiesen ist, dass der Embryosack in den Samenknospen der höheren Pflanzen den Makrosporen der höheren Gefässkryptogamen vollständig entspricht, ist durch eine Reihe weiterer Arbeiten verschiedener Forscher der bedeutungsvolle Nachweis geliefert worden, dass auch die den Embryosack einschliessenden Samenknospen ihrer Entwicklung und dem ganzen Baue nach mit den die Sporen hervorbringenden Sporangien derartig übereinstimmen, dass man auch diese Organe als vollständig gleichwerthig ansehen muss²⁾, womit die Frage nach der morphologischen Werthigkeit der Eichen, welche lange Zeit von verschiedenen Forschern erörtert worden ist, und über welche man zu keinem abschliessenden Resultate gelangen konnte, endgültig als werthlos beseitigt sein dürfte. Betrachten wir die Ursprungstätten dieser Sporangien bei den Gefässkryptogamen, so ergibt sich, dass die Sporangien in den klaren und überaus meisten Fällen von Blättern getragen werden, die in den einfachsten Fällen mit den gewöhnlichen Laubblättern vollständig übereinstimmen, in andern dagegen mehr oder weniger tiefgreifende Veränderungen erfahren haben, doch so, dass sie in ihren ersten Anlagen sich deutlich als Blätter ausweisen. Man bezeichnet dieselben als Sporophylle. Die Sporophylle der meisten echten Filicineen, bei denen die Sporangien aus Epidermiszellen des Blattes entstehen, unterscheiden sich in nichts von den vegetativen Blättern. Auch diejenigen Sporophylle, welche von gewöhnlichen Laubblättern bedeutend abweichen, z. B. bei *Onoclea Struthiopteris*, sind doch als direkte Umwandlungen von Laubblättern anzusehen, wie sich nach Goebel experimentell bestätigen lässt³⁾. Bei den Equisetaceen stimmen die Sporangienträger ihrer ersten Anlage nach mit den Blattanlagen vollständig überein und erfahren erst im weiteren Verlaufe der Entwicklung die ihren späteren abweichenden Bau bedingenden Veränderungen. Bei *Lycopodium* hat

1) W. Hofmeister: Vergl. Unters. der Keimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen. Lpz. 1851.

2) Goebel: Vergl. Entwicklungsgesch. der Pflanzenorgane. — Schenk, Handb. der Bot. Bd. III, pag. 382 ff. — Ders.: Beitr. zur vergl. Entwicklungsgesch. der Sporangien. Bot. Ztg. 1880 u. 1881. — Warming: de l'ovule. Ann. d. sc. nat. VI. série Bot. T. V. — Strasburger: Die Angiospermen und die Gymnospermen. Jena 1879.

3) Goebel: Ueber künstliche Vergrünung der Sporophylle von *Onoclea Struthiopteris*. Ber. der Deutsch. Bot. Ges. Bd. V. Berlin 1887, LXIX.

Hegelmaier ¹⁾ nachgewiesen — und Goebel bestätigt dessen Angaben, dass die Sporangien auf der Blattbasis entspringen und ihre spätere Stellung in den Axeln der Blätter durch Verschiebung gewinnen. Ebenso entstehen die Sporangien bei Isoëtes aus Zellen der Blattbasis und behalten diese Stellung auch bei. Anders verhält es sich dagegen bei Selaginella. Zwar sind auch hier einige Forscher der Ansicht, dass die Sporangien von Zellen der Blattbasis gebildet werden, doch sollen nach den genaueren Untersuchungen dieselben aus Oberflächenzellen des Stammvegetationspunktes entspringen und zwar aus solchen, die unmittelbar über denjenigen liegen, aus welchen der Blatthöcker hervorgeht. In späteren Stadien ist dieses nicht mehr zu erkennen, indem die Sporangien später auf die Blattbasis gerückt erscheinen. Schon dieser Umstand, dass das die Sporangien tragende Gewebe später in die Bildung des Blattes mit hineingezogen wird, muss auffällig erscheinen, wenn nicht schon Selaginella durch dieses auffällige Verhalten den übrigen Gefässkryptogamen gegenüber vereinzelt dastände. Es wäre doch wohl möglich, dass auch jene Zellen, aus welchen die Sporangien entstehen, schon von Anfang an mit zur Blattanlage gehören. Diese Frage verdient eine erneute gründliche Prüfung mit besonderer gleichzeitiger Berücksichtigung der Blattentwicklung. Verfasser war die Entscheidung leider wegen Mangels an passendem Materiale nicht möglich.

Ebenso erweisen sich die Träger der Sporangien bei den Gymnospermen als echte Blätter, als Sporophylle. Dieselben unterscheiden sich z. B. bei Cycas in nichts von den gewöhnlichen Blättern. In anderen Fällen ist wieder genaue Uebereinstimmung in der Anlage von Blättern und Sporangienträgern nachweisbar.

Schwieriger gestalten sich nun die Verhältnisse bei den Angiospermen. Es liegt in der Natur der eigenthümlichen Ausbildung des Gynaeceums der Angiospermen begründet, dass man hier oft zweifelhaft sein konnte, ob nicht neben den Sporophyllen, den Fruchtblättern oder Karpellen, auch die Axe einen bedeutenden Antheil an der Ausbildung des Gynaeceums und zwar des wichtigsten Theiles desselben, nämlich der die Samenknospen tragenden Placenta, habe. So wurden manche Forscher zur Unterscheidung eines axilen und eines appendikulären Theiles des Gynaeceums geführt. Diese Unterscheidung wurde wohl zum grossen Theile der »Knospentheorie« der Samenknospen zu Liebe gemacht, indem diese dann stets auf dem axilen Theile gefunden wurden. Die einfachsten Fälle mussten dadurch eine gezwungene Erklärung finden, diejenigen Fälle nämlich, in denen die Samenknospen an den Rändern der Fruchtblätter sitzen. Es hat nun bereits Goebel in seiner vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane und in seinem Beitrag: Zur

1) Hegelmaier: Zur Morphologie der Gattung *Lycopodium*. Bot. Ztg. 1872.

Entwicklungsgeschichte des unterständigen Fruchtknotens¹⁾ für manche zweifelhafte Fälle den Nachweis geliefert, dass die Ursprungsstellen der Samenknospen, die Placenten, doch als Theile der Fruchtblätter aufzufassen sind. Von mir wurden einige weitere Pflanzen daraufhin untersucht und mögen die Resultate dieser Untersuchung im Folgenden dargestellt werden.

Zur Untersuchung der einschlägigen Fragen konnten nur 2 Methoden in Betracht kommen, die anatomische und die vergleichend entwicklungsgeschichtliche. Wenn Payer²⁾ zu der falschen Ansicht gelangte: »que dans tout pistil il y a une partie axile qui porte les ovules et une partie appendiculaire«, so ist der Fehler gewiss nicht auf Rechnung der entwicklungsgeschichtlichen Methode zu schreiben, sondern wurde verursacht durch eine vielfach äusserliche und ungenaue Beurtheilung der vortrefflichen Beobachtungen und in der nicht immer lückenlosen Darstellung der entwicklungsgeschichtlichen Stadien. Van Tieghem³⁾ hatte bei seiner abfälligen Kritik der entwicklungsgeschichtlichen Methode wohl nur die Untersuchungen Payers vor Augen. Er behauptet: Sur cet ordre de choses l'organogénie ne peut donc rien nous apprendre et en ce qui concerne en particulier la question proposée, elle est impuissante à faire avec quelque certitude, la part de ce qui dans un pistil donné, revient à l'axe floral, et de ce qui est dû aux appendices. Und warum? Weil die Entwicklungsgeschichte keine entwicklungsgeschichtlichen Definitionen habe für l'axe d'un côté, l'appendice de l'autre! Das ist nun allerdings kaum möglich, und es kann als Merkmal eines Blattes bei kritischer Betrachtung schliesslich nur die seitliche Stellung oder entwicklungsgeschichtlich das seitliche Entstehen an einem Axengebilde geltend gemacht werden⁴⁾. Aber wie steht es mit seinen eigenen anatomischen Definitionen für die Begriffe Blatt und Axe? Er stützt dieselben auf die Vertheilung der Gefässbündel und sagt⁵⁾: »En résumé, le système vasculaire des axes tant végétatifs floraux des Dicotylédones et des pédicelles floraux des Monocotylédones, est symétrique par rapport à une droite; le système vasculaire des appendices n'est symétrique que par rapport à un plan«. So bestimmt also Van Tieghem die Begriffe appendikulär und axial nach der Gefässbündelvertheilung in den ausgebildeten Organen. Er vergisst dabei, dass die Gefässbündel erst secundärer Entstehung sind, dass ihre

1) Goebel: Zur Entwicklungsgeschichte des unterständigen Fruchtknotens. Bot. Ztg. 1886.

2) Payer: Organogénie comparée de la fleur pag. 728 u. f.

3) Van Tieghem: Recherches sur la structure du pistil. (Ann. des sc. nat. V. série bot. IX. Paris 1868. pag. 144 ff.

4) Vergl. die Ausführungen in Goebel; vergl. Entwicklungsgesch. der Pflanzenorgane. pag. 128 u. 129.

5) l. c. pag. 131.

Anordnung durch die besondere Ausbildung des betreffenden Organes bedingt ist, so dass man nicht umgekehrt sagen darf: Dieses Organ ist appendikulär oder es ist axial, weil die Gefässbündel in dieser betreffenden Weise angeordnet sind! Auch in den Inflorescenzaxen von *Urtica dioica* ist der Holzring ein nach oben offener. »Der Querschnitt einer jüngeren »Inflorescenzaxe zeigt, dass der der Rückenseite angehörige Theil des »Gefässbündelringes kaum angelegt ist, während auf den Flanken und »der Bauchseite schon Bündel mit stark entwickelten Phloëm- und »Xylemtheilen sich finden«¹⁾. Schon Hofmeister sagt: »Uebereinstimmungen oder Differenzen der äusseren Form, des inneren Baues, der Funktion sind nicht massgebend für die Deutung eines gegebenen Gebildes als Axe, Blatt oder Haar«²⁾. Gerade durch entwicklungsgeschichtliche Untersuchung könnte diese anatomische Methode erst volle Sicherheit erlangen, durch Zurückgehen auf die frühesten Stadien und den Nachweis über die Art der Ausbildung der Gefässbündel. Dazu kommt noch, dass Van Tieghem der Möglichkeit von Fehlern dadurch ausgesetzt ist, dass er seine Schlüsse fast nur auf successive Querschnitte basirt hat. Dabei können immerhin in vielen Fällen die mittelst dieser anatomischen Methode gefundenen Resultate das Richtige treffen. Dieselbe Methode ist es aber auch, welche Van Tieghem zu den ganz unhaltbaren Resultaten bezüglich der Phyllokladien von *Ruscus* u. a. geführt hat³⁾. Dieselben sind ihm Blattorgane, deshalb, weil deren anatomischer Bau völlig dem Bau eines Blattes entspricht, dessen Dorsalseite nach oben, dessen Ventralseite nach unten gewendet ist, indem nämlich die in der cylindrischen Basis im Kreise angeordneten Gefässe sich allmählich in eine Ebene ausbreiten und divergirend die ganze Lamina durchziehen, dabei immer mit dem Phloem nach oben, mit dem Xylem nach unten gerichtet. Ist die ganze Art der Betrachtung äusserlich, so führt sie auch zu eigenthümlichen Folgerungen. Seine Begründung stützt sich ganz auf den Umstand, dass in dem Mittelnerv der Gefässbündel-Cylinder nicht so vorhanden ist, wie man es bei einem Sprosse erwartet, und wie derselbe bei den Flachsprossen von *Opuntia* und *Mühlenbeckia*, bei den Sprossen von *Epiphyllum*, *Phyllanthus*, *Xylophylla* und *Phyllocladus* sich findet. Dieser centrale Gefässbündelcylinder findet sich nun aber in den fertilen Phyllokladien bis zur Ansatzstelle der Braktee deutlich entwickelt, und auch Van Tieghem erblickt hierin den Centralcylinder der Axe. Ist also das Phyllokladium fertil, so wäre es bis zu dem Punkte, wo die Blüthe sich ausbildet, Axe, und

1) K. Goebel: Ueber die Verzweigung dorsiventraler Sprosse. Arb. des Bot. Inst. zu Würzburg. Bd. II. Lpz. 1882. 3. Heft. pag. 430.

2) Hofmeister: Allgemeine Morphologie pag. 415.

3) Ph. Van Tieghem: Sur les feuilles assimilatrices et l'inflorescence des *Danaë*, *Ruscus* et *Semele* (Bulletin de la Soc. Bot. de France IIème série. T. VI. 1884. pag. 81—90).

begänne von da an Vorblatt (?) zu sein, oder das Vorblatt müsste an der Axe hinablaufen! Bringt es dagegen keine Blüthen hervor, so wäre es seiner ganzen Ausdehnung nach Blattorgan (auch Vorblatt?); — und das deshalb, weil kein Cylinder von Gefässen mehr vorhanden ist! Bedenkt man dagegen, dass, wie schon betont, die Gefässbündel erst nachträglich entstehen, und dass sie in einer Axe sich bilden, welche gewissermassen das Bestreben hat, in die von ihr ausgegliederten Gebilde diese Gefässbündel abzugeben, so ist es doch gewiss erklärlich, wenn sie nicht mehr zur Ausbildung gelangen, sobald das Bestreben, Seitenglieder zu bilden, aufhört. Da ferner bekanntlich bei *Ruscus* die Sprossspitze selbst sich schliesslich blattartig ausbildet, so hätten wir hier nach Van Tieghem's Auffassung den einzigen Fall eines terminalen Blattes in der vegetativen Region (auch Vorblatt?), der Umwandlung eines Sprossvegetationspunktes in ein Blatt. Zum Schlusse mag noch erwähnt sein, was schon Schacht betonte ¹⁾, dass entwicklungsgeschichtlich die Anlage eines Phyllokladiums von derjenigen eines cylindrischen Zweiges nicht zu unterscheiden ist, und dass sich erst später zeigt, was ein cylindrischer Zweig, was ein Phyllokladium wird.

So sehen wir, kehrt sich der Vorwurf geradezu um. Gerade die Entwicklungsgeschichte ist geeignet, uns über die fraglichen Verhältnisse Aufschluss zu geben. Doch muss eine vergleichende Betrachtung und Deutung eintreten, weil das Material uns selten eine vollständig lückenlose Entwicklungsreihe liefert. Die Vergleichung mit klaren Fällen kann uns dann die Gesichtspunkte liefern, kann uns diejenigen Entwicklungsstufen andeuten, auf deren Vorhandensein wir unser Augenmerk zu richten haben. Denn man darf nicht vergessen, dass die auf Grund blosser komparativer Methode gefundenen Resultate nur hypothetischen Werth haben, solange diese nicht auch entwicklungsgeschichtlich unwiderleglich erhärtet sind.

Den bedeutendsten Fortschritt in den vergleichend entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen bezeichnet Goebels letzte Arbeit über den unterständigen Fruchtknoten. Er stellt daselbst den Grundsatz auf, nach welchem »künftige vergleichend-entwicklungsgeschichtliche Untersuchungen über Fruchtknotenentwicklung zu verfahren haben«, nämlich den, zu untersuchen, »welches Areal des Blütenbodens die Fruchtblätter gleich bei ihrem Auftreten einnehmen« ²⁾.

Bevor ich mit der Einzeldarstellung beginne, muss ich noch etwas näher eingehen auf Celakovsky's Theorie der Tuten- oder Kappenbildung, auf welche dieser Forscher die Fruchtknotenbildung zurückführt. Er hat in seiner »Vergleichenden Darstellung der Entwicklung der Placenten

1) Schacht: Beitrag zur Entwicklungsgeschichte flächenartiger Stammorgane. Flora 1853, pag. 471.

2) l. c. pag. 738.

in den Fruchtknoten der Phanerogamen«¹⁾), einer Arbeit, die verfasst ist zwecks genauerer Begründung der Foliartheorie der Eichen, diese Theorie der Tutenbildung aufgestellt auf Grund seines Studiums verlaubter Eichen und umgebildeter Staubgefäße. Welchen geringen Werth das Studium der Missbildungen für die Entscheidung entwicklungsgeschichtlicher Fragen hat, ist schon genugsam von anderer Seite betont worden. Ich brauche deshalb darauf nicht näher einzugehen. Da, wo er die Entwicklungsgeschichte mit zu Rathe gezogen hat, hat er sich darauf beschränkt, das in dem trefflichen Atlas zu Payers organogénie de la fleur niedergelegte Material nach seinen Anschauungen zu deuten, wobei manche Unrichtigkeiten mit unterfliessen, und hat sich mit eigenen entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen nicht befasst. Er stellt den Vorgang der Kappenbildung folgendermassen dar²⁾): »Das junge Blattprimordium von halbkugelig oder etwas cylindrischer Gestalt plattet sich bei weiterem Wachsthum ab, indem es in transversaler Richtung (senkrecht zur Mediane) mehr in die Breite wächst, wodurch die Blattränder gebildet und eine Ober- und Unterseite differenziert werden. Nimmt die Abplattung, also die Differenz zwischen dem Breitenwachsthum, in medianer und transversaler Richtung bis zu Null nach dem Grunde des Blattes (Blattstiel z. B.) zu ab, so nähern sich einander die Blattränder auf der Oberseite des Blattes, bis sie zusammenstossen, sie gehen aus der senkrechten zur Längsaxe des Blattes parallelen Richtung in eine schiefe und zuletzt dazu transversale Richtung über; in diesem Punkte hört die differenzierte Blattoberseite auf; mit den Blatträndern greift auch die Blattunterseite nach oben herum, der stielrunde Blattstiel ist ringsum undifferenzierte Unterseite. Findet nun ein Breitenwachsthum, von den so gelegenen Rändern ausgehend, also auch in transversaler Richtung statt, so entsteht eine Tute oder Kappe; und zwar ist diese Kappe ventral gespalten, wenn nur der Punkt, in dem die Ränder der Abplattung zusammentreffen, an dem Breitenwachsthum nicht theilnimmt; die durch das nachträgliche Breitenwachsthum entstandenen Ränder bleiben untereinander frei. Wenn aber kein Punkt des transversalen Randes von dem allgemeinen Breitenwachsthum zurückbleibt, so wächst die Kappe geschlossen, indem die Ränder der vorigen Figur verschmolzen erscheinen. Dass die ventrale Mittellinie der geschlossenen Kappe wirklich als durch Verschmelzung freier Ränder vorgestellt werden muss, beweisen die Fälle, wo der freie Blattrand der gespaltenen Ventralseite der Kappe normal und gesetzlich eine seitliche Blattsprossung erzeugt, denn dann erscheint in der geschlossenen Kappe diese Sprossung innen an der ventralen Mittellinie. Solche konstante Sprossungen sind die Ovularblättchen der Karpellarkappen, die im normalen Ovarium nach innen stehen, in Vergrünungen, in denen die Kappe erst in eine gespaltene

1) Celakovsky: Vergl. Darst. der Plac. in den Frkn. der Phanerog. Prag 1876.

2) Cel. l. c. pag. 20 u. 21.

Kappe und dann in ein flaches Blatt zurückgegangen ist, am freien Rande des Blattes entstehen«. Celakovsky ist sogar »die Kappe des Ovularblättchens, inneres (oder einziges) Integument genannt, genau dieselbe morphologische Bildung, wie die Kappe des Karpells«! Dass diese Schilderung nicht auf entwicklungsgeschichtliche Thatsachen gegründet ist, sondern auf Vermuthungen, die aus Vergrünungen gewonnen sind, ist leicht zu sehen. Vergrünungen, an denen er die Schilderung erläutert, sind ihm massgebend für Darstellung eines entwicklungsgeschichtlichen Vorganges! Dieser stimmt dann auch mit seiner Auffassung keineswegs überein. Danach ist zunächst zu betonen, dass von einem Uebergreifen der Blattunterseite nach oben herum nichts zu bemerken ist. Die Ausbildung der Kappe, besonders des Ventraltheiles derselben, geht auch keineswegs von den vorher differenzirten Blatträndern aus, sondern mindestens gleichzeitig mit vorschreitender Differenzirung dieser Ränder erhebt sich der Ventraltheil als ein geschlossener Wulst, als Wucherung an der basalen Partie der Oberseite des Blattes. Dieses ist der entwicklungsgeschichtliche Vorgang, wie er schon von Goebel bei den Rosaceen und Ranuncuaceen unter Hinweis auf die analoge Ausbildung des schildförmigen Blattes dargestellt worden ist¹⁾. Zwar führt auch Celakovsky an, dass die Bildung schildförmiger Blätter mit der Kappenbildung im Wesentlichen identisch sei, wonach er von der Entwicklung schildförmiger Blätter eine ebenso äusserliche Vorstellung zu haben scheint. Goebel bezeichnet »den unteren, das Karpell abschliessenden, nicht durch Verwachsung der Karpellränder entstandenen Theil als die »Sohle« desselben«, während Celakovsky sich des Ausdrucks »Kesseltheil« bedient. Dass die normal auftretenden »konstanten Sprossungen der Ovularblättchen« innen auf der ventralen Mittellinie dieser Sohle stehen, kann nicht gegen unsere Auffassung sprechen, da wir die Samenknospen nicht als Blattfiedern, die immer am Rande stehen müssten, anzusehen haben, sondern als den Sporangien der höheren Gefässkryptogamen analoge Bildungen, von denen wir wissen, dass sie auch, wie z. B. bei *Ceratopteris*, auf der Blattoberfläche selbst stehen können. Viel eher könnte man bei der Verschmelzung zweier Ränder und bei der Auffassung der Samenknospen als Blattfieder 2 den beiden Rändern entsprechende Sprossungen nebeneinander erwarten. Ebensowohl kann man sich vorstellen, dass bei Vergrünungen die normal zur Ausbildung der Sohle verwandte Gewebepartie sich theilt oder an einen der Blattränder rückt, wo dann auch die Samenknospe erscheint. Die Blattsohlentheorie, welche mit der Entwicklungsgeschichte vollkommen übereinstimmt, ist früher auch von Celakovsky ausgesprochen worden. Er verliess dieselbe, weil nach seiner Meinung »die Blattsohlentheorie manche Vergrünungserscheinungen nicht erklären kann, nämlich die, dass die ovula z. B. das unterste von *Dictamnus*, am Rande des Fruchtblattes erscheinen, dagegen

1) Goebel, Vergl. Entw. pag. 309 ff.

normalerweise auf der Axe oder Blattsohle«¹⁾. Wir haben gesehen, dass sie das doch sehr wohl kann. Massgebend ist uns, dass die Blattsohlentheorie mit der Entwicklungsgeschichte vollkommen übereinstimmt, während die Kappentheorie mit ihr im Widerspruch steht.

In allen Fällen nun, wo die Bildung einer Sohle aus dem Karpelhöcker entwicklungsgeschichtlich nachweisbar ist, kann natürlich von einer Betheiligung der Blütenaxe am Aufbaue des Gynaeceums keine Rede sein. Nicht so klar, wie bei den Ranunculaceen, lag die Entwicklungsgeschichte bei einigen anderen apokarpen Gynäceen, so bei *Ailanthus glandulosa*. Ich werde im Folgenden zunächst die Resultate meiner Untersuchung an *Ailanthus* mittheilen.

***Ailanthus glandulosa*.**

Die Blüten werden Anfangs Mai angelegt und sind bereits Mitte Mai so weit vorgeschritten, dass die ersten Stadien der Karpellentwicklung zu verfolgen sind. Die Karpelle werden, wie auch Payer richtig darstellt²⁾, als 5 gesonderte halbkugelige Höcker seitlich des schwachgewölbten Blütenvegetationspunktes angelegt, erscheinen also nicht, wie Celakovsky fälschlich angibt, in Form eines Ringwulstes³⁾. Diese Gestaltung bezeichnet vielmehr eine spätere Entwicklungsstufe, und wir werden sehen, wie dieselbe zu Stande kommt. Aus einem Längsschnitte durch schon etwas vorgeschrittene Karpellanlagen erkennen wir, dass die Höcker von dem Blütenvegetationspunkte nur schwach abgesetzt sind, an ihrer Innenböschung sich allmählich verflachen. Die innere Seite des Höckers hat sich abgeflacht und reicht an dem Vegetationspunkte weiter hinauf als es auf den ersten Blick besonders bei Oberansichten scheinen möchte. Es hat sich also durch Abplattung des Höckers eine Differenz zwischen Ober- und Unterseite des Höckers herausgebildet. Im weiteren Verlaufe der Entwicklung würden sich nach Payer vor den 5 Höckern Vertiefungen bilden. Dieser Beobachtung liegt das Stadium zu Grunde, welches auch Celakovsky veranlasst hat, die Karpelle in Form eines Ringwulstes erscheinen zu lassen⁴⁾. Die vor diesen Vertiefungen liegenden, von der Axe aus zwischen die Ränder der karpellären Ringwulste vorspringenden Theile, aus welchen später die Samenknospen hervorsprossen, vollkommen entsprechend den Karpellsohlen der Rosaceen und Ranunculaceen, würden demnach nicht Bildungen der ursprünglichen Karpellanlagen sein, sondern Neubildungen des Blütenvegetationspunktes. Auf einem Längsschnitte durch eine solche vorgeschrittene Karpellanlage ruft diese Sohle den

1) Cel. l. c. pag. 12.

2) Payer, l. c. Pl. 24, Fig. 8.

3) Cel. l. c. pag. 33, angeführt unter B: Karpelle in Form eines Ringwulstes erscheinend.

4) Payer, l. c. Fig. 9.

Anschein hervor, als ob sie einen neuen inneren Blattkreis darstelle (Fig. 2). Es würde diese Anschauung derjenigen entsprechen, welche Huisgen für *Reseda luteola* und die Cruciferen zu beweisen versuchte, »dass die Placenten vollständige, unabhängige, aber mit den Fruchtknoten verwachsene Gebilde seien« ¹⁾, eine Ansicht, auf welche wir im Weiteren noch genauer einzugehen haben, deren Unrichtigkeit in den betreffenden Fällen bereits von Goebel nachgewiesen wurde ²⁾. Auch für unseren Fall ist diese Anschauung nicht haltbar. Schon die genauere Betrachtung der so weit vorgeschrittenen Karpellanlage auf einem medianen, etwas stärkeren, die Anlage etwa halbirenden Schnitte, kann uns das Richtige zeigen. Da sehen wir, dass die Ränder des Ringwulstes keineswegs bloss bis zur Axe reichen, so dass dazwischen die Sohle hervorsprossete. Vielmehr umgreifen dieselben die Basis der Sohle, sie setzen sich direkt in die Sohle fort, was uns schon wahrscheinlich macht, dass wir diese als einen Theil der ursprünglichen Karpellanlage zu betrachten haben. Diese Vermuthung bestätigt sich bei genauerer Untersuchung dieses als Sohle bezeichneten Theiles. Wir waren bereits darauf aufmerksam geworden, dass der an seiner Oberfläche etwas abgeflachte Höcker bei seiner Weiterentwicklung ein ziemlich bedeutendes Areal des Blütenvegetationspunktes verbraucht. Schon danach muss die Sohle, wie aus ihrer späteren Stellung folgt, von der Basis des Karpelles aus gebildet sein. In der That ergibt sich, dass die Vertiefung nicht vor den Karpellen auf der Axe auftritt, sondern auf diesen selbst, und zwar dadurch, dass, eingeleitet durch Periblemtheilungen, aus der Basis der Karpellanlagen, und zwar auf deren Oberseite, sich ein Höcker hervorwölbt, die Anlage der späteren Karpellsohle (Fig. 1). Dass die Sohle später gegen die Karpelloberfläche so scharf abgesetzt ist, dass sie als eine Sprossung der Blütenaxe selbst erscheint, beruht darauf, dass mit dem gleichmässig, aber langsam, sich erhebenden Blütenvegetationspunkt, besonders die der Axe zugekehrte Seite der Sohlenanlage, emporgewölbt wird, so dass dieselbe gleichsam um die Ansatzstelle der Sohle an die Karpellfläche gedreht erscheint, während gleichzeitig die Randpartieen der Oberseite stark in die Höhe, die unter der Karpellspitze liegenden Theile stark in die Breite wachsen, wodurch jene eigenthümliche Kapuzenform entsteht, welche mit geringen Abänderungen bei allen Formen mit Sohlenbildung wiederkehrt.

Als Resultat unserer Untersuchung ergibt sich somit, dass die die Placenta darstellende Sohle nicht aufzufassen ist als durch Verwachsung freier Karpellränder entstanden, sondern dass sie sich darstellt als eine geschlossen auftretende Ausgliederung der basalen Partie des abgeflachten Karpellprimordiums. Da sich die Sohle an die Karpellränder stets direct

1) Huisgen, Untersuchungen über die Entwicklung der Placenten. Bonn 1873. (Diss.)

2) Goebel, Vergl. Entw. l. c. pag. 816.

ansetzt, so ist nicht zu verwundern, das bei Vergrünungen die Sohle den Karpellrändern entsprechend sich theilt resp. in den Blattrand direct sich fortsetzt.

Der Vorgang, auf welchem die geschilderte Sohlenbildung hier beruht, ist jedenfalls ein in der Fruchtknotenbildung auch anderwärts sich wiederholender. Wahrscheinlich haben wir es damit in allen den Fällen zu thun, wo vor den Karpellhöckern Vertiefungen auftreten, so dass die ursprünglich halbkugeligen Höcker dann in der Form hufeisenförmiger Wälle erscheinen. Die Vertiefungen treten dann nicht vor den Höckern auf, sondern auf den Karpellanlagen selbst.

Verschieden von dieser Art der Placentenbildung ist die besonders bei synkarper Fruchtknotenbildung sich findende, wo die verwachsenden Ränder je zweier zusammenstossender Karpellhöcker anschwellen und die Samenknospen an diesen Anschwellungen hervorbringen.

Beide Fälle können auch combinirt auftreten, derart, dass zunächst die Basis des Primordiums anschwillt und von da aus vorschreitend die miteinander in Berührung tretenden Ränder. So finden wir es bei manchen Malvaceen. Ich werde im Folgenden eine vergleichende Darstellung der Fruchtknotenentwicklung innerhalb dieser Familie versuchen, soweit es mir nach eigenen Untersuchungen und nach dem von Payer in seinen Tafeln niedergelegten Beobachtungen möglich ist.

Malvaceen.

Man hat hier Gattungen, bei denen im fertigen Zustande nur eine Samenknospe in jedem der Fächer anzutreffen ist, und andere, bei denen mehrere Samenknospen sich finden. Den ersteren Fall pflegt man als den typischen zu betrachten. Huisgen¹⁾ hat in seinen Untersuchungen sich vollständig auf diesen beschränkt und dehnt den durch ganz äusserliche Betrachtung gewonnenen Schluss auf die ganze Familie aus: »Bei den Malvaceen folgt schon aus der Stellung der Samenknospen ihr unmittelbarer Ursprung aus reinem Axenorgan«. Auch der Satz: »die Axe bildet sich nicht einmal zu einem besonderen Organe aus, dem man den Namen Placenta geben könnte«, gilt nicht für alle Fälle. Ausserdem werden wir sehen, dass die Placenta, wenn sie besonders ausgebildet wird, deutlich als Erzeugniss der Karpelle, nicht aber der Axe erscheint.

Von Vertretern der Malvaceen mit nur einer Samenknospe in jedem Fache untersuchte ich *Malva moschata* und *Althaea rosea*, sodann *Malope trifida* und *Kitaibelia vitifolia*. Die einzige Samenknospe entspringt bei den ersten beiden aus einer scheinbar der Axe zugehörigen von dieser nicht scharf abgesetzten, der Mitte des Karpelles gegenüberliegenden

1) Huisgen: Untersuchungen über die Entwicklung der Placenten. Diss. Bonn 1873, pag. 21.

Gewebepartic. Die Längsschnitte von *Malva* lassen erkennen, dass hier die ganze von den Karpellen gebildete Höhlung durch die eine Samenknospe von deren erstem Auftreten an völlig ausgefüllt ist. Huisgen giebt hierüber an: »Die Fruchtblätter umfassen die Samenknospen von aussen und von den Seiten her vollständig, bleiben jedoch unten ziemlich zart, weshalb der stehenbleibende doppelte Kelch eine schützende Hülle für dieselben abgeben muss. Oberhalb derselben wachsen sie zum Griffel aus und verrücken sich in einer stärkeren Bedeckung der Samenknospen«. Vielleicht dienen auch die bei einigen Arten, z. B. bei *Abutilon*, an der inneren Seite der Kronblätter auftretenden Harleisten, die sich zunächst allerdings wohl als Nektarien darstellen, mit demselben Zwecke. Das Gewebe der Samenknospe geht scheinbar direct in dasjenige der Axe über. Das Gefässbündel ist ein Zweig des nach der schmalen Ansatzstelle des Karpellrückens gehenden.

Während bei *Malva* und *Althaea* die in Mehrzahl vorhandenen Fächer in gleicher Höhe rings am Rande des Blütenbodens sich befinden, und als Träger der Samenknospen eine besondere Placenta nicht ausgebildet ist, sind diese bei *Malope* und *Kitaibelia* in 5 Gruppen vereinigt, wo jede Gruppe mehrere bogenförmig über dem Rande sich erhebende Fächer enthält. Es sind 5 von dem Axengewebe scharf abgesonderte Gewebewülste vorhanden, welche rings an ihrem Rande die Fächer und in jedem eine Samenknospe tragen.

In dem anderen Falle der *Malvaceen* mit mehreren Samenknospen in jedem Fache finden wir diese in 2 Reihen angeordnet. Ich untersuchte aus der hierher gehörigen Gruppe 2 Arten von *Abutilon* aus dem Gewächshause des hiesigen botanischen Gartens, welche Anfang Januar die Entwicklung der Karpelle in allen Stadien zeigten. Die Samenknospen sitzen hier an deutlich entwickelten Placenten, die leicht als Anschwellungen der Karpellränder zu erkennen sind. Payer hat die Entwicklung einer ganzen Anzahl hierhergehöriger Arten dargestellt. Bei *Hibiscus syriacus*¹⁾ sehen wir die Placenten ihrer ganzen Ausdehnung nach durch eine deutliche Furche geschieden. Die Anzahl der Samenknospen ist bei dieser Art paarig. In anderen Fällen dagegen sind die Placenten unten miteinander verschmolzen und tragen an dieser Stelle noch eine oder mehrere Samenknospen, so bei *Hibiscus illicifolius*²⁾. Sogar einen äusseren Gegensatz zwischen beiden Arten von Samenknospen, zwischen der einen unpaaren und den paarigen Samenknospen haben wir bei *Sphaeralcea angustifolia*³⁾, wo die untere unpaare Samenknospe die Mikropyle, wie gewöhnlich bei den *Malvaceen*, nach unten richtet, die paarigen dagegen mit den Mikropylen nach oben gewendet sind. Die untere Samenknospe wird stets zuerst

1) Payer: l. c. Pl. 7. Fig. 22 u. 23.

2) Payer: l. c. Pl. 6, Fig. 18.

3) Payer: l. c. Pl. 6, Fig. 26.

angelegt, darauf die oberen Paare in nach oben fortschreitender Reihenfolge. Bei *Modiola caroliniana* sind in dem von Payer abgebildeten Stadium ¹⁾ die Placenten vollständig entwickelt, dagegen erst die eine unpaare Samenknospe angelegt, während die seitlichen bedeutend später erscheinen, zu einer anderen Zeit, wo die untere unpaare Samenknospe in ihrer Entwicklung schon weit vorgeschritten ist. Bei meinen Untersuchungen an *Abutilon* fand ich diese Beobachtung überall bestätigt, indem auch hier die untere unpaare Samenknospe in ihrer Entwicklung stets am weitesten vorgeschritten war. Es ist diese Bemerkung von Wichtigkeit für das Verständniss der Ausbildung der Placenten, indem danach der Schluss nahe liegt, dass auch diese in derselben Richtung, von unten nach oben, der vorschreitenden Verwachsung der Karpellränder entsprechend, vor sich geht. Die Placenta ist auch meist am unteren Ende am massigsten entwickelt. Auf einem Längsschnitte durch die Placenta eines der 15 Fächer von *Abutilon venosum* erscheint die Placenta bei noch nicht ganz ausgebildeten Fruchtknoten da, wo das Karpell an dem Vegetationspunkt mit breiter Basis schräg aufsitzt, als ein breiter Wulst hervorgewölbt, der sich nach oben hin etwas verschmälert (Fig. 4). Das untere Ende der Höhlung liegt hier mit dem Vegetationspunkte fast in gleicher Höhe, während später der Vegetationspunkt ungefähr gleiche Höhe hat mit dem oberen Ende der Höhlung, die sich bedeutend vertieft hat (Fig. 3). Die Placenta erscheint in so vorgeschrittenem Stadium nicht mehr wie in jüngeren Stadien von der Axe scharf abgesetzt, bildet vielmehr die äusserste Schicht derselben. Ohne Berücksichtigung der Entwicklung könnte bei oberflächlicher Betrachtung nur der älteren Stadien der Schein entstehen, als ob die Placenten von der Axe gebildet würden, oder vielmehr als ob die Samenknospen direkt aus der Axe entsprängen, da eine besondere als Placenta ausgebildete Gewebeparthie hier scheinbar nicht mehr vorhanden ist. Sie ist nur noch angedeutet in einem geringen vor der Fruchtknothöhhlung liegenden Wulst. Hervorgerufen ist diese Veränderung durch ein nachträgliches gesteigertes Wachsthum der Axe besonders in ihren Randparthien, wodurch auch die Spitze der Axe, welche vorher als ein ziemlich spitzer Kegel erschien, sich abflacht. Die Axe wird so gewissermassen von der früher als deutlich abgesetzten Placenta nachweisbaren Gewebeparthie »berindet«. Ein solches nachträgliches gesteigertes Wachsthum der Randparthien der Axe habe ich auch noch bei anderen Malvenarten beobachtet, z. B. bei *Malva moschata* (Fig. 9 u. 10). Dasselbe wirkt hier, dass die früher den höchsten Punkt einnehmende Mitte des flachen Blütenbodens später etwas eingesenkt erscheint (Fig. 9). Dieses Wachsthum bewirkt bei *Abutilon* auch, dass die oberen Enden der Karpelle von der als Wulst nur noch angedeuteten Placenta unter einem Winkel

1) Payer: l. c. Pl. 6, Fig. 19.

scharf abgesetzt erscheinen (Fig. 3, bei *a*), während sie früher auf dem breiten Placentenwulst direct auflagerten, dessen Richtung fortsetzend (Fig. 4).

Dass die Placenten entstehen durch Verwachsen und Anschwellen der zusammentreffenden Karpellränder, kann man auch auf successiven Querschnitten leicht verfolgen. In der Region, welche dem Uebergange der Placenten in die oberen Enden der Karpelle entspricht, findet man, dass die Placenten sich spalten und man erkennt, dass die anstossenden Enden zweier Placenten, die sich zusammenneigen, zusammengehören als die Ränder eines Karpelles (Fig. 7).

Damit ist jedoch noch nicht bewiesen, dass auch der untere Theil des Placentenwulstes, die Stelle, wo die seitlichen Placenten miteinander verschmolzen sind, karpellaren Ursprungs ist. Dieser Placententheil welcher auch meist nur eine unpaare Samenknospe trägt, ist es aber offenbar, welcher bei der ersten Gruppe der Malvaceen dem die einzige Samenknospe tragenden Gewebe entspricht, und gilt es vor Allem über Ursprung und Bedeutung desselben klar zu werden. Zwar lässt schon der Umstand, dass bei den Malvenarten, wo durch Entwicklung dieses Theiles neben den seitlichen Placenten das ganze Samenknospen tragende Gewebe zu einem hufeisenförmig gestalteten Wulste entwickelt ist, derselbe sich direct an die seitlichen Placenten ansetzt, ohne Grenze in dieselben übergeht, als gewiss annehmen, dass das ganze Gewebe einheitlicher Entstehung ist, doch müssen wir, um darüber volle Sicherheit zu erlangen, auf die jüngsten Entwicklungsstufen der Fruchtknotenanlagen zurückgehen.

Durch Periblemtheilungen werden die Karpelle bei den meisten Malven in einer Mehrzahl von 5 als rundliche halbkugelige Höcker am Rande des flachen Blüthenvegetationspunktes angelegt. Längsschnitte durch diese ersten Anlagen zeigen immer dasselbe Bild. Dieselben verbrauchen rasch den ganzen Rand des Vegetationspunktes, indem sie durch Wachsthum in die Breite mit den Basen miteinander in Berührung treten, so dass dann der Rand von einem Ringwulst eingenommen ist, welcher eine Mehrzahl von 5 halbkugeligen Höckern trägt. An der Innenseite böscht sich derselbe allmählich ab, indem die Zelltheilungen auch nach der Mitte der Blüthenanlage hin vorschreiten. Für die Möglichkeit der Auffassung dieser Karpelle als Fieder von 5 primordialen Höckern ergibt sich hier kein Anhaltspunkt. Anders ist es bei *Kitaibelia vitifolia*, für welches ich Payers Beobachtungen ¹⁾ bestätigen kann. Hier werden zuerst 5 primordiale Höcker angelegt, an deren Rande dann die Fruchtknotenanlagen als Fieder hervorsprossen. Auch bei *Malope trifida* ist diese Art der Entstehung noch angedeutet, indem hier die Anlagen nicht im Kreise am Rande des Blüthenvegetationspunktes angeordnet sind, sondern in einem Fünfseit (Fig. 13), und zwar so, dass immer die Mitten dieser 5 Seiten am höchsten stehen,

1) Payer, l. c. Pl. 8, Fig. 9 u. 10.

um so höher, je weiter die Entwicklung fortschreitet. Danach kann man die bei *Kitaibelia* stattfindende Entwicklung der Karpelle als Fieder von 5 primordialen Höckern als das Ursprüngliche ansehen, und es würde dann *Malope trifida* den Uebergang vermitteln zu der Rückbildung bei den anderen Malvenarten, wo eine solche Ausbildung nicht mehr erkennbar ist. Bezeichnend für das Aufbrauchen des gesammten Randes der Blüthenaxe ist es, dass auch bei *Kitaibelia* und *Malope* die zwischen den 5 ersten Anlagen liegenden Ecken sich mit Karpellanlagen bedecken. In derselben Weise wie bei *Ailanthus* flachen sich diese Höcker an der Oberfläche ab. Während jedoch dort auf den Karpellen eine Vertiefung entstand durch Hervorwölben eines Wulstes aus dem Grunde der Anlage, erhebt sich hier zuerst durch starkes Längenwachsthum der Rückentheile und von da aus seitlich vorschreitend die Seitentheile. Durch dieses starke Hervorwölben von Rücken- und Seitentheilen, das verbunden ist mit einem Anschwellen derselben, erscheint die Mitte der Anlage vertieft. Es haben sich somit wiederum mitten auf den Anlagen Vertiefungen, Grübchen gebildet, nicht vor denselben, wie es Payer auch hier falsch angibt. Da die Karpellanlagen den Rand des Blüthenvegetationspunktes aufbrauchen, so treten die jetzt hufeisenförmig gestalteten Anschwellungen miteinander in Berührung. Dadurch, dass die Anschwellungen immer weiter nach der Mitte zu vorschreiten, scheinen die Berührungsstellen der Hufeisen immer nach dem Vegetationspunkt hin vorzugreifen. Sehr lehrreich für diesen Vorgang ist die von Payer dargestellte Entwicklung von *Pavonia hastata* ¹⁾. Diese Malve beginnt die Fruchtknotenentwicklung mit der Anlage von 10 Karpellhöckern. Payer gibt hierüber an (pag. 38): »Ce sont dix mamelons dont cinq un peu plus grands que les autres, semblent nés les premiers: ils sont ici déjà réunis par la base de manière à former une enceinte continue«. Die 10 Höcker erscheinen jedoch jedenfalls gleichzeitig. Dass in dem von Payer gezeichneten ersten Stadium 5 der Höcker grösser erscheinen als die anderen, beruht gewiss nicht darauf, dass sie früher angelegt werden, sondern es ergibt sich aus der Entwicklungsgeschichte, dass die anderen 5 Höcker, welche kleiner erscheinen, in der Entwicklung überhaupt zurückbleiben. Es sind diejenigen, welche später keine Vertiefungen an ihrem Grunde zeigen, also keine Fächer bilden. Ihre einzige Entwicklung ist die, dass sie in die Länge wachsen und dabei von dem Walle passiv emporgehoben werden. Wir haben dann später, obwohl 10 Karpelle angelegt sind, doch nur 5 Fächer mit 10 Griffeln. Indem so zwischen 2 fruchtbaren Karpellen immer ein unfruchtbares liegt, kann man das Vorgreifen der Anschwellungen sehr schön verfolgen (Fig. 11 bei Payer). Sie umgreifen den Rand der unfruchtbaren Karpelle bis zur Vereinigung mit dem nächstfolgenden fruchtbaren Karpelle, sich dort zur Anlage der Placenta massig entwickelnd. So

1) Payer, l. c. Pl. 7, Fig. 10 u. 11.

erscheinen dann später die unfruchtbaren Karpelle als Spitzen der Placentenwülste, von denen sie anfangs noch durch eine seichte Furche getrennt sind.

Diese Thatsache, dass bei fortschreitender Entwicklung ein immer grösseres Areal des Blütenvegetationspunktes in die Fruchtknotenbildung mit hineingezogen wird, zur Ausbildung der Fruchtblätter verwandt wird, ist auch sonst vielfach zu beobachten. So umfasst z. B. das einzige Fruchtblatt der Papilionaceen beim Entstehen nur die eine Seite der Blütenaxe in Form eines Hufeisens, dehnt sich aber allmählich über den ganzen Axenscheitel aus¹⁾. Auch bei Ausbildung vegetativer Blätter, z. B. des Grasblattes, findet sich, wie Goebel gezeigt hat, ganz derselbe Vorgang.

War die bisher geschilderte Entwicklung bei allen Malven ziemlich dieselbe, so zeigen sich im weiteren Verlauf derselben bei den einzelnen Arten bedeutende Unterschiede. Bei *Abutilon* wird die Höhlung schliesslich unten gegen die Axe hin geschlossen, dadurch, dass die Anschwellung der Karpellränder immer weiter vorschreitend schliesslich auch die der Axe angrenzende Ansatzstelle ergreift. Dieser zuletzt sich massig entwickelnde Rand der Fruchtblätter ist es aber, welcher später als die Vereinigungsstelle der seitlichen Placenten erscheint, auf dessen Entstehung es uns ankommt. Würde das Flächenwachsthum des Karpellrückens hier ein mehr gefördertes sein, wie bei *Ailanthus*, und die Oeffnung sich vorne durch einfache Verwachsung der Ränder schliessen, so würde dieser Theil ebenso wie bei *Ailanthus* uns als »Sohle« entgegentreten (Fig. 5). Bei *Abutilon* ist jedoch die Placentenbildung damit noch nicht abgeschlossen. Vielmehr treten hier, von dieser Verschlussstelle der ringförmigen Anschwellung an, die Karpellränder, welche als die nach der Axe zu stark verbreiterten Enden der Leisten erscheinen, von unten nach oben fortschreitend bei massiger Entwicklung miteinander in Berührung und verwachsen, bis schliesslich die Höhlung nach vorne ganz geschlossen ist. Wir sehen, dass die Anschwellung der der Sohle bei *Ailanthus* entsprechenden Ansatzstelle der Fruchtblattoberseite hier zuletzt auftritt, während sie bei *Ailanthus* die Aushöhlung des Höckers einleitet. Auf einem Längsschnitte durch ein Stadium, wo die Ausbildung der seitlichen Placenten noch nicht begonnen hat, erhalten wir dasselbe Bild wie bei *Ailanthus*. Die »Sohle« ist von den seitlichen Rändern umfasst. Ein weiterer Unterschied gegen *Ailanthus* ist der, dass dort die vordere Spalte einfach durch Verwachsung der Ränder von oben her geschlossen wurde, was hier deshalb nicht möglich ist, weil die Ränder der Fruchtblätter hier nicht frei sind. Durch Verwachsung der zusammenstossenden seitlichen Ränder zweier benachbarten Karpelle werden dieselben von der Vereinigung zurückgehalten, so dass die Verwachsung erst allmählich von

1) Goebel, Vergl. Entw. pag. 309.

unten nach oben fortschreiten kann. Danach ist es leicht denkbar, dass bei apokarper Ausbildung des Fruchtknotens eine Entwicklung eintritt, welche derjenigen von *Ailanthus* vollständig entspricht. Das sehen wir bestätigt bei der Malvacee: *Plagianthus divaricatus*¹⁾, welche in dem aus nur einem Fruchtblatte bestehenden Gehäuse eine Samenknospe an einer »Sohle« trägt. Das in Fig. 27 von Payer dargestellte Gehäuse zeigt die eigenthümliche Kapuzenform, vorne mit einem dreieckigen Spalte geöffnet. Die Fig. 25 und 26 zeigen dieselbe Form der Sohlenbildung wie *Ailanthus*. Auf dem gezeichneten Fruchtblatte hatte sich eine Vertiefung gebildet, indem aus dem Grunde desselben ein Höcker, die spätere »Sohle« sich hervorwölbte.

In derselben Weise verläuft offenbar die Entwicklung bei allen Malvaceen, welche mit *Abutilon* gleiche Placentenbildung haben. Auf den Vorgang der Verwachsung der seitlichen Fruchtblattränder zur Bildung der seitlichen Placenten ist auch bereits Payer bei *Abelmoschus moscheutos* aufmerksam geworden²⁾. Die Placenten erscheinen auch bei dieser Malve, welche übrigens mehrere Reihen Eichen auf den Placenten trägt, als vollständiges Hufeisen. In Fig. 13 u. 14 bei Payer sehen wir die oberen freien Schenkel derselben noch nicht miteinander verwachsen, während sie in Fig. 15 u. 16 vollständig bis oben hin miteinander verwachsen sind. Payer sagt hierüber: *Les deux branches du fer à cheval placentaire se sont rapprochées et soudées*; ebenso ist es zu sehen bei *Hibiscus illicifolius*³⁾. Bei der von Modiola in Fig. 19 (Tab. VI) dargestellten Entwicklungsstufe sind die Schenkel des Hufeisens noch ganz frei, auf der Krümmung des Hufeisens erscheint eine unpaare Samenknospe. In Fig. 20 sind die Hufeisenschänkel wieder verwachsen und es bilden sich da auch an den oberen Theilen die paarigen Samenknospen.

Von dieser an *Abutilon* dargestellten Weise der Fruchtknoten- und Placentenbildung aus kann man nun leicht die bei anderen Malvaceen sich findende abweichende Ausbildung ableiten. Diese macht sich in doppelter Weise geltend.

Bei einer nur eine geringe Anzahl von Arten enthaltenden Gruppe erfolgt die Anschwellung der an die Axe stossenden Leistenenden und die Verwachsung deren Ränder so rasch, dass die als Sohle bezeichnete Gewebeparthie vorher nicht mehr zur Ausbildung gelangt. Dann sehen wir also, wie bei *Hibiscus syriacus*, nur die seitlichen ihrer ganzen Ausdehnung nach durch eine Furche voneinander getrennten Placenten entwickelt.

Denken wir uns dagegen die Ausbildung der seitlichen Placenten unterdrückt und nur die als »Sohle« bezeichnete Gewebeparthie als

1) Payer, l. c. Pl. 7. Fig. 25—28.

2) Payer, l. c. Pl. VI. Fig. 13—16.

3) Payer, l. c. Pl. VI. Fig. 18.

Placenta entwickelt, die dann nur die einzige unpaare Samenknospe trägt, womit schliesslich noch eine Rückbildung der Sohle verbunden sein kann, so werden wir auf den bei den Malvaceen gewöhnlich als typisch angesehenen Fall geführt. Für meine Auffassung des oben an *Abutilon* dargestellten Verhaltens als des ursprünglichen spricht einmal der Umstand, dass es leicht ist, von diesem aus alle anderen Fälle durch Rückbildung herzuleiten, sodann auch, dass wir alle möglichen Uebergänge auffinden können.

Als eine solche Uebergangsform bietet sich zunächst *Kitaibelia vitifolia* dar. Die Sohle gelangt hier noch zur vollen Entwicklung und zwar ist die Placenta auf diese Sohle beschränkt. Von der Form, wie sie Payer Pl. VIII, Fig. 13 darstellt, liesse sich noch sehr wohl eine Entwicklung denken, wie wir sie bei *Abutilon* gefunden haben. Es brauchte nur noch eine stärkere Entwicklung der Seitentheile der Karpelle stattzufinden und ein Verwachsen der letzteren an ihren der Axe zugewandten Enden. Es wächst aber nur noch der Rückentheil stark in die Länge und wölbt sich deshalb, da die Seitentheile damit nicht gleichen Schritt halten, mit seiner Spitze über die Sohle weg. Die oberen Enden entwickeln sich gewöhnlich sehr massig, so dass sie mit breit aufsitzendem Grunde den offen bleibenden Leitungsweg überdecken.

Ist bei *Kitaibelia vitifolia* die die Samenknospe tragende Gewebeparthie noch deutlich als »Sohle« entwickelt, so ist diese bei anderen Malvaceen theils nur noch andeutungsweise wenigstens in gewissen Stadien vorhanden, wie bei *Malope trifida* und *Althaea rosea*, theils überhaupt nicht mehr nachweisbar wie bei *Malva*, *Lavatera* u. a.

An *Kitaibelia* schliesst sich zunächst an *Malope trifida*. Hier ist jedoch die Sohle schon nicht mehr als ein so scharf abgesetzter noch ziemlich massig entwickelter Höcker ausgebildet, sondern als ein von der Axe weniger scharf abgesetzter flacher Saum. Auch bei *Althaea rosea* ziehen sich die der Sohle entsprechenden vor den Höhlungen liegenden basalen Theile der Karpelle wenigstens in jüngeren Stadien noch als flacher Saum an der Grenze zwischen Karpell und Vegetationspunkt hin (Fig. 12). Derselbe verschwindet jedoch hier sehr bald.

Ohne jeden Rest von Sohlenbildung verläuft die Entwicklung bei unseren gewöhnlichen einheimischen Malven, z. B. bei *Malva moschata*. Während nämlich bei den letztgenannten Malvaceen die Ansatzstellen der Karpelle wenigstens noch einen Anfang dazu machten, mit den rasch in die Länge wachsenden Rückentheilen gleichen Schritt zu halten, unterbleibt dieser hier gänzlich, da auch die Randparthieen der Axe hier schon ziemlich früh ein vermehrtes Längenwachsthum zeigen, wie auf Längsschnitten an den intensiven Quertheilungen in dieser Region leicht zu erkennen ist.

Das Resultat unserer Untersuchung der Malvaceen können wir kurz dahin zusammenfassen, dass für die erste Anlage der Fruchtblätter derjenige Fall als Grundform aufzufassen ist, wie er sich noch bei *Kitaibelia* verwirklicht und bei *Malope trifida* angedeutet findet, wo die einzelnen Karpellhöcker als Fieder an 5 primordialen Höckern entstehen. Bei Herleitung der verschiedenen Placentenformen dagegen ist von den Fällen auszugehen, wo eine Sohlenbildung analog der von *Ailanthus* auftritt in Verbindung mit der Ausbildung verwachsener Karpellränder zu Placentenwülsten. Von dieser Grundform leiten sich die übrigen Fälle her durch ungleichmässiges Längenwachsthum der verschiedenen Ränder der Fruchtblattanlagen, durch ein Zurückbleiben der Seitentheile und dann auch der Vorderseite gegen die Rückentheile. Durch nachträglich eintretendes starkes Längenwachsthum der Randparthien der Axe, welches bei den am weitesten rückgebildeten Formen ziemlich früh bemerkbar ist, wird das ursprünglich über das Niveau der Blütenaxenspitze erhobene Placentengewebe an den Rand der Axe und mit der Fruchtknotenhöhlung unter das Niveau des Blütenbodens verschoben. Man könnte diesen Vorgang kurz als eine »Berindung« der Axe mit Placentengewebe bezeichnen.

Diese eigenthümliche Ausbildungsweise der Berindung, welche darin besteht, dass die Axe mit Gewebe bekleidet wird, das von Blattorganen gebildet ist, findet sich auch bei der Ausbildung vegetativer Organe und scheint überhaupt ziemlich verbreitet zu sein. Ein klassisches Beispiel hierfür ist *Chara*. Auch bei den Coniferen findet sie sich. War sie uns schon hier bei den Malvaceen für das Verständniss der endgültigen Ausbildung der Fruchtknotenhöhlung förderlich, so wird sie es in noch höherem Masse beim unterständigen Fruchtknoten.

Bei den Malvaceen beruhte die Schwierigkeit der Untersuchung, ob das vor den die Ausbildung der Fruchtknotenhöhlung einleitenden Grübchen liegende Gewebe zur Axe oder zu den Fruchtblättern gehöre, mit anderen Worten, ob die Vertiefung vor den Karpellen oder auf diesen entsteht, darin, dass die Fruchtblätter mit ihren Basen an den nicht aufgebrauchten Vegetationspunkt gebunden sind. Bei vielen synkarpen Fruchtknoten dagegen, wo aus den sämmtlichen angelegten Fruchtblättern nur ein einziges Gehäuse sich ausbildet, macht sich die Schwierigkeit in anderer Weise geltend. So bei den Scrophularineen und Solaneen. Hier gilt es den Nachweis zu liefern, dass das Vegetationspunktgewebe zur Ausbildung der Fruchtblattanlagen verbraucht wird, woraus dann folgt, dass die Grübchen auf diesen selbst entstehen, dass die sich später findende scheinbar central-axile Placenta gebildet wird durch Emporwachsen der gemeinsamen Ansatzstelle sämmtlicher Karpelle, nicht aber durch Erheben der Axe.

Scrophularineen und Solaneen.

Sowohl bei den Scrophularineen als auch bei den Solaneen findet sich die auch bei anderen Pflanzenfamilien wiederkehrende Eigenthümlichkeit, dass der ausgebildete Fruchtknoten im unteren Theile zwei-, im oberen einfacherig erscheint. Die Placenten stellen sich im oberen Theile dar als 2 von der Wand ausgehende, in der Mitte zusammenstossende, von Leitungs-gewebe bekleidete Leisten, welche in jedem der angeschwollenen Ränder von je einem Gefässbündel durchzogen sind. Im unteren Theile dagegen geht eine einzige geschlossene Scheidewand durch den Fruchtknoten. Die Theilung der Placenten nach oben einestheils, die Vertheilung der Gefässbündel andernteils legen es nahe, die Placenten entstanden zu denken durch Verwachsung der Fruchtblattränder. Dieser Ansicht ist Noll für *Veronica* ¹⁾. Die Bildung der Placenta ginge nach ihm in der Weise vor sich, dass »die einander gegenüberbefindlichen Leisten aufeinander zu rücken, sich schliesslich mehr oder weniger in der Mitte des Hohlraumes treffen und da ihre Enden verbreitern, indem sie sich gegenseitig abzu-platten scheinen«. Dem widerspricht jedoch, dass die Wülste nicht bis auf den Grund der Höhlung getrennt sind. Solche Längsschnitte, auf welchen die Placenta als ein in die Höhlung vorragender Zapfen erscheint, sollen nach ihm senkrechte Durchschnitte durch die Wülste, also nicht genau median geführt sein. Vom Gegentheil hätte er sich leicht durch successive Längsschnitte und noch besser durch successive Querschnitte überzeugen können. Diese Erklärung ist also durchaus nicht haltbar. Andere Forscher legten auf den Umstand das Hauptgewicht, dass die Scheidewand im unteren Theile als directe Fortsetzung der Axe erscheint, und erklärten danach die Placenten als Axenorgan. So kommt Buchenau²⁾ aus seinen Untersuchungen an *Maurandia* und *Nicotiana* zu dem Resultate: »Bei den Solaneen und Scrophularineen ist der Fruchtknoten lediglich von Blattoorganen gebildet und die Placenta entschiedenes Axenorgan«. Derselben Meinung ist auch Huisgen³⁾. Payer gibt die Entwicklung folgendermassen an⁴⁾: »Au pied de chacun de ces bourrelets primitifs, on remarque une petite excavation qui devient de plus en plus profonde, en sorte qu'à un certain âge, l'ovaire se trouve creusé de deux trous. Ces trous sont les loges, et c'est sur la cloison qui les sépare et se renfle en placenta qu'apparaissent les ovules«. Auch Goebel nahm in seiner »Vergleichenden Entwicklungsgeschichte«⁵⁾ noch eine Entstehung aus der Axe an, indem er den Vorgang der Fachbildung in derselben Weise wie Payer als eine

1) Noll, Entwicklungsgeschichte der *Veronica*-Blüthe. Marburg 1883. (Diss.)

2) Buchenau, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Pistills Marburg. 1851. (Diss.) pag. 32.

3) Huisgen, l. c. pag. 76.

4) Payer, l. c. Texte, pag. 540.

5) Goebel, l. c. pag. 320.

Aushöhlung der Axe an den 2 vor den Karpellen liegenden Punkten auffasste. Auch diese Erklärung ist mit der Entwicklung nicht in Einklang zu bringen. Soll sie richtig sein, so muss die Placenta einestheils auf Längsschnitten durch jüngere Stadien als verlängertes Axenende nachweisbar sein, anderntheils müsste entwicklungsgeschichtlich eine Theilung dieses Axenendes in 2 Hälften nachweisbar sein, wenn man nicht zu dem Ausfluchtsmittel greifen will, nur den unteren Theil als Axengebilde zu betrachten, den oberen dagegen als eingeschlagene und verwachsene Fruchtblattränder. Als solche erscheinen sie nämlich von allem Anfang an, eine Verästelung des Axenendes ist nicht nachweisbar. Es ist charakteristisch, wie Celakovsky trotzdem hier von einem Zelltheilungsprocesse redet. Er gibt für die Scrophularineen an (l. c. pag. 39): »Obwohl deutlich axil, theilt sich die Placenta in jedem Fache durch eine Längsfurche zwischen den beiden Reihen Eichen in 2 Lippen, welcher Process offenbar darauf hinweist, dass die beiden Ränder der Karpelle in der Centralplacenta vordem schon gebunden waren, jetzt aber durch einen neuen Zelltheilungsprocess auch thatsächlich in die Erscheinung treten«! Ein solcher Zelltheilungsprocess existirt in Wirklichkeit gar nicht. Es entsteht nicht erst im Grunde ein Wall, der sich dann oben theilte und die seitlichen Placenten abgab, sondern die seitlichen Placenten werden von allem Anfange angelegt ja noch früher als die aus dem Grunde sich hervorwölbende scheinbar axile Centralplacenta, die erst später entsteht und die seitlichen Placenten verbindet.

Sehen wir nun zu, welche Deutung sich aus dem genaueren Verfolg der Entwicklung ergibt. Während nach Payer, ebenso nach Buchenau u. a., die Anlage des Pistills durch 2 wulstige hufeisenförmige Höcker dargestellt wird, gibt bereits Noll für *Veronica longifolia* an, dass dieselbe durch einen Ringwall gebildet wird. Dieses kann ich nach meinen Untersuchungen an *Veronica gentianoides* und *Linaria vulgaris*, an *Nicotiana rustica* und *Atropa Belladonna* sowohl für die Scrophularineen als auch für die Solaneen bestätigen. Ansichten, wo die Karpellanlagen als 2 hufeisenförmige Wülste erscheinen, entsprechen einer weiteren Entwicklungsstufe, wo durch stärkere Entwicklung der beiden vorderen und hinteren in der Mediane liegenden Seiten die beiden Fruchtblätter sich aus dem Walle herauszudifferenziren beginnen. Mediane Längsschnitte durch derartige Entwicklungsstufen beweisen, dass das Gewebe der Axe zur Ausbildung der Fruchtblätter vollständig verbraucht wird (Noll Tab. I, Fig. 9). Von einem etwa in die Höhlung vorragenden Ende des Vegetationspunktes, selbst von einer nur flachen Ausbreitung desselben ist nichts zu bemerken. Die beiden gegenüberliegenden Fruchtblattanlagen stossen am Grunde der Vertiefung unter einem mehr oder weniger scharf entwickelten Winkel aufeinander. Dieses ist jedoch nur auf genau medianen Schnitten ersichtlich. Etwas mehr seitlich gehende Schnitte, welche leicht daran

kennflich sind, dass hier 2 Antherenanlagen getroffen werden, zeigen natürlich den Grund mehr abgeflacht, die Karpelle nicht so deutlich gegeneinander abgegrenzt. Die Fruchtblätter bedecken die ganze Innenböschung des von aussen etwas steil aufsteigenden, nach der inneren Vertiefung zu sich mehr abflachenden Ringwalles. Auch noch auf medianen Längsschnitten durch schon weiter entwickelte Stadien ist dieses Aufbrauchen des Vegetationspunktes fast mit noch grösserer Bestimmtheit zu erkennen. Die Weiterentwicklung lässt sich am besten auf etwas stärkeren Längsschnitten oder in Oberansichten verfolgen. Nachdem durch stärkeres Wachsthum der beiden in der Mediane liegenden Stellen des Ringwalles die Spitzen der Fruchtblätter sich herausgebildet haben, verbreitet sich die Anschwellung von da aus fortschreitend auch über die seitlichen Ränder, doch so, dass immer die in der Mediane liegenden Spitzen ein gefördertes Wachsthum zeigen. Ist diese Anschwellung bis zur Ansatzstelle der beiden Fruchtblätter auf dem Rande vorgeschritten, so beginnt wiederum der Vorgang, welchen man auch als Verwachsung der Karpellränder bezeichnet. Diese Verwachsungsstellen beginnen gemeinsam in die Höhe zu wachsen und dabei massig anzuschwellen. Noll gibt diese Bildung für die Veronicablüthe noch richtig an: »An den Seiten jedoch, wo die beiden Fruchtblätter aneinandergrenzen, macht sich alsbald jederseits eine leistenartige rundliche Ausstülpung bemerklich. Diese tritt zunächst an der Basis der Fruchtknotenwand hervor, entspringt bei dem fortschreitenden Höhenwachsthum dann auch immer höheren Zonen. Die Anlagen erscheinen jetzt als 2 mit ihren freien Schenkeln aneinanderstossende und da angeschwollene Hufeisen«. Die Anschwellung der Fruchtblattränder verbreitet sich jedoch noch weiter über den Grund der Höhlung über denjenigen Theil, wo die Karpelle mit ihren breiten Ansatzstellen aufeinanderstossen. Von einem Aufeinanderzurücken der seitlich gebildeten Placentenwülste kann dabei keine Rede sein. Nicht die seitlich gebildeten Anschwellungen selbst rücken aufeinander zu, sondern der Vorgang der Anschwellung verbreitet sich auch auf die am Grunde aneinandergrenzenden Fruchtblattränder. Die gemeinsame Ansatzstelle derselben erhebt sich selbständig. Ein medianer Längsschnitt zeigt dann die Zellen der äussersten am Grunde der Höhlung liegenden Periblemschicht in Theilung durch Querwände begriffen (Fig. 17). Es bildet sich dadurch im Grunde der Höhlung eine Erhebung aus. Die seitlichen Placentenwülste stehen von allem Anfang an am Grunde miteinander in Verbindung. An Oberansichten macht sich diese Entwicklung in der Weise geltend, dass sich vor den hufeisenförmigen Karpellanlagen Vertiefungen gebildet haben. Diese sind also wiederum nicht vor den Anlagen auf der Axe, sondern auf den Fruchtblättern selbst entstanden, der Vorgang kann nicht als eine Ausbuchtung der Axe sondern der Karpelle bezeichnet werden. Die ganze Weise der Ausbildung kann man sich am besten so verdeutlichen, dass

der Vegetationspunkt eingenommen ist von den Anlagen zweier mit ihren Basen aneinanderstossender schildförmiger Blätter. Indem die bei der Entwicklung schildförmiger Blätter auftretende Anschwellung der Blattränder schliesslich auch die gemeinsame Ansatzstelle ergreift, bildet sich an dieser Stelle eine Erhebung.

Der Vorgang ist also wieder ganz entsprechend dem an den Malvaceen dargestellten; nur dass hier die Karpelle mit ihren Basen nicht an die *Axe* gebunden sind und da je einen der Sohle analogen Gewebewulst ausbilden, sondern dass die beiden hier vorhandenen Fruchtblätter mit ihren breiten Ansatzstellen aneinandergrenzen, nachdem sie zu ihrer Ausbildung das Gewebe des Vegetationspunktes vollständig verbraucht haben. Durch Emporwachsen der gemeinsamen Ansatzstelle wird hier gewissermassen eine Doppelsohle gebildet. Auch bilden sich hier die seitlichen Placenten nicht durch Verwachsung und Anschwellung der beiden Ränder je eines Fruchtblattes aus, sondern durch Verwachsung von je 2 aneinanderstossenden Rändern der beiden Fruchtblätter.

Caryophylleen.

Zum Schlusse der Betrachtung des oberständigen Fruchtknotens gehe ich noch kurz ein auf die Placentenbildung innerhalb der Familie der Caryophylleen. Hier findet man das die Samenknospen tragende Gewebe, die Scheidewände und das in die Fruchtknotenhöhlung hineinragende Axenende in gewissen Stadien so eng verschmolzen, dass der Nachweis, dass auch hier die Samenknospen nicht aus der *Axe* entspringen, sondern aus Gewebe, welches den Fruchtblättern zugehört, sehr schwierig erscheint. Die Placenten der Caryophylleen haben infolgedessen auch die verschiedenartigsten Deutungen erfahren. Von einer freien axilen Centralplacenta, die man zuweilen noch erwähnt findet, kann natürlich nicht die Rede sein. Dieselbe ist nur scheinbar, und es beruht deren Bildung darauf, dass — und zwar erst ziemlich spät — das Gewebe der Scheidewände sich löst. Nach Rohrbach soll die Placenta, das »Mittelsäulchen« wenigstens bei der Untergruppe der Sileneen, gebildet sein durch die eingeschlagenen und verwachsenen Fruchtblattränder¹⁾. Er beruft sich dabei, jedoch mit Unrecht auf die Entwicklungsgeschichte. Schon ein einfacher Längsschnitt durch eine junge Blütenanlage lehrt das Unhaltbare dieser Anschauung, beweist, dass die centrale Erhebung von allem Anfang an vorhanden ist und sich nicht erst durch Verwachsung der Fruchtblattränder bildet. Celakovsky löst die Schwierigkeit einfach durch Anwendung seines Schemas der Kappentheorie. In dem Placentengewebe sieht er den gebundenen Kappentheil, welcher nur dadurch in die Erscheinung tritt, dass sich auf den beiden n ihn vereinigt gedachten Rändern 2 Reihen Samenknospen bilden. Der

1) Rohrbach: Morphologie der Gattung Silene. Inaug.-Diss. Lpz. pag. 32.

Unterschied seiner Kappentheorie und unserer Darstellung der Sohlenbildung bei einigen Pflanzenfamilien tritt hier ganz besonders deutlich hervor. Sein Kappentheil ist eben weiter nichts als eine Umschreibung des gewöhnlichen Falles der Placentenbildung aus verwachsenden Fruchtblatträndern. Es ergibt sich daraus sofort die Unmöglichkeit der Anwendung seiner Kappentheorie auf die Fälle, in welchen die Bildung einer Sohle nachgewiesen wurde. Von einer Sohlenbildung in unserem Sinne kann bei den Caryophylleen keine Rede sein. Eine richtige Auffassung der Placentenbildung kann hier nur gewonnen werden durch eine vergleichende Betrachtung der Fruchtknotenbildung innerhalb der ganzen Familie der Caryophylleen. Diese ist bereits durchgeführt in einer kleinen Abhandlung von Miss G. Lister¹⁾. Danach haben wir auszugehen von der Untergruppe der Sileneae. Für diese ist der karpellare Ursprung der Placenten ganz offenbar. Die Karpelle werden als 5 getrennte Höcker dicht unterhalb der Blütenaxenspitzen angelegt, wachsen anfangs hauptsächlich in die Breite und treten sehr bald an ihren Rändern miteinander in Berührung. Ist so ringsum der ganze Rand des Vegetationspunktes verbraucht, so erfolgt von den Stellen aus, welche den zusammenstossenden Karpellrändern entsprechen, die Ausbildung der Scheidewände, welche gewissermassen als die verwachsenen eingeschlagenen Karpellränder erscheinend, von diesem Punkte aus sich rasch bis zur Spitze der Blütenaxe verbreiten. Sobald sie daselbst zusammengetroffen sind, scheint die Axe vollständig verbraucht, ganz bedeckt mit karpellarem Gewebe. Sehr schön zeigt dieses Figur 3, Tab. 32 (G. Lister l. c.) Es ist zu bemerken, dass während dieser Vorgänge, seit Anlage der Karpellhöcker, die Axenspitze sich nicht weiter entwickelt oder wenigstens nur in geringem Masse in die Länge wächst; sowohl hier als auch bei anderen Caryophylleen habe ich ein ausgiebigeres Längenwachsthum seit Anlage der Karpellhöcker nicht bemerken können. Die Länge des innerhalb der späteren Fruchtknothöhle sich findenden Axenendes hängt vielmehr ab von der Höhe, in welcher seitlich am Vegetationspunkte die Fruchtblätter angelegt werden. Bei den Sileneen ist dasselbe verhältnissmässig kurz. Hier wird die Axenspitze schon sehr bald von den am Vegetationspunkte hinlaufenden Scheidewänden erreicht, und die weiteremporwachsenden Scheidewände sind im oberen Theile des Fruchtknotens später nicht mehr durch die Axe verbunden, sondern stellen sich als frei ins Innere hineinragende Gewebeplatten dar. Die Samenknospen entstehen nun immer zuerst an diesen freien Gewebeplatten und entwickeln sich von da nach unten hin fortschreitend in 2 Reihen dicht an den Ansatzstellen der Scheidewände an die Axe. Den Uebergang bildet Sagina. Sagina schliesst sich am nächsten an die Sileneen an. Die Karpelle werden hier noch nicht unterhalb der Spitze der hier ziemlich breit endenden Axe

1) Miss G. Lister: On the Origin of the Placentas in the Tribe Alsineae of the Order Caryophylleae. Linn. Soc. Journ. Bot. Vol. XX. 1883. pag. 423-428. Pl. 32-35.

angelegt, »and their four dissepiments nearly meet in a cross-like manner at its apex. This they surmont before the appearance of the ovules«. (Fig. 4. l. c.). Etwas früher erscheinen die Samenknospen schon bei *Spergula*, wo jedoch das Gewebe der Axenspitze schon beim ersten Auftreten der Karpelle fast ganz verbraucht wird. Bedeutend tiefer werden die Karpelle bei *Arenaria* angelegt, doch erreichen auch hier die Scheidewände sehr bald den Gipfel des Vegetationspunktes. Es macht sich immer mehr ein anfängliches Zurückbleiben der Karpellspitze im Längenwachsthum gegen die seitlichen Theile bemerkbar und zugleich ein immer früheres Auftreten der Samenknospen. Während sie bei *Sagina*, *Spergula* und *Arenaria* erst zu einer Zeit auftreten, wo die emporwachsenden Scheidewände die Spitze bereits erreicht haben, machen sie sich bei *Cerastium*, dem äussersten Gliede in der Entwicklungsreihe der Caryophylleen, bereits bemerkbar, wenn die am Vegetationspunkte hinauflaufenden Scheidewände die Spitze noch nicht erreicht haben und zwar direct an den Stellen, wo das Gewebe der Scheidewände in dasjenige des Vegetationspunktes sich abflacht. So steht auch hier der Annahme keine Schwierigkeit im Wege, welche das sich direct an die Scheidewände ansetzende, die Samenknospen tragende Gewebe den Karpellrändern zurechnet. Wir haben an den Caryophylleen wieder einen sehr deutlichen Fall für das allmähliche Aufbrauchen eines Vegetationspunktes von seiten einer Blattanlage, für das allmähliche Hineinziehen eines Blüthenvegetationspunktes in die Ausbildung der Fruchtblätter, ein Vorgang, der mehr Beachtung verdient, und auf welchen wir schon bei den Malvaceen aufmerksam wurden. Die jüngsten Fruchtblattanlagen sind gegen den massig entwickelten Blüthenvegetationspunkt z. B. bei *Cerastium* ganz verschwindend, und doch beschränkt sich dessen ganze Thätigkeit auf die Ausbildung der Karpelle. Erst allmählich breiten sich diese über den ganzen Vegetationspunkt aus, was besonders deutlich an den an ihm hinauflaufenden verschmolzenen Fruchtblatträndern zu beobachten ist.

Unterständiger Fruchtknoten.

Bezüglich des unterständigen Fruchtknotens hat bereits Goebel in seinem Aufsatz: »Zur Entwicklungsgeschichte des unterständigen Fruchtknotens«¹⁾, an einigen Fällen entwicklungsgeschichtlich den Nachweis geliefert, »dass es sich auch bei Bildung der Fruchtknotenhöhle des unterständigen Fruchtknotens um eine Betheiligung der Fruchtblätter handelt«, dass dieselbe also weder durch Verwachsung der vorhergehenden Blüthenblattkreise zustande kommt, wie noch Köhne²⁾ und van Tieghem³⁾ wollten, noch, dass sie von der Blüthenaxe selbst gebildet wird, welcher Auffassung nach dem Vorgehen Schleidens⁴⁾ sich die meisten und be-

1) Bot. Ztg. 1886. pag. 729-738.

2) Köhne, Ueber Blütenentwicklung bei den Compositen. Dissert. Berlin 1869.

3) l. c.

4) Schleiden, Grundz. d. wissensch. Bot. Aufl. 4. pag. 377 u. 435.

deutendsten Botaniker, wie Hofmeister¹⁾, Payer²⁾, Sachs³⁾, angeschlossen hatten. Nach dieser letzteren Annahme sollten die zuletzt angelegten Karpelle nur dazu dienen, die Höhlung nach oben hin abzuschliessen und den Staubweg mit den Narben zu bilden. Auf dem Boden dieser Lehre stehen neuere Untersuchungen über die Compositenblüthe von Haenlein⁴⁾ und über die Blütenentwicklung der Onagraceen von Barcianu⁵⁾. Dieselben suchen den Nachweis von der Axennatur des unterständigen Fruchtknotens nach der von Hanstein begründeten anatomisch-entwicklungsgeschichtlichen Methode, welche auf die Zelltheilung grosses Gewicht legt, zu führen.

Danach müssten auch die Placenten axile Gebilde sein, wenn man sie nicht mit Popoviciu Barcianu als einen selbständigen Blattkreis ansehen will, was sich bis jetzt bei allen den Familien, für welche diese Ansicht geltend gemacht wurde, bei genauer vorurtheilsfreier Untersuchung als unhaltbar erwiesen hat. Gegen die axile Natur der Placenten spricht aber schon bei äusserlich vergleichender Betrachtung der Umstand, auf den mit klaren Worten zuerst Goebel aufmerksam machte, dass nämlich die Placentation im oberständigen und unterständigen Fruchtknoten eine ganz übereinstimmende ist⁶⁾, »welche Thatsache auf eine übereinstimmende Betheiligung der Fruchtblätter in beiden Fällen hinweist«. Es mag diese Einsicht viele zu der künstlichen Unterscheidung eines axilen Theiles, des »cordon pistillaire«, und eines oberen, die Scheidewände bildenden, durch Verwachsung der Karpellränder entstandenen Theiles mitveranlasst haben.

So befand sich die Entwicklungsgeschichte in schroffem Gegensatz zur Morphologie, welche auf Grund theils von vergleichenden Untersuchungen, theils von Missbildungen zu der Annahme gekommen war, dass die Fruchtblätter sich auch an der Bildung des unterständigen Fruchtknotens betheiligen, indem sie, mit ihren Rückentheilen an die Axe gebunden, die Innenseite der Höhlung auskleiden.

Goebel hat nun in dem erwähnten Aufsätze nachgewiesen, dass diese Erklärung auch entwicklungsgeschichtlich sehr wohl annehmbar ist, dass der dieser Erklärung entsprechende entwicklungsgeschichtliche Vorgang auf derselben Wachstumsweise beruht, wie die Berindung bei niederen und höheren Pflanzen, z. B. bei den Coniferen, d. h. die Bekleidung des Stammes durch den unteren Theil der Blätter.

1) Hofmeister, Allgemeine Morphologie der Gewächse p. 551.

2) l. c. p. 733.

3) Sachs, Lehrb. der Bot. 4. Aufl. p. 548.

4) F. H. Haenlein, Beiträge zur Entwicklungsgesch. der Compositenblüthe (Schenk-Luersen, Mitt. der Bot. Bd. II, 1. Heft. Lpz. 1875 p. 144 ff.

5) Daniel Popoviciu Barcianu, Unters. über d. Blütenentw. der Onagr. (Schenk-Luersen Mitt. d. Bot. Bd. II. 1. Hft. Lpz. 1875 pag. 81 ff.

6) Goebel, Entwicklungsgesch. l. c. p. 324 u. 326. Bot. Ztg. 1886. l. c. p. 731.

Der unterständige Fruchtknoten kommt nach seinen Untersuchungen an den Pomaceen dadurch zustande, »dass eine Zone des Blütenbodens, welche die Insertionsstelle der Fruchtblätter mit umfasst, ein starkes interkalares Wachstum zeigt, während sie bei der Bildung perigynen Blüten nur noch wenig sich strecken würde« ¹⁾

Auch Haenlein führt zur Erklärung der Bildung des unterständigen Fruchtknotens der Compositen Quertheilung in einer Region der hohlen Blütenaxe an, welche aber nach ihm die Ansatzstelle der Fruchtblätter nicht mitumfassen sollte²⁾. Das der angeführten Zeichnung entsprechende Stadium ist jedoch zur Entscheidung dieser Frage zu alt. Es machte dem gegenüber Goebel in seinem Aufsatz darauf aufmerksam, dass in jüngeren Stadien die Fruchtblattanlagen bis auf den Grund des ausgehöhlten Blütenbodens hinabzureichen scheinen, dass sie also nicht, wie Haenlein und die übrigen Verfechter der Axennatur des unterständigen Fruchtknotens ohne Weiteres annehmen, nur auf den oberen Rand der ausgehöhlten Blütenaxe beschränkt seien.

Compositen.

Auf diese Frage hin sind die Compositen nochmals von mir genauer untersucht worden. Das Resultat ergab sich als ein bei allen untersuchten Compositen im Wesentlichen übereinstimmendes. Es soll im Folgenden an einigen besonders deutlichen Beispielen, an *Helianthus annuus* und an *Silphium connatum* dargestellt werden.

Die frühere Litteratur finden wir zusammengestellt von Haenlein²⁾ und Koehne³⁾.

Vergegenwärtigen wir uns zunächst den äusserlichen Vorgang, soweit er von früheren Beobachtern festgestellt ist. Bekanntlich entsteht hier, wie überhaupt bei Blüten mit epigynen Insertion, zuerst eine Vertiefung des einzelnen Blütenvegetationspunktes durch wallartige Erhebung der Randparthie. Am Rande der Vertiefung bilden sich aufeinanderfolgend die Anlagen der 5 Korollenzipfel und damit alternirend diejenigen der 5 Staubblätter. Hat sich danach die Axe noch etwas vertieft, so erscheinen an den Wänden der Vertiefung nahe über dem Grunde des Bechers die Anlagen der Fruchtblätter und zwar nicht sofort als 2 Wülste, wie Koehne fälschlich angibt ⁴⁾, sondern zuerst in Form eines Ringwulstes, welchem Haenlein den nach Hansteins Vorschlag eingeführten Namen Cyclom beilegt. Erst später sprossen aus diesem 2 einander gegenüberstehende halbringförmige Wülste hervor.

1) Bot. Ztg. 1886. pag. 732.

2) Haenlein, l. c. p. 162.

3) Koehne, Ueber Blütenentw. der Compos. Diss. Berlin 1869.

4) Koehne, l. c. pag. 5.

Die Anhänger der Schleiden'schen Ansicht, also auch Haenlein, betrachten diese von der Axe sich abgliedernde Sprossung, welche ich oben als die Anlage der Fruchtblätter bezeichnete, nur als die Anlage der Griffel. Von deren Entwicklung, welche einfach so verläuft, dass die Spitzen der Wülste nach dem Inneren zu rasch vorwachsen und nach dem Zusammentreffen zu den beiden Griffelschenkeln auswachsen, wird diejenige des Fruchtknotens getrennt betrachtet.

Ueber die Entstehung des Griffels gibt Haenlein kurz an: »Auch die Anlage des Griffels geht, wie bei den vorhergehenden Organen, vom Periblem aus«¹⁾. Das ist auch ziemlich das Einzige, was aus seinen angeführten Fig. 20 und 21 geschlossen werden kann. Ueber die Art der Ausbildung lassen sie, zu alten Stadien entnommen, im Unklaren. Der Grund der Höhlung ist hier bereits verbreitert, wie es erst später als Vorbereitung zur Samenknochenbildung zu geschehen pflegt. Schon Koehne gibt richtig an, dass der Grund der Fruchtknotenhöhle anfangs ziemlich schmal ist und sich erst später zu verbreitern pflegt²⁾.

Verfolgen wir die Zelltheilung etwas genauer bei *Helianthus annuus*, so sehen wir nach Anlage der Staubblätter die Höhlung nur wenig vertieft (Fig. 18). Unter der Epidermis finden sich mehrere Schichten fast regelmässig angeordneten Periblemes. In den in Theilung begriffenen Zellen besonders der seitlichen Periblemschichten sind die Theilungswände immer radial gerichtet. Diese bewirken also die Vertiefung der Höhlung. Auf Längsschnitten durch etwas ältere Stadien (Fig. 19) sieht man seitlich einige der äussersten Periblemzellen vergrössert und die oberen derselben durch tangential gerichtete Wände getheilt, während die angrenzenden Zellschichten der Axe als durch Antiklinen getheilt noch fortdauernd sich strecken. In ganz jungen Stadien findet man auf Längsschnitten immer nur eine oder doch wenige Periblemzellen, welche durch tangential Theilungen die Hervorwölbung dieses Theiles des Wulstes bewirken. Es macht sich die Frage geltend: Wie weit reicht die erste Anlage, wie können wir sie begrenzen? Man könnte geneigt sein, sie auf diejenigen Zellen zu beschränken, welche man gleich von allem Anfang an durch tangentiale Wände getheilt findet, danach müsste der Umfang derselben sehr gering sein. Denn es ist ja nur eine schmale ringförmige Zone von Zellen, in welcher die verlangten Theilungen stattgefunden haben. Die tiefer liegenden Zellen der äussersten Periblemschicht sieht man jedoch bereits vergrössert und in Vorbereitung zur Zelltheilung begriffen. Es ist ganz unmöglich eine genaue Grenze anzugeben. Auf Längsschnitten durch weiter vorgeschrittene Zustände erkennt man, wie immer tiefer nach dem Grunde der Höhlung zu liegende Zellen in Theilung durch tangentiale Wände übergehen. Vergleichen wir Fig. 20, so sehen wir die obere der in Betracht kommenden

1) Haenlein, l. c. pag. 158.

2) Koehne, l. c. pag. 7.

Zellen durch eine der ersten Theilungswand schief aufgesetzte Wand weiter getheilt, 2 tiefer liegende Zellen sind durch Periklinen gefächert, während die anderen folgenden Zellen der äussersten Periblemschicht durch ihre Grösse ausgezeichnet und als in Vorbereitung zur Theilung begriffen, kenntlich sind. Auf Längsschnitten durch noch ältere Stadien findet man auch diese tiefer unten liegenden Zellen getheilt, so auch in den von Haenlein gezeichneten Fig. 20 und 21. Ausserdem ist zu bemerken, wie die Theilungswände, in je tiefer liegenden Zellen sie auftreten, um so weniger der Oberfläche parallel laufen, vielmehr gegen dieselbe schief geneigt sind. Es liegt nahe, diese Zelltheilungen aufzufassen als Folgen einer Wachstumsweise, welche darauf gerichtet ist, die junge Anlage aus der Axe gleichsam herauszuschieben. Etwas ganz Aehnliches, wie das hier Geschilderte, ist offenbar der Vorgang, welchen Schleiden als »Nachschieben der Blattbasis« bezeichnet¹⁾. Es ist diese Bemerkung geeignet, uns eine einigermaßen befriedigende Antwort auf die Frage zu geben, welche der in Theilung begriffenen Zellen wir als zur jungen Blattanlage gehörig rechnen dürfen. Es gehören eben dazu alle diejenigen Zellen, deren Theilung als Folge eines Wachstums erkennbar ist, welches darauf hinzielt, die junge Blattanlage hervorzuschieben. Die Berechtigung dieser Annahme muss zugestanden werden, zumal sie nichts principiell Neues bietet. Schon bei Bildung des oberständigen Fruchtknotens bot sich mehrfach Gelegenheit zu der Beobachtung und war dort schon bei äusserlicher Betrachtung erkennbar, wie bei weiterer Entwicklung ein immer grösseres Areal des Blütenbodens in den Aufbau des Fruchtknotens mit hineingezogen wird, auch wurde daselbst auf analoge Vorgänge bei der Entwicklung vegetativer Blätter hingewiesen (S. 76).

Mit aller Deutlichkeit ist demnach auf Längsschnitten durch ältere Stadien zu sehen, dass die Anlage bis auf den Grund der Höhlung hinabreicht. Auch jetzt noch ist es gänzlich unmöglich, genau jede einzelne Zelle zu bezeichnen, welche mit zur Anlage gehört, wenn wir sie nicht in Theilung begriffen finden, in welchem Falle wir nach dem aufgestellten Princip über die Zugehörigkeit entscheiden können. Für die vorhergehenden Blütenblattkreise gilt dasselbe. Auch für die Blumenblatt- und Staubblattanlagen ist es unmöglich, genau anzugeben, wie weit jede reicht, wo die eine beginnt, die andere aufhört. Es genügt für unsere Betrachtung die Erkenntniss, dass zur Bildung der Fruchtblätter die ganze Aussenfläche der Axe in Anspruch genommen wird, und dass die alte Ansicht falsch ist, welche die Fruchtblätter an dem oberen Rande der becherförmig ausgehöhlten Axe entstehen lässt.

Betrachten wir den Längsschnitt durch die junge Anlage noch etwas aufmerksamer, so sehen wir am Grunde der Seitenwandung in der Ecke

1) Schleiden, Grundzüge der wissenschaftl. Botanik Tl. II. pag. 172. Lpz. 1846.

zwischen dieser und dem Grunde der Höhlung 4 untereinander liegende Periblemzellen durch radiale Wände getheilt (Fig. 20 t). Es beginnt mit diesen Quertheilungen der Vorgang, welcher zur Bildung des unterständigen Fruchtknotens führt. Auch in allen älteren Stadien sind gerade an der entsprechenden Stelle intensive Quertheilungen erkennbar. Die der Oberfläche zunächst liegenden dieser in Theilung befindlichen Zellen gehören offenbar dem Grunde der Fruchtblattanlage an, welche dadurch emporgeschoben wird. Die tiefer liegenden sind Zellen des Axengewebes. Sie bewirken ein Emporheben des ganzen darüberliegenden Gewebes mit Staubblättern und Blumenblättern. Wir erkennen hier bei Vergleich mit älteren Stadien den Anfang zur Ausbildung der durch starkes interkalares Wachsthum ausgezeichneten Zone des Blütenbodens, welche also auch hier den Grund der Karpelle mit umfasst. Während die intensiven Quertheilungen der nach der Seitenwandung zu abgegebenen Zellen ein Emporheben des ganzen darüber gelegenen Gewebes bewirken, beruht auf den radialen Theilungen der nach dem Grunde des Bechers zu abgegebenen Zellen die Verbreiterung des Grundes, wie wir sie von jetzt in allen folgenden Stadien antreffen.

Haenlein ist auf diesen Vorgang erst an viel älteren Stadien aufmerksam geworden. Zur Erklärung der Bildung des unterständigen Fruchtknotens führt er an: »In der That sieht man auch bei näherem Eingehen auf die Zellen, dass es hauptsächlich die zwischen dem Grunde der Fruchtknotenhöhle und der Insertionsstelle der Karpelle liegende Region der hohlen Blütenaxe ist, welche sich durch Streckung ihrer Zellen in die Länge und durch Auftreten von Quertheilungen derselben auszeichnet« ¹⁾. Die von ihm zum Beweise benutzten Figuren zeigen aber die Bildung bereits so weit vorgeschritten, dass beim Ausbleiben der hier stattfindenden Quertheilungen der fertige Fruchtknoten von einem unterständigen nur sehr wenig verschieden sein würde. Die Stadien sind so alt, dass nicht nur der unterständige Fruchtknoten bereits ausgebildet, sondern sogar die Samenknospe angelegt ist. Würden auf dieser Entwicklungsstufe die Quertheilungen unterbleiben und nur die freien sich zu den Griffeln ausbildenden Enden der Fruchtblätter, welche Haenlein in der citirten Stelle als die ganzen »Karpelle« bezeichnet, sich strecken unabhängig von dem angrenzenden Axengewebe, so müsste es zur Bildung eines halbunterständigen Fruchtknotens kommen. Die Quertheilungen, welche zur Bildung des unterständigen Fruchtknotens führen, beginnen, wie wir gesehen haben, viel früher auf einer Entwicklungsstufe, wo noch sehr wohl die Bildung eines perigynen Fruchtknotens denkbar wäre, wie Goebel an den Pomaceen nachwies. Es wäre dann nur nöthig, dass die Karpelle, ohne Betheiligung der Zellen der Axe, durch Quertheilungen an ihren Ansatzstellen hervorgeschoben würden.

1) Haenlein, l. c. p. 162.

Nach dem Geschilderten ist es unzulässig, die Entwicklung des Griffels getrennt zu betrachten von derjenigen der Fruchtknotenwand, da wir gesehen, dass die als Anlage der Griffel bezeichneten Theile nur die Enden der die Axe auskleidenden, bis auf den Grund des Bechers reichenden Karpellanlagen sind, und da es thatsächlich unmöglich ist eine Grenze anzugeben, wo das Karpellgewebe gesondert vom Axengewebe seine Thätigkeit beginnt.

Viel näher der Wahrheit kann hierin schon die Anschauung Köhnes, nach welchem »die Ansicht gar nicht so verwerflich ist, dass wenigstens die Karpelle an der Bildung des unterständigen Fruchtknotens betheiligt sind«¹⁾. Nur ist die Folgerung ganz unbegründet, welche er hieraus zieht: »Wenn dieses aber der Fall ist, so müssen nothwendig auch die vorausgehenden Blütenkreise eine Verwachsung mit der Fruchtknotenwand eingegangen sein«. Es bietet sich auch nicht der geringste Anhalt für die Auffassung, den mit dem Blattgrund der Karpelle verwachsenen Theil der Fruchtknotenwand als aus der Basis von Staubblättern und Blumenblättern verwachsen anzusehen. Für jeden unbefangenen Urtheilenden ist dieser Theil reines Axengewebe. Man sieht an diesem Beispiele, wie irreführend es ist, von Verwachsung zu reden bei Geweben, die weder ihrer Anlage nach getrennt auftreten, noch später sich trennen. Nur der Umstand, dass er den Blattgrund der Karpelle als »verwachsen« mit dem angrenzenden Gewebe ansah, veranlasste Koehne, weiter zu schliessen, dass dann auch dieses Gewebe verwachsen sei aus den Basaltheilen der Staub- und Blumenblätter. Corrigiren wir Koehne in diesem Sinne, so können wir mit seinen Worten das Resultat unserer bisherigen Untersuchung kurz zusammenfassen: »Unterhalb der Staubblätter liegt die Zone, welche die Karpelle erzeugt. Letztere treten dadurch hervor, dass ihre Primordialblätter sich in Oberblatt — d. h. Griffelschenkel und Griffelröhre — und in Blattgrund zu sondern beginnen; der Blattgrund bleibt an das angrenzende Axengewebe gebunden, kleidet dasselbe aus. Wenn er also, unter Theilnahme dieses Axengewebes, sich zu strecken beginnt, so erzeugt er die Fruchtknotenwand«²⁾.

Die hierauf im Fruchtknoten stattfindenden Vorgänge stehen in Beziehung zur Samenknospenbildung. In den bisher betrachteten Längsschnitten erschien der Grund des Blütenbodens ausgerundet, die Seitenwandungen von da aus schief nach aussen aufsteigend — welche Thatsache schon bei äusserlicher Betrachtung darauf hinweist, dass das Axengewebe vollständig verbraucht wird. — Der Grund beginnt allmählich durch radiale Theilungen der darunter liegenden Zellen sich zu verbreitern, so dass wir jetzt Ansichten erhalten, wo die Höhlung von fast senkrechten Wänden umschlossen ist (Fig. 22). Die diese Verbreiterung bewirkenden

1) Koehne, l. c. pag. 54.

2) cf. Koehne pag. 51.

Zellen gehören der den beiden Fruchtblättern gemeinsamen Ansatzstelle an. Die Verbreiterung durch radiale Theilungen schreitet immer weiter vor, während zugleich die freien Enden der Fruchtblätter mit ihren Spitzen aufeinanderzuwachsen. Es zeigt jetzt die Fruchtknotenhöhle auf einem medianen Längsschnitt die Form eines spitzwinkligen Dreiecks, und zwar ist dasselbe ungleichschenkelig. Der die Basis des Dreiecks bildende Grund der Höhlung ist nicht wagrecht, sondern etwas schief geneigt, vom vorderen nach dem hinteren Karpelle zu ansteigend. Der Neigungswinkel dieser schiefen Ebene gegen die Horizontale ist, wie schon Haenlein hervorhebt ¹⁾, sehr verschieden bei den einzelnen Gattungen. Bei einigen, so auch bei *Helianthus annuus*, beträgt sie nur wenige Grade, während sie bei anderen bis zu 45° und mehr wächst. Koehne führt diese Thatsache an mit den Worten: »Es rührt dieses daher, dass der ziemlich ebene Grund der Fruchtknotenhöhle mit dem vorderen Fruchtblatt einen spitzen, manchmal bis zu 45° abnehmenden ³⁾ Winkel bildet, mit dem hinteren Fruchtblatt aber unter einem stumpfen Winkel zusammenstösst, also nach dem Centrum des Blüthenköpfchens hin ansteigt« ²⁾. Es ist ganz offenbar, dass damit keine Erklärung gegeben sein soll, wie es Haenlein auffasst ³⁾, indem er rügt, dass damit nur idem per idem erklärt sei. Vielmehr gibt Koehne im Weiteren die Erklärung, dass die Fruchtblätter in ungleicher Höhe auf der Axe erscheinen. »Das erste Fruchtblatt würde nämlich unterhalb der Spitze des etwas gewölbten Endes der Blüthenaxe inserirt sein und deshalb einen spitzen Winkel mit der Axe bilden; das zweite Karpell aber würde ganz an der Spitze der Axe stehen« ⁴⁾. Das Unrichtige dieser Erklärung leuchtet nach dem Geschilderten sofort ein. Celakovsky erklärt die Erscheinung durch Hemmung des hinteren Fruchtblattes oder vielmehr durch die »Präponderanz des fertilen Fruchtblattes über das sterile, infolge dessen das letztere gleichwie etwas emporgeschoben und gehemmt ist, ähnlich wie man es bei *Trapa* und bei *Rhus* beobachtet« ⁵⁾. Der schiefe Blüthenboden ist nach ihm »als der gebundene Kappentheil des vorderen Karpelles anzusehen«. Dem gegenüber ist hervorzuheben, dass von einer Hemmung des hinteren Fruchtblattes absolut nichts zu bemerken ist. Dasselbe wächst normal ebenso weiter wie das vordere Fruchtblatt, streckt sich in gleicher Weise und bildet ebenso normal einen der Griffelschenkel. Bei dem zum Vergleiche herangezogenen *Trapa* dagegen haben wir es thatsächlich mit Hemmungsbildungen zu thun, indem 2 der ursprünglich angelegten Karpelle hier verkümmern.

1) Haenlein, l. c. pag. 162.

2) Koehne, l. c. pag. 8.

3) Haenlein, l. c. pag. 163.

4) Koehne, l. c. pag. 67.

5) Celakovsky, l. c. pag. 61.

Die richtige Erklärung beruht auf ganz einfachen Wachsthumsvorgängen. Auf medianen Längsschnitten erkennt man nämlich leicht, dass die dicht vor dem hinteren Karpelle liegenden Periblemzellen des Blütengrundes sich durch tangentiale Scheidewände getheilt haben und dadurch den Boden an dieser Stelle etwas zu heben beginnen (Fig. 23). Auf eine weitere Deutung dieses Vorganges, ob diese Zellen dem vordere oder dem hinteren Fruchtblatte angehören, brauchen wir uns nicht einzulassen, zumal wir gesehen haben, dass eine deutliche Grenze nicht gezogen werden kann, weshalb ich die den Grund der Höhlung einnehmenden Zellen als den Ansatzstellen der beiden Karpelle gemeinsam angehörig bezeichnete. Es findet dieser Vorgang sein Analogon beim oberständigen Fruchtknoten der Scrophularineen und Solaneen. Gehörte der schiefe Blütenboden allein dem vorderen Fruchtblatte zu, so hätten die Zellen, welche, wie wir sahen, die Verbreiterung des Blütenbodens bewirkten, allein von den Zellen des vorderen Fruchtblattes gebildet sein müssen, was thatsächlich nicht der Fall ist.

Den schiefen Grund der Fruchtknotenhöhle betrachtet Haenlein als Placenta, weil aus diesem, »nicht in der Mitte, sondern etwas abwärts, dem vorderen Karpelle mehr genähert, die Samenknospe entspringt«¹⁾, also auf der tiefer liegenden Hälfte des schiefen Grundes. Sehen wir die erwähnten tangentialen Zelltheilungen, welche die schiefe Neigung des Grundes der Höhlung bewirken, als letzten Rest eines Gewebes an der Stelle an, wo die beiden Karpelle am Grunde zusammenstossen, so hat die Bezeichnung dieses Gewebes als Placenta seine Berechtigung, wenn auch das Bedürfniss für Anwendung dieser Bezeichnung bei den Compositen nicht vorhanden ist, indem das Gewebe später nicht mehr als eine besonders abgegliederte, in Form eines Trägers hervortretende Ursprungsstätte der Samenknospen erscheint²⁾.

In Erörterung der Frage nach der morphologischen Bedeutung der Samenknospe, die wir unberücksichtigt lassen, weil uns die Samenknospen den Sporangien der Gefässkryptogamen analoge Bildungen sind, erwähnt Haenlein einer Erscheinung aus der Vergrünungsgeschichte, welche er als Beweis für die Blattnatur der Samenknospe der Compositen anführt, dass nämlich »der Scheitel der Axe neben derselben (Sk.) häufig weiter wächst und sich in der verschiedensten Weise ausbildet«³⁾. Das beweist aber weiter nichts, als dass in einzelnen anormalen Fällen das Axengewebe zur Ausbildung der Placenten nicht vollständig verbraucht wird, und dass dann der Vegetationspunkt desselben zwischen den Ansatzstellen der Karpelle weiter wächst, ohne dass diese — wie es ja auch möglich wäre —

1) Haenlein, l. c. pag. 163.

2) cf. Goebel, Entw. pag. 273.

3) Haenlein, l. c. pag. 168.

eine weitere Entwicklung erföhren, d. h. ohne dass sie mit emporgehoben werden. Die Samenknospe erscheint nämlich nicht an der Spitze dieser verlängerten Axe, sondern im Grunde des vorderen Fruchtblattes. Der Umstand, dass in allen solchen vergrünten Blüthen die Samenknospe immer dem vorderen Fruchtblatte zugehört, kann keineswegs als ein Beweis dafür gelten, dass dieses auch in den normalen Blüthen als das allein fruchtbare anzusehen ist. Die Samenknospe, welche in normalen Fällen aus dem den Ansatzstellen beider Fruchtblätter gemeinsamen Gewebe entspringt, rückt natürlich in anormalen Fällen, wo dieses gemeinsame Gewebe nicht zur Ausbildung gelangt, an den Rand des zunächst stehenden Fruchtblattes.

In der geschilderten Weise verläuft in der Hauptsache die Entwicklung des Fruchtknotens bei allen fruchtbaren Blüthen der Compositen. Von den fruchtbaren Blüthen unterscheiden sich die unfruchtbaren nur darin, dass bei ihnen auch zur Ausbildung der einen Samenknospe kein Raum gelassen wird; die sonstige Entwicklung ist ganz entsprechend. Es werden z. B. bei den unfruchtbaren Röhrenblüthen von *Silphium conatum* in ganz normaler Weise 2 Karpelle angelegt, und zwar kurz nach Hervortreten der Staubblätter ganz am Grunde des nur wenig vertieften Blütenbodens, so dass das Axengewebe hier schon auf sehr früher Stufe der Entwicklung verbraucht wird. Der Blüthengrund ist hier nicht, wie bei den fruchtbaren Blüthen, ausgerundet, sondern die Seitenwände stossen auf einem medianen Längsschnitt fast geradlinig unter einem spitzen Winkel zusammen. Es unterbleibt auch die Verbreiterung des Grundes. Die Karpelle wachsen zusammen weiter, einen geschlossenen Cylinder bildend, der nur in seiner Axe von einem ganz schmalen Spalt durchzogen ist.

Oenothereen.

Nur in wenigen Einzelheiten verschieden, der Hauptsache nach ebenso, erfolgt die Ausbildung der Fruchtknotenhöhlung bei allen unterständigen Fruchtknoten. In der Placentation dagegen wiederholen sich alle möglichen Fälle. Wir betrachten im Folgenden noch einige Familien, bei denen nach den bis jetzt geföhrtten Untersuchungen auch die Bedeutung der Placenten noch nicht ganz klar gestellt ist. Dieses gilt besonders von der Familie der Oenothereen, welchen auch Celakovsky eine wichtige Stelle in der Reihenfolge seiner vergleichenden Darstellung anweist ¹⁾.

Diese Familie ist von Duchartre, Payer und Popoviciu Barcianu genaueren entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen unterworfen worden. Alle drei kommen zu verschiedenen Resultaten, sowohl in Beziehung auf die Bildung des unterständigen Fruchtknotens als auch auf

1) Celak. l. c. p. 43.

die Deutung der Placenten. Die beiden letzteren vertreten die Axennatur des unterständigen Fruchtknotens, wobei Barcianu sich auf genauere histologische Untersuchungen stützt¹⁾. Nach Duchartre dagegen sind Fruchtknoten wie Placenten durch Verwachsung der Karpelle entstanden²⁾. Doch sind ihm die Placenten zusammengesetzt aus den durch die einwärtsgeschlagenen verwachsenen Ränder der Karpelle gebildeten eigentlichen Scheidewänden des Fruchtknotens und den aus Theilung der Axe hervorgegangenen cordon pistillaire. Ganz ähnlich ist die Anschauung Payers, nach welchem der untere axile Theil der Placenten durch Vertiefung des Blütenbodens an 4 vor den Karpellen gelegenen Stellen entsteht. Er sagt darüber: »Ces changements consistent principalement dans l'apparition sur le fond du petit bassin circulaire de quatre petites fossettes situées de façon qu'il y en a une au pied de chaque mamelon carpellaire primitif«. Ueber den oberen Theil dagegen gibt er an: »Des cloisons alternes avec les mamelons carpellaires, et continuant par conséquent les cloisons, qui séparent les loges de la partie inférieure, se montrent sur les parois et s'avancent vers le centre«.

Nach Barcianu dagegen stellen die Placenten einen neuen selbstständigen Blattkreis dar, angelegt als 4 Höcker im Grunde der Fruchtknotenöhlung.

Die Resultate meiner Untersuchungen sollen im Folgenden an *Oenothera biennis* dargestellt werden. In Beziehung auf die erste Entstehung habe ich den Beobachtungen Barcianus nur Weniges hinzuzufügen. Hier wie bei den Compositen erscheint unterhalb der Staubblattanlagen ein einheitlicher ringförmiger Wall, Barcianus Carpidiencyclom, aus welchem dann durch lokalisierte raschere Theilungen die später vorhandenen Karpellanlagen, deren es hier 4 sind, hervorsprossen. Auch hier ist die Bildung des Cyklomes durch tangential Theilungen von Periblemzellen auf die dicht unterhalb des Staubblattkreises liegende Region der ausgehöhlten Blütenaxe beschränkt. Sobald die Karpelle als 4 Höcker aus diesem Walle nach dem Inneren der Höhlung sich vorzuwölben beginnen, erkennt man auf Längsschnitten leicht, wie wiederum die ganze Wandung bis auf den Grund des Bechers verbraucht wird, indem nach unten zu fortschreitend immer mehr Zellen durch Scheidewände getheilt werden, die so gerichtet sind, dass dadurch ein Hervorschieben der 4 Karpellhöcker bewirkt wird. Auch Barcianu hat diese Thatsache beobachtet. Er sagt hierüber: »Auf dieser Entwicklungsstufe nimmt das Cyklom, wie

1) Popoviciu Barcianu, Unters. über d. Blütenentw. d. Onagr. Schenk-Luerssen, Mitt. d. Bot. II. Bd. Heft 1. pag. 81 ff. Payer l. c. p. 451 (*Epilobium spicatum*).

2) Duchartre, Observations sur la fleur et plus partic. sur l'ovaire de l'*Oenothera suaveolens*. H. P. in Ann. d. sc. nat. Série II. Bd. 18. 1842.

»die Längsschnitte in Fig. 7–10 zeigen, fast die ganze Seitenwandung »des Axenbechers ein, der unterhalb der Insertionsstelle liegt« ¹⁾).

Im Gegensatz zu den übrigen Vertheidigern der axilen Natur des unterständigen Fruchtknotens, welche die Karpellanlagen schon ihrer Entstehung nach auf den oberen Rand des ausgehöhlten Axenbechers beschränkten, hat Barcianu die Entstehung derselben aus der ganzen Innenwandung bis auf den Grund des Bechers bereits richtig erkannt. Trotzdem hält er an der axilen Natur des ausgebildeten unterständigen Fruchtknotens fest. Zur Begründung greift er zu der künstlichen Erklärung, dass im weiteren Verlaufe der Entwicklung die Anlagen an der Seitenwandung immer weiter hinaufrücken. Er sagt darüber: »Da aber später »dieser ganze Theil und namentlich auch die Zone, die zunächst dem »Becherboden anliegt, sich bedeutend in die Länge streckt, so rückt auch »das Cyclom mit den 4 nun grösser werdenden Höckern immer weiter »hinauf, so dass in vorgerückten Stadien dasselbe nur an der Bildung »des oberen Theiles sich betheiligt«. Dass dieser Schluss vollständig verfehlt ist, ist leicht einzusehen. Von einem Emporheben des Cyclomes mit den 4 Fruchtblatthöckern könnte nur dann die Rede sein, wenn die das Emporheben bewirkenden Quertheilungen nach Anlage des Cyclomes beschränkt wären auf eine unterhalb der Insertionsstelle des Carpidien-cyclomes liegende ringförmige Region der Axe, wozu vor allem auch erforderlich wäre, dass eine scharfe Grenze zwischen den Karpellen und diesem Theile der Axe gezogen werden könnte, was thatsächlich nicht der Fall ist. Die lebhaftesten Zelltheilungen findet man immer in dem Cyclom mit den Karpellen, derart, dass die Fruchtblätter nicht nur in die Länge, sondern auch in die Breite wachsen. Radiale und tangential Wände sieht man bei vorgeschrittenen Stadien innerhalb der ganzen Ausdehnung der Karpellanlagen auftreten und zwar nicht nur in der bis auf den Grund der Höhlung reichenden äusseren Region des Axenbechers, sondern auf immer tiefer liegende Schichten des Axengewebes sich verbreitend. Auch seitlich noch unterhalb des abgeflachten Bodens der Höhlung lassen sich dieselben deutlich erkennen (Fig. 29), wonach auch dieser Theil in die Karpellbildung mit hineingezogen wird, ein Schluss, welcher von vornherein durch den analogen Vorgang bei den Compositen nahe liegt. Ein gänzliches Aufbrauchen des am Grunde gelegenen Vegetationspunktes lässt sich dagegen hier nicht constatiren.

Erst nach und nach beginnen die am Grunde der Seitenwandung liegenden Zellen des Karpellgewebes sich auf Quertheilungen zu beschränken und in Verbindung mit dem angrenzenden Axengewebe eine Streckung dieser Region und damit ein Emporheben des ganzen darübergelegenen Gewebes zu veranlassen. Barcianu selbst gibt in der citirten Stelle

1) Barcianu l. c. pag. 101.

eine Streckung innerhalb des die ganze Seitenwandung einnehmenden Cyklomes an (»dieser ganze Theil«), was doch offenbar nicht so aufgefasst werden darf, dass hierdurch »dieser ganze Theil« wieder zu Axengewebe würde. Wenn dann »namentlich auch die Zone, die zunächst dem Becherboden anliegt, sich bedeutend streckt«, so umfasst diese Zone doch einen Theil des Karpellwalles mit. Derselbe reicht dann selbst in späteren Stadien immer noch bis auf den Grund des Bechers, ja sogar, wie wir gesehen haben, darüber hinaus auf einen Theil des Becherbodens.

Barcianu gibt dann weiter an: »Dadurch, dass es (das Cyclom) in »seiner ganzen Höhe und ebenso in der ganzen Peripherie durch Vermehrung »und Streckung seiner Zellen weiter wächst, entsteht ein röhrenförmiges »Gebilde, das auf seinem oberen freien Rande die 4 erwähnten Höcker »trägt. Die trichterförmige Basis bildet den Verschluss des Fruchtknotens »nach oben zu, der eigentliche mittlere röhrige Theil stellt den Griffel mit »dem Griffelkanal her, und die 4 Höcker, die durch das anfänglich »stärkere Wachsthum ihrer Innenseite aus dem Lumen auf den Rand der »Röhre treten, bilden die Narbenlappen«¹⁾. Es ist diese eigenthümliche Auffassung eine Folge der falschen Annahme vom Emporheben des Cyklomes an den oberen Rand des Axenbechers. Dieses beginnt nach Barcianu ungefähr da, wo es in Wirklichkeit aufhört, um sich in das von den aus seinem oberen Rande entsprossenen Karpellhöckern gebildete Gewebe fortzusetzen. Es müssten danach die 4 schon sehr früh hervortretenden Karpellhöcker gar keine Weiterentwicklung erfahren; diese müssten von dem sich röhrenförmig emporstreckenden Cyklome passiv in die Höhe gehoben werden, um dann zuletzt an der Spitze des ausgebildeten Griffels die 4 Narben zu bilden. Erscheint dieses schon auf den ersten Blick als unwahrscheinlich, da es eine in der Entwicklungsgeschichte wohl einzig dastehende Erscheinung wäre, so zeigt auch eine genauere Untersuchung das gänzlich Unrichtige der Darstellung. Der ganze obere Theil des Fruchtknotens wird vielmehr durch diese 4 Höcker selbst gebildet, also nicht nur Narbe und Griffel, sondern auch die den Verschluss der Fruchtknotenöhle nach oben bewirkende Gewerbestriphe. Die Ausbildung desselben steht im Zusammenhang mit der Placentenbildung.

Keineswegs verläuft die weitere Entwicklung so, dass die Höcker auf 4 engbegrenzte Stellen am Rande des Walles beschränkt blieben, immer als scharfgesonderte Spitzen auf demselben erscheinend. Indem sie nicht nur in die Länge, sondern auch in die Breite wachsen, treten sie mit ihren Rändern in Berührung. Die Narben werden dann durch die Spitzen dieser 4 Höcker gebildet, nicht aber durch die Höcker selbst.

Von dem Augenblicke an, wo die Karpelle mit ihren Rändern zusammentreffen, verläuft die weitere Entwicklung ebenso, wie in ober-

1) Barcianu l. c. pag. 101.

ständigen Fruchtknoten, wie z. B. in dem der Malvaceen. Es beginnt die Placentenbildung. Wenn Barcianu meint, »dass von einem Verwachsen der Ränder früher getrennt gewesener Fruchtblätter nicht die Rede sein könne, so scheint er darunter ein Aneinanderwachsen getrennt ausgebildeter Ränder zu verstehen. Nach seiner Meinung müsste man dann »2 Dermatogenlagen rechts und links, und 2 sich aneinanderlegende in »der Mitte der Leiste haben; zu diesem müssten dann noch die Periblem- »und Pleromzellen jedes der Blätter, die mit einander verwachsen, hin- »zukommen, so dass wir wenigstens 10 Zelllagen neben einander, auch »in sehr jungen Leisten, haben würden«¹⁾. Jeder Unbefangene wird sich der Bemerkung Celakovskys anschliessen, dass dieser entschieden ablehnende Einwurf etwas primitiver Art ist²⁾. Die seitlich zusammenstossenden Karpellränder beginnen gemeinsam zu wachsen und treten infolgedessen als leistenförmige Anschwellungen an den Seitenwänden nach dem Lumen der Höhlung hervor. Es hat dieser Vorgang durchaus nichts Eigenthümliches. Er findet sich immer auch in oberständigen Fruchtknoten bei der Ausbildung eines Fruchtknotens aus mehreren Karpellen und wird da allgemein als eine Verwachsung der Karpellränder bezeichnet. Indem die Ränder der Karpelle mit deren fortschreitendem Längen- und Breitenwachsthum immer höher hinauf zusammentreffen, findet eine von unten nach oben fortschreitende Verwachsung statt. Es entsteht so das den Verschluss der Fruchtknotenöhle nach oben bildende Gewebe. Diese Verwachsung findet auch noch statt, nachdem die Spitzen der Karpelle zusammengestossen und nebeneinander in die Höhe gewachsen sind, wodurch der röhrenförmige Theil des Griffels gebildet wird. Die 4 freien, nicht mit einander verwachsenden Spitzen bilden dann die Narben. Für die Richtigkeit dieser Beobachtung, welche mit der normalen Entwicklung des Griffels bei oberständigen Fruchtknoten übereinstimmt³⁾, spricht auch die Ausbildung der Kommissurnarben bei *Epilobium*.

Aehnliche Anschwellungen wie an den verwachsenden Karpellrändern treten gleichzeitig an der Innenseite des Cyklomes und am Grunde des Bechers auf. Diese Vorgänge lassen sich am besten veranschaulichen — eine Vorstellung, die nur ein Bild zur Verdeutlichung sein soll —, dass in dem Walle die Basen der 4 Karpelle gebunden sind. Es beginnen dann die Ränder derselben sich aus dem Walle herauszudifferenzieren, indem die diesen Rändern entsprechenden Stellen von oben nach dem Grunde des Bechers zu fortschreitend anschwellen und durch massige Entwicklung die Placenten bilden. Nach Barcianu dagegen sollen bei Beginn der Placentenbildung am Grunde des Bechers 4 neue Höckerbildungen auftreten. Die zum Beweise von Barcianu benutzten Fig. 13,

1) B. l. c. pag. 107.

2) Cel. l. c. pag. 45. Anm. 2.

3) cf. Goebel, Entw. pag. 329.

14 und 15 entsprechen, wie man sich auf entsprechenden etwas dickeren Längsschnitten leicht überzeugen kann, so alten Stadien, dass die Placenten bereits als an den Seitenwänden verlaufende Leisten leicht erkennbar sind. Die Figuren 13 und 14 stellen keine medianen Schnitte dar. Es ist hier einer der Placentenwülste dicht vor der nach dem Beobachter zu liegenden Wand getroffen, diese Blüthe ist also nur angeschnitten. Daraus schliesst nun Barcianu: »Wenn wir nämlich ein Präparat vor uns haben, das »ein Entwicklungsstadium repräsentiert, wie es in Fig. 13 wiedergegeben »ist, so sehen wir bei oberflächlicher Einstellung die Contoure eines runden »Höckers, die nach beiden Seiten zu abfallend in das Gewebe des Bechergrundes sich verlieren (Contour 1)«¹⁾. Dem ist nur hinzuzufügen, dass dieser Höcker sich rückwärts an die abgeschnittene Wand ansetzt, sogar noch an dieser eine Strecke weit in die Höhe läuft. Es ist also tatsächlich gar kein Höcker, sondern der angeschnittene Theil des Placentenleists. Dieses folgt auch aus dem Vergleiche mit dem Folgenden: »Beim langsamen Senken des Tubus verschwindet die Deutlichkeit dieser »Contour immer mehr, bis wir, bei einer mittleren Einstellung, von ihr »nichts mehr deutlich unterscheiden können, dagegen uns scharf um»schrieben die Contour (2) entgegentritt, die quer von der einen Seite des »Fruchtknotens zur gegenüberliegenden verläuft; sie erscheint da, wo »sie der Fruchtknotenwand anliegt, am höchsten und steigt »sanft ab gegen das Centrum, welches die tiefste Stelle einnimmt«. Es ist das die Contour der beiden seitlich an den Wänden verlaufenden Placentenleisten. Sie erscheint aber nicht nur an der Ansatzstelle am höchsten, sondern verläuft allmählich in dieselbe. Selbst aber nach Barcianus, in dieser Beziehung nicht ganz getreuen Zeichnung, kann die Contour 2 nicht als Umriss zweier Höcker gedeutet werden. Es ist ganz deutlich zu sehen, dass sie mit der Wand in Verbindung stehen, durch keinen Zwischenraum von ihr getrennt.

Wären Höcker vorhanden, so müsste ein median geführter Schnitt 2 derselben treffen. Ein solcher medianer Schnitt, obwohl verhältnissmässig leicht zu erhalten, ist von Barcianu nicht gezeichnet worden, weil eben auf diesem von Höckerbildung gar nichts zu sehen ist. Jeder mediane Schnitt geht durch 2 gegenüberliegende Placentenleisten. Wir sehen die Wand gleichmässig in den Becherboden übergehen. Dagegen sind zwei Höcker zu sehen auf einem von B. in Fig. 15 dargestellten Schnitte durch 2 gegenüberliegende Vertiefungen, der viel schwieriger zu erhalten ist, weil er quer zur Mediane geführt werden muss. Die beiden hier am Grunde des Bechers erscheinenden Höcker, welche vor der Mitte der Karpelle liegen, müssten nach B.'s Auffassung die Ränder seiner Placentenhöcker sein. Diese selbst erscheinen im Hintergrunde als an den Seiten-

1) Barcianu a. a. O. pag. 106.

wandungen verlaufende Leisten. Es ist dieses eine entsprechende Ansicht, wie wir sie schon mehrfach in oberständigen Fruchtknoten, z. B. bei *Ailanthus* gefunden haben. Die 2 Höcker sind danach den »Sohlen« analoge Gebilde. Ein solcher Längsschnitt beweist also, dass sich die Anschwellung nicht nur über die ganze Innenseite des Cyklomes bis an den Grund verbreitet hat — und zwar in absteigender Richtung, während die freien Karpellränder, wie wir gesehen, in aufsteigender Richtung verwachsen —, sondern noch über den Bechergrund selbst. Wir erkennen, wie die vor den Spitzen der freien Karpelle liegenden Randstellen der gebundenen Karpelle sich durch Periblemtheilungen hervorzuwölben beginnen. Diese »Sohlen« müssen wir auch hier als die Randprodukte der im Cyklome gebundenen Karpellbasen auffassen, wenn wir uns gegenwärtig festhalten, dass das Cyklom mit seiner Basis auf den Boden des Axenbechers übergreift. Aeusserlich bemerkbar macht sich dieser Vorgang als das Auftreten von 4 Grübchen, wie es Payer angab. Nur entstehen dieselben nicht vor der Basis des Cyklomes auf einem den Grund des Bechers einnehmenden Axengewebe, sondern auf der Basis des auf den Grund des Bechers übergreifenden Cyklomes, auch nicht durch einen »unbestimmten Prozess der Aushöhlung«, wie es Payer von Barcianu vorgeworfen wird, sondern durch den ganz bestimmten oben geschilderten Vorgang der vorschreitenden Anschwellung der Karpellränder, wie es sich typisch bei der Entwicklung schildförmiger Blätter findet, und wie es analog bei der Sohlenbildung von *Ailanthus* festgestellt wurde.

Diese Grübchen vertiefen sich dadurch immer mehr, dass die am Grunde derselben, also etwas oberhalb der Ansatzstellen des Karpellwalles liegenden Zellen sich nur durch radiale Wände theilen, während rings um dieselben die angeschwollenen Karpellränder durch intensiv tangentielle Theilungen rasch in die Höhe wachsen.

Die zugleich hiermit stattfindende Weiterentwicklung ist von B. richtig in der Weise angegeben worden, dass der Vegetationspunkt der Axe, wenn wir einen solchen als noch vorhanden annehmen, im Zusammenhange mit dem ihn aussen bekleidenden Placentengewebe derart in die Höhe wächst, dass das Axengewebe im ausgebildeten Fruchtknoten etwa bis zu $\frac{2}{3}$ der Fruchtknotenhöhle emporreicht.

Barcianus Gründe für die Annahme, dass die Placenten als selbständige, den übrigen Phyllomkreisen coordinirte Blasteme aufzufassen seien, erweisen sich als hinfällig. Es beruht vielmehr die Placentenbildung hier auf ganz demselben Vorgange, wie er sich bei vielen oberständigen Fruchtknoten findet, analog dem der Entwicklung schildförmiger Blätter charakteristischen Verhalten.

Campanulaceen.

Betrachten wir schliesslich noch einen in Beziehung auf Placentenbildung zu den Scrophularineen und Solaneen analogen Fall beim unterständigen Fruchtknoten, so bietet das zu den Campanulaceen gehörige *Phyteuma* zur Untersuchung gut geeignetes Material. Untersucht wurde von mir *Phyteuma nigrum*, das Ende April gesammelt in seiner Aehre bereits Blüthen auf allen nöthigen Entwicklungsstufen angelegt hatte.

Auf medianen Längsschnitten durch ältere Fruchtknoten erscheint die Placenta wieder als ein scheinbar die Fortsetzung der Axe bildender, unten massig ausgebildeter Zapfen, der nach oben in die Ränder der zu den Griffeln sich ausbildenden beiden Spitzen der Fruchtblätter sich fortsetzt. Dieser Umstand sowie der ganze Verlauf der Zellen weist darauf hin, dass wir die Placenta als Erzeugniss der Fruchtblattränder anzusehen haben. Es umziehen nämlich die Zellen in regelmässiger Anordnung bogenförmig ringsum die Höhlung. Auch die Gefässbündel folgen diesem Verlauf, indem sie sich nicht direct nach unten wenden, sondern in einem Bogen etwas nach oben umbiegend dem Hauptgefässstrange unter einem spitzen Winkel sich anlegen, was sie als eine Fortsetzung nicht des Hauptgefässstranges, sondern des in der Fruchtknotenwandung und im Griffel verlaufenden Zweiges erscheinen lässt (Fig. 30).

Nachdem auf dem bei den Campanulaceen verhältnissmässig wenig vertieften Blüthenhöcker der Reihe nach die fünf Kelch-, Blumen- und Staubblätter in regelmässiger Alternation angelegt sind, bildet sich ganz am Grunde der nur noch wenig vertieften Höhlung die Anlage der beiden Fruchtblätter als ein schon bald an den zwei in der Mediane einander gegenüberliegenden Stellen etwas erhöhter Ringwall aus. Zur Ausbildung desselben wird das Axengewebe hier wiederum von Anfang an ganz verbraucht. Die Zelltheilungen erfolgen, wie gewöhnlich, in der ersten Periblemschicht und verbreiten sich da rasch bis auf den Grund der Höhlung. Durch Quertheilungen der am Grunde liegenden, den Ansatzstellen beider Fruchtblätter gemeinsamen Zellen wird danach eine starke Verbreiterung des Grundes bewirkt. Der vorher ausgerundete Blüthenboden erscheint dadurch bald eben.

Während die Fruchtblätter bis dahin nur sehr langsam emporgewachsen sind, strecken sich dieselben jetzt rasch. Die von ihnen eingeschlossene Höhlung wird also nicht nur breiter, sondern auch tiefer, indem die zu den Seiten des Grundes liegenden Zellen der Fruchtblätter durch Quertheilungen das darüberliegende Gewebe emporheben. Beim ersten Auftreten sind diese Quertheilungen auf die ersten zwei bis drei Periblemschichten beschränkt. Erst allmählich betheiligen sich auch die tiefer liegenden Schichten des Axengewebes.

Gleichzeitig mit der Anlage dieser bekanntlich durch intensive Quertheilung die Ausbildung des unterständigen Fruchtknotens bewirkenden

Querzone erfolgen in transversaler Richtung über den Grund der Höhlung fortschreitend diejenigen Zelltheilungen, welche die Placentenbildung zur Folge haben. Es wird zuerst seitlich an den Stellen, wo die beiden freien Fruchtblattränder zusammenstossen, eine Anschwellung bemerkbar. Diese verbreitet sich rasch bis zur Mitte der Höhlung, doch so, dass sie immer an den Seiten, beim Uebergange in die freien Fruchtblattränder, am höchsten bleibt. Auf medianen Längsschnitten erscheint infolgedessen der Grund der Höhlung von jetzt ab immer gewölbt, und die Wölbung erscheint um so grösser, je mehr seitlich der Schnitt geführt ist. Indem die an den Seiten verlaufenden Theile des Wulstes nach oben hin rasch verwachsen und besonders nach der Mitte der Höhlung zu sich massig ausbilden, wächst der mittlere Theil nur bis etwa zu $\frac{2}{3}$ der Fruchtknotenhöhlung in die Höhe und besonders nach den Seitenwandungen zu stark in die Breite, so dass er bald die ganze innere Höhlung ausfüllt und nur einen schmalen Spalt frei lässt. Auf medianen Längsschnitten findet man immer in den oberflächlichen Schichten des mittleren Wulstes intensive Theilung durch tangentielle Scheidewände.

Wie im Gegensatz zu den vorher betrachteten unterständigen Fruchtknoten schon die Vertiefung der Anlage von Anfang an eine geringe war, so unterscheidet sich *Phyteuma* auch noch dadurch, dass die freien Ränder der Fruchtblätter getrennt bleiben. Das Gewebe, welches die obere Decke der Fruchtknotenhöhle bildet, erscheint als eine Fortsetzung der seitlichen Placentenwülste.

Erwähnt mag noch werden, dass nicht selten bei *Phyteuma* wie bei den übrigen Campanulaceen, sich drei Fruchtblätter ausbilden, eins median nach der Axe zu, die beiden anderen seitlich, und entsprechend dann auch drei Placentenwülste.

Schlussbemerkung.

Zum Schlusse sei noch einmal kurz darauf hingewiesen, dass diese Untersuchung den Zweck hatte, die Entscheidung einiger noch schwebender Fragen betreffs des Fruchtknotens herbeizuführen auf Grund der entwicklungsgeschichtlichen Methode, indem alle sonst etwa anwendbaren Methoden, besonders die anatomische, sich als unzulänglich erweisen. Besonderes Gewicht wurde dabei auf die Untersuchung der Frage gelegt, welches Areal des Blütenbodens eine Fruchtblattanlage von allem Anfang an verbraucht. Als ein weiterer für das Verständniss einiger Verhältnisse wichtiger Factor erwies sich die Thatsache, dass wie oft in der vegetativen Region, so auch bei Ausbildung der Blütenblattorgane, allmählich ein immer grösseres Areal des Blütenbodens verbraucht wird, in die Ausbildung der Blattorgane mithineingezogen wird, was sich als ein Vorschreiten der Fruchtblätter auf den Blütenboden bemerkbar machte. Es bestätigen diese Untersuchungen die Annahme, dass der Aufbau des

oberständigen Fruchtknotens der Angiospermen durch die Entwicklung der Fruchtblätter herbeigeführt wird, dass die Axe, besonders beim Aufbaue des unterständigen Fruchtknotens nur als Träger der Karpelle theiligt ist. Auch haben sich die Fruchtblätter in wahren Sinne als Sporophylle erwiesen, indem die Placenten stets als Ausgliederungen desselben erscheinen. Die verschiedenen Arten der Placentenbildung lassen sich immer auf eine massige Ausbildung der Fruchtblattränder zurückführen, da in solchen Fällen, wo die Samenknospen auf der Blattfläche der Karpelle selbst zerstreut und nicht auf einem besonders ausgebildeten Gewebe sitzen, von einer Placenta überhaupt nicht die Rede sein kann. Dabei ist noch ein Umstand zu erwähnen, welcher gegen die früher eifrig erörterte Foliartheorie der Samenknospen spricht, dass nämlich auch in den Fällen, wo eine deutliche Placenta entwickelt ist, die Samenknospen nicht an den Rändern selbst sitzen, wie an vegetativen Blättern die Fiederblättchen, sondern etwas seitlich des Randes auf der Fläche der Fruchtblätter selbst. Als Grundarten der Placentation, auf welche sich alle vorkommenden Fälle zurückführen lassen, erscheinen diejenigen, wo einestheils an der Ansatzstelle des Karpelhöckers die Placenta sich als Sohle entwickelt, anderntheils der bekannte Fall, wo die Placenta gebildet wird durch massige Entwicklung zweier zusammenstossender und verwachsener Ränder, sei es desselben Fruchtblattes oder zweier aneinandergrenzender Fruchtblätter. Diese beiden Fälle können dann auch miteinander kombinirt auftreten. So erwies sich die Placenta bei *Ailanthus glandulosa* als eine echte Sohle, die nicht durch Verwachsung freier Karpellränder entstanden ist, sondern als eine geschlossen auftretende Ausgliederung der Ansatzstelle des Karpelhöckers, welche Auffassung sich sehr wohl mit den Vergrünungen in Einklang bringen lässt.

Eine solche echte Sohle in Verbindung mit der Ausbildung verwachsener Fruchtblattränder zu Placentenwülsten fanden wir als Grundform der Placentenbildung bei den Malvaceen. Von dieser Grundform aus machte sich innerhalb dieser Familien in doppelter Weise eine Rückbildung bemerkbar, indem bei einer kleinen Anzahl Arten nur die seitlichen Placentenwülste zur Ausbildung gelangen, während bei einer anderen, die meisten Malvenarten umfassenden Gruppe durch Zurückbleiben der Seitentheile der Fruchtblätter diese seitlichen Placenten ganz verschwinden und nur die Sohle, wenigstens bei den Uebergangsformen, gebildet wird. Durch einen als Berindung bezeichneten Prozess werden die Placentenwülste immer unter das Niveau des Blütenbodens an den Rand der Axe verschoben. Ebenderselbe diesem Prozesse zu Grunde liegende Wachsthumsvorgang bewirkt in Verbindung mit einem starken Flächenwachsthum des Karpellrückens das Verschwinden jeder Art von Placenta bei den am meisten rückgebildeten Arten.

Ganz entsprechend fanden wir den Vorgang bei den Scrophularineen und Solaneen, bei denen das Vegetationspunktgewebe von Anfang an verbraucht wird, so dass die beiden Fruchtblätter mit breiten Ansatzstellen ineinander übergehen.

Auch für die Familie der Caryophylleen bestätigte sich der karpellare Ursprung der Placenten. Es machte sich innerhalb dieser Familie wiederum ein Rückgang von der Untergruppe der Sileneen bis zu *Cerastium*, dem äussersten Gliede der Alsineen bemerklich.

Die Placentation im unterständigen Fruchtknoten, welche in den Familien der Compositen, Oenothereen und Campanulaceen untersucht wurde, erwies sich mit derjenigen in oberständigen Fruchtknoten völlig übereinstimmend.

Figuren - Erklärung.

Ailanthus glandulosa.

Fig. 1 und 2. In 1 ist die »Sohle« angelegt; Fig. 2 etwas älteres Stadium.

Malvaceen.

Abutilon venosum.

Fig. 3—6: mediane Längsschnitte.

Abutilon spec?

Fig. 7: stärkerer Querschnitt, zeigt Theilung der Placenten.

Malva moschata.

Fig. 8—11: mediane Längsschnitte. Schraffierte Zone in Fig. 9 zeigt starkes Längenwachsthum. In Fig. 11 sind die Karpelle eben angelegt.

Althaea rosea.

Fig. 12: Längsschnitt zeigt »Sohle« noch als Saum angedeutet.

Malope trifida.

Fig. 13: Beginn der Karpellbildung.

Scrophularineen und Solaneen.

Atropa Belladonna.

Fig. 14—17: 14a medianer, 14b etwas seitlicher Längsschnitt durch junge Karpellanlagen.

Compositen.

Helianthus annuus.

Fig. 18—23: mediane Längsschnitte. *cp*: Karpell; *st*: Staubblatt.

Silphium connatum: mediane Längsschnitte.

Fig. 24 und 25: fruchtbare Blüten. Fig. 26—28: unfruchtbare Blüten.

Oenothereen.

Oenothera biennis.

Fig. 29: medianer Längsschnitt.

Campanulaceen.

Phyteuma nigrum.

Fig. 30—38: mediane Längsschnitte. *f*: Fruchtblatt; *st*: Staubblatt.

Zur Kenntniss von *Macrocystis* und *Thalassiophyllum*.

Von
Otto Rosenthal.

(Hierzu Tafel VII und VIII.)

Im Jahre 1884 erschien in der botanischen Zeitung eine vorläufige Mittheilung von Will¹⁾ über die Anatomie von *Macrocystis luxurians*, in welcher eine eingehendere Zusammenstellung der Untersuchungsergebnisse in Aussicht gestellt wird.

Da seitdem Ausführliches nicht veröffentlicht ist, so unternahm ich es, auf Veranlassung von Herrn Prof. Dr. Falkenberg, *Macrocystis* genauer zu bearbeiten, zumal dieses um so nothwendiger war, als Will sich augenscheinlich von unrichtigen Anschauungen über die Vermehrung der Gewebemasse leiten liess, und weil die Entwicklungsgeschichte auch im einzelnen grosse Lücken aufzuweisen hatte.

Im Verlauf der Bearbeitung von *Macrocystis* gelangte ich an verschiedene Punkte, die zu einem Vergleich mit anderen *Melanophyceen* Veranlassung gaben. So bildet die Untersuchung von *Macrocystis* und die Vergleichung ihrer anatomischen Verhältnisse mit anderen *Laminariaceen* und einigen *Fucaceen* den ersten, grösseren Abschnitt meiner Arbeit.

Der zweite Theil behandelt die Gattung *Thalassiophyllum*, über deren Aufbau und Wachsthum bisher keinerlei Angaben vorlagen, ausser dem was Agardh²⁾ über die Gattung sagt.

Die Arbeit wurde im Wintersemester 1888/89 und einen Theil des Sommersemesters 1889 im botanischen Institut der Universität Rostock angefertigt. Es sei mir an dieser Stelle gestattet, meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Falkenberg, für die lebenswürdige und anregende Unterstützung, welche mir derselbe jederzeit angedeihen liess meinen herzlichen Dank auszusprechen. Auch Herrn Privatdocent Dr. Oltmanns fühle ich mich verpflichtet.

Das mir zu Gebote stehende Material von *Macrocystis* verdanke ich der italienischen Expedition des Vittore Pisano; es wurde in der Magalhaensstrasse von Capitain Chierchia gesammelt und, in Alcohol gesetzt, durch Vermittelung der zoologischen Station in Neapel dem Rostocker botanischen Institut bereitwilligst überlassen.

Herbariumsexemplare, welche ich zur Orientirung über die äussere Gestaltung brauchte, wurden mir freundlichst vom Berliner botanischen Museum zur Verfügung gestellt; auch ihm bin ich zu Dank verpflichtet.

1) Will, Zur Anatomie von *Macrocystis luxurians* Hook fil. et Harv. Botan. Zeitung 1884. No. 51 und 52. Vorläufige Mittheilung.

2) J. G. Agardh, Spec. gen. et ordin. Algarum pag. 138. 139,

Das übrige Material, von *Thalassiophyllum* und den anderen *Melanophyceen*, entstammt dem Herbarium und der Spiritussammlung des Rostocker botanischen Instituts.

Bevor ich mit der Darstellung meiner Untersuchungsergebnisse beginne, möchte ich kurz die Behandlungsweise des Materials anführen.

Bei der äusserst feine Schnitte erfordernden Verfolgung der entwicklungsgeschichtlichen Punkte, bei der Empfindlichkeit der Präparate gegen Wasser und Glycerin, wodurch oft eine störende, zu starke Quellung der Gewebe hervorgerufen wurde, sowie endlich bei der, durch das schnelle Verdampfen bedingten unzweckmässigen Verwendung von Alcohol, empfahl es sich, das Material nach der von Strasburger¹⁾ angegebenen Methode in Paraffin einzubetten und mit dem Mikrotom zu schneiden.

Die untersuchten Algen, ausser *Thalassiophyllum*, welch' letzteres Jahre lang im Herbarium gelegen hatte, konnten ohne Weiteres der Härtung und Einbettung unterworfen werden. *Thalassiophyllum* war jedoch der starken Schrumpfung der Gewebe wegen, vor der Verarbeitung mit Wasser zu behandeln, und erwies sich die Methode, die Thallusstücke mehrere Stunden in Wasser von 55—60° liegen zu lassen, als ganz zweckmässig, soweit überhaupt die eingetrockneten Gewebe eine Aufbesserung gestatteten.

Die Härtung vor der Einbettung in Paraffin hatte sehr vorsichtig zu geschehen, weil bei zu schneller Concentration des Alcohol die Zellen bedeutende Schrumpfung erlitten. Am besten eignete sich die Härtungsmethode mittelst des Dialysators, wie sie Strasburger²⁾ angiebt.

Zur Erreichung günstiger Färberesultate wandte ich zwei verschiedene Verfahren an, die sich beide bewährten.

Das erste beruht darauf, das Material von vornherein zu färben und dann die Einbettung vorzunehmen; das zweite besteht in der Färbung nach dem Aufkleben der Schnitte.

Bei der ersten Methode bediente ich mich wässriger Farbstofflösungen, in welche ich die Thallusstücke meist 48 Stunden hineinlegte, um sie dann der Härtung zu unterwerfen und einzubetten. Nach dem zweiten Verfahren werden die aufgeklebten Schnitte entweder mit einer Lösung von Farbstoff in Chloroform tingirt, oder nach Entfernung des Paraffins mittelst Chloroform oder Benzin und nachheriger Behandlung der paraffin-freien Schnitte successive mit Aether-Alcohol, Alcohol und Wasser, durch wässrige Lösungen gefärbt. Es ist die zuletzt angegebene Methode etwas umständlich und äusserst sorgfältig vorzunehmen, sie eignet sich auch nicht für Serien, bietet jedoch wieder den Vorthail, sehr dünne Schnitte mit Reagentien weiter behandeln zu können, wie ich beispielsweise bei

1) Strasburger, Das botanische Practicum pag. 270 ff.

2) Strasburger, Das botanische Practicum pag. 314 ff.

der Plasmaentfernung durch Eau de Javelle öfters auszuführen Gelegenheit hatte. Man kann ja allerdings auch ohne Einbettung das Material zwischen Hollundermark mit dem Mikrotom schneiden, es haben aber die Uebertragung der äusserst dünnen Schnitte auf den Objectträger und die unversehrte Ausbreitung bedeutend mehr Schwierigkeiten, als wenn man aus den aufgeklebten Schnitten durch gehärtetes Material das Paraffin entfernt.

Bei den überaus vielen Versuchen, wo es sich darum handelte, zweckentsprechende Doppelfärbungen zu erzielen, kam ich immer wieder auf Safranin und Haematoxylin zurück. Besonders ersteres ist in wässriger Lösung ganz vorzüglich zu brauchen.

Eine Lösung von Safranin in Chloroform, welche ich zur Färbung der aufgeklebten Schnitte meist anwandte, wird durch Eosinsäure, einem neuen, im Rostocker chemischen Universitätslaboratorium von Herrn stud. Walcker dargestellten Farbstoff, in gleicher Lösung an Tinctionsintensität noch bedeutend übertroffen.

Macrocystis luxurians.

I. Aeussere Gestaltung.

Der mit gabelig verzweigten Wurzeln an Steinen haftende Thallus von *Macrocystis* gliedert sich in »Stamm« und »Blätter« (Fig. 2) und in ein grösseres zusammenhängendes Endstück (Fig. 1).

Das Endstück ist ein sichelförmiges bis schwertförmiges Gebilde, welches sich der ungleichen Dicke seiner Ränder wegen, der Klinge eines Messers vergleichen lässt, insofern als der verdickte Rand (Fig. 1 *s—v*), der sich nach der Spitze des Gipfelstückes mehr und mehr verdünnt (Fig. 1 *v—l*), dem Rücken, der andere Rand (Fig. 1 *d*) der Schneide des Messers entsprechen würde.

An jener Stelle, wo der Rücken sich nach der Spitze des Endstückes hin zu verdünnen beginnt, liegt der Vegetationspunkt (Fig. 1 *v*). In diesem treten Risse auf, welche streng progressiv entstehen: Die jüngsten und dementsprechend kleinsten liegen daher immer der Spitze des Endstückes zunächst.

Die Risse verlaufen mehr oder minder unter spitzem Winkel zum Rücken; sie beginnen in der Nähe des letzteren und verlängern sich gegen die Schneide hin.

Die Rissebildung geschieht im Vegetationspunkt derart, dass zwischen dem jüngsten Riss und dem Rücken des Endlappens, parallel oder unter spitzem Winkel zum Rücken verlaufende Furchen von der oberen und unteren Fläche her durch das Gewebe mit einander in Verbindung treten, zu einem einzigen Riss verschmelzen und so den Vegetationspunkt in zwei Hälften theilen, welche, wie ihre weitere Ausbildung zeigt, nicht gleichwerthig sind.

Während die eine Hälfte sich an ihrer Basis streckt, mehr oder weniger cylindrischen Querschnitt annimmt und sich in ihrem mittleren Theil den Character des Vegetationspunktes conservirt, wird die andere Hälfte blattartig; sie rundet sich an ihrer Basis zum Stiel ab, der sich mit der Zeit zur Schwimmblase modificirt (Fig. 1 *b*), während die oberhalb des Stieles gelegene Partie spreitenartig bleibt (Fig. 1 *c*).

Durch die beträchtliche Längenwachsthumsenergie des Rückens und der ihm angrenzenden Partien, die sich unterhalb des Vegetationspunktes in Folge des Dickenwachsthums mehr und mehr cylindrisch abgerundet und das Aussehn eines Stammes angenommen haben, rücken die Insertionspunkte der blattartigen, anfänglich noch zusammenhängenden Lappen auseinander.

Mit Hülfe der Wellen werden schliesslich die Lappen von der Endlamina unter Verlängerung der Spalten bis zum Schneidenrand abgerissen. Sie erscheinen dann dem Rücken des Endstückes wie die Blätter höherer Pflanzen inserirt, und zwar ist die Einfügung eine einzeilige.

Wenn auch die blattartigen Gewebelappen ihrer Entstehung nach keine Blätter sind, und ebenfalls der abgerundete Rand mit einem Stamm nichts gemein hat, so wird doch der Einfachheit wegen die Nomenclatur Blatt und Stamm in folgenden Anwendung finden.

Die Spaltung in ungleichwerthige Hälften, wie im Vegetationspunkt von *Macrocystis*, ist nicht von Anfang an an den Individuen vorhanden.

Verfolgen wir das einseitige Verzweigungssystem nach der Basis des gegliederten Thallus (Fig. 2), so kommen wir schliesslich an einen Punkt, an dem die einseitige Insertion von einzelnen Blättern aufhört und Spaltungen in gleichwerthige Abschnitte stattgefunden haben.

Eines dieser Theilstücke (Fig. 2 *a* 6) erhob sich nach unserer Figur durch gesteigertes Längenwachsthum über die anderen *a*₅ *a*₄ *a*₃, und wird durch das ganze einseitige Verzweigungssystem (Fig. 2 *a* 6 + Fig. 1) mit dem thätigen Vegetationspunkt repräsentirt.

Diese anfänglichen Spaltungen in gleichwerthige Lappen lassen sich am besten an einem Keimling von *Macrocystis* übersehn (Fig. 3).

Nach Will und Agardh¹⁾ wird der Anfang zur späteren reichen Gliederung des Thallus von *Macrocystis* dadurch eingeleitet, dass sich an der Basis der schwert- bis sichelförmigen, stiellosen jugendlichen Pflanze in der Mitte ein Spalt sichtbar macht, der sich nicht bis zur Spitze oder dem Rand der Lamina fortsetzt (Fig. 3 *a*), und durch den der Keimling an der Basis in zwei gleichwerthige Hälften gespalten wird. Die letzteren theilen sich ihrerseits eben so weiter, indem sich auch in der Mitte der durch Spaltung entstandenen Hälften an der Basis Risse bemerkbar machen, die jeden Abschnitt wieder in zwei Theile spalten (Fig. 3 *b*¹ *b*²).

1) Agardh, Spec. gen. et ordin. Algar. pag. 153 ff.

Diese Theilungen in gleichwerthige Hälften können sich in derselben Weise noch weiter wiederholen.

Die Basis des Keimlings, sowie die entstandenen Lappen wachsen in die Länge und werden an ihrem unteren Ende stielrund, während die oberen flachen Theile zunächst noch unter einander in Zusammenhang bleiben und später auseinander gerissen werden.

Es entspricht die Gliederung in Figur 2 derjenigen in Figur 3. Die Risse a , b^1 , b^2 im jugendlichen Stadium (Fig. 3) sind analog s , s^1 , s^2 im weiter vorgerückten (Fig. 2). Die noch nicht gestreckten und abgerundeten gleichwerthigen Thallustheile $c_1 c_2$; $c_3 c_4$; $c_5 c_6$ an der Basis c kann man den in Stiel und Spreite gegliederten älteren gleichwerthigen Abschnitten $a_1 a_2$; $a_3 a_4$; $a_5 a_6$ an der Basis a vergleichen. Von diesen weisen die Blätter A , B , C am Grunde der Lamina je drei Risse auf.

Die Spaltung in gleichwerthige Hälften hört nach Agardh auf, wenn das eine oder das andere dieser Theilstücke vom Längenwachsthum bevorzugt wird und sich bedeutend über die anderen erhebt (Fig. 3 c_6 entsprechend Fig. 2 a_6).

Es werden dadurch die übrigen Lappen, welche im Wachsthum zurückbleiben, von der kräftigst wachsenden Lamina in ähnlicher Weise abgerissen, wie ich es oben für das spätere Endstück beschrieb; der stärker wachsende Abschnitt mit dem dauernd thätigen Vegetationspunkt (Fig. 1 v) sorgt für weitere Gliederung durch einseitige Blattbildung, und so kommt das Verzweigungssystem zu stande, welches ursprünglich den zusammenhängenden Thallus ausmachte (Fig. 3).

Meist sind es an der jugendlichen Pflanze die am weitesten nach aussen gelegenen Theilstücke, welche sich über die anderen erheben; es kommt aber auch vor, dass dieses oder jenes nach innen gelegene Stück stärker in die Länge wächst. Es kann sich ereignen, dass dies mehr oder weniger zu gleicher Zeit stattfindet — man denke sich zum Beispiel, wie es an einigen von mir untersuchten Pflanzen der Fall war, Fig. 2 a_4 zum Stamm verlängert, in gleicher Weise wie a_6 — ich habe aber auch Exemplare angetroffen, an denen bereits ein Stück sehr lang entwickelt war und hoch über der Basis des gegliederten Thallus einen Vegetationspunkt trug, während ein jüngeres Theilstück sich nachträglich auch stärker in die Länge streckte als seine Schwesterstücke (Fig. 2 $A \times$) und sich ebenso verhielt, wie das zuerst vom Längenwachsthum bevorzugte, also gleichfalls durch Rissbildung für die weitere einseitige Gliederung sorgte.

Es geht aus diesen Thatsachen hervor, dass schliesslich jedes Theilstück einen dauernd thätigen Vegetationspunkt haben kann, und dürfte Agardh nicht ganz im Recht sein, wenn er behauptet, dass die Rissbildung in der jugendlichen Pflanze aufhört, sobald sich das eine oder andere Theilstück in Folge stärkeren Längenwachsthums erhebt.

Während die Blätter *A*, *B*, *C* in Figur 2 durch »Dichotomirung« — wenn man diese allerdings bequeme aber uncorrecte Bezeichnung anwenden will — aus dem jungen Thallus hervorgegangen sind (Fig. 3 *c*₃—*c*₅), findet mit der Streckung von *a*₆ die Abtrennung der Blätter im Vegetationspunkt, wie oben angegeben, nur nach einer Seite hin statt. Will bezeichnet diese Erscheinung als eine »sympodiale bostrychoide Gabelung«. Man kann dieses Verzweigungssystem allerdings als sympodiale Gabelung auffassen, jedoch schliesst die Bezeichnung »bostrychoid« eine Richtung der seitlichen Blätter ein, welche in verschiedenen Ebenen liegt, und das ist bei *Macrocystis* nicht der Fall. Andererseits ist es auch nicht unzweckmässig, das fortwachsende Ende als gemeinsames Fussstück der seitlich inserirt erscheinenden Blätter zu betrachten und das System als Monopodium aufzufassen, zumal aus dem gleichen Vegetationspunkt das ganze Verzweigungssystem hervorgeht.

Die durch die Thätigkeit des Vegetationspunktes entstandenen Blätter (Fig. 1, Fig. 2 *ED*) modificiren ihren Stiel, wie bereits erwähnt, zu einer birnförmigen Schwimmblase. Es schien mir anfangs, dass mit der Blasenentstehung für die Blätter die Fähigkeit verloren gegangen sei, an ihrer Basis durch Risse neue zu erzeugen, weil sich an dem mir zu Gebote stehenden Material kein einziges blasentragendes Blatt vorfand, welches Risse gezeigt hätte. An einem alten, der Basis der Pflanze genäherten Blatte von *Macrocystis pyrifera* var. *zosteraefolia* aus dem Herbarium des botanischen Museums zu Berlin bemerkte ich jedoch oberhalb der Schwimmblase, wo die Erweiterung zur Spreite ihren Anfang nimmt, einen grösseren und einen kleineren Spalt; ich zeichnete dieselben in Figur 2 *D* hinein. Es schien mir dies ein noch thätiger Vegetationspunkt zu sein, der, wie wohl anzunehmen, erst später seine Thätigkeit entfaltete, es müssten sonst die Risse bei dem Alter des Blattes länger gewesen sein, oder es hätte schon ausgiebigere Blattbildung stattgefunden.

Wenn man auch aus dem Vorhandensein progressiv kürzerer Risse mit ziemlicher Sicherheit auf einen thätigen Vegetationspunkt schliessen kann, so ist doch die Möglichkeit da, dass seitlich von dem grösseren Riss ein dem auf der anderen Seite entsprechender kleinerer sich noch nachträglich einstellt. In diesem Fall würde man es nicht mit einem activen Vegetationspunkt zu thun haben.

Jedenfalls ist aber Will's Angabe, dass mit Schwimmblasen vershene Blätter die Fähigkeit eingebüsst haben, durch Rissbildung für weitere Differenzirung zu sorgen, unter Vorbehalt aufzunehmen.

Nach dem Abreissen der jungen Blätter von der Endlamina der Sprossspitze finden sich am Rande oberhalb des Stieles oder der in Bildung begriffenen Schwimmblase kleine zahnartige Vorsprünge, die mit dem Wachsthum der Blattspreite auch an Grösse zunehmen; es sind dann die älteren Blätter in gewissen Zwischenräumen mit länglichen, dem Rande

anliegenden und nach der Spitze gerichteten Zähnen besetzt; auch die letztere läuft in einen Zahn aus.

Die an die Blattstellung höherer Pflanzen erinnernde seitliche Insertion tritt sehr deutlich hervor, wenn, wie es regelmässig vorkommt, der Stamm sich dehnt; die Blätter erscheinen dann zweizeilig an demselben eingefügt. Die Entstehung der ihnen eigenen schwertförmigen Gestalt rührt daher, dass die eine Seite des mit dem Gipfelstück noch zusammenhängenden Blattes, und zwar die vom Vegetationspunkt abgewendete stärker wächst als die andere.

In der Jugend glatt, zeichnen sich die Blätter im Alter durch runzliche Beschaffenheit aus. Nach Will schwanken Länge und Breite, und bewegen sich innerhalb weiter Grenzen; an einem ca. 70 Meter langen *Macrocystis*stamm fanden sich Blätter von 1,6 Meter Länge bei einem mittlern Durchmesser von 0,27 Meter.

Die im jüngeren Zustande cylindrischen Stiele und Stämme mit kreisförmigem Querschnitt nehmen mit der Zeit auf dem Querschnitt ovale, plattgedrückte Gestalt an. Der Stamm erreicht nach Will, speciell an der Blatininsertion, wo er sich besonders abflacht, einen grösseren Durchmesser von 15 Millimetern.

Das Dickenwachsthum ist also im Verhältniss zur Ausdehnung in die Länge, die 200—300 Meter betragen kann, ein relativ geringes.

Fortpflanzungsorgane habe ich, ebensowenig wie Will, nachweisen können.

II. Anatomie und Histologie.

Wie die äussere Gestaltung, so wurde auch der innere Bau von *Macrocystis* bereits von Will unter gleichzeitiger Rücksichtnahme auf die Entstehung einzelner Formelemente behandelt.

Will geht zu Anfang seiner Arbeit auf die Gewebeformen der Spreite ein und beschreibt dann die Differenzirung des Spreitentheils in Stamm und Blatt. Des weiteren behandelt er den inneren Bau des jungen Stammes und Blattstiels, knüpft daran Betrachtungen über das Dickenwachsthum und spricht am Ende dieses Abschnittes von der Entstehung der Schwimmblasen. Der Bau des alten Stammes bildet den Schluss seiner Arbeit.

Ich werde im folgenden den Stoff etwas anders anordnen. Es scheint mir zweckmässiger, vom Vegetationspunkt auszugehen und dann Rücksicht zu nehmen auf Spreite und Stamm, in die der Vegetationspunkt nach der Sprossspitze und der Basis zu übergeht.

Nach Besprechung der Anatomie und des Dickenwachsthums werde ich die entwicklungsgeschichtlichen Punkte zu erledigen haben.

1) Thätiger Vegetationspunkt.

Der länglich-ovale Querschnitt durch den Vegetationspunkt lässt drei sehr scharf von einander abgegrenzte Gewebe unterscheiden: Zu äusserst die Bildungsschicht, dann die Rinde und endlich das Füllgewebe, welches den mittleren Theil einnimmt.

Die Zellen der Bildungsschicht (Fig. 4*a*) sind durch ihre Gestalt von dem übrigen Gewebe auf den ersten Blick hin zu unterscheiden. Sie besitzen Cylinder-, Kegel- oder umgekehrte Kegelform und enthalten reichlich gefärbte Chromatophoren.

Die sich an die Bildungsschicht anschliessende Rinde (Fig. 4*b*) besteht in ihrem äusseren Theil, der Aussenrinde, aus radialen Zellreihen, deren Glieder zunächst der Bildungsschicht klein und isodiametrisch sind, und, wie diese, Chromatophoren, allerdings in spärlicherer Menge führen. Eine Mittellamelle tritt in ihren Wänden in Folge anderen Lichtbrechungsvermögens deutlich hervor. Weiter nach innen vergrössert sich das Lumen der Zellen mehr und mehr und nimmt radial gestreckte Gestalt an.

Die innere Schicht des Rindenmantels, die Innenrinde, unterscheidet sich von der Aussenrinde dadurch, dass die Zellwände hier dickere Beschaffenheit haben, und die radiale Streckung der Zellen, wie sie die Aussenrinde zeigt, isodiametrischer oder tangential gestreckter Form Platz machte. Auf dem Längsschnitt erweisen sich die Innenrindenzellen als Gebilde, deren grösserer Durchmesser in die Längsaxe des Vegetationspunktes fällt (Fig. 4*c* und Fig. 5). Je näher dieselben dem Füllgewebe liegen, desto reichlicher treten in ihnen neugebildete Querwände auf, durch welche die langgestreckten Innenrindenzellen quer gefächert erscheinen. Die einzelne Innenrindenzelle wird dadurch in einen Zellfaden verwandelt, der aus rechteckigen oder quadratischen Gliedern besteht, und dessen Endzellen zugespitzt sind (Fig. 5 u. 6).

Bildungsschicht und Rindenzellen schliessen sich interstitienlos an einander an.

Die Mitte des Vegetationspunctes wird durch ein Gewebe eingenommen, dessen Wände mehr verdickt sind als die der Innenrinde und sich in Folge dessen von Bildungsschicht und Rinde als dritte Gewebeform deutlich unterscheiden lässt; sie wurde bereits mit dem Namen Füllgewebe bezeichnet.

Seine Zellen ähneln sehr denen der innern Rinde, zeigen ebenfalls auf dem Querschnitt isodiametrische oder tangential gestreckte Form und bestehen aus mehr oder weniger durch die gequollenen, verdickten Wände auseinandergedrängten Reihen, die an einigen Stellen noch mit einander in Zusammenhang stehn und deren einzelne Zellen nur wenig gestreckter erscheinen als die der inneren Rinde (Fig. 7*i*, vergl. auch Fig. 10). Zwischen ihnen ziehen sich in beschränkter Anzahl nach allen Richtungen schmale Zellfäden hin, die Hyphen.

Wenn ich die äusserste Gewebepartie mit Bildungsschicht bezeichne, so geschieht das aus dem Grunde, weil einzig und allein durch ihre Thätigkeit die übrigen Gewebe, äussere und innere Rinde, sowie das Füllgewebe erzeugt werden.

Ungemein klar und übersichtlich tritt die Entstehung sämtlicher Zellen aus der Bildungsschicht auf axilen Schnitten durch einen Vegetationspunkt hervor, welche parallel der Flächenausbreitung des Endlappens geführt wurden (Fig. 4—7 i).

Die Bildungsschicht ist in lebhafter Theilung durch radiale und tangentielle Wände begriffen (Fig. 4 a). Durch den ersten Process wird die Zahl der Oberflächenzellen vermehrt, während die durch tangentielle Wände abgeschnittenen Zellen zu Rindenzellen werden. Die letzteren theilen sich ihrerseits wieder, sodass radiale Zellreihen entstehen, die auf Quer- und Längsschnitt dieselbe Anordnung aufweisen (Fig. 4 b) und überaus deutlich, eben durch ihre radial an die Zellen der Bildungsschicht sich anschliessende Orientirung den Ursprung aus letzterer erkennen lassen. Man würde die Bildungsschicht und das Rindengewebe deutlich als ein System von radial gestellten Fäden mit selbstständigem Spitzenwachsthum und weiterer Verzweigung ansehen können, wenn nicht eben nachträglich in den inneren älteren Segmenten des Fadens neue Zelltheilungen aufträten.

Dort, wo die Wände der Rindenzellen sich zu verdicken beginnen, also am Uebergang von äusserer zu innerer Rinde, strecken sich die Zellen der ersteren in die Richtung der Längsaxe des Vegetationspunktes (Fig. 4 c) und beginnen sich dann durch Querwände zu fächern und zu Fäden zu modificiren (Fig. 5 und 6), wie ich vorher schon angegeben. Diese kurzgliederigen Fäden bilden die erwähnte dritte Gewebeform, das Füllgewebe (Fig. 7 i), welches dadurch characterisirt ist, dass in ihm Hyphen verlaufen, dass die Längswände der Zellfäden sich stärker verdickt haben und die Mitte des Querschnitts einnehmen, in welche sie durch den von der Bildungsschicht aus erfolgenden Nachschub gedrängt werden.

Was die Bildung der Hyphenfäden anlangt, so findet dieselbe in den Zellen der inneren Rinde statt und zwar derart, dass sich an irgend einem Punkte der Zelllängswand eine Ausstülpung bemerkbar macht. Dieselbe wächst bedeutend in die Länge, fächert sich durch Querwände und dringt, blind endigend, zwischen die Zellen des innersten Gewebecylinders hinein (Fig. 7 h).

Will hat die Entstehung sämtlicher Gewebe aus der Bildungsschicht nicht in ihrem vollen Umfange erkannt, wie wir bei Behandlung des Dickenwachsthums sehen werden, und ist daher auch seine Nomenclatur nicht correct.

Was ich als Bildungsschicht, Rinde und Füllgewebe bezeichne, nennt Will »Hautschicht«, »Rindenparenchym« und »Hyphengewebe«.

Die oberflächlich gelegenen Zellen, die Will »Hautschicht« nennt, können mit einer solchen überhaupt nicht verglichen werden, da sie continuirlich nach innen Elemente bilden, die successive zu Rinden- oder Füllgewebszellen werden. Ich habe sie daher als Bildungsschicht bezeichnet.

Unter »Rindenparenchym« versteht Will dasselbe, was ich als äussere und innere Rinde trenne. Er spricht erst beim »Stamm« von einem »secundären Rindenparenchym«, dessen Zellen jedoch von der inneren Rinde jüngerer Stämme, als sie Will untersuchte, verschieden gestaltet sind (vgl. sub Abschnitt 4a). Hätte er in jungen Stammtheilen den Uebergang von äusserer zu innerer Rinde verfolgt, so würde er nicht zu seiner unrichtigen Beurtheilung des Dickenwachstums durch Annahme eines besonderen »Verdickungsringes« gekommen sein.

Der Ausdruck »Hyphengewebe« scheint mir ebenfalls für die mittelste Gewebezone nicht der richtige zu sein, denn die Hyphen sind im Verhältniss zu den vertical verlaufenden Zellen des Füllgewebes nur von geringerer Bedeutung und erst aus den letzteren, resp. den angrenzenden Innenrindenzellen entstanden, immerhin also eine secundäre Erscheinung und in Folge dessen nicht geeignet, dem mittelsten Gewebecomplexe als Bezeichnung zu dienen.

2) Uebergang vom Vegetationspunkt in die Endlamina und den jungen Stamm.

Aufwärts vom Vegetationspunkt geht dessen Gewebe in dasjenige der Endlamina, abwärts in das Gewebe des Stammes über.

Die Endlamina zeigt die Gewebe des Vegetationspunktes in Lagerung und Ausbildung gleich, nur durch Wachstum des Organes in einer Richtung in die Breite gezogen. Bei dem vorherrschenden Wachstum in Richtung der Flächenausbreitung der Lamina, welches eine überwiegende Theilung durch radiale Wände bedingt, ist die innere Rinde in älteren Parteen aus der Endlamina nur äusserst schmal und besteht aus nur einer bis zwei Reihen von Zellfäden, die auf dem Querschnitt tangential gestrecktes Lumen aufweisen. Auch das Füllgewebe ist in Folge des geringen Zuwachses in radialer Richtung und der Zerrung, die es durch das Wachstum in Richtung der Flächenentwicklung der Spreite erfährt, in älteren Parteen sehr schmal. Die Veränderungen im Füllgewebe, gegenüber den Verhältnissen im Vegetationspunkt, sind dieselben wie im jungen Stamm, auf den ich jetzt zu sprechen komme.

Wies der Querschnitt im Vegetationspunkt länglich-ovale Form auf, so ist er im jungen Stamm, in Folge starken Wachstums der vorderen und hinteren Fläche in radialer Richtung kreisrund geworden. Die Gewebeelemente sind im Princip dieselben wie im Vegetationspunkt. Acussere und innere Rinde sind allerdings etwas umfangreicher geworden, haben jedoch dieselbe Anordnung wie dort. Die äussere Rinde besteht aus

radialen Reihen, die innere aus Zellen, deren Längsaxe derjenigen des Stammes parallel liegt. Auf dem Querschnitt zeigen die Innenrindenzellen isodiametrisches bis tangential gestrecktes Lumen; es sind das die in lebhafter Theilung begriffenen, gestreckten, zugespitzten Zellen (Fig. 5, 6, 10).

Im Füllgewebe haben einige Veränderungen stattgefunden, auf die ich hier eingehen werde. Während im Vegetationspunkt die Zellen des Füllgewebes denen der Innenrinde im grossen und ganzen gleichen und nur wenig stärker verdickte Wände haben als letztere, so ist im jungen Stamm darin eine Aenderung eingetreten, insofern als die Verdickungen im Füllgewebe bedeutend gegen die in der inneren Rinde überwiegen.

Auf dem Querschnitt treten im Füllgewebe radiale Zellreihen, deren rundes Lumen nach der Mitte zu kleiner wird, und die vielfach durch horizontal verlaufende Hyphen getrennt werden, deutlicher hervor als im Vegetationspunkt; sie liegen mit den Innenrindenzellen auf einem Radius und lassen klar den Ursprung aus letzteren erkennen. Es sind dies, wie der Längsschnitt ergiebt, vertical verlaufende Füllgewebszellen, die sich beträchtlich gestreckt haben und durch Querreihen (Fig. 7 *l*, 8 *a*) mit einander verbunden sind.

Die eigenartige Aufbauschung an den Querwänden, der contrahierte Plasmahalt, sowie das Vorkommen von callus- und schlauchkopfähnlichen Bildungen (Fig. 8 *c*), Verhältnisse, wie sie sich besonders an älteren Füllgewebszellen finden, geben denselben das Aussehn von Siebröhren höherer Pflanzen. Auf ihre Entstehung, sowie auf die Vergleichung mit den Siebröhren der höheren Pflanzen gehe ich später ein.

Die Hyphen haben sich, gegenüber dem Vegetationspunkt, im jungen Stamm bedeutend vermehrt; sie durchziehen das Füllgewebe nach allen Richtungen (Fig. 8 *h*, *h'*) und zeichnen sich durch grössere Länge aus.

Was die Entstehung der die vertical verlaufenden Zellen des Füllgewebes verbindenden Querreihen betrifft, so lässt sich dieselbe auf Längsschnitten durch den jungen Stamm verfolgen. Die Horizontalreihen fallen hier mehr in's Auge als im Vegetationspunkt.

Beim Uebergang von innerer Rinde zum Füllgewebe, wo Zunahme der Quellung der Membranen stattfindet, kann man constatiren, dass die Tüpfelschliesshäute ihre ursprüngliche Dünne beibehalten (Fig. 6 *t'*). Während man dort von einem Tüpfelkanal eigentlich kaum reden kann, weil der Tüpfel sehr breit, und der Kanal äusserst flach und ohne scharfe Ränder ist, kommen im ausgebildeten Füllgewebe schliesslich durch die Quellung der an die dünnbleibende Schliesshaut angrenzenden Membranpartieen Tüpfelkanäle zu stande, die mit fortschreitender Quellung der Wände immer tiefer werden, und entweder auf beiden Seiten gleich stark (Fig. 7 *a*) oder ungleich stark (Fig. 7 *t*) entwickelt sind. Mit der Vertiefung der Tüpfelkanäle wird an der längsverlaufenden Füllgewebszelle gewissermassen ein horizontal gerichteter Ast gebildet, der durch das Auftreten

einer Querwand von dem Haupttheil der Zelle als selbstständige Zelle abgegrenzt werden kann (Fig. 7 *l*).

Es ist dies die Entstehung der einen Form von Querverbindungen, durch welche die verticalen Reihen beim Auseinanderweichen in Zusammenhang bleiben. Eine andere Art, welche wohl noch häufiger ist, als die eben beschriebene, entsteht dadurch, dass sich von einer oder mehreren spitzen Zellen der Fäden an der Grenze des Füllgewebes von vornherein Tochterzellen abgliedern, die der Streckung folgen und sich derselben entsprechend theilen (Fig. 10 *b, e*).

Uebergänge zwischen aus Tüpfeln entstandenen Querreihen und den zuletzt beschriebenen sind nicht selten.

Callus- und Schlauchkopfbildung finden sich an den Querwänden der verbindenden Horizontalreihen in derselben Weise wie bei den vertical verlaufenden siebröhrenähnlichen Füllgewebszellen.

Solche Vegetationspunkte, welche ihre Thätigkeit bereits eingestellt hatten, zeigten, abgesehen von der Querschnittsform, im wesentlichen dieselben Gewebeelemente, besonders im Füllgewebe, wie der junge Stamm.

3) Das Dickenwachsthum des Stammes.

Während im Vegetationspunkt das Wachsthum in Richtung der Flächenausbreitung der Lamina dem Dickenwachsthum bedeutend überlegen ist, und dementsprechend Theilungen in radialer Richtung seltener auftreten, so sind im jungen Stamm durch ein am ganzen Umfang intensiv thätiges Wachsthum radiale Zellreihen entstanden, die sich deutlicher als im Vegetationspunkt von der Bildungsschicht bis in's Füllgewebe hinein verfolgen und klar ihre Entstehung in letzter Linie aus der Bildungsschicht erkennen lassen.

Wenn man, wie schon oben bei Besprechung des Vegetationspunktes, die Entstehung der Gewebe von der Bildungsschicht bis in's Füllgewebe verfolgt (Fig. 4—8) und sich noch einmal vergegenwärtigt, dass aus den Zellen der Bildungsschicht die äussere Rinde hervorgeht, die sich ihrerseits wieder theilt und die innere Rinde erzeugt, und dass sich aus letzterer das Füllgewebe bildet, wenn man ferner bedenkt, dass nach Differenzirung von äusserer, innerer Rinde und Füllgewebe, die Bildungsschicht immer noch durch ausgiebige Theilungen für weiteren Nachschub sorgt, und zwar selbst dann noch, wenn auch nur in geringem Maasse, theilbar ist, wenn die Aussenrinde ihre Theilungen beschränkt und die Innenrinde aufgehört hat, Füllgewebszellen zu erzeugen, so ist nicht einzusehn, weshalb der Bildungsschicht die Fähigkeit, für das Dickenwachsthum zu sorgen, abgesprochen werden kann, und weshalb dasselbe einer Meristemzone im Inneren, der von Will als »Verdickungsring« bezeichneten Uebergangszone von innerer Rinde zum Füllgewebe — den Zellfäden (Fig. 6 u. 10) — zugeschrieben werden soll.

Für meine Auffassung des Dickenwachstums vermittelt der oberflächlich gelegenen Bildungsschicht spricht auch die in verschiedenen Entwicklungsstadien verschiedene Lage der später noch ausführlicher zu erwähnenden Schleimgänge (Fig. 14—20), deren Bildung dicht unter dem Vegetationspunkt, und zwar dicht unter der Bildungsschicht, beginnen. Dieselben rücken mit zunehmendem Alter und zunehmender Dicke des Stammes mehr und mehr nach innen.

Ueberzeugt man sich ferner, dass auf einem Stadium, wie Fig. 20 es zur Anschauung bringt, das Füllgewebe keinen Zuwachs mehr erfährt, die innere Rinde also nichts mehr abgiebt, während dort die Bildungsschicht noch in geringem Grade theilungsfähig ist, so dürfte auch durch die Lage der Schleimgänge der sichere Beweis erbracht sein, dass nicht der im Inneren gelegene »Verdickungsring« die Ursache des Dickenwachstums von *Macrocystis* ist, sondern lediglich die oberflächlich gelegene Bildungsschicht.

Ein Widerspruch macht sich offenbar in der Bemerkung Will's geltend, dass in älteren Stammtheilen die Schleimgänge durch die Thätigkeit der »Hautschicht« — Bildungsschicht — weiter nach innen gerückt sind, während er doch vorher behauptet, die Zellen der »Hautschicht« folgen nur dem durch den »Verdickungsring« verursachten Dickenwachstum. Träfe letzteres wirklich zu, so könnten die fast oberflächlich entstehenden Schleimgänge nicht schliesslich so weit im Inneren liegen, wie es thatsächlich der Fall ist.

Will scheint, wie schon früher angegeben, dadurch zu falschen Deutungen verleitet worden zu sein, dass er von vornherein nicht der ausgesprochenen, auf Flächenschnitten durch jüngere Stadien so klar gegebenen Entstehung der Gewebe aus der Bildungsschicht die nöthige Beachtung angedeihen liess; auch dürften ihn die lebhaften und sehr auffälligen Theilungen in äusserer und innerer Rinde etwas älterer Stämme (vgl. sub Abschnitt 4a), neben denen die Thätigkeit der Bildungsschicht wenig in's Auge fällt und die radiale Anordnung des Gewebes sich weniger deutlich sichtbar macht, zur falschen Beurtheilung der Sachlage gebracht haben.

Wenn er die Dickenwachstumsunterschiede in Lamina und Stamm auf das geringere und reichlichere Vorhandensein von Hyphen zurückführt, und somit letztere dadurch, dass sie die Reihen im Füllgewebe auseinanderdrängen, als wesentliche Factoren für das Dickenwachstum hinstellt, so entspricht auch diese Auffassung nicht den thatsächlichen Verhältnissen.

Durch den breiten Innenrindenmantel im Stamm, aus dessen Zellen ja die Hyphen entspringen, kann auf einen relativ kleinen Raum, wie ihn das runde Füllgewebe einnimmt, eine grössere Anzahl von Hyphen zusammengedrängt werden, als durch den schmalen Innenrindenkörper der

Lamina, in welch' letzterer die Hyphen in weiteren Entfernungen von einander im flachen Füllgewebskörper verlaufen.

Dieser Umstand ist es, nach meinem Dafürhalten, der Will zu dem Schluss geführt hat, dass die Hyphen durch ihre auseinanderdrängende Thätigkeit Einfluss auf das Dickenwachsthum ausüben.

Von einem secundären Dickenwachsthum, wie ich es im alten Stamm von *Thalassiophyllum* fand, kann bei *Macrocystis* keine Rede sein. Während dort die Zellen der Bildungsschicht absterben, und eine Meristemzone in der äusseren Rinde ein secundäres Dickenwachsthum einleitet, functionirt bei *Macrocystis* die oberflächlich gelegene Bildungsschicht, so lange der Stamm überhaupt in die Dicke wächst, ununterbrochen weiter.

4) Spätere Entwicklungsstadien des Stammes.

a) Aelterer Stamm, von 2 mm. Durchmesser, näher der Basis des Thallus.

Während im jungen Stamm der Unterschied zwischen äusserer und innerer Rinde sich durch die radiale Streckung der Zellen der ersteren und die auf dem Querschnitt hervortretende isodiametrische oder tangential gestreckte Form der kurzgliederigen spitzendenden Zellfäden der letzteren sehr deutlich bemerkbar machte, so ist in etwas älteren Stämmen auch noch eine Unterscheidung sehr gut möglich, jedoch tritt dieselbe nicht mehr so klar hervor, weil die äussere Rinde beim Uebergang in die innere sich nicht wie im jungen Stamm zu Zellen streckt, die sich hernach zu Fäden fächern, sondern sie erzeugt durch Theilwände nach allen Richtungen isodiametrische Zellen. Die Innenrindenzellen sind von gleicher Form und zeigen ebenfalls ausgiebige Theilungen.

Während also der innere Theil der Aussenrinde und der sich an letztere anschliessende Innenrindenmantel aus mehr oder minder isodiametrischen Zellen besteht, entgegen den Verhältnissen im jungen Stamm, hebt sich von diesem breiten Gürtel die dem Füllgewebe angrenzende schmale Zone der Innenrinde durch ihr auf dem Querschnitt kleiner und gewöhnlich mehr in tangentialer Richtung gestrecktes Lumen ab. Es sind dies die langgestreckten Zellfäden (Fig. 10), wie der Längsschnitt ergibt, denen wir im jungen Stamm begegneten, und die dort unmittelbar aus der äusseren Rinde an der Grenze der inneren sich zu bilden begannen (Fig. 4c, 5). Waren im jungen Stamm Rinde und Füllgewebe einander fast an Durchmesser gleich, so ist letzteres hier von einer Rinde umgeben, welche zwei- bis dreimal so breit erscheint als das Füllgewebe.

Will nennt die breite Innenrindenzone »secundäres Rindenparenchym« und die an der Grenze des Füllgewebes liegenden Zellfäden »Verdickungsring«.

Dieses Stadium ist es, welches Will zu seinen falschen Schlüssen betreffs des Dickenwachsthums veranlasste (vgl. sub Abschnitt 3).

Im Füllgewebe sind die langgestreckten Zellen durch die verringerte Quellung der Membranen näher aneinander gerückt.

b) Alter Stamm, in dem sämtliche Gewebe, mit Ausnahme der Bildungsschicht, ihre Theilungen eingestellt haben.

Die anatomische Untersuchung dieses Stadiums giebt bald darüber Aufschluss, dass die Theilungen hier auf die Bildungsschicht und die ihr direct anliegenden kleinen Zellen der äusseren Rinde beschränkt sind und nur noch in geringem Grade stattfinden, dass aber die andern Gewebe mehr oder weniger in den Dauerzustand übergangen und durch geringe Streckung und passive Dehnung dem beschränkten Wachsthum folgen.

Die Bildungsschicht hat dasselbe Aussehn wie im jungen Stamm und dem Vegetationspunkt.

Während die Zone der Innenrinde an Mächtigkeit bedeutend zugenommen hat, erscheint die Dicke der Aussenrinde kaum wesentlich vergrößert. Die Zellen der Innenrinde sind dort, wo sie sich an die äussere anschliessen, isodiametrisch, meist nicht gleichmässig rund, sondern polyëdrisch und zeigen ein sehr grosses Lumen. Vielfach liegen zwischen den grosslumigen Rindenzellen kleinere eingefügt. Nach dem Füllgewebe hin werden die Zellen kleiner und haben auf dem Querschnitt tangentiale Streckung; sie sind, wie in jungen Organen, in Reihen, die sich mit spitzen Enden in einander keilen, angeordnet, lassen jedoch nicht mehr die Quellung an den Längswänden und die kurzgliederige Beschaffenheit erkennen, sondern sind langgedehnt; sie geben an's Füllgewebe nichts mehr ab. Der plasmatische Inhalt, den die Zellfäden jüngerer Organe in sehr reichlichem Maasse führen, ist hier nur noch gering.

Der Querschnitt des Füllgewebes hat, dem Umriss des Stammes entsprechend, länglich ovale Form und tritt um das 6—8fache gegen die Breite der Rinde zurück.

Die Zunahme der Membranquellung hat fast vollständig aufgehört und die vertical verlaufenden Reihen von Zellen werden jetzt durch ein Gewirr von Hyphen von einander getrennt. Die cylindrischen langgestreckten Füllgewebszellen haben gegen die im jungen Stamm betrachteten ein weites Lumen, zeigen jedoch nicht mehr wie dort radiale Anordnung; dieselbe ist in Folge der Dehnung des Gewebes und der Einschiebung der Hyphen verloren gegangen. Vielfach sind die langgestreckten Zellen einzeln im Füllgewebe zerstreut, oft trifft man jedoch zwei bis vier unmittelbar an einander liegen.

Die Beschaffenheit der Füllgewebszellen wird in noch älteren Stadien, wie in dem unter Abschnitt 4a und hier beschriebenen, um so mehr siebröhrenartig als die Querwände und einzelne Stellen der Längswände ein Aussehn zeigen — entgegen den Verhältnissen im Füllgewebe jüngerer Thallustheile — welches an Siebplatten und Siebfelder erinnert. Die Querwände der die Siebröhren verbindenden Horizontalreihen weisen dieselbe Erscheinung auf.

Die bereits früher erwähnten callus- und schlauchkopfähnlichen Bildungen finden sich auch in diesen Stadien.

Im Plasma und an den Längswänden sind schliesslich stark lichtbrechende Krystalloide sichtbar.

Meine Untersuchungen des alten Stammes stimmen im wesentlichen mit den Will'schen überein. Die streng radiale Anordnung der Füllgewebszellen konnte ich auf dem Querschnitt wohl in jungen Stammtheilen, wie angegeben, nachweisen; hier ist dieselbe jedoch nicht gewahrt geblieben.

5) Die Wurzel.

Die Wurzel von *Macrocystis* zeigt dieselben Gewebeformen wie Stamm und Blatt; man kann hier ebenfalls Bildungsschicht, Rinde und Füllgewebe unterscheiden.

Was die Wachstumsweise der Wurzel von der des Stammes wesentlich unterscheidet, ist der terminal gelegene Vegetationspunkt, welcher die Wurzelspitze einnimmt.

Die Verzweigungen der Wurzel sind echte Dichotomirungen und kommen dadurch zu Stande, dass an einem Punkt der Wurzelspitze das Wachsthum sistirt wird, und die rechts und links gelegenen Partien in einer Ebene in die Länge wachsen.

Eine Scheitelzelle konnte ich im Vegetationspunkt an meinen Präparaten nicht constatiren, glaube auch nach letzteren mit Sicherheit annehmen zu dürfen, dass eine solche nicht vorhanden ist, sondern dass die Aufgabe, für Zuwachs zu sorgen, lediglich der Bildungsschicht zukommt, wie in den übrigen Organen des Thallus. Mit absoluter Sicherheit konnte ich diese Frage nicht entscheiden, weil mein Alcoholmaterial überhaupt keine Wurzeln enthielt, und die aus den Herbariumsexemplaren stammenden in Folge der nicht ganz wegzubringenden Schrumpfung die Gewebe nicht in unversehrter, regelmässiger Anordnung zeigten.

Die Wurzelspitze besteht aus neben einander liegenden, mehr oder weniger parallel der Längsaxe orientirten Zellfäden, deren Scheitelzellen die oberflächlich gelegene Bildungsschicht bilden. In einiger Entfernung von der Spitze wandeln sich die Zellreihen, welche die Mitte des Gewebes einnehmen, in Füllgewebe um und zeigen längergestreckte Gestalt.

6) Zahnbildung am Rande der Blätter.

Oberhalb der Stelle des jungen Blattes, die sich zum Stiel abrundet, machen sich am Rande der Lamina die jugendlichen Zähne in ihrer dichten Reihenfolge zuerst bemerkbar.

Mit der Zunahme des Längenwachsthums rücken sie auseinander, sodass sie an älteren Blättern als spitze Gebilde in ziemlich weiten Abständen stehn.

Ihre Entstehung findet nach Art der Bildung von Emergenzen in der Weise statt, dass sich die Zellen der Bildungsschicht und der äusseren Rinde an dem Punkte, wo der Zahn später sichtbar wird, lebhafter theilen und strecken als an den anderen Theilen des Randes und dadurch im Verlauf des Wachstums diese Gewebepartie über den Rand des Blattes hervortreten lassen.

7) Beschaffenheit der Membranen.

Die äusseren, vorgewölbten, Schichtung zeigenden Wände der Bildungsschichtzellen sind gleichmässig von einer dicken Membran überzogen, die von Reinke ¹⁾ bei *Laminaria* als »Schleimcuticula« bezeichnet wird (Fig. 4 s). Dieselbe hat jedoch mit einer Cuticula nichts gemein, sondern ist vollständig, ohne Hinterlassung eines cuticularisirten Häutchens, in einer wässerigen Lösung von Chromsäure löslich; man thut daher wohl besser, für den Ausdruck »Schleimcuticula« die Nomenclatur äusserte oder oberflächlich gelegene Schleimmembran anzuwenden.

Die nach innen gelegenen Wände der Zellen der Bildungsschicht, sowie die Membranen der jüngeren Aussenrindenzellen besitzen relativ dünne Beschaffenheit; erst mit dem Uebergang in die Innenrinde nehmen die Wände an Dicke zu, sodass die Zelllumina nach der Mitte des Füllgewebes hin mehr und mehr auseinander gerückt erscheinen, wie ich es oben bereits angab.

Ueber die Natur der äussersten Schleimmembran, über die Ursache der zunehmenden Dicke der Zellwände in der Innenrinde, und der Auseinanderweichungen der Zellfäden giebt die Färbemethode mit einer wässerigen Lösung von Safranin die denkbar günstigsten Resultate.

Während die jungen Wände der Bildungsschicht und der äusseren Rinde — je nach dem Alter — mit rosa bis gelbrother Nüance auf Safranin reagiren, verhält sich die äusserste Schleimmembran gegen Safranin genau wie die dicken Wände der Innenrinde, und haben beide mit dem Inhalt der Schleimgänge dieselbe Reaction, indem sie sich braunroth färben.

Dieses gemeinsame Verhalten gegen Safranin ist der beste Beweis dafür, dass die oberflächlich gelegene Schleimmembran durch Quellung aus den äusseren Schichten der Bildungsschichtzellen hervorgegangen ist, und dass auch die grössere Dicke der Zellwände der Innenrinde zum grossen Theil auf Quellung von Cellulose zurückzuführen ist.

Dieselbe rothbraune Färbung zeigen auch in der Aussenrinde die Parteen, an denen mehrere Zellen mit ihren abgerundeten Ecken an einander stossen, wo die Mittellamelle, anstatt einen Intercellularraum zu

1) Reinke, Beiträge zur Kenntniss der Tange; Jahrbücher für wissenschaftl. Botanik, Pringsheim, pag. 372.

bilden, der oberflächlich gelegenen Schleimmembran und den Innenrindenzellen gleich verändert ist.

Eigenthümlich ist die Erscheinung, dass sich die Zellwände in den äusseren Theilen der Innenrinde nicht an allen Stellen zu gleicher Zeit durch Quellung verändern.

Während manche Stellen schon braunrothe Färbung durch Safranin angenommen haben (Fig. 9 *c, d*), reagiren wieder andere von gleicher oder ungleicher Ausdehnung ebenso wie die Membranen der Aussenrinde, sie färben sich rosa bis gelbroth (Fig. 9 *a, b*).

Es führt mich dieser Umstand zu der Annahme, dass die Dichtigkeit in den Zellwänden nicht an allen Punkten übereinstimmend ist.

Auch das Auseinanderweichen der Zellfäden in den inneren Theilen der Innenrinde und im Füllgewebe ist auf Quellung der Mittellamelle zurückzuführen (Fig. 6 *t'*). Es ist hier aber eine Umwandlung der Membransubstanz damit verbunden, die von den bisher erwähnten Veränderungen der Zellwände vollständig verschieden ist.

Färbten sich die Wände der Innenrinde und der äussersten Schleimmembran braunroth, so sind hierin im Füllgewebe Aenderungen eingetreten, wie die verschiedene Reactionsfähigkeit gegen Safranin deutlich beweist. Die gequollene Mittellamelle färbt sich nämlich nicht, oder nur schwach rosa, und auch die Längswände der Füllgewebszellen haben die Eigenschaft eingebüsst, sich mit Safranin braunroth zu färben, sondern erscheinen gleich der gequollenen Mittellamelle farblos bis rosa.

Die einzigen Membranen, welche sich im Füllgewebe mit Safranin rothbraun färben, sind die Querwände der siebröhrenartigen Zellen. Dieselben nehmen jedoch nicht in ihrer ganzen Ausdehnung rothbraune Färbung an, sondern nur in den Theilen, welche den Längswänden angrenzen, während die Mitte hell bleibt (Fig. 8 *b, 11*). Auf dem Querschnitt durch eine junge Siebröhre zeigt ein dunkel gefärbter Ring zwischen sich eine helle Wandpartie eingeschlossen. Diese letztere findet sich schon in der dem Füllgewebe angrenzenden Innenrinde in der Mitte der Querwände, ist jedoch dort bedeutend zarter. Auf diese Verhältnisse komme ich übrigens bei Besprechung der Siebplattenentwicklung zurück.

Die Hyphen verhalten sich gegen Safranin genau wie die Füllgewebszellen.

Quellungsmittel, wie Glycerin, Wasser, Chlorzinkjod, Schwefelsäure geben hinsichtlich der Beschaffenheit der Zellwände Aufschlüsse, welche die oben geäusserte Annahme bezüglich der ungleichen Dichtigkeit der Membransubstanz bestätigen.

Vor Allem in jüngeren Zellwänden macht sich eine eigenthümliche Falten- und Lamellenbildung bemerkbar, die speciell bei längerer Einwirkung von Wasser hervortritt.

Glycerin, Chlorzinkjod und Schwefelsäure lassen in Wänden von Rindenzellen die Mittellamelle an einzelnen Punkten aufquellen (Fig. 12 *a*, *b*, *c*), sodass dadurch, zumal auf Schnitten durch älteres Rindengewebe scharfumschriebene, linsenförmige Verdickungen entstehen.

Die Eigenschaft, in dieser Weise auf Quellungsmittel zu reagiren, zeigen schon junge Wände; es ist also die Quellungsfähigkeit der Mittellamelle, wie sie am stärksten im Füllgewebe zur Geltung kommt, von vornherein schon vorhanden.

Die interessante Erscheinung, dass die Zellen der Innenrinde mit dem Uebergang in's Füllgewebe — theilweise schon die letzteren angrenzenden — spiralige Verdickungsleisten aufweisen, mag hier erwähnt sein (cf. Fig. 27). Es erinnert diese Structur der Zellwände lebhaft an die in ähnlichem Sinne verdickten Längswände der Gefässe höherer Pflanzen, und ist dieselbe zu charakteristisch und streng regelmässig an allen Füllgewebszellen, als dass sie als Folge einer Quellung, die auf Einwirkung von Reagentien hätte stattfinden können, zu betrachten wäre. Diese Verdickungen sind übrigens nicht auf die vertical und quer verlaufenden Füllgewebszellen beschränkt, sondern finden sich ebenfalls an den Hyphen, an denen sie schon im Vegetationspunkt nachzuweisen sind. Sehr hübsch treten die Verdickungsleisten an den älteren siebröhrenartigen Füllgewebszellen nach Behandlung mit geeigneten Färbemitteln hervor, von denen Lösungen von Safranin oder Eosinsäure in Chloroform die besten Dienste thun.

Die von Will beschriebene Schichtung und Faltung in den Wänden der Siebröhren bei Zusatz von Quellungsmitteln hängt, meiner Ansicht nach, ausser mit der verschiedenen Dichtigkeit, noch mit dem Vorhandensein der spiraligen Verdickungen zusammen, die Will's Beobachtung entgingen.

8) Entstehung der Risse im Vegetationspunkt.

Früher erwähnte ich bereits, dass die Spalten im Vegetationspunkt mehr oder minder parallel oder unter spitzem Winkel zum Rücken gegen die Schneide hin verlaufen.

Die Anlage der Risse wird nun dadurch eingeleitet, dass von der vorderen und hinteren Fläche des Vegetationspunktes aus die äusseren Gewebe des letzteren in der Richtung des künftigen Risses oberflächlich gespalten werden.

Nach dem Auftreten dieser äusserlichen Risse machen sich sehr bald im Füllgewebe stärkere Quellungen sichtbar, die sich, wie der Querschnitt zeigt, radial vom Füllgewebe ausgehend, in die Rinde hinein fortsetzen und den von aussen her angelegten Rissen entgegen laufen. Während die Bildungsschicht- und Rindenzellen an den Spaltenrändern ihre Theilungen zu vermehren beginnen, bilden sich in den gequollenen Partien der inneren Gewebe Hohlräume aus, welche schliesslich in die von aussen

her entstandenen Risse münden. Damit ist die Spaltung des Vegetationspunktes perfect geworden.

Die in lebhafter Theilung begriffenen Bildungsschicht- und Rinden- zellen der Wundränder produciren nach Art der Kallusbildung an den Wundstellen höherer Pflanzen ein Gewebe, welches die Spaltungsränder verschliesst. Die Zellen des Füllgewebes verhalten sich dabei völlig passiv.

Dass nach Will's Mittheilungen die in der Quellung entstandenen Hohlräume bis an die »Hautschicht« — Bildungsschicht — reichen, und dass durch gesteigerte Theilung der letzteren »das Rindenparenchym« von beiden Seiten nach den entstandenen Hohlräumen gedrängt wird, ist nach meinen Untersuchungen nicht ganz zutreffend, sondern zuerst treten die Risse von aussen auf und in zweiter Linie findet erst Communication zwischen den Spalten und Hohlräumen statt. Den Wundverschluss besorgt nicht die »Hautschicht« allein, sondern derselbe wird von der Bildungsschicht, resp. den durch die Zerreissung freigelegten Zellen des äusseren Rindengewebes gemeinschaftlich bewerkstelligt.

9) Die Schleimbehälter und ihre Entstehung.

Schleimbehälter finden sich im ganzen Thallus von *Macrocystis*, in Stamm, Blatt und Wurzel, mit Ausnahme des Vegetationspunktes. Sie treten zuerst, wie bereits oben angedeutet, an der Stelle auf, wo der Vegetationspunkt nach unten in den jungen Stamm übergeht, unter Ausschluss der Seite, an welcher die Ablrennung des letzten Blattes erfolgte.

Die Schleimbehälter lassen sich, ihrer Entstehung nach, als primäre und secundäre Bildungen unterscheiden, die sämmtlich in der Rinde, wie im Füllgewebe der Organe verlaufen.

a) Die primären Bildungen durchziehn die Pflanze ausschliesslich in der Längsrichtung, und sind lange Gänge oder Röhren, die daher zweckmässig Schleimgänge oder Schleimröhren genannt werden können (Fig. 20 s). Auf dem Querschnitt haben sie, je nach dem Alter, elliptisches bis kreisrundes Lumen, liegen in Abhängigkeit vom Alter in verschieden grosser Entfernung von der Peripherie des Organes (Fig. 14 s, 15 s, 16 s), und sind in jüngerem Zustande von kleinen, durch reichlichen Plasmahalt ausgezeichneten Zellen, die ich als Begrenzungszellen bezeichne (Fig. 15 b, 18 b), umgeben. Den alten Schleimgängen fehlen die letzteren.

b) Die secundären Bildungen lassen sich einerseits in secundäre Schleimnester, andererseits in secundäre Schleimgänge eintheilen.

α) Die secundären Schleimnester (Fig. 16 s' s²) sind Gebilde von der Form eines Schlauches; dieselben haben auf Quer- und Längsschnitt annähernd die gleiche Form und sind in derselben Weise von Begrenzungs- zellen umgeben (Fig. 16 b) wie die primären Schleimröhren. Man theilt diese secundären Nester am besten in zwei Kategorien ein, die einen liegen den primären Gängen dicht an (Fig. 16 s' s²) und stehn mit den-

selben in Verbindung, die anderen liegen ziemlich weit von den primären Gängen entfernt und treten nicht mit ihnen in Zusammenhang, wie es in den alten Stämmen vorkommt.

β) Die secundären Schleimgänge (Fig. 20 s' — s^4) finden sich nur in alten Thallustheilen. Sie verlaufen meist radial von den primären Schleimgängen bis zwischen die Bildungsschichtzellen, und sind von vornherein nicht, wie die secundären Schleimnester und jüngeren primären Gänge, von Begrenzungszellen umgeben.

Sämmtliche Schleimbehälter, mit Ausnahme der secundären Nester in der Innenrinde alter Stammorgane, können wieder unter einander in Verbindung treten und so das System mehr oder minder in Zusammenhang stehender Schleimbehälter bilden, welches nach innen zu durch die primären Gänge, denen einige secundäre Nester anliegen können, begrenzt wird (Fig. 20 s , 16).

Ich wies bereits früher darauf hin, dass der Inhalt der Schleimbehälter mit Safranin, Haematoxylin und Alauncarmin gleiche Reaction zeigt wie die gequollenen Zellwände der Innenrinde, woraus zu schliessen ist, dass der Inhalt aus desorganisirter Cellulose besteht. Auf Schnitten durch ältere Stammtheile, die reichlichen Inhalt führten, suchte ich nach geformten Elementen im Schleim und konnte auch die Anwesenheit von stark lichtbrechenden, grösseren und kleineren Krystalloiden, die sich mit Haematoxylin violett färbten und in Essigsäure unlöslich waren, feststellen. Auch waren Krystalle, dem rhomischen und quadratischen System angehörig, vorhanden; dieselben verhielten sich gegen Essigsäure wie die Krystalloide.

Die Veränderungen der Lage, sowie die Grössenunterschiede der primären Schleimgänge in successive älteren Organen zeigen, dass die Gänge in den äussersten Gewebeparthieen angelegt werden, und dass die Schleimgänge unter Vergrösserung ihres Lumens nach und nach dadurch weiter nach innen rücken, dass die Bildungsschicht fortfährt an der Oberfläche der Organe neue Zellschichten zu erzeugen.

Da die primären Schleimgänge stets nur in der Rinde, niemals im Füllgewebe, verlaufen und in Stämmen beliebigen Alters immer in relativ grosser Entfernung vom Füllgewebe sich vorfinden, so lässt sich von vornherein beim ersten Auftreten der Schleimgänge constatiren, bis wie weit etwa die Umwandlung des Rindengewebes in Füllgewebe stattfinden wird, denn die Umwandlung der Rinde in Füllgewebe hört stets eher auf, als die Füllgewebebildung die Schleimgänge erreicht hat.

Aus dem Umstand, dass die in der Bildungsschicht angelegten primären Schleimgänge später tief im Stamm in der Innenrinde zu finden sind, ergibt sich, dass alles Gewebe, soweit es ausserhalb der durch die primären Schleimgänge bezeichneten Zone liegt, aus dem Gewebe hervorgegangen

sein muss, welches bei der ersten Anlage der primären Gänge aussserhalb dieser lag: und das ist die oberflächliche Bildungsschicht.

Die primären Schleimgänge kommen nun in der Bildungsschicht, ähnlich wie die Secretbehälter schizogenen Ursprungs bei höheren Pflanzen, durch Auseinanderweichen benachbarter Längsreihen zu stande. Wenn zwei der letzteren unter Quellung der Mittellamelle im mittleren Abschnitt der trennenden Wand auseinandergedrängt sind (Fig. 14 s), so bildet sich in der Gallerte ein scharf umschriebener Hohlraum aus, der mit desorganisirter Cellulose erfüllt ist.

Die Zellen, welche den später weiter nach innen gerückten Schleimgang umgeben, sind Derivate der ursprünglichen Bildungsschichtzellen, zwischen denen der primäre Gang angelegt wurde; dieselben rückten in Folge des Auftretens tangentialer Wände in den äussersten Partien der Bildungsschichtzellen zugleich mit dem Schleimgang nach innen und theilten sich der Erweiterung des letzteren entsprechend.

Dass die Begrenzungszellen den alten primären Schleimröhren fehlen, deutete ich bereits an; dieselben werden nach und nach, wie die Zellen bei Bildung der Oelbehälter höherer Pflanzen, resorbirt. Es dürfte das Vorhandensein der geformten Elemente im Schleim alter Gänge mit der Resorption der Grenzzellen in Zusammenhang zu bringen sein.

Was die secundären Bildungen betrifft, so findet die Entstehung der secundären Schleimnester, welche von vornherein dem primären Gänge anliegen (Fig. 16 s₁ s₂), in der Weise statt, dass sich eine der dem letzteren angrenzenden Zellen durch Scheidewände theilt (Fig. 17, 1). Die Tochterzellen treten an einem oder verschiedenen Punkten durch Quellung der Mittellamelle auseinander und werden ebenso wie in der Bildungsschicht nach Entstehung eines schleimerfüllten Hohlraumes (Fig. 18, 2; 19, 3) bei Seite gedrängt. Es ist auf diese Weise ein secundäres Schleimnest entstanden, welches, wie die primären Gänge in jüngeren Organen, von Begrenzungszellen umgeben ist. Die letzteren können durch Theilung und Auseinanderweichen weitere Schleimnester erzeugen.

Die secundären Schleimnester der zweiten Kategorie, wie sie in der Innenrinde alter Stämme vorkommen, und die nicht mit den primären Schleimgängen in Verbindung treten, entstehn aus Rindenzellen, die jenseits der Grenzzellen liegen, in derselben Weise wie ich es für die dem primären Gänge angrenzenden Schleimnester beschrieb.

Die secundären Schleimgänge, die meist in radialer Richtung gegen die Bildungsschicht verlaufen, bilden sich durch Verschleimung der Mittellamelle der benachbarten Gewebe (Fig 20 s₁—s₄). Auf gleiche Art kommt die Verbindung zwischen sämmtlichen überhaupt in Zusammenhang stehenden Schleimbehältern zu stande.

Will giebt die Entwicklungsgeschichte der Schleimbehälter nicht in Zusammenhang und macht nicht den Unterschied in primäre und secun-

däre Schleimbehälter, sondern spricht von »Schleimgängen und kurzen Abzweigungen, welche sich in Gruppen kleiner plasmahaltiger Zellen, Secretionszellen, fortsetzen«. Die Will'schen »Schleimgänge« und »kurzen Abzweigungen« sind identisch mit den von mir als primäre Schleimgänge beziehungsweise secundäre Schleimnester bezeichneten Gebilden.

Bei Besprechung des alten Stammes erwähnt Will die radial gegen die Bildungsschicht verlaufenden Gänge zwar, unterscheidet dieselben jedoch nicht von den übrigen Behältern als secundäre Schleimgänge.

Die Will'schen »Secretionszellen« sind gleichbedeutend mit meinen Grenzzellen.

10) Die Anordnung der Tüpfel.

Durch Entfernung des Plasma aus den Zellen und Färbung der Wände mit Haematoxylin gelang es mir, die charakteristische Vertheilung der Tüpfel in den Rindenzellen von *Macrocystis* nachzuweisen. Die Tüpfelschliesshäute heben sich deutlich gegen die dunkelen Zellwandflächen als helle ungefärbte Fleckchen ab, die auf Quer- und Längsschnitten durch das Gewebe auf jeder Zellwand kreisförmig angeordnet erscheinen, sodass nach allen Richtungen hin im Gewebe Tüpfelverbindungen vorhanden sind (Fig. 21—23).

Meist weist die Scheidewand zwischen zwei Zellen 6—10 Tüpfel auf, es können jedoch auch weniger, äusserst selten mehr sein. Die Tüpfel lassen sich an günstigen Präparaten schon in den Zellen der Bildungsschicht erkennen und sind in der kreisförmigen Lagerung bei der geeigneten Behandlungsweise mit Eau de Javelle und Haematoxylin durch das ganze Rindengewebe bis zum Füllgewebe leicht zu verfolgen.

Beim Uebergang der Rindenzellen in's Füllgewebe treten mit den Tüpfeln zum Theil Veränderungen ein, auf die unten weiter eingegangen werden wird, zum Theil bleiben sie — zumal an den Längswänden der Füllgewebszellen — unverändert erhalten, jedoch geht hier durch die Längsstreckung der Zellen die charakteristische Anordnung, wie sie die Rindenzellen zeigen, verloren.

11) Entwicklung der Siebröhren.

Mit dem Uebergang der Innenrindenzellen in's Füllgewebe hören in denselben die Theilungen auf (Fig. 7), und die Füllgewebszellen folgen dem äusserst starken Längenwachsthum der Organe durch Streckung, ohne sich zu theilen.

Diese Streckung nimmt von der Grenze der inneren Rinde bis in's Füllgewebe hinein successive zu, wie sich auf Längsschnitten sehr klar und übersichtlich verfolgen lässt, sodass die ältesten, am weitesten nach innen gelegenen Füllgewebszellen die längsten sind.

Diese innersten Zellen des Füllgewebes zeigen am deutlichsten den Typus der sogenannten Siebröhren Will's ausgeprägt. Je weiter man

nach aussen geht, um so kürzer sind die Siebröhren, und um so weniger ausgebildet ist der Siebröhrencharakter, denn in dem Maasse wie die Zellen der Innenrinde allmählich zu den Füllgewebszellen werden, so nehmen die letzteren dann weiter nach innen unter fortschreitender Streckung den Character der sogenannten Siebröhren an (Fig. 7 + 8).

Auf das Vorhandensein dieser Siebröhren bei *Macrocystis* hat Will bereits hingewiesen; er ist jedoch erst bei Untersuchung des alten Stammes darauf aufmerksam geworden und hat keine Rücksicht auf die Entwicklung genommen. Die in jüngeren Thallustheilen befindlichen siebröhrenartigen Füllgewebszellen sind aber, wenn sie auch noch auf niedriger Ausbildungsstufe stehen, vollkommen identisch mit den im älteren Stamm vorkommenden, von Will als Siebröhren hervorgehobenen Zellen. Den Namen hat Will ihnen gegeben wegen der siebartigen Skulptur ihrer Querwände.

12) Entwicklung der Siebplatte.

Nach Entfernung des Plasma aus den Zellen mit Eau de Javelle und Dunkelfärbung der Wände durch Haematoxylin waren die Hauptschwierigkeiten, die sich dem Nachweis der Siebplattenentwicklung entgegenstellten, gehoben, und zeigten günstige Präparate zweifellos, dass die Siebplatte aus den Tüpfeln der Innenrinde beim Uebergang letzterer in's Füllgewebe gebildet wird.

Während die Tüpfel in den Zellen der inneren Rinde noch zu einem weiteren Kreise angeordnet sind (Fig. 22), liegen dieselben an der Grenze des Füllgewebes sehr dicht aneinander (Fig. 23), so dass es den Anschein gewinnt, als ob sie in den äusseren Theilen des Stammes ursprünglich durch stärkere Turgescenz der Zellen weiter auseinander gerückt worden wären.

Dann wird der Umriss der einzelnen Tüpfel an ihrem Innenrande dadurch undeutlich, dass die oberflächlichen Partien des zwischen den Tüpfeln liegenden Membrantheiles resorbirt werden und zuletzt fliesst der ursprüngliche Kreis von Tüpfeln zu einem einzigen grossen Tüpfel zusammen (Fig. 24). Diese zeitweilige ganz dünne Membran wird zur Siebplatte.

Unmittelbar nach der Verschmelzung der getrennten Tüpfel stellt sich die Querwand dar als ein an die Längswand angrenzender, durch Haematoxylin oder Safranin sich dunkel färbender Ring, zwischen dem eine ungefärbt gebliebene Lamelle, die junge Siebplatte, diaphragmaartig ausgespannt ist (Fig. 11). Mit dem Alter verdickt sich die junge Siebplatte mehr und mehr und weist deutlich eine Mittellamelle auf.

Während die Platten junger Siebröhren sich durch Corallin und Safranin nicht verändern, zeigen die Siebplatten sehr alter Röhren auf dem Querschnitt nach Einwirkung genannter Farbstoffe ihre Oberfläche

mehr oder minder roth gefärbt. Es folgt daraus, dass sich die Siebplatte mit einem nach und nach dicker werdenden Ueberzuge von callusartiger Substanz bedeckt, welcher an mancher alten Platte so beträchtliche Dicke erreicht, dass er der Siebplatte wie ein Polster aufliegt und durch sein starkes Lichtbrechungsvermögen, sowie durch die Eigenschaft, sich durch Corallin und Safranin sehr intensiv zu färben, sofort in's Auge fällt.

Bleiben die jüngeren Siebplatten auf dem Längsschnitt nach Behandlung mit Safranin farblos, so nehmen dieselben im Alter einen schwach rosarothem Ton an.

Strukturverschiedenheiten innerhalb der ganz jungen Platten (Fig. 11 s) konnte ich trotz vorzüglichster Färbemethode, sehr dünner Schnitte und äusserst starker Vergrösserung — Oelimmersion, Zeiss — nicht nachweisen.

Da an Platten älterer Organe eine siebartige Zeichnung vorhanden ist, und ich an ganz alten Siebröhren thatsächlich eine Perforation der Platte gesehen habe, wie ich vorgreifend bemerke, so muss ich entweder annehmen, dass sich von vornherein in den zur Siebplatte verschmolzenen primären Tüpfelschliesshäuten der Rinde Poren befinden, welche über die Grenze des Sichtbaren hinausgehen, oder aber, dass nachträglich erst nach Verschmelzung der Tüpfel in der ganzen Siebplatte diese Poren nach Art der Siebplatten der Angiospermen entstehen, und sich gleichfalls bis zu einem gewissen Alter dem Blick entziehen.

Gegen die erste Annahme, dass von Anfang an in den Schliesshäuten der primären Tüpfel Poren vorhanden sein könnten, spricht der Umstand, dass in den alten Siebplatten die grösseren Löcher sich in der Mitte befinden (Fig. 13) — also an einer Stelle, wo ursprünglich gar kein Tüpfel gelegen hat — es müsste denn sein, dass die kleineren, in den Tüpfelschliessmembranen vorhandenen in der Entwicklung gegen die in der Mitte der jungen Siebplatte angelegten Tüpfel zurückblieben.

Mir scheint diese Annahme wenig Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, ich möchte vielmehr glauben, dass in der jungen Siebplatte die Anlage aller Poren von der Mitte aus nach dem Rande fortschreitend nachträglich erfolgt.

Der Nachweis von durchgehenden Plasmasträngen hatte grosse Schwierigkeiten, da der Zellinhalt bei dem Alcoholmaterial sehr contrahirt war, und die Möglichkeit nahe lag, dass sich die zarten Stränge aus den Siebplatten bei den vielen mit den Schnitten angestellten Manipulationen zurückgezogen haben könnten.

Nachdem Versuche, die Cellulose mit Schwefelsäure zu entfernen und hernach die Plasmastränge mit Jod, Safranin oder Haematoxylin zu färben, zu einem negativen Resultat geführt hatten, und da die von Hick ¹⁾ an-

1) Hick, Protoplasmatic continuity in the Fucaceae. Journal of Bot. XXIII. pag. 97—102, 354—357.

gegebenen Doppelfärbungen und Quellungsmethoden ebenfalls ohne Erfolg verliefen, so versuchte ich, das Material von vornherein mit einer sehr concentrirten Lösung von Safranin in Wasser zu färben, und war dies die einzige Methode, welche mich zum positiven Resultat führte.

Nur einige wenige Präparate von *Macrocystis*, Schnitte von $\frac{1}{400}$ mm Dicke, zeigten durch die alte, schwach rosa gefärbte Siebplatte ununterbrochene Stränge von dunklerer Nüance hindurchgehn.

Ich bin sicher der Ansicht, dass keine trennende Mittellamelle zwischen den Strängen des Protoplasma sich befand, und wurde mir durch zwei Zeugen Bestätigung meiner Ansicht zu Theil.

13) Vergleich der Siebröhren von *Macrocystis* mit denen höherer Pflanzen.

Ausser der durch den äusseren Habitus und dem Vorkommen von Callus und Schlauchköpfen bedingten Aehnlichkeit zwischen den Siebröhren von *Macrocystis* und denen höherer Pflanzen, bietet sich in der Entwicklung der Siebplatte eine weitere Verwandtschaft.

Fischer¹⁾ und Russow haben in der jungen Siebplatte höherer Pflanzen bereits »seichte Tüpfelungen« bemerkt, die sich mit dem Alter vergrössern und durchbrochen werden. *Macrocystis* zeigt, wie wir gesehen haben, in jungen Platten noch keine sichtbaren Structurverschiedenheiten, dieselben treten erst in älteren Stadien auf; es finden sich hier, ebenso wie in den Siebplatten höherer Pflanzen, Tüpfel, die schliesslich unter Resorption der trennenden Mittellamellen mit einander in offene Communication treten.

Ob bei *Macrocystis* auch Obliteration der Siebröhren stattfindet und sich auch darin Uebereinstimmung mit den Siebröhren höherer Pflanzen geltend macht, kann ich nicht mit Sicherheit angeben, da mir kein lebendes Material zur Verfügung stand. Aus dem Vorkommen krystalloïdähnlicher Schleimkörper im Plasma oder an den Längswänden alter Siebröhren, aus dem Auftreten von stark lichtbrechenden, homogenen Schleimfäden, welch' letztere die langen Füllgewebszellen in ihrer ganzen Ausdehnung durchziehn, sowie aus dem Vorhandensein von dicken Calluspolstern an den Siebplatten alter Röhren lässt sich allerdings schliessen, dass auch bei *Macrocystis*, wie bei den gleichen Erscheinungen zeigenden Siebröhren höherer Pflanzen, Obliteration stattfindet. Es spricht jedoch auf der anderen Seite die Thatsache dagegen, dass Schlauchköpfe, die nach Fischer das Kriterium für eine active Siebröhre bilden, bei *Macrocystis* erst in den älteren, Obliterationserscheinungen zeigenden Siebröhren auftreten.

1) A. Fischer, Neue Beiträge zur Kenntniss der Siebröhren. Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Math.-phys. Klasse. 38. Band. pag. 307 ff.

Wesentliche Unterschiede zwischen den Siebröhren von *Macrocystis* und denen höherer Pflanzen sind in der Entwicklung und dem Fehlen oder Vorhandensein des Zellkerns und der spiraligen Verdickungen zu suchen.

Während bekanntlich die Entwicklung der Siebröhren bei den höheren Pflanzen mit Abgliederung von Geleitzellen verbunden ist, verwandelt sich bei *Macrocystis* die junge Füllgewebszelle durch Streckung direct in eine Siebröhre, ohne vorhergehende Abscheidung besonderer Zellen, die man als Geleitzellen auffassen dürfte.

Jede Siebröhre von *Macrocystis* weist einen Zellkern auf, wohingegen die Röhren höherer Pflanzen keinen Kern besitzen.

Endlich zeigen die sogenannten Siebröhren von *Macrocystis* spiralige Verdickungen, und das ist eine Skulptur der Membranen, wie dieselbe niemals an den Längswänden der Siebröhren höherer Pflanzen auftritt.

14) Bildung der Schwimmblasen.

An dem jungen Blattstiel macht sich die Umgestaltung zur Schwimmblase schon äusserlich durch eine Anschwellung bemerkbar. Im Inneren des Füllgewebes ist stärkere Quellung der Intercellularsubstanz eingetreten, dieselbe lässt in älteren Stadien Hohlräume erkennen, welche in noch älteren Stielen mit einander durch die Gallerte in Verbindung treten und so einen zusammenhängenden Hohlraum bilden, welcher das Füllgewebe bei Seite drängt, und in den Reste des letzteren hineinragen. Die Gewebe in den Wandungen der Schwimmblase sind genau dieselben wie im darunter befindlichen Stiel und im jungen Stamm. Die innere Rinde giebt ebenso wie dort an's Füllgewebe so lange neue Elemente ab, als dieselbe überhaupt noch in Theilung begriffen ist.

Das Füllgewebe wird nach und nach von innen nach aussen resorbirt, sodass in einer älteren Schwimmblase, deren Wand den gleichen anatomischen Bau wie der unter Abschnitt 4b beschriebene alte Stamm bis zum Füllgewebe zeigt, von letzterer Gewebeform nicht mehr die Rede sein kann, sondern es grenzen die englumigen gestreckten Zellen der inneren Rinde direct an den Hohlraum.

Wenn N. Wille¹⁾ das Vorhandensein des Füllgewebes, welches von ihm ohne die nothwendige Unterscheidung in Vertical-, Querreihen und Hyphen unrichtig als einheitliches »Siebhyphengewebe« bezeichnet wird, ausschliesslich als der Leitung in verticaler Richtung dienend annimmt, weil die Rindenzellen nur an ihren tangentialen Wänden »Poren« besitzen und daher nur in radialer Richtung leiten können, so ruht diese Anschauung auf falscher Grundlage.

Abgesehn davon, dass die Rindenzellen in Folge der Tüpfelvertheilung am ganzen Umfang fähig sind, Diffusion nach allen Richtungen zu ge-

1) N. Wille, Bidrag til Algernes physiologiske Anatomi.

statten, ist durch das vollständige Zugrundegehen des Füllgewebes in den Schwimmblasen der beste Beweis gegeben, dass nicht ein besonderes Leitungsgewebe — in diesem Fall das Füllgewebe — da zu sein braucht, dass wenigstens demselben nicht die grosse Bedeutung hinsichtlich der Leitung von Nährstoffen beizulegen ist, wie es N. Wille thut.

Bezüglich des Inhalts der Schwimmblasen an Gasen kann ich keine sicheren Angaben machen, da ich nur mit totem Material arbeitete und die bisher von Rosanoff und N. Wille¹⁾ angegebenen Resultate absolut keine Uebereinstimmung zeigen. Rosanoff fand in der Blase von *Fucus* Stickstoff, während in denen, welche N. Wille von *Ozothallia* und *Fucus* im chemischen Laboratorium zu Stockholm untersuchen liess, Sauerstoff nachgewiesen ist.

15) Anatomische Vergleichung von *Macrocystis* mit anderen Laminariaceen und einigen Fucaceen.

Als ich zum Zweck des Constatirens der Plasmaverbindungen bei *Macrocystis* noch andere Melanophyceen aus den Gruppen der Laminariaceen und Fucaceen untersuchte, — worüber ich hernach in einem besonderen Abschnitt berichte — zeigte sich, dass sich trotz der Uebereinstimmung in der Lage der verschiedenen Gewebeschichten constante Unterschiede im Membranbau zwischen den Laminariaceen einerseits und den Fucaceen andererseits constatiren lassen.

Die untersuchten Laminariaceen sind: *Alaria esculenta*, *Laminaria saccharina*, *Thalassiophyllum Clathrus* und im Anschluss an dieselben *Chorda filum*.

Aus der Familie der Fucaceen lagen mir vor: *Fucus vesiculosus*, *Fucus serratus*, *Ascophyllum nodosum* und *Halidrys siliquosa*.

Für alle hier kurz zu betrachtenden Melanophyceen gilt, wie bei *Macrocystis*, die Unterscheidung der drei Gewebearten: Bildungsschicht, Rinde und Füllgewebe.

Die Bildungsschicht liegt zu äusserst und erzeugt die Rinde; aus letzterer geht die centrale Schicht, das Füllgewebe, hervor, den Verhältnissen bei *Macrocystis* entsprechend.

Wenn auch im Prinzip der Uebergang der Innenrindenzellen in's Füllgewebe bei allen untersuchten Melanophyceen gleich ist, so nimmt *Macrocystis* doch insofern eine Sonderstellung ein, als in der inneren Rinde von *Macrocystis* so ausgiebige Theilungen stattfinden, wie sie keine andere der oben erwähnten *Melanophyceen* aufzuweisen hat. Ich möchte das darauf zurückführen, dass *Macrocystis* ein bedeutend stärkeres Längenwachsthum zeigt als die übrigen braunen Algen.

1) N. Wille, Ueber die Blasen der Fucaceen.

Fächerte sich bei *Macrocystis* eine tangential gestreckte Innenrindenzelle durch zahlreiche horizontale Scheidewände zu einem Faden, dessen Endzellen spitz erscheinen, so habe ich bei *Ascophyllum* (Fig. 26 f) und *Fucus* (Fig. 29), die ich speciell darauf untersuchte, wohl auch Streckung und prosenchymatische Zuspitzung von Innenrindenzellen unter Anlage von wenigen horizontalen Wänden bemerkt, eine so lebhafte Theilung, wie bei *Macrocystis*, habe ich jedoch bei keiner der anderen Melanophyceen nachweisen können.

Die lange Streckung der Siebröhren im Füllgewebe von *Macrocystis*, deren die Siebröhren der übrigen untersuchten braunen Algen entbehren, ist ebenfalls, wie die erwähnte lebhafte Theilung in der Innenrinde auf das energischere Längenwachsthum von *Macrocystis* zurückzuführen.

Die Füllgewebszellen sind unter einander durch Querreihen verbunden, deren Entstehung die gleiche ist, wie ich sie bei *Macrocystis* beschrieb. Hyphenfäden durchziehn das Füllgewebe sämtlicher Melanophyceen nach allen Richtungen.

Die Beschaffenheit der Membranen ist im wesentlichen dieselbe, wie sie *Macrocystis* zeigt, und verhalten sich die Zellwände aller untersuchten Melanophyceen gegen die bei *Macrocystis* gebrauchten Farbstoffe in übereinstimmender Weise. Die Bildungsschichtzellen sind bei sämtlichen von der oberflächlich gelegenen Schleimmembran überzogen. Die Wände der Rindenzellen nehmen nach dem Füllgewebe hin successive an Dicke zu, und tritt auch an der Grenze des Füllgewebes bedeutende Quellung der Intercellularsubstanz ein, die gegen die Mitte des Organes stärker wird, sodass bei allen Melanophyceen die Füllgewebszellen gleichsam einer homogenen Masse eingebettet erscheinen. Die verschiedene Dichtigkeit, wie sie bei *Macrocystis* nach Anwendung von Quellungsmitteln hervortritt, war bei den meisten darauf hin untersuchten braunen Algen ebenfalls vorhanden.

Während sich in der Lagerung der Gewebeschichten, dem Uebergang der Innenrindenzellen in's Füllgewebe und in der Beschaffenheit der Membranen im grossen und ganzen Uebereinstimmung zwischen *Macrocystis* und den übrigen Melanophyceen zeigte, so treten in der Anordnung der Tüpfel in den Rindenzellen, der Entstehung der Siebplatte, sowie dem Vorkommen der spiraligen Verdickungen zwischen den Laminariaceen incl. Chorda einerseits und den Fucaceen andererseits interessante Unterscheidungsmerkmale auf, welche für die Zusammengehörigkeit der einzelnen Gattungen zu Familien nicht ganz ohne Bedeutung sein dürften.

Sind bei *Macrocystis* die Tüpfel auf Quer- und Längsschnitt kreisförmig orientirt, so trifft dies ebenfalls für die nahe verwandten Laminariaceen mit Einschluss von Chorda zu, während man bei den Fucaceen auf Quer- und Längsschnitt nur einen Tüpfel findet (Fig. 25 t, 26 t). Es ist demnach auch die Siebplattenentwicklung bei beiden Familien eine

verschiedene. Sie stimmt bei *Alaria* mit *Macrocystis* überein und wird wohl auch bei *Laminaria*, *Thalassiophyllum* und *Chorda* eine gleiche sein, wie bei derselben Anordnung der Tüpfel zu erwarten ist.

Bei den Fucaceen jedoch geht die Siebplatte nicht aus mehreren Tüpfeln hervor, wie bei den Laminariaceen, sondern nur aus einem. Derselbe wird von der Bildungsschicht nach dem Füllgewebe zu grösser und stellt beim Uebergang in letzteres die junge Siebplatte dar (Fig. 25 s, 26 s). Die weitere Ausbildung der Platte im Füllgewebe stimmt im wesentlichen mit derjenigen bei *Macrocystis* überein; ich muss auf diesen Punkt bei Besprechung des Plasmazusammenhangs in anderen Melanophyceen noch zurückkommen.

Die spiraligen Verdickungen an den Längswänden der Siebröhren und Hyphen, deren ich bei *Macrocystis* Erwähnung that, fand ich zuerst bei *Laminaria* (Fig. 27). Nachdem ich dieselben bei *Macrocystis* ebenfalls nachgewiesen, suchte ich das Vorkommen noch bei den anderen Laminariaceen festzustellen, was mir auch gelang. Die Verdickungsleisten treten bei sämtlichen untersuchten Laminariaceen und bei *Chorda* in der Innenrinde an der Grenze des Füllgewebes zuerst auf.

Die Uebereinstimmungen, die *Chorda* in der Anordnung der Tüpfel und dem Vorhandensein der spiraligen Verdickungen mit den Laminariaceen zeigt, dürften für die noch fragliche Zusammengehörigkeit beider von Wichtigkeit sein.

Es erschien mir von Interesse, die Anwesenheit der spiraligen Verdickungen auch bei den Fucaceen zu constatiren, jedoch war es mir nicht möglich, bei dieser Familie in Füllgewebszellen und Hyphen irgend welche Verdickungen nachzuweisen, und sind also letztere nur den Laminariaceen eigen.

16) Plasmaverbindungen in anderen Melanophyceen.

Die Schwierigkeiten, mit denen ich anfangs bei dem Nachweis von durchgehenden Plasmasträngen durch die Siebplatte von *Macrocystis* zu kämpfen hatte, veranlassten mich, andere Melanophyceen in den Bereich der Untersuchungen zu ziehen, in der Hoffnung, bei diesen eher zum Ziel zu gelangen, und nahm ich daher *Laminaria*, *Thalassiophyllum*, *Fucus* und *Ascophyllum* in Arbeit.

Da sich aber bald herausstellte, dass ich bei diesen Untersuchungsobjecten noch weniger zum Resultat kam, kehrte ich zu *Macrocystis* zurück, und gelang es mir ja auch, in den Siebplatten Plasmaverbindungen mit Sicherheit zu constatiren.

In Folge der vergeblichen Bemühungen, auch bei anderen Melanophyceen Zusammenhang des Protoplasma nachzuweisen, bin ich zu der Annahme gedrängt, dass die Perforationen bei allen übrigen bedeutend winziger sind als bei *Macrocystis* und sich auch mit den besten Hilfsmitteln nicht sicher feststellen lassen.

Hick ¹⁾ will, wie bei den Florideen, so auch bei den Melanophyceen Continuität des Plasma constatirt haben, und zwar im ganzen Gewebe mit Ausnahme der Bildungsschicht. Die von ihm untersuchten Algen sind: *Fucus vesiculosus*, *Fucus serratus*, *Ascophyllum nodosum*, *Himantothalea lorea* und *Laminaria digitata*.

Ich habe bei *Fucus*, *Ascophyllum*, *Laminaria* und *Thalasssiophyllum*, wie erwähnt, gesucht, konnte aber nicht zu demselben Schluss kommen, und möchte ich Hick's Resultate sehr in Frage stellen; mir scheint, als hätte Hick überall da, wo Tüpfel sind, von vornherein durchgehende Plasmastränge angenommen, ohne auf das Vorhandensein einer Schliesshaut Rücksicht zu nehmen.

Bei der Grösse der Tüpfel in der Rinde von *Ascophyllum* und *Fucus* (Fig. 26 t, 25 t) durfte es, wenn überhaupt möglich, nicht schwer fallen, die Schliesshaut durchziehende Stränge zu sehn, es ist mir aber in keinem Fall gelungen, ebensowenig wie bei *Laminaria*, *Macrocystis* und *Thalasssiophyllum*.

In den langgestreckten, siebröhrenähnlichen Füllgewebszellen hatte es ja den Anschein, als wären Verbindungen da; dieselben aber mit Sicherheit nachzuweisen, wie bei *Macrocystis*, dazu war ich ausser Stande.

Die von Hick beobachtete vierfache Art des Plasmazusammenhangs beruht ebenfalls auf falschen Deutungen. Hicks »weiter offener Porus«, welcher von einem »Verdickungsring« umgeben ist, stellt meiner Ansicht nach nichts Anderes vor, als die stark lichtbrechende, gegen Farbstoff indifferente junge Siebplatte, die Hick wahrscheinlich in Folge ihrer zu starken Quellung übersehn hat (Fig. 28 c).

Wenn er in dem, in anderen Fällen beobachteten, in den Ring (Fig. 11 r) gespannten Diaphragma drei verschiedene Durchbohrungsformen gefunden haben will, nämlich erstens »ein feines rundes Loch«, zweitens »einen schmalen Spalt« und endlich »viele Löcher«, wie in der alten Siebplatte, so sind auch die beiden ersten Beobachtungen aus unrichtig gedeuteten Präparaten hervorgegangen.

Schnitte, die parallel der Längswand einer Füllgewebszelle durch den Ring und einen Theil der Siebplatte geführt werden, können je nach der Region, wo das Messer Ring und Siebplatte trifft, zu der Auffassung führen, dass die beiden auf dem Präparat sichtbaren dicken Zapfen des Ringes die Siebplatte darstellen, und dass die dünnen Stellen zwischen den Zapfen spalt- oder lochartige Perforationen sind (Fig. 28 a, b).

Mit Safranin, in Wasser gelöst, gefärbte Präparate, die den Ring braunroth, die zarte Siebplatte aber ungefärbt zeigen, könnten bei Anwendung von Quellungsmitteln zu dergleichen Missverständnissen Anlass geben.

1) Hick, Protoplasmatic continuity in the Fucaceae. J. of B. XXIII. pag. 97—102, 354—357.

Die Hick'sche Ansicht, dass wirklicher Abschluss der benachbarten Zellen nur nach dem Absterben derselben einzutreten scheint, kann ich aus dem Grunde nicht theilen, weil doch in den ältesten Zellen des Füllgewebes die Tüpfel resp. Perforationen erst recht deutlich hervortreten. Hick gründet wahrscheinlich seine Anschauung darauf, dass er »den weiten Porus« für das Anfangsstadium und die »loch- und spaltenförmigen Perforationen« für den Uebergang zur siebplattenartigen Querwand hält, deren vollständige Schliessung nach seiner Meinung mit dem Tode eintritt.

Thalassiophyllum Clathrus.

1) Aeussere Gestaltung.

Wie bei *Macrocystis*, so kann man in gleichem Sinne auch bei *Thalassiophyllum* von einer Gliederung in Stamm und Blatt reden.

Der Thallus von *Thalassiophyllum* stellt ein Gebilde vor, welches im Alter reiche Verzweigung aufweist, und dessen Hauptstamm und Seitenäste an ihrer Spitze in eine durchlöchernte Lamina von nierenförmigem Umriss übergehen (Fig. 30).

Betrachten wir einen einzelnen Spross, so sehen wir, dass die Lamina, in die er ausgeht, an dem einen Rande dütenartig eingerollt ist; Figur 30 *r* zeigt diesen Rand nach der Auseinanderrollung. Nach unten hin setzt sich derselbe in den Stamm fort (Fig. 30 *s*), sodass der Punkt *x* in seiner natürlichen Lage in der Verlängerung der Richtung des Stammes liegt. Die andere Seite der Lamina geht allmählich zu Grunde und ihre Reste bleiben als eine den Stamm spiralig umlaufende Narbe übrig.

In dem eingerollten Seitenrand liegt der Vegetationspunkt (Fig. 30 *v*).

Wie bei *Macrocystis* der den Vegetationspunkt tragende Rand dem Rücken, der entsprechende andere der Schneide eines Messers vergleichbar ist, so kann man auch bei *Thalassiophyllum* denselben Vergleich anwenden und den Rand *r*, bis zum Punkt *x* in der Figur 30, mit dem Vegetationspunkt als Rücken, den gesamten übrigen Rand der Lamina als Schneide bezeichnen.

Die Bildung der Löcher findet im Vegetationspunkt in einiger Entfernung vom Rücken statt. Die Löcher sind dort so klein, dass man sie mit blossen Auge nur schwer wahrnehmen kann. Nach der Schneide hin wächst das Lumen, und ändert sich auch die Form von der kreisrunden bis zur länglich-ovalen (Fig. 30). Während die Löcher in der Nähe des Rückens so dicht bei einander liegen, dass eine Anordnung in Reihen nicht zu constatiren ist, so orientieren sie sich, je näher man der Scheide kommt, um so deutlicher in Längsreihen, die mit dem Thallusrücken einen spitzen Winkel bilden und gegen die Schneide strahlenartig divergiren.

Die Ränder jüngerer Löcher sind nach aussen zurückgeklappt (Fig. 33 u 34 u). Diese Umklappungen gleichen sich mit dem Alter immer mehr aus, sodass die Ränder alter Löcher flach sind und mit beiden Flächen der Lamina in einer Ebene liegen.

In den Grössenunterschieden der Löcher des eingerollten Randes ist uns ein Mittel gegeben, zu bestimmen, wo der eigentliche Vegetationspunkt gelegen ist. Es stellt sich heraus, dass die Erstreckung desselben wie bei *Macrocystis*, nicht scharfe Begrenzung zeigt.

Ebenso entspricht die Lage des Vegetationspunktes bei *Thalassiophyllum* genau der von *Macrocystis*. Bei beiden Laminariaceen ist der Vegetationspunkt am Rande gelegen; bei *Thalassiophyllum* wird er seitlich einerseits vom Rücken, andererseits von der jüngsten Lochreihe begrenzt, bei *Macrocystis* durch den Rücken und den jüngsten Riss.

Die Gewebe des Vegetationspunktes gehn bei *Thalassiophyllum* wie bei *Macrocystis* nach oben in die Gewebe der Lamina, nach unten in die des Stammes über, und liegt dem Vegetationspunkt bei beiden Laminariaceen die Function ob, einerseits die Lamina zu vergrössern andererseits den Stamm zu verlängern.

Wenn auch die im Vegetationspunkt von *Thalassiophyllum* erzeugten Löcher mit den Rissen von *Macrocystis* wenig Verwandtschaft zu haben scheinen, so findet man doch bei genauerer Betrachtung, dass beide Bildungen analog sind.

Die Reihen der progressiv vom Rücken bis zur Schneide grösser werdenden Löcher von *Thalassiophyllum*, wie auch die zwischen ihnen liegenden Spreitentheile, welche zum Rücken unter spitzem Winkel verlaufen, haben gewisse Aehnlichkeit mit den successive sich vergrössernden Rissen in der Endlamina, beziehungsweise den unter gleichem Winkel zum Rücken inserirten jungen Blättern von *Macrocystis*, nur dass der einzelne Riss von *Macrocystis* einer ganzen Reihe von Löchern bei *Thalassiophyllum* entspricht.

Wie bei *Macrocystis* der Vegetationspunkt durch den Riss in zwei ungleichwerthige Hälften getheilt wird, deren eine das spätere Blatt darstellt, deren andere den Charakter als Vegetationspunkt beibehält, so findet auch bei *Thalassiophyllum* durch die Lochbildung gleichsam eine Theilung des Vegetationspunktes in ungleichwerthige Hälften statt. Der eine Theil würde dem Blatt von *Macrocystis* entsprechen, der andere weiter als Vegetationspunkt fungiren.

Während bei *Macrocystis* das Längenwachsthum bedeutend stärker ist als das Wachsthum in Richtung der Flächenausbreitung, so herrscht bei *Thalassiophyllum* das letztere vor. Durch die Thätigkeit des Vegetationspunktes wird einmal die Fläche der Spreite verbreitert und damit auch Platz für die Neuanlage von Löchern geschaffen, andererseits wird die Länge des ganzen Thallus vergrössert.

Verfolgen wir zunächst den Uebergang des Vegetationspunktes nach unten, so sehen wir, dass sich derselbe wie bei *Macrocystis*, zum Stamm verdickt, der aber hier viel stärkeren Durchmesser erreicht. Hatte der Querschnitt durch den Vegetationspunkt eine Form, wie sie Figur 31 schematisch andeutet, so zeigt derselbe nach Beginn der Verdickung eine Gestalt, wie sie Figur 32 veranschaulicht. Das Wachstum in die Dicke nimmt nach unten hin zu, wie auch die seitlich angrenzende Spreite (Figur 32 *sp*) sich, gegenüber derjenigen des Vegetationspunktes, verstärkt hat.

Was nun das Wachstum der Spreite betrifft, so sei zunächst erwähnt, dass der Grund der spiraligen, dütenartigen Einrollung des Vegetationspunktes einerseits in dem stärkeren Wachstum der äussern Lamina-seite im Verhältnisse zu dem der inneren zu suchen ist, andererseits in dem Bestreben des Vegetationspunktes in die Länge zu wachsen.

Während diese Eigenschaften dem Vegetationspunkt dauernd erhalten bleiben, stellen die unterhalb desselben befindlichen Gewebepartien nach und nach das Wachstum in Richtung der Länge und Spreitenfläche ein und verdicken sich, wie wir sahen, zum Stamm.

Die seitlich an den Vegetationspunkt sich anschliessenden Spreitentheile, die natürlich durch das stärkere Flächenwachstum ihrer Aussen-seite in den Einrollungsprocess, der die jüngsten Thallustheile trifft, mit hineingezogen worden sind, gleichen die Krümmung allmählich durch stärkeres Wachstum der Innenseite aus und entfalten sich.

Während sie selbst aber sich aus der eingerollten Lage heraus in eine Ebene auszubreiten bestrebt sind, vermögen sie nicht, die durch die ursprüngliche Einrollung bedingte spiralige Drehung der Rückenpartie der Lamina rückgängig zu machen, da diese inzwischen sich selbstständig zum Stamm zu verdicken begonnen hat.

Der flache Spreitentheil bleibt, seiner Entstehung entsprechend, mit der zum Stamm werdenden Rückenpartie zunächst in Zusammenhang und erscheint an demselben in einer Spirallinie inserirt. Schliesslich reisst der flache Spreitentheil aber vom Stamm ab mit Hinterlassung einer der ursprünglichen Insertion entsprechenden spiralig verlaufenden Narbe.

Zu diesem Abreissungsprocess trägt einmal das Bestreben der Spreite bei, sich durch nachträglich stärkeres Wachstum der Innenseite in eine Ebene auszubreiten, andererseits der Umstand, dass im Stamm nun auch ein secundärer Dickenzuwachs beginnt.

- 2) Der innere Bau der Spreite vom Rücken bis zur Schneide, soweit derselbe für das Wachstum von Bedeutung ist.

Dass *Thalassiophyllum* die drei Gewebearten Bildungsschicht, Rinde und Füllgewebe, ebenso wie *Macrocystis*, unterscheiden lässt, erwähnte ich schon.

Die anatomische Untersuchung des Vegetationspunktes giebt sofort darüber Aufschluss, dass die Ein- und Abrollungen des Thallus auf ungleichmässig auf seine beiden Spreitenflächen vertheiltes Wachthum zurückzuführen sind. In den eingerollten Partien sind die Bildungsschicht- und Rindenzellen der äusseren Laminaseite in sehr lebhafter Theilung begriffen, und es werden hier Reihen von Zellen erzeugt, die auf dem Querschnitt radial hintereinander gelegen sind. Dagegen findet in den Geweben der inneren Seite des Vegetationspunktes bei weitem nicht so rege Theilung statt; es ist hier die Rinde schmaler als auf der Aussen- seite, und zeigen auch die Zellen eine ganz andere Anordnung, indem dieselben auf dem Querschnitt zu kurzen tangential gestreckten Reihen, welche mit ihrer oft spitzen Endzelle in einander greifen, orientirt sind. Die Gewebe der Innenseite werden also in dem eingerollten Vegetationspunkt durch die stärker wachsende Aussenseite gedehnt.

Dass das stärkere Wachsthum der äusseren Laminaseite in Richtung der Fläche es ist, welches die jungen Theile der Lamina zunächst dem Vegetationspunkt zwingt, sich dütenartig einzurollen, geht daraus hervor, dass zugleich mit der Abnahme der Einrollung auch die Unterschiede in der Zellenanordnung auf der Aussen- und Innenseite mehr und mehr verschwinden; nachdem eine Zeitlang die innere Fläche stärker gewachsen ist als die äussere, zeigen dann die vollständig flachen älteren Spreiten- theile die Rindenzellen auf beiden Seiten des Füllgewebes gleichmässig ausgebildet und zwar auf beiden Seiten mit tangential gestrecktem Lumen.

Aus der ungleichen Breite des Füllgewebes, welches ich auf Querschnitten durch die Spreite vom Rücken bis zur Schneide der Messung unterzog, konnte ich schliessen, dass das Rindengewebe sehr bald seine Theilungen einstellt und nichts mehr an's Füllgewebe abgiebt. Während ungefähr $1\frac{1}{2}$ Centimeter vom Rücken entfernt das Füllgewebe breiter ist als im Vegetationspunkt, und bis dort die Rindenzellen also noch das Füllgewebe vergrössert haben, so verschmälert sich dasselbe, je näher man der Schneide kommt, mehr und mehr, und hat man schliesslich auf Querschnitten durch ganz alte Spreitentheile aus der Nähe der Schneide ein Gewebe, welches kaum noch die Differenzirung in Bildungsschicht, Rinde und Füllgewebe erkennen lässt. Es ist in Folge der Streckung der oberflächlichen Zellen das Füllgewebe durch passive Zerrung so schmal geworden, dass uns hier und da eine Zelle desselben, auf dem Querschnitt durch das kleinere Lumen erkennbar, zwischen die tangential gestreckten Rindenzellen eingestreut erscheint. Die Quellung der Mittellamelle, wie sie jüngeres Füllgewebe zeigt, hat hier vollständig aufgehört.

Mit dem baldigen Uebergang der Rindenzellen in den Dauerzustand ist auch das äusserst geringe Vorkommen von Hyphen in alten Spreiten- theilen in Zusammenhang zu bringen.

Schnitte, die parallel der Flächenentwicklung geführt sind, zeigen die Folge der Zerrung in Richtung der Fläche insofern auch sehr deutlich, als die siebröhrenartigen Füllgewebszellen sehr weit auseinander gerückt sind, und die sie verbindenden Querreihen bedeutende Streckung erfahren haben.

Dass auch Wachstum in die Länge stattfindet, geht aus der That-
sache hervor, dass die Füllgewebszellen in älteren Laminatheilen sehr viel längere Ausdehnung zeigen als in jüngeren.

3) Die Entstehung der Löcher im Vegetationspunkt.

Die Lochbildung beruht auf dem Absterben des Gewebes an einer Stelle des Vegetationspunktes. Das Zugrundegehen der Zellen nimmt seinen Anfang von aussen her, und zwar von der äusseren und inneren Fläche des eingerollten Vegetationspunktes ausgehend; es werden aber die Zellen in der ganzen Ausdehnung der Stelle, welche zum Loch werden soll, nicht überall mit gleicher Energie desorganisirt, sondern das Absterben des Gewebes zeigt sich von beiden Laminaflächen aus nach innen vorzüglich in einer kreisförmigen Zone, welche dem Umfange des späteren Loches entspricht, so dass es den Anschein gewinnt, als sollten runde Stücke aus dem Zusammenhang des Vegetationspunktes herausgetrennt werden.

Das Absterben der Gewebe theilt sich nun auch dem innerhalb der ringförmigen Zone befindlichen, dem späteren Loche selber entsprechenden Spreitentheile mit, indem von beiden Laminaflächen aus nach einander Bildungsschicht-, Rinden- und Füllgewebszellen zu Grunde gehn. Gleichzeitig vermehren sich die Theilungen in den Bildungsschicht- und Rindenzellen der dem späteren Loche angrenzenden Partien, und ist es besonders die Innenseite, welche durch ausgiebigere Theilungen für die Schliessung der Stellen sorgt, an denen das Absterben der Gewebe sich zuerst bemerkbar machte. Indem in der Umgebung des gebildeten Loches das Wachstum sich zunächst fortgesetzt auf die Innenseite der Lamina concentrirt, wird die Umklappung des Lochrandes nach der äusseren Spreitenfläche herbeigeführt.

4) Entstehung der Adventivprosse.

Die Seitensprosse von *Thalassiophyllum* sind keine normalen Verzweigungen, sondern verdanken ihre Entstehung lediglich der gesteigerten Wachstumsenergie an den Wundrändern der neugebildeten Löcher der Spreite. Sie sind also vergleichbar den aus dem Wundcallus höherer Pflanzen hervorgehenden Adventivsprossen.

Von den umgeklappten Rändern von Löchern, welche dicht am Stamme liegen, wächst der eine oder der andere stärker in Richtung der Fläche und rollt sich dütenartig nach innen ein (Fig. 33a, 34a). Der eine

Rand eines solchen Adventivlappens wird zum Vegetationspunkt, welcher Stamm und Spreite eines Adventivsprosses producirt.

Während im Laufe der Zeit die alten Spreitentheile vom Stamme abgerissen werden, bleiben die jungen Adventiväste mit demselben in Zusammenhang und entwickeln sich weiter.

5) Das Dickenwachsthum des Stammes und die Entstehung der concentrischen Gewebezonen im Innern des alten Stammes.

In jener Region des Rückens, wo die vom Vegetationspunkt erzeugten Gewebe durch stärkeres Wachsthum zur Stammbildung schreiten, entfalten die Bildungsschichtzellen am Rücken und den zunächst angrenzenden Stücken der Aussen- und Innenseite des Vegetationspunktes eine regere Thätigkeit und erzeugen eine umfangreiche Rinde, die in ihrer radialen Anordnung zweifellos den Ursprung aus der Bildungsschicht erkennen lässt.

Weiter nach der Basis hin vergrößert sich der Durchmesser der Rindenschicht mehr und mehr und erreicht eine so bedeutende Ausdehnung, dass das geringe Füllgewebe sehr weit nach innen gerückt erscheint.

Die verdickende Thätigkeit der Bildungsschicht hört allmählich auf, und es sterben die Bildungsschicht und die äussersten Rindenzellen nach und nach ab, je näher man der Gegend des Stammes kommt, wo die Abreissung der Spreite erfolgt. Dort finden unterhalb der absterbenden äusseren Gewebeschichten in den peripherischen Theilen der Aussenrinde lebhaftere Theilungen statt als vor Eintritt des Absterbens der äusseren Gewebe, und es kommt hier zur Bildung einer Zone von meristematischem Gewebe, dessen Zellen auf dem Querschnitt cambiumähnliches, tafelförmiges Aussehen besitzen.

Es haben in der That nach dem Absterben der Bildungsschicht diese Aussenrindenzellen die Function übernommen, für das weitere Dickenwachsthum zu sorgen.

Durch die vermehrten Theilungen in der äusseren Rinde und die damit verbundene Vergrößerung des Stammumfanges tritt in dem abgestorbenen Gewebe, welches sich der Zunahme des Umfanges entsprechend nicht zu dehnen vermag, Bildung von Rissen ein.

Durch die Desorganisation der äusseren Gewebepartieen zur Zeit des Beginnes des secundären Dickenwachsthums wird auch hauptsächlich das Abreissen der Lamina bedingt, die des secundären Dickenwachsthums entbehrt.

Schon mit blossen Auge sieht man auf Querschnitten durch den alten Stamm dunkle Zonen, deren Entstehung erst beginnt, nachdem die äusseren Gewebe des Stammes ihre Lebensfähigkeit verloren haben; es wird durch die Gewebezonen ganz wesentlich zur Verdickung des Stammes beigetragen.

Die Färbemethode durch eine concentrirte Lösung von Safranin in Wasser erweist sich beim Nachweis der Entstehung der concentrischen Zonen als sehr zweckentsprechend.

Während die zu Grunde gegangenen und die theilweise im Absterben begriffenen Zellen der äusseren Partien des alten Stammes sich mit Safranin dunkelroth färben, so nehmen die inneren Zellen der Rinde einen dunklen Rosaton an, ihre Mittellamelle zeigt braunrothe Nüancirung.

In jener Zone, wo die ausser Function gesetzten Rindenzellen an die noch thätigen grenzen, findet sehr ausgiebige Zelltheilung statt. Es tritt diese nicht am ganzen Umfang des Stammes zu gleicher Zeit ein, sondern meist zeigen sich die vermehrten Theilungen zuerst an irgend einer beliebigen Stelle der Aussenrinde, um sich nach und nach an der ganzen Peripherie bemerkbar zu machen.

Diese jungen Zellen nehmen mit Safranin hellrosa Nüance an, die Mittellamelle ist weniger gequollen und fällt daher nicht so auf als in den älteren Rindenzellen, sodass diese in Folge ihrer ungleichzeitigen Entstehung verschieden breite Zone sich deutlich gegen das ältere Rindengewebe abhebt und letzteres als Ring klar hervortreten lässt. Dieser Gürtel junger Zellen ist es, durch den die Dickenzunahme des Stammes wesentlich bedingt wird.

Es macht sich die Grenze zwischen jüngerem und älterem Rindengewebe noch um so deutlicher sichtbar, als speciell die peripherischen Schichten der älteren Rinde reichlicheren Inhalt an dunkelbrauner Masse führen als die Zone der jüngeren Rindenzellen.

Anfangs hielt ich den braunen Zellinhalt für Harz; da jedoch weder Alcohol noch Aether denselben lösten, so kam ich von dieser Annahme bald zurück.

Lösungsversuche mit Eau de Javelle, die erfolgreich verliefen, brachten mich zu der Ansicht, dass der Zellinhalt Plasma ist, welches seine geformte Beschaffenheit eingebüsst hat und sich zu einem homogenen Klumpen zusammenballt. Meine Ansicht ist um so gerechtfertigter, als die jüngeren Rindenzellen älterer Stämme, sowie die äusseren Gewebe jüngerer Organe denselben Inhalt führen, der sein homogenes, harzartiges Aussehn dadurch erhalten haben mag, dass das mir zu Gebote stehende Material getrocknet wurde, denn in frischem Zustande ist der Inhalt körnig, wie Ruprecht¹⁾ angiebt.

Es sind eben im alten Stamm die reichlicher Plasma enthaltenden Aussenrindenzellen durch die vermehrten Theilungen in der cambialen Zone der äusseren Rinde weiter nach innen gerückt.

1) Ruprecht, Bemerkungen über den Bau und das Wachsthum einiger grossen Algenstämme, pag. 62 ff. Mémoires de l'académie impériale des sciences de St. Pétersbourg, sér. VI, scienc. math. phys. et natur. Tome VIII. 1849.

Das dunklere Aussehn der Wände der älteren Rindenzellen gegenüber dem der jüngeren, wie es sich besonders an der Grenze zwischen beiden zeigt, führte mich anfangs zu der Vermuthung, dass eine Verholzung der Membranen eingetreten sei; da jedoch Phloroglucin und schwefelsaures Anilin keine charakteristische Reaction gaben, so kam ich auf Grund des verschiedenen Verhaltens der Membranen der jungen und alten Rindenzellen gegen Safranin zu dem Schluss, dass das ungleiche Aussehn derselben auf stärkere Quellung der Wände, besonders der Mittellamelle der alten Rindenzelle zurückzuführen sei. Ohne Färbung lässt sich schon constatiren, dass die Mittellamelle der älteren Zellen stärker gequollen und dunkler braun gefärbt ist als in jüngeren.

Ruprecht hat bereits über die Entstehung der concentrischen Ringe oder Zonen Mittheilungen gemacht. Meine Untersuchungsergebnisse stimmen im wesentlichen mit denen von Ruprecht überein. Er führt an, dass die Ringbildung »auf neuer Zellenbildung in der Peripherie des Stammes und Hineinrücken der anliegenden Rindenzellen in's Innere« beruht, wie ich es angab. Ruprecht bringt ebenfalls das dunklere Aussehn der älteren Rindenzellen mit der verschieden starken Quellung und Braunfärbung der Mittellamelle in Zusammenhang und stellt, gegenüber den Behauptungen anderer Forscher, das Auftreten der Ringe als nicht streng periodisch wiederkehrend hin, wie sich aus der ungleichen Entfernung mehrerer dunkler Zonen von einander und auch aus der nicht gleichzeitig von allen Punkten der Peripherie ausgehenden Entstehung ergibt.

Der vielfach angestellte Vergleich mit den Jahresringen dicotyler Stämme ist daher wegen der abweichenden und besonders nicht periodischen Entstehung nicht richtig.

Mit der Behauptung Ruprecht's, dass bei *Thalassiophyllum* die braune körnige Masse, welche ich als Protoplasma diagnosticirte, in den Ringen nicht stärker angehäuft sei als in dem übrigen Rindengewebe, kann ich mich nicht einverstanden erklären; ich habe in den Zellen der concentrischen Zonen, speciell den peripherischen, stets etwas grössere Plasmamassen gefunden als in den jüngeren Rindenzellen.

Morphologische Vergleichung von *Macrocystis* und *Thalassio- phyllum* mit den übrigen Laminariaceen.

Nachdem schon vorher die analogen Erscheinungen im Bau des Thallus von *Macrocystis* und *Thalassiophyllum* besprochen wurden, mag jetzt auf eine Vergleichung ihrer äusseren Gestalt mit der der übrigen Laminariaceen eingegangen sein.

Alle Laminariaceen, mit Ausnahme der zweifelhaften Chorda, sind in stamm- und blattartigen Abschnitt gegliedert.

Wie bei *Thalassiophyllum* und *Macrocystis* der Vegetationspunkt nicht scharf localisirt und in einiger Entfernung von der Sprossspitze gelegen ist, so auch bei *Laminaria*. Bei allen drei Gattungen vergrößert resp. erzeugt der Vegetationspunkt einerseits das Blatt, andererseits bildet und verlängert er nach unten den Stamm.

Befindet sich aber bei *Macrocystis* und *Thalassiophyllum*, wie wir sahen, der Vegetationspunkt seitlich an dem einen Rande der Lamina, so nimmt derselbe bei *Laminaria* dem gegenüber die Mitte des Blattgrundes an der Grenze zwischen Stamm und Spreite ein.

Die Spaltung des Vegetationspunktes in ungleichwerthige Hälften, wie wir sie bei *Macrocystis* und ähnlich bei *Thalassiophyllum* kennen lernten, ist bei *Laminaria* nicht vorhanden, sondern es löst sich bei einigen Gattungen die Spreite in riemenartige Blätter auf, die alle gleichwerthig sind, und von denen keines wie bei *Macrocystis* einen thätigen Vegetationspunkt besitzt.

Bei *Macrocystis* sind die Blätter der Lage des Vegetationspunktes entsprechend dem Stamm seitlich inserirt und perennirend, bei *Laminaria* dagegen nimmt die Spreite terminale Stellung ein und wird, mit einigen Ausnahmen, alle Jahre durch eine neue, vom Vegetationspunkt erzeugte emporgehoben und schliesslich abgeworfen.

In Folge dieser durch die verschiedene Lage des Vegetationspunktes bedingten verschiedenen Gliederung des Thallus, nehmen einerseits *Macrocystis* und *Thalassiophyllum*, andererseits *Laminaria* gesonderte Stellung ein.

Wenn wir auch für *Alaria*, *Costaria* und *Agarum* nicht wissen, wo der Zuwachs erfolgt, und ob auch bei ihnen ein jährliches Abwerfen der Spreite stattfindet wie bei *Laminaria*, so schliesst sich diese Gruppe in Folge der Gliederung ihres Thallus doch an *Laminaria* an, und steht also *Macrocystis* - *Thalassiophyllum* der Gruppe *Laminaria* - *Alaria* - *Costaria* - *Agarum* gegenüber.

Sind beide Gruppen auch durch die Lage des Vegetationspunktes unterschieden, so wiederholt sich die Gliederung der *Laminaria* in beiden Gruppen doch nach denselben Prinzipien.

Wie die Spreite bei *Macrocystis* durch lange Spalten in lineale Streifen zerrissen wird, so auch bei *Laminaria*.

Ein Pendant zu *Thalassiophyllum*, bei dem nur einzelne Löcher auftreten, die den Gesamtzusammenhang der Lamina nicht stören, bildet innerhalb der anderen Gruppe von Gattungen *Agarum* mit seiner durchlöcherten Spreite.

Erklärung der Figuren.

- Fig. 1. *Macrocystis*. Sprossspitze mit Vegetationspunkt *v*. Bei *a*, setzt sich Fig. 1 an den Stamm *a*, der Fig. 2 an. Schematisirt. Natürliche Grösse. Weitere Erklärung im Text.
- Fig. 2. *M.* Thallusstück kurz über der Wurzel; oberhalb des Blattes *E* sind einige Blätter weggelassen. Natürliche Grösse, etwas schematisirt. Weitere Erklärung im Text.
- Fig. 3. *M.* Schematische Darstellung der Spaltenbildung am Keimling. *c*, ↑ das Stück, welches sich mit dem Vegetationspunkt *v*, *a*, in Fig. 2 entsprechend, in Folge stärkeren Längenwachstums über die anderen Abschnitte erhebt. Weitere Erklärung im Text.
- Fig. 4. *M.* Radialer Längsschnitt, parallel der Flächenentwicklung der Lamina, durch einen Theil eines nicht mehr thätigen Vegetationspunktes. *s* oberflächlich gelegene Schleimmembran; *a* Bildungsschicht; *b* äussere Rinde; *c* Beginn der inneren Rinde. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 5. *M.* Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 4 *c* sich anschliessend. Die Zeichnung stellt einen Theil der inneren Rinde dar. *t* Tüpfel. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 6. *M.* Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 5 sich anschliessend. Die Zeichnung stellt die innere Rinde am Uebergang in's Füllgewebe dar. *t*, *t'* Tüpfel. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 7. *M.* Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 6 sich anschliessend. *i* Gewebe, wie sie im Füllgewebe eines thätigen Vegetationspunktes vorkommen. *i* + *k* die Fortsetzung von Fig. 6 nach dem Füllgewebe hin. *a*, *t* in der Entstehung aus Tüpfeln begriffene Querverbindungen, *l* weiter fortgeschrittenes Stadium; *h* Hyphen. Die gequollene Mittellamelle schraffirt. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 8. *M.* Schnitt wie sub Fig. 4. An Fig. 7 sich anschliessend. Die Zeichnung stellt die Mitte des Füllgewebes dar mit den siebröhrenartigen Zellen. *a* verbindende Querreihen; *h* Hyphen auf dem Längsschnitt, *h'* auf dem Querschnitt. Bei *b* der durch Safraninfärbung hervortretende Ring an den Querwänden der Füllgewebezellen. Bei *c* callusartige Bildung. Die gequollene Mittellamelle schraffirt. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 9. *M.* Schnitt, parallel der Oberfläche, durch einen ganzen Stamm, den verschiedenen Grad der Quellbarkeit der Wand einer Zelle der inneren Rinde zeigend. Die Wandstellen *a* und *b* noch nicht, *d* und *c* dagegen bereits gequollen. *t* Tüpfel. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 10. *M.* Längsschnitt durch einen jungen Stamm. Die durch Quellung auseinandergewichenen in's Füllgewebe übergehenden Innenrindenzellen. *e*, *b* verbindende Querreihen an den zugespitzten Enden des durch Theilung aus einer Rindenzelle hervorgegangenen Zellfadens. Die gequollene Mittellamelle schraffirt. Vergr. $\frac{240}{1}$.
- Fig. 11. *M.* Längsschnitt aus einem jungen Stamm. Junge Füllgewebezellen mit schwach gequollener Siebplatte *s* und dieselbe umgebendem Ringe *r*. *s* bleibt hell nach Färbung mit Safranin, *r* färbt sich braunroth. Vergr. $\frac{500}{1}$.
- Fig. 12. *M.* Querschnitt durch einen alten Stamm in Chlorzinkjodlösung. Bei *a*, *b*, *c* die durch Quellung der Mittellamelle verdickten Wandpartieen; *t* Tüpfel. Vergr. $\frac{300}{1}$.
- Fig. 13. *M.* Querschnitt durch einen alten Stamm. Siebplatte. Vergr. $\frac{500}{1}$.
- Fig. 14. *M.* Querschnitt durch einen jungen Stamm. *s* junger primärer Schleimgang. Vergr. $\frac{450}{1}$.

- Fig. 15. M. Querschnitt durch einen wenig älteren Stamm. *s* weiter nach innen gerückter primärer Schleimgang. Vergr. $450\times$. *b* Begrenzungszellen.
- Fig. 16. M. Querschnitt durch einen älteren Stamm. Ein aus zweien entstandener primärer Schleimgang *s*, der mit zwei secundären Schleimnestern, *s*₁, *s*₂, in Verbindung steht; letztere von kleinen Begrenzungszellen, *b*, umgeben. Vergr. $450\times$.
- Fig. 17. M. Querschnitt durch einen älteren Stamm. *s* primärer Schleimgang. 1) in Theilung begriffene Grenzzelle, jüngstes Stadium der Bildung eines secundären Schleimnestes. Vergr. $450\times$.
- Fig. 18. M. Querschnitt durch einen älteren Stamm. *s* primärer Schleimgang; 2) in der Entwicklung begriffenes secundäres Schleimnest, älter als wie es Fig. 17 darstellt. In der Mitte der getheilten Zelle macht sich Quellung der Inter-cellularsubstanz bemerkbar. Vergr. $450\times$. *b* Begrenzungszellen.
- Fig. 19. M. wie sub Fig. 18. *s* primärer Schleimgang; 3) weiter vorgerücktes Stadium eines secundären Schleimnestes. Vergr. $450\times$.
- Fig. 20. M. Längsschnitt durch einen alten Stamm. *s* primärer Schleimgang, die Begrenzungszellen sind resorbirt. *s*₁—*s*₄ mehr oder minder ausgebildete, radial gegen die Bildungsschicht verlaufende secundäre Gänge, von denen *s*₄ in seitlicher Richtung sich zu erweitern beginnt. Vergr. $160\times$.
- Fig. 21. M. Querschnitt durch einen jungen Stamm. Anordnung der Tüpfel in einer Aussenrindenzelle. Vergr. $610\times$.
- Fig. 22. M. Querschnitt durch einen älteren Stamm. Anordnung der Tüpfel in einer Innenrindenzelle. Vergr. $610\times$.
- Fig. 23. M. Querschnitt durch einen älteren Stamm. Anordnung der Tüpfel in einer dem Füllgewebe benachbarten Innenrindenzelle. Vergr. $610\times$.
- Fig. 24. M. Querschnitt durch einen älteren Stamm. Die Tüpfel verschmelzen unter Resorption der zwischen ihnen liegenden Membran, die zum Theil noch sichtbar ist, zur Siebplatte. Der Umriss der Tüpfel auf ihrer Aussenseite noch erkennbar. Vergr. $610\times$.
- Fig. 25. *Fucus vesiculosus*. Querschnitt durch die Mittelrippe des Laubes. *t* Tüpfel verschiedenen Alters, die nach der Mitte an Grösse zunehmen und im Füllgewebe zur Siebplatte *s* werden. Vergr. $925\times$.
- Fig. 26. *Ascophyllum nodosum*. Längsschnitt durch ein jüngeres Organ. *t* Tüpfel, welche die durch starke Quellung auseinandergerückten Rindenzellen verbinden. Bei *f* strecken sich die Innenrindenzellen tangential, um sich im Füllgewebe zu siebröhrenartigen Gebilden weiter zu strecken. Bei *s* die aus einem Tüpfel hervorgegangene Siebplatte. Vergr. $160\times$.
- Fig. 27. *Laminaria saccharina*. Längsschnitt aus einem alten Stamm. Spiralige Verdickungen in der Wand einer Siebröhre. Vergr. $1000\times$.
- Fig. 28. *Macrocystis luxurians*. Längsschnitt durch einen jungen Stamm. Drei Füllgewebezellen, schräg getroffen. Bei *a* der dicke, die Siebplatte umgebende Ring; letztere nur als schmaler Spalt sichtbar, der sich mit Safranin nicht färbte, während der Ring braunrothe Farbe angenommen hatte. Bei *b* ein grösseres Stück der Siebplatte, bei *c* die ganze Siebplatte, der Ring nur als zwei kleine Zacken sichtbar. Vergr. $1000\times$.
- Fig. 29. *Fucus vesiculosus*. Längsschnitt durch die Mittelrippe des Laubes. Die Zellfäden mit spitzē Endzellen an der Grenze der Innenrinde und des Füllgewebes. *h* verbindender Tüpfelcanal, durch Quellung der Mittellamelle vertieft. *s* Siebplatte; *t* Tüpfel. Vergr. $160\times$.

- Fig. 30. *Thalassiphyllum Clathrus*. Oberer Theil eines Stammes mit Spreite, schematisirt; natürliche Grösse. Der Rand r ausgerollt; in Wirklichkeit ist derselbe dütenartig eingerollt, so dass der Punkt x in der Verlängerung der Richtung des Stammes s liegt. Rand r dem Rücken, der andere Rand, von x an, der Schneide eines Messers entsprechend. Die Spreite, welche sich vom Stamm abrollt, a , ist von reihenweise gestellten Löchern durchbrochen, deren kleinste und jüngste sich in der Nähe des Vegetationspunktes v befinden.
- Fig. 31. Thal. Querschnitt durch den eingerollten Rand, schematisch. v Vegetationspunkt, sp Spreite.
- Fig. 32. Thal. Querschnitt durch den sich zum Stamm verdickenden Theil unterhalb des Vegetationspunktes, schematisch. s junger Stamm, sp Spreite.
- Fig. 33. Thal. Oberes Stück eines älteren Stammes s mit Spreitenresten sp . Jüngstes Stadium der Adventivsprossbildung a , u zurückgeklappter Rand. Mittelst des Dicotyls gezeichnet. Viermal vergrössert
- Fig. 34. Thal. Theil eines Thallus, welcher die Adventivsprossbildung in ihrer weiteren Entwicklung zeigt. a Adventivspross; bei e die Einrollung des Lochrandes sichtbar. u nach der unteren Spreitenfläche zurückgeklappte Ränder. Mittelst des Dicotyls gezeichnet. Viermal vergrössert.

Ueber den anatomischen Bau von *Danaea*

von
Dr. Richard Kühn.

In meiner Arbeit über den anatomischen Bau der Marattiaceen¹⁾ habe ich bereits darauf hingewiesen, dass die Untersuchungsergebnisse von Holle²⁾, betreffend die Gattung *Danaea*, sehr auffallende Abweichungen von dem sonst so gleichmässigen Bau der übrigen Angehörigen dieser Familie zeigen. Da ich durch die Freundlichkeit der Herren Professoren Urban in Berlin und Peter in Göttingen Material dieser Gattung aus den betreffenden Universitätsherbarien erhielt, (wofür ich diesen Herren meinen besten Dank sage), konnte ich Holle's Angaben prüfen. Obwohl von der durch Holle untersuchten Species *D. trifoliata* nur stammlose Exemplare im Göttinger Herbar vorhanden sind, lehrte doch die Untersuchung der übrigen Species, dass der anatomische Bau der Gattung *Danaea* in nichts Wesentlichem von dem der anderen Marattiaceen-Gattungen abweicht.

An der Hand der Arbeit von Holle werde ich in Folgendem die Abweichungen seiner Angaben von meinen Untersuchungsergebnissen anführen.

1) Rich. Kühn, Untersuchungen über die Anatomie der Marattiaceen und anderer Gefässkryptogamen. Flora 1889. S. 457 u. f.

2) Holle, Ueber die Vegetationsorgane der Marattiaceen. Sitzung d. kgl. Gesellschaft d. Wissensch. zu Göttingen, 8. Jan. 1876; Botan. Ztg. 1876. S. 215.

Holle führt an:

Bei D. ist der Stamm ziemlich gestreckt und verzweigt. Am Grunde des Blattstiels finden sich keine Stipeln. Die untersuchten Arten dagegen besaßen einen radiären, gestreckten Stamm, der dem der Keimpflanzen der Gattung *Marattia* entspricht, welchen ich in meiner citirten Arbeit beschrieben habe¹⁾. Eine Verzweigung konnte nirgends erkannt werden, obwohl dieselbe nicht ausgeschlossen ist, da die Herbarexemplare unvollständig sind. Am Grunde des Blattstiels sind stets *Stipulae* vorhanden, deren Gestalt jedoch nicht sicher zu erkennen war, da dieselben völlig verschrumpft waren.

Nach Holle findet sich bei D. unmittelbar unter der Epidermis des Blattstieles, ähnlich wie bei *Marattia* und *Angiopteris*, hellgefärbtes Sklerenchym, welches aber nicht wie bei letzteren Gattungen am Grunde des Blattstieles in Collenchym und schliesslich in gewöhnliches Parenchym übergeht, sondern sich in normales braunwandiges Sklerenchym verwandelt, das an den Seiten des Blattstieles von einem schwammigen unverdickten Zellgewebe unterbrochen wird. Das braunwandige Sklerenchym setzt sich auch in den Stamm hinein fort, denselben mit einem ununterbrochenen Sklerenchymmantel bedeckend. Ausserdem aber finden sich zerstreute Gruppen besonders stark verdickter dunkel gefärbter Sklerenchymzellen in der Umgebung der Gefässbündel des Stammes und des Blattstielgrundes. Dieses letztere zeichnet sich von dem peripherischen Sklerenchym dadurch aus, dass seine an unveränderte Parenchymzellen stossende Wände fast immer unverdickt sind. Auch die Rinde der Wurzel ist sklerenchymatisch ausgebildet. Ueber die Anordnung der Gefässbündel sagt Holle nichts. Dieselben sind im Blattstiel, wie aus der Untersuchung hervorging, auch hier wie bei den anderen *Marattiaceen* zu einem kreisförmigen Gefässbündelcylinder angeordnet, in dessen Inneren ein Centralstrang verläuft. Die einzelnen Bündel sind hier ebenfalls concentrisch gebaut, und zwar ist der centrale Gefässtheil vom peripherischen Siebröhrentheil umgeben. Eine Strangscheide ist nicht vorhanden. Das einige Zellschichten unter der Epidermis verlaufende, hellgelblich gefärbte Sklerenchym geht auch hier am Grunde in normal gebautes Collenchym und schliesslich in Parenchym über.

Der Stamm weist weder einen Sklerenchymmantel, noch irgend welche andere sklerenchymatische Elemente auf und stimmt darin ebenfalls mit den anderen *Marattiaceen*-Gattungen überein. Die Gefässbündel sind denen des Blattstiels conform gebaut.

Die Epidermis der Blattunterseite besteht aus ziemlich gleichgrossen mit gewellten Wänden ineinandergreifenden Zellen, deren Spaltöffnungen von 3 bis 4 schmalen langgestreckten Zellen umgeben sind, welche bei

1) l. c. S.

D. elliptica Sm. stets, bei den anderen Species, soviel an dem getrockneten Material constatirt werden konnte, hier und da Gerbstoff enthielten.

Auch der Gattung *D.* fehlen die den Marattiaceen eigenthümlichen Schleimgänge und Gerbstoffschläuche weder im Stamm noch im Blattstiel. Eine Abweichung der Gattung *D.* von den übrigen Gattungen der Familie findet dagegen im Bau der Wurzel statt. Wenige Zellschichten unter der Epidermis befindet sich, wie im Blattstiel, ein geschlossener 2 bis 3 Zellreihen starker Sklerenchymfaserring.

In der Innenrinde liegen zahlreiche Schleimgänge, während Gerbstoffzellen über den ganzen Querschnitt vertheilt sind. Beide Elemente erwähnt Holle nicht. Der centrale Gefässbündelstrang ist von einer Strangscheide umgeben und ist nicht, wie Holle angibt, diarch, sondern besteht bei den untersuchten Exemplaren aus 10 bis 12 Gefässtheilen und ebensoviel Siebröhrentheilen.

Eine von mir bei den anderen Marattiaceen-Gattungen nicht beobachtete Eigenthümlichkeit konnte hier constatirt werden. Nur bei einigen Exemplaren von *D. alata* Sm. bestand das sogenannte Verbindungsgewebe¹⁾ des Wurzelgefässbündels aus unverdickten Parenchymzellen. Bei anderen Exemplaren derselben Species und bei allen der untersuchten übrigen waren dagegen die Zellen des Verbindungsgewebes in stark verdickte, gelbliche Sklerenchymfasern verwandelt worden. Die Wurzeln scheinen normal unverzweigt zu sein. Eine Pilzinfektion war nicht zu beobachten.

Nach all dem Vorstehenden kann nur angenommen werden, dass Holle als *Danaea trifoliata* einen überhaupt nicht zu den Marattiaceen gehörenden Farn untersucht hat, was um so leichter möglich ist, da auch ich folgende Beobachtung gemacht habe.

Im Berliner Herbarium befindet sich unter Nr. 1295 ein nicht fructificirendes Exemplar, angeblich von *Danaea elliptica* Sm., welches 1858 von Wilson in Jamaica gesammelt worden ist und aus dem Herbarium des königlichen Gartens zu Kew stammt. Während die anderen, sämtlich fructificirenden und daher unzweifelhaft als *D.* zu indentificirenden Exemplare von *D. elliptica* Sm. obigen normalen Bau besitzen, zeichnet sich jenes Exemplar durch einen ganz anderen morphologischen und anatomischen Bau aus. Das kriechende, dorsiventrale Stämmchen trägt an der Oberseite die Blätter, während an der Unterseite die Wurzeln entspringen. Sowohl das Stämmchen, wie die eingerollten Blattstiele sind mit Paleae besetzt, welche allen Marattiaceen fehlen. Die Blätter ähneln zwar in Gestalt und Nervatur auffällig den Marattiaceen, doch kann dies allein noch keinen Anhalt für die Richtigkeit der Bestimmung bieten, da, wie schon erwähnt, die Fructificationsorgane fehlen. Das betreffende Exemplar

1) De Bary, Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane. Leipzig 1877. S. 365.

trägt übrigens von Wilson die Bemerkung: this is seldom to be found on trees or in fructification. Der anatomische Bau ist dagegen völlig verschieden von dem der übrigen Marattiaceen. Die äussere Rinde des Stämmchens besteht aus dünnwandigen, polyedrigen, dicht aneinander schliessenden Zellen, auf die ein Sklerenchymfaserring folgt. Die Innenrinde ist an der Unterseite von einem mächtigen, halbmondförmigen Gefässbündel durchzogen, während nach der Oberseite zu fünf kleinere Bündel liegen. Ein centrales Bündel ist nicht zu erkennen. Die Bündel sind wie die von *Aspidium filix mas* L. bicollateral gebaut, d. h. dem Gefässtheil sind auf beiden Seiten Siebröhrentheile aufgelagert. Die Bündel sind von einer starken Sklerenchymscheide umgeben. Während Gerbstoffzellen vorhanden sind, fehlen Schleimgänge völlig. Der Blattstiel trägt zehn Fiederblätter, welche abwechselnd gestellt sind. Er wird von drei Gefässbündeln durchzogen, welche mit einer Sklerenchymscheide umgeben sind. Unterhalb der Epidermis liegt auch hier ein Sklerenchymfaserring, der aber an der Basis nicht in Collenchym übergeht, sondern sich direct in den Stamm hinein fortsetzt. Auch hier sind Gerbstoffzellen vorhanden, während Schleimgänge fehlen. Die Epidermis der Blattunterseite besitzt langgestreckte, ineinandergreifende Epidermiszellen mit normalen Spaltöffnungen. Die Gefässbündel des Blattes sind zunächst von einem braunen Sklerenchymfaserring, dann von einem ebensolchen, aber farblosen umgeben. Demnach gehört diese Pflanze sicher nicht zu *Danaea*.

Die wesentlichen Resultate dieser Untersuchung sind folgende:

1. Die Gattung *Danaea* stimmt in ihrem anatomischen Bau im Wesentlichen mit dem der anderen Marattiaceen überein.
2. Es existiren einige, wahrscheinlich zu den Polypodiaceen gehörende, Farne, welche in ihrer Blattform grosse Aehnlichkeit mit den Marattiaceen zeigen, in ihrem anatomischen Bau aber völlig von diesen verschieden sind.
3. Das kleinste Stammstück einer Marattiacee ist leicht als eine solche zu erkennen an dem Fehlen der sklerenchymatischen Elemente und an dem Vorhandensein von Schleimgängen, Gerbstoffzellen und concentrischen Gefässbündeln.

Litteratur.

Kohl, Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalksalze und Kieselsäure in der Pflanze. Ein Beitrag zur Kenntniss der Mineralstoffe im lebenden Pflanzenkörper. Mit 8 lithogr. Tafeln. Marburg 1889. 314 S.

Der Verf., welcher sich bei Beginn seiner Untersuchungen zwei Aufgaben stellte, hat die eine, die zerstreuten Beobachtungen und Angaben über seinen Gegenstand zu sammeln und durch eigene Beobachtungen zu vermehren, in verdienstvoller Weise gelöst. Für diejenigen, welche auf diesem Gebiete vorzudringen beabsichtigen, wird das Buch des Verf. eine ganz wesentliche Erleichterung ihrer Arbeit sein, da sie die umfassende Bearbeitung der Litteratur hier vorfinden. Die zweite Aufgabe, welche dem Verf. vorschwebte, war die, aus der Sammlung der Thatsachen womöglich erst

den rechten Nutzen durch Erlangung von Einsicht in die physiologische Bedeutung der Mineralstoffe zu ziehen. Doch kann man diese vom Verf. durch einen Satz von Solms-Laubach ausgedrückte Hoffnung wohl kaum als erfüllt ansehen. Der Verf. hat zwar, seiner Aufgabe entsprechend, nicht versäumt, an die mitgetheilten Beobachtungen physiologische Betrachtungen anzuschliessen, allein es sind dies eben mehr Betrachtungen und Hypothesen, zu denen die Beobachtungen vielfach berechtigen können, als zwingende Schlüsse, welche auf dem angezogenen Gebiete ja besonders erwünscht wären. Es darf nicht verkannt werden, welche grosse Schwierigkeiten sich gerade hier der Forschung entgegenstellen, aber deshalb wird es auch nach der Ansicht des Ref. geboten sein, die Lösung dieser Aufgabe nicht mit einseitiger Bevorzugung einer Methode, sei diese nun die chemische oder anatomische, sondern unter gründlicher Anwendung aller einschlägigen Methoden der Untersuchung anzugreifen.

Das in dem Buche des Verf. enthaltene Thatsachenmaterial ist zu umfangreich, als dass es hier vollständig besprochen werden könnte; es kann hier nur unsere Aufgabe sein, eine kürzere Kritik der Darstellung der Thatsachen und einiger Auffassungen des Verf. zu geben. Was der Verf. über Kalkpflanzen im Allgemeinen sagt, ist gewiss zutreffend, es erscheint aber doch unzweckmässig einen ganz neuen Begriff der »Kalkpflanze« neben dem bis jetzt herrschenden aufzustellen, der ja durch des Verf. Auffassung nicht beseitigt wird. Da man bisher die Indicatoren des Kalkbodens mit dem Namen Kalkpflanzen bezeichnete, so dürfte man kaum, ohne Verwirrung anzurichten, denselben Namen auf Pflanzen übertragen, deren Asche sich durch einen hohen Procentgehalt an Kalk auszeichnet.

Die ausführliche Behandlung der einzelnen Calciumsalze beginnt in dem Buche mit dem Calciumoxalat. Der Aufführung der vorkommenden Krystallformen reiht der Verf. Versuche zur Ermittlung der Entstehungsbedingungen der verschiedenen Formen und Combinationen an. Beide Abschnitte haben vorwiegend ein krystallographisches Interesse. Bezüglich des Verhaltens des oxalsauren Kalkes im Stoffwechsel beobachtete der Verf. dieselben Verschiedenheiten wie Schimper, dessen Untersuchungen als bekannt vorausgesetzt werden dürfen. Ref. hält es nicht für sehr glücklich, das verschiedene physiologische Verhalten derselben chemischen Verbindung durch die adjectivischen Bestimmungen primär, secundär etc. auszudrücken, da hierdurch leicht zwischen verwandten Wissenschaften Missverständnisse entstehen. Ihren Zweck einer kurzen Verständigung verfehlen aber diese Beiworte natürlich ganz, wenn, wie im vorliegenden Falle zwei Autoren, Kohl und Schimper, dieselben in verschiedenem Sinne anwenden. Die Anhäufung von Calciumoxalat an Orten, wo Zellwandverdickungen beobachtet werden, veranlasst den Verf. einen Zusammenhang beider Vorgänge anzunehmen, doch nur in hypothetischer Weise, wie dies schon früher (vom Ref. vor Möller in »Die Quebrachorinde«) von anderer Seite geschehen. Es lassen sich aus den mitgetheilten Beobachtungen keine bestimmten Schlüsse ableiten. Die ausführlicheren Auseinandersetzungen, welche Verf. im »Anhang zu den Kalksalzen« p. 171 ff. über die Entstehung und Bedeutung des Calciumoxalates mittheilt, entfernen sich doch im Allgemeinen etwas zu weit vom Boden der Thatsachen, um mehr als Vermuthungen des Verf. zu sein. Die Bildung von Amidon aus Nitraten und Kohlenwasserstoffen ist durch keine Thatsache glaubwürdig gemacht, sondern ganz willkürlich angenommen, um ein Schema für die Eiweissbildung zu vervollständigen. Aber ebendeshalb kann dieses nicht einmal den Werth besitzen zu experimentellen Untersuchungen Anlass zu geben. Die an diesem Orte berechtigtere Meinungsäusserung über die Entstehung der Oxalsäure erscheint aber ebenfalls nicht einleuchtend. Der Verf. ist der Ansicht, dass die Oxalsäure bei der Synthese der Eiweissstoffe entstehe. Wenn man ohne thatsächliche Unterlage

über diese Frage discutiren wollte, so würde es Ref. für berechtigter halten, auf Grund der chemischen Vorgänge bei der künstlichen Eiweisspaltung die Oxalsäure in den Pflanzen als ein Spaltungsprodukt der Eiweissstoffe zu bezeichnen. Es ist vielleicht nicht unberechtigt, die Frage aufzuwerfen, ob nicht die Oxalsäure bei der Athmung als Spaltungsprodukt von Eiweissstoffen entstehe. So dankenswerth die Zusammenstellung der Beobachtungen über das Calciumoxalat ist, so kann man doch nicht sagen, dass eine erweiterte Einsicht in die Entstehung und Bedeutung des verbreiteten Salzes aus dem Studium dieses Kapitels sich ergibt. Es gilt dies aber auch für die übrigen Kalksalze. Weder über die Entstehung der Incrustirungen von Calciumcarbonat, noch über die Cystolithen, gelangen wir zu wesentlich erweiterten Anschauungen.

Die Ansicht des Verf. über die Funktion der Cystolithen ist zwar neu, bedarf aber doch zunächst einer Bestätigung. Die Cystolithen werden als Speicherorgane betrachtet für kohlensauen Kalk, welcher gelegentlich wieder in den Stoffwechsel eintreten soll, um wanderungsfähige Verbindungen von Calcium und Kohlehydraten zu bilden. »Man kann beobachten, dass aus alten Blättern, die dem Absterben entgegengehen, allmählig der grösste Theil des Kalkes in den Stamm zurückgeführt wird«. Ueberlegt man, dass in absterbenden Blättern durch die Einwirkung der sauren Zellsäfte auf die Cystolithen sehr leicht eine Lösung des Calciumcarbonates zu Wege kommen lassen, so ist das Verschwinden des Carbonates verständlich, eine Wanderung ohne Beweis anzunehmen, liegt kein Grund vor. Der Verf. schliesst überhaupt mehrfach aus dem blossen Verschwinden von festen Substanzen ohne Weiteres auf eine »Wanderung« derselben.

Der zweite Abschnitt des Buches, welcher das Vorkommen der Kieselsäure behandelt, beschränkt sich mehr als der erste auf die Nachuntersuchung der vorhandenen Angaben. Ausführlicher in eigenen Untersuchungen wendet sich der Verf. den Stegmatis zu, welche bei den Dicotylen nicht vorzukommen scheinen bei den Palmen, Pandaneen, Cannaceen, Musaceen, einem Theil der Orchideen und bei einer Anzahl Pteridophyten gefunden wurden. Die später gewöhnlich linsenförmigen Deckzellen gehen durch Theilung aus Parenchymzellen hervor, in ihnen scheiden sich die aus amorpher Kieselsäure bestehenden Inhaltskörper ab. In der Auffassung der eigenthümlichen Kieselkörper als Ventilverschlüsse, welche die Wasserbewegung reguliren sollen, scheint mir der Verf. wieder etwas kühn in den Hypothesenschatz gegriffen zu haben. Nicht immer sind auch die Speculationen des Verf. klar durchdacht. Derselbe erblickt in der Verkieselung der Podostemaceen ein wirksames Schutzmittel gegen das Austrocknen und gegen Zerreißen durch Wassergewalt: »man wird es von vornherein begreiflich finden, dass die Podostemaceen, sollen sie die Trockenperiode auch nur eine kurze Zeit lang ertragen oder gar überstehen, um bei dem nächsten Wasserzufluss weiter zu wachsen, ganz besondere Einrichtungen besitzen müssen, welche das schädliche Zusammenfallen ihrer Gewebe verhindern«. Verf. erblickt in der Erzeugung verkieselter Zellinhalte ein wirksames Schutzmittel gegen diese Gefahr. Inwiefern aber eine Steifung durch Kieselsäureeinlagerung die Pflanzen vor übertriebener Verdunstung schützen soll, erhellt nicht aus den Angaben des Verf. Es kann den Podostemaceen bitterwenig daran liegen, wenn sie nach völligem Vertrocknen auch noch so steif ausschen. Auch in dem zweiten Theile erscheinen dem Ref. die thatsächlichen Beobachtungen wichtiger und dankenswerther, als die theoretischen Erörterungen. Die ersteren hat der Verf. durch 8 Tafeln mit einer Fülle schön gezeichneter Abbildungen erläutert, welche ganz besonders dem Buche eine dauernde Benutzung sichern. Die correctere Wiedergabe zahlreicher der angeführten Pflanzennamen wäre erwünscht gewesen.

Dr. A. Hansen.

F. von Müller, records of observations on Sir William Mac Gregor's Highland-Plants from New-Guinea.

Neu-Guinea's, so lange ganz unbekannte Pflanzenwelt, bietet, wie schon jetzt ersichtlich ist, höchst interessante pflanzengeographische Verhältnisse und vor Allem gilt dies von der Hochgebirgsflora dieser Insel. Zöllers bekannte Expedition hat eine botanische Ausbeute, soweit Ref. bekannt, nicht ergeben. Bekanntlich hat der Gouverneur von Britisch Neu-Guinea, Sir W. Mac Gregor, eine Besteigung der Owen Stanley-Kette ausgeführt. F. von Müller hat eine Bearbeitung der in einer Höhe zwischen 8000 und 13000 Fuss gesammelten Pflanzen gegeben. Es sind deren 80. Davon ist, soweit sich bis jetzt beurtheilen lässt, nicht weniger als die Hälfte endemisch. Zwei der endemischen Arten *Ischnea elachoglossa* und *Decatoca Spencerii* stellen neue Gattungen dar. Die eine ist der ausschliesslich italienischen (sehr seltenen) Composite *Nananthea perpusilla*, die andere der australischen (hauptsächlich alpinen) *Trachocarpa* verwandt. Von den anderen endemischen Pflanzen gehören 17 Himalaya-Typen an, obwohl einige derselben auch Anklänge an die Sundavegetation (a touch of the Sundaic vegetative element) zeigen. Auffallend ist die reichliche Vertretung von Ericaceen- (incl. Vacciniaceen)-Formen, die in Australien nur spärlich und ausschliesslich in der alpinen Region vorkommen. Andererseits kommen sogar vorwiegend alpin-australische, neuseeländische und sub-antarktische Typen in der Hochlands-Vegetation von Neu-Guinea vor (soweit sich bis jetzt übersehen lässt). Dies wird bewiesen durch das endemische Vorkommen von *Ranunculus amerophyllus*, *Metrosideros Regelii*, *Rubus dielinis*, *Olearia Kernotii*, *Vittadinia Alinae*, *V. macra*, *Veronica Lendenfeldtii*, *Libocedrus Papuana*, *Phyllocladus hypophyllus*, *Schoenus curvulus* und *Festuca oreoboloïdes*, ferner kommen eine Anzahl von Arten in Neu-Guinea vor, welche mit denen der obengenannten Gebiete identisch sind. Merkwürdigerweise finden sich aber auch vier Pflanzen, die bis jetzt nur von den (Nepenthes — berühmten!) Höhen des Kina Balu ¹⁾ in Borneo bekannt waren; es sind dies *Drimys piperita*, *Drapetes ericoïdes*, *Rhododendron Lowii* und *Phyllocladus hypophyllus*. Noch auffallender ist das Vorkommen von *Taraxacum officinale* und *Scirpus caespitosus*, welche den malayischen Inseln und dem australischen Continent fehlen. Von weitverbreiteten Pflanzen sind zu nennen: *Aira caespitosa*, *Festuca ovina*, *Lycopod. clavatum*, *L. Selago*; auch eine *Potentilla* kommt vor.

Mögen bald weitere erfolgreiche Forschungsreisen, namentlich auch in Deutsch-Neu-Guinea (Kaiser Wilhelmsland), weitere Aufschlüsse ergeben! Erst dann werden allgemeinere Erwägungen eine feste Basis haben.


K. G.

Eingegangene Litteratur.

- Bachmann, Ueber nichtkrystallisirte Flechtenfarbstoffe, ein Beitrag zur Chemie und Anatomie der Flechten. S.-A. aus Pringsheim's Jahrb. f. wiss. Botanik. Bd. XXI, Heft 1.
 Boehm, Ursache des Saftsteigens. S.-A. aus d. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. Jahrgang 1889, Band VII.

1) F. von Müller schreibt Kini-Balu, die obige Schreibweise, welche z. B. auch von Burbidge, der den Berg besuchte, angewandt wird, dürfte die richtigere sein.

- Errera, Sur la distinction microchimique des Alcaloïdes et des matières protéiques. Extrait des Annales de la Société belge de microscopie. t. XIII, 2^e fascicule 1889.
- Gravis, Anatomie et Physiologie des tissus conducteurs chez les plantes vasculaires. Extr. des Mémoires de la soc. belge de microscopie, t. XII.
- Heinricher, Johann Peyritsch. S.-A. a. d. Ber. d. deutschen botan. Gesellschaft. Jahrg. 1889, Band VII.
- Hempel u. Wilhelm. Die Bäume und Sträucher des Waldes. II. Lieferung.
- Jännicke, Gekeimte Samen in Früchten von *Impatiens longicornis* Wall. S.-A. a. d. Ber. d. Deutschen Bot. Ges. Jahrgang 1889, Band VII, Heft 8.
- Keller, Das Potentillarium von Herrn H. Siegfried in Winterthur. S.-A. a. d. Bot. Centralblatt Nr.
- Klebs, Zur Physiologie der Fortpflanzung. S.-A. a. d. »Biol. Centralblatt« Bd. IX, Nr. 20 und 21.
- Müller, Baron Ferdinand von, Records of observations on Sir William Mac Gregor's Highland plants from New Guinea.
- Prahl, Kritische Flora der Provinz Schleswig-Holstein, des angrenz. Gebiets der Hansastädte Hamburg u. Lübeck u. des Fürstenthums Lübeck. II. Theil, 1. Heft: Kritische Aufzählung und Besprechung der im Gebiete beobachteten oder aus demselben angegebenen Gefässpflanzen und ihrer Formen.
- Rostowzew, Ein interessanter Wohnort wilder Pflanzenformen oder Verzeichniss der auf der »Galitschja Gora« wildwachsenden Pflanzen. S.-A. a. d. Botan. Centralblatt.
- Schütt, Ueber Auxosporenbildung der Gattung *Chaetoceros*. S.-A. a. d. Ber. d. Deutschen bot. Gesellschaft. Jahrgang 1889, Band VII.
- Schröter u. Stebler, Die besten Futterpflanzen. III. Theil. Die Alpen-Futterpflanzen. Bern, Verlag v. K. J. Wyss.
- — Beiträge zur Kenntniss der Matten und Weiden der Schweiz. S.-A. aus dem Landw. Jahrbuch der Schweiz. III, 1889.
- Schröter u. Fischer, Rapport sur une excursion botanique à la Grigna di Mandello. S.-A. d. l. bibliothèque universelle, III. période, tome XXII.
- Schröter, Beiträge zur Kenntniss schweizerischer Blütenpflanzen. S.-A. aus dem Jahresbericht der St. Gallischen naturw. Gesellschaft 1887/1888.
- Taubert, Monographie der Gattung *Stylosanthes*. S.-A. a. d. Abh. d. Bot. Vereins d. Prov. Brandenburg. XXXII.
- Voigt, Localisirung des ätherischen Oeles in den Geweben der *Allium*-Arten. S.-A. a. d. Jahrbuch der Hamb. Wissenschaftl. Anstalten VI.
- Wettstein, Untersuchungen über »*Nigritella angustifolia* Rich.« S.-A. aus dem Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellschaft. 1889. Bd. VII, Heft 8.
- — Studien über die Gattungen *Cephalanthera*, *Epipactis* und *Limodorum*. S.-A. aus der »Oestr. Bot. Zeitschrift«. Jahrg. 1889, Nr. 11 und 12.



C. Geisenhagen ad nat. del.

W. A. Meyn lith.







Fig. 1. *Vigna*
127







Arbeiten aus dem botanischen Institut zu Marburg.

VII. S. Rostowzew: Beiträge zur Kenntniss der Gefässkryptogamen.

1. Umbildung von Wurzeln in Sprosse.

In der Litteratur findet sich eine Anzahl von Angaben über die Umwandlung einer Wurzelspitze in einen Spross. Viele Beobachter erwähnen diese Eigenthümlichkeit bei den verschiedensten Pflanzen, Gefässkryptogamen und Phanerogamen, aber nur in wenigen Fällen ist diese Erscheinung genauer untersucht und sicher nachgewiesen worden, in den meisten anderen bedarf sie noch sehr der Bestätigung. An die erste Stelle der zweifellos constatirten Thatsachen betreffs der Umwandlung einer Wurzelspitze in einen Spross, müssen wir die monocotyle Pflanze, *Neottia nidus avis*, stellen. Viele Autoren, Vaucher¹⁾, Reichenbach²⁾, Irmisch³⁾, Prillieux⁴⁾, Hofmeister⁵⁾, bieten mehr oder minder genaue Angaben über diese Eigenthümlichkeit der Neottia-wurzeln dar und Warming⁶⁾ hat sie genau untersucht. Bei der Umwandlung einer Wurzelspitze in einen Spross bei dieser Orchidee erneuert sich die Haube der Wurzel nicht mehr, die Spitze der Wurzel verengt sich, sie wird weisslich, da die Haube abfällt. Dann erscheinen am Sprosse das erste Blatt und nachher die erste Wurzel des Sprosses. Das Gefässbündel der veränderten Wurzel geht geradezu in den Spross über und dabei verändert sich die Vertheilung des Phloëms und des Xylems im Gefässbündel. Am Querschnitte der Stelle, wo die Wurzel in den Spross übergeht (Fig. 11, Warming'scher Taf. IV) sieht man, dass einige Phloëmelemente nicht nur zwischen Xylempartieen, wie in der normalen Wurzel (Fig. 12, Taf. IV), sondern auch vor denselben liegen. Wahrscheinlich dreht sich hier das Gefässbündel und nimmt also den typischen Stamm-bau an.

Ein anderer zweifelloser Fall der Wurzelspitzenumbildung in einen Spross ist bei *Anthurium longifolium* von Goebel⁷⁾ nachgewiesen. Er

1) Vaucher: Hist. physiologique des plantes d'Europe. IV.

2) Reichenbach: De pollinis orchidearum genesi ac structura. Lipsiae 1852.

3) Irmisch: Beiträge zur Biologie und Morphologie der Orchideen, 1852, und Bot. Zeit. 1857. S. 472.

4) Prillieux: Ann. d. sc. nat. IV. sér. 1852.

5) Hofmeister: Allgem. Morph. S. 428.

6) Warming: Om Rødderne hos *Neottia nidus Avis* L. (Medd. fra den naturhist. Forening i Kjøbenhavn. 1874, N. 1—2).

7) Bot. Zeit. 1878. S. 645.

hat bei einem älteren Exemplar von dieser Pflanze an der Oberfläche des Topfes zahlreiche junge Pflänzchen gefunden, welche, wie die Beobachtungen gezeigt haben, direct an den Wurzelspitzen sassen. Die Veränderungen der Wurzel beginnen nach des Verfassers Beobachtungen damit, dass an der Spitze der Wurzel, welche der Oberfläche des Bodens nahe ist, einige grünliche Schüppchen erscheinen, die bei weiterem Wachsthum des Pflänzchens verkümmern. Nachher bemerkt man eine kleine Einschnürung an der Wurzelspitze; auf die Einschnürung folgt eine knötchenförmige Anschwellung, der erste Knoten des jungen Pflänzchens, welches bald Blätter entwickelt. Das Gefässbündel und der anatomische Bau der Wurzel geht direct in den des Stammes über. In der Wurzel befindet sich ein centrales polyarches Gefässbündel, dessen centraler Theil von einem Strange langgestreckter dickwandiger Bastzellen eingenommen wird. Bei dem Uebergange verschwindet vollständig der Centralskleromstrang und verlaufen die Gefässtheile des Wurzelgefässbündels unregelmässig, geschlängelt und gewunden. Von einem Gefässtheil der Wurzel gehen gewöhnlich zwei Gefässtheile in den Stamm. Querschnitte durch die Uebergangsstelle zeigen, dass an der Aussenseite des Wurzelgefässbündels die Parenchymzellen Theilungen erfahren und der Verfasser glaubt, dass aus diesen Zellen ein Phloëmtheil sich vor jedem Gefässtheil bildet und auf diese Weise das neue Gefässbündel den collateralen Bau erhält. Ob diese Phloëmtheile des Sprosses mit denen der Wurzel in Verbindung stehen, hat der Verfasser nicht nachgewiesen.

In diesen zwei Fällen ist die uns interessirende Erscheinung bei den Phanerogamen zweifellos constatirt. Es gibt auch noch einige zufällige lückenhafte Beobachtungen dieser Erscheinung bei anderen Phanerogamen. Obwohl diese Angaben in Lehrbüchern und in Abhandlungen von vielen Beobachtern ziemlich oft erwähnt worden, sind sie nicht mit Sicherheit nachgewiesen, sie sind zum Theil zweifelhaft und unrichtig. So bemerkt Beer ¹⁾, dass bei *Catasetum tridentatum*, einer Orchidee, »eine vollkommene junge Pflanze sich an der Wurzelspitze bildet.« Diese kurze Bemerkung ist nicht genau genug, um diese Angabe für zweifellos halten zu können. Karsten's Beobachtung über die Entwicklung des Blütenstandes resp. des Sprosses aus einer Wurzelspitze bei einer gefülltblühenden Gartenbalsamine ist unvollständig. Das sieht man schon an den Notizen des Verfassers selbst. Er sagt ²⁾, dass »die umgebildete Wurzel aus der Basis eines Astes entsprossen war« »Das Gewebe der Wurzelmütze war in der Entwicklung augenscheinlich zurückgeblieben, dagegen hatte an deren Stelle die Epidermis mit den äusseren Schichten des Rindengewebes, bis fast zur Spitze hin das Cambium überwachsen,

1) Beer: »Praktische Studien an der Fam. der Orchideen«. Wien 1854. S. 36.

2) Karsten: »Blumenentwicklung aus einer Wurzelspitze«. Flora 1861. S. 232.

aus dem die Blumenknospen sich entwickelt hatten«¹⁾). Diese Beschreibung ist nicht klar genug, um daraus einen sicheren Schluss über das Wesen der beobachteten Erscheinung abzuleiten.

Die Angaben von diesem Verfasser über die Umwandlung der Wurzelspitze in einen Spross bei einer *Dioscorea*²⁾ sind auch nicht gut nachgewiesen und sehr zweifelhaft. Bei mehreren *Dioscorea*-Arten kommen einige unterirdische Knöllchen durch eine eigenthümliche Veränderung der Wurzeln vor. Sachs³⁾ hat solche Knöllchen bei *D. sativa* und *D. Japonica* untersucht. Nach dieser Beobachtung unterscheiden sich aber ganz entwickelte Knöllchen sehr von den echten Wurzeln, da sie keine Haube haben und einen ganz besonderen anatomischen Bau besitzen. Sachs hat beobachtet, dass neue Sprosse sich aus dem dünnen Oberende der Knöllchen entwickeln. Er hat auch einige Knöllchen in 3—10 Stücke geschnitten und an jedem Stück entstand wenigstens eine neue Pflanze; jede von diesen Pflanzen hatte eine Hauptwurzel und einen Hauptspross, verhält sich also ganz ähnlich, wie eine sich aus einem Samen entwickelnde Pflanze. Karsten beobachtete auch die Entwicklung eines Sprosses bei einer unbestimmten *Dioscoree*. Er sagt⁴⁾, »dass an dem unteren Ende dieser Knollen dort, wo früher die Wurzelmütze sich befand, bei der *Dioscorea* sich später Knospen bilden, die einen beblätterten Stamm entwickeln«. Die Angabe Karsten lässt nicht zweifellos erkennen, ob eine wirkliche Wurzelumbildung oder eine Adventivknospe an den Knöllchen vorlag. Vaucher⁵⁾ erwähnt, dass eine Entwicklung eines Sprosses aus einer Wurzelspitze bei einer anderen *Dioscoree*-Gattung — *Tamus* — vorkommt. Aber schon Dutrochet und Mohl⁶⁾ haben darauf aufmerksam gemacht, dass bei *Tamus* das Rhizom eine eigenthümliche Veränderung annimmt: es besteht aus einem einzigen Internodium, welches sich in concentrischen Schichten verdickt und nicht aus axillaren Knospen Stengel treibt, sondern dieselben aus Adventivknospen entwickelt. Dasselbe war wahrscheinlich auch bei Vaucher der Fall.

Unter den Gefässkryptogamen ist die Umbildung einer Wurzelspitze in einen Spross bis jetzt nur bei einer Polypodiaceenart, *Anisogonium seramporenses* Presl durch Lachmann⁷⁾ constatirt. Dieser Beobachter

1) L. c. p. 233.

2) Karsten: Die Vegetationsorgane der Palmen. Berlin 1847. S. 113.

3) Sachs: Stoff und Form der Pflanzenorgane. Arbeit. des bot. Inst. in Würzburg. IV. H. 1882. S. 708.

4) L. c. p. 113.

5) Vaucher: Hist. phys. p. 323.

6) Citaten nach Schnitzlein: Iconoger. I. t. 57.

7) Lachmann: Contributions à l'histoire naturelle de la racine des Fougères p. 159.

hat bei einem grossen, gut entwickelten Exemplare dieses Farns im Gewächshause von Lyon drei Pflänzchen gefunden, welche aus den Enden der Wurzeln entstanden waren. Diese Wurzeln, die Verfasser als »*les racines gemmipares*« bezeichnet, verliefen horizontal, nicht allzu tief unter dem Boden und unterscheiden sich nicht von den anderen unveränderten Wurzeln dieser Pflanze; sie waren von normalem Bau und Ansehen. Ich werde die Gelegenheit haben, noch genauer auf diesen Fall einzugehen. Obwohl der Verfasser nicht jüngere Stadien beobachtet hat, müssen wir annehmen, dass hier thatsächlich eine Wurzelspitze sich in einen Spross umbildet, da die vom Verfasser beobachteten Sprosse direct an den Wurzelenden sassen und das Wurzelgefässbündel direct in das des Sprosses übergeht und da zweitens *Anisogonium seramporenses* dieselbe Pflanze ist wie *Asplenium esculentum* Kr.¹⁾, deren Wurzelspitzenumwandlung in einen Spross ich mit Sicherheit nachgewiesen habe.

Ausser diesem Falle kennen wir keine andere Gefässkryptogamenpflanze, bei welcher die Wurzelspitzenumwandlung in einen Spross vorkommt, obwohl man noch Ophioglossenarten erwähnt, aber das ist nicht richtig. Obwohl verschiedene Autoren, (Mettenius, Hofmeister, Van Tieghem, Fée, Holle, Lecoq, Duval-Jouve und andere) über die Knospenercheinung an den Wurzeln von *Ophioglossum* (*vulgatum*, *pedunculatum*, *nudicale*) und *Botrychium lunaria* bemerken, sieht man nach diesen Beobachtungen nicht, dass die Knospen bei diesen Arten durch eine Wurzelendungveränderung hervorgeht. Vergl. z. B. Angaben von Hofmeister²⁾, Van Tieghem³⁾ und Holle⁴⁾. Zwar sieht man, dass der junge Spross auf einer Wurzel, an der Stelle⁵⁾, wo eine Nebenwurzel erscheinen sollte, sitzt; allein damit ist nicht nachgewiesen, dass sich hier die Nebenwurzel in einen Spross umbildet.

Endlich rechnen einige Autoren zu der Kategorie der Erscheinungen der Wurzelspitzenumwandlungen in einen Spross auch die Entwicklung des Laubsprosses bei Selaginella-Arten, die Pfeffer⁶⁾ beobachtet hat. Bei einigen Selaginella-Arten (*S. laevigata*, *Martensii* und *inaequalifolia*⁷⁾) findet man beblätterte Sprosse an der Stelle der Wurzelträger, besonders dann, wenn die über den Wurzelträgern stehenden beiden Gabelsprosse

1) Vergl. Hooker: Sp. Fil. 3. p. 268: *Asplenium esculentum* = *An. serampurenses*.

2) Hofmeister: Abhandl. der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissensch. 1856. 1. Bd. S. 133.

3) Van Tieghem: Ann. sc. nat. 5. ser. t. XIII. p. 111.

4) Holle: Bot. Zeit. 1875. S. 313.

5) s. Holle, l. c. Fig. 10.

6) Pfeffer: Die Entwicklung des Keimes der Gattung Selaginella. Hanstein's Bot. Abh. Bd. 1, Heft V, 1867. S. 67.

7) Beijerinck (Beobachtungen und Betrachtungen. Amsterdam 1886. S. 16) hat noch solche Sprosse bei *S. denticulata* und *S. Galeottiana* beobachtet.

weggebrochen waren. Jedoch muss man hier zuvor nachweisen, ob die Wurzelträger Wurzeln ohne Haube oder blattlose Sprosse sind.

Nach der oben geführten Betrachtung der wichtigsten Angaben über die Wurzelspitzenumwandlung in einen Spross, sehen wir, dass diese Erscheinung ohne Zweifel nur bei *Neottia nidus avis*, *Anthurium longifolium*, *Anisogonium seramporense* (oder *Asplenium esculentum*) nachgewiesen ist. (Nachher ist die Zahl solcher Pflanzen vergrössert worden etzt können wir zu diesen Pflanzen noch *Platyceriumarten* rechnen. Schon Sachs¹⁾ hat die Vermuthung ausgesprochen, dass bei *Platycerium Willinkii* sich eine Wurzelspitze in einen Spross umbilden kann, und diese Vermuthung ist jetzt durch meine Beobachtungen bestätigt.

Ich habe die Umbildung der Wurzelspitze in einen Spross bei *Asplenium esculentum* Pr. und *Platycerium alcicorne* Desv. untersucht, ausserdem habe ich solche Umwandlung bei anderen *Platyceriumarten*, welche in den Marburger Gewächshäusern cultivirt werden (*Pl. Willinkii* Hr., *Pl. Stemmaria* Desv. und *Pl. Hilli* Moore) beobachtet.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, dem Herrn Prof. Goebel für die Ueberlassung des Untersuchungsmaterials und für das grosse Interesse, welches er für meine Arbeit gezeigt hat, an dieser Stelle verbindlichst zu danken.

Im Spiritusmaterial von *Asplenium esculentum*, welches mir Herr Prof. Goebel liebenswürdig zur Verfügung gestellt hatte, habe ich eine grosse Anzahl junger Sprosse gefunden; wie die nähere Untersuchung ergab, stellten dieselben Wurzelendumwandlung in Sprosse in allen möglichen Entwicklungsstadien dar. Dieses Material war in Rostock von Herrn F. Schulze (früher Universitätsgärtner in Rostock), welcher auf diese Erscheinung schon einige Jahre vor der Publikation Lachmann's aufmerksam machte, von einem grossen Exemplar von *Asplenium* gesammelt worden, welches im Gewächshause des dortigen botanischen Gartens cultivirt wird.

Die umgebildeten Wurzeln waren von verschiedenem Alter und verschiedener Grösse, einige waren sehr jung, fein und kurz, einige waren ziemlich lang und dick (bis 2 mm), also kann die Wurzelspitze in verschiedenem Lebensalter sich in einen Spross umbilden, in einigen Fällen geschieht das wahrscheinlich schon, bevor die Wurzel noch die Rinde ihrer Abstammwurzel durchbrochen hat. Nach den Notizen des Rostocker Universitätsgärtners und so viel man aus dem Spiritusmaterial urtheilen konnte, bilden sich sehr leicht Sprosse aus den Nebenwurzeln solcher Wurzeln, von denen die Spitze abgeschnitten worden ist (Taf. IX, Fig. 1). Man bekommt mit ziemlicher Sicherheit zu Sprossen umgebildete Wurzeln, wenn man ein Stück einer gut entwickelten, gesunden Wurzel von der

1) Sachs: Vorlesungen. 1. Aufl. S. 29.

Pflanze abschneidet, wie die Beobachtungen des Herrn Schulze und die meinigen im Marburger Gewächshause gezeigt haben. Da die von mir untersuchten Sprosse ziemlich klein waren und nur kurze, aber gut entwickelte Blätter hatten, müssen wir annehmen, dass sie sich an solchen Wurzeln bilden, welche nicht tief im Boden liegen, wie das auch Lachmann in Lyon beobachtet hat.

Es ist sehr interessant, dass bei dem *Asplenium esculentum* gewöhnlich nur diese eine Vermehrungsart existirt; fertile Blätter werden hier, soviel bekannt, nur äusserst selten gebildet. Das Rostocker Exemplar, welches massenhaft junge Sprosse aus Wurzeln bildet, hat bisher niemals fertile Blätter entwickelt. Auch in Lyon befindet sich nach Lachmann¹⁾ ein grosses Exemplar dieser Pflanze, an welchem noch nie Sporenbildung beobachtet wurde.

Es ist meine Aufgabe, zunächst zu untersuchen, welche anatomischen Veränderungen in der Wurzel bei ihrer Umbildung zum Spross vor sich gehen. Nach Erledigung dieser Frage wird es interessant sein, auch über die äusseren Ursachen Näheres zu erfahren. Vorläufig kann ich freilich zur Aetiologie nur wenige Angaben machen, welche sich auf Beobachtungen an todttem Material und einige an lebenden Pflanzen stützen. Ich kann nur sagen, dass die umgebildeten Wurzeln der von mir untersuchten Farnarten immer gesund, gut genährt, ihre Rinde reich an Stärke oder an Schleim (bei *Platynerium*) waren, und dass sie nahe der Oberfläche des Bodens oder ganz auf derselben (*Platynerium*) liegen. Eine spätere Fortsetzung meiner Arbeit wird mir hoffentlich gestatten, auf Grund experimentaler Untersuchungen eingehender die Ursachen der Umbildungserscheinung klarzulegen.

Die Wurzeln der von mir untersuchten Farnarten haben ganz normalen Bau. Bei *Asplenium esculentum* und *Platynerienarten* sind sie diarch gebaut und haben viele zweizeilig gestellte Nebenwurzeln (Fig. 1 und Fig. 2). Bei *Asplenium* bildeten sich grösstentheils die Endungen der Hauptwurzeln um (Fig. 1), aber nicht selten auch die der Nebenwurzeln: manchmal konnte man auf einem Wurzelstück viele Sprosse finden, von denen die einen an der Spitze einer Hauptwurzel, die anderen an der der Nebenwurzeln sassen, manchmal beobachtete man einen Spross nicht am Ende der Wurzel, sondern an ihrer Seite (Fig. 1, *Sp'* und folgende Fig.), wie das zu erklären ist, werde ich weiter unten auseinander zu setzen Gelegenheit haben. Bei *Platynerienarten* waren, wie Fig. 2 (*Pl. alcicorne*) zeigt, die Haupt- und Nebenwurzeln zu Sprossen umgewandelt und bei *P. alcicorne* fanden sich nicht selten eine grosse Anzahl solcher Sprosse dicht bei einander. Bisweilen war aber bei *Pl. alcicorne* und grösstentheils bei anderen *Platynerienarten* auch an einem grösseren

1) L. c. p. 159.

Wurzelstück nur eine einzige Umwandlung zu finden. Die Zahl der Sprosse ist vom Alter der Mutterpflanze abhängig.

Die Wurzeln der beiden Farnarten haben eine tetraedische Scheitelzelle, der Vegetationspunkt ist mit einer gut entwickelten Haube bedeckt. Bei *Platycerium* ist die Scheitelzelle ziemlich tief in das Meristemgewebe der Wurzel eingesenkt. Bei *Asplenium* liegt die Scheitelzelle hoch und tritt aus dem Meristemgewebe der Spitze empor, so dass das Ende der Wurzel zugespitzt ist (Fig. 1), bei *Platycerium* ist es stumpf (Fig. 2), da die Wurzelhaube bei dieser Art etwas weniger entwickelt ist als bei *Asplenium*. Die Oberfläche der Neben- und Hauptwurzeln ist bei *Platycerium* in ihrer ganzen Länge, wie meistens bei epiphytischen Pflanzen, dicht mit braunen Haaren bedeckt (Fig. 2); bei *Asplenium* (Fig. 1), als bei einer Landpflanze, stehen die Haare nur an einer kurzen Strecke des Wurzelendes unweit von ihrer Spitze. Die braunen Haare des *Platycerium* sind ziemlich lang, am Ende bisweilen verzweigt und einige von ihnen stellen eine dünne Röhre dar, welche von Pilzfäden und Conidien überragt ist. Die Wände der Haare sind braun und bestehen aus umgewandelter Cellulose, welche der Wirkung der kochenden Kalilauge und Schwefelsäure widersteht, nur das Ende einiger Haare ist farblos und es besteht aus reiner Cellulose; bisweilen fällt dieses farblose Ende bei dem nächsten Haarwachsthum ab und es bildet sich dann eine dünne Röhre. Die jüngsten, dicht an der Wurzelspitze stehenden Haare sind ganz farblos. Man muss annehmen, dass die alten Haare die Function haben, die Wurzel gegen starke Wasserverdunstung und gegen das Austrocknen zu schützen, während die jüngsten Haare das Wasser und die Nährstoffe aus dem Substrat absorbieren. Wahrscheinlicher wird diese Annahme noch durch den Umstand gemacht, dass die Wände der Epidermiszellen weiter rückwärts von der Wurzelspitze ebenfalls incrustirt und zur Wasseraufnahme unfähig gemacht sind.

Von der Pilzinfektion kann ich nur einige Worte sagen. Einige sehr dünne Hyphen des Pilzes, dessen Natur nicht nachgewiesen ist, umschlingen manchmal sehr dicht einige Haare, treten in dieselben ein, entweder durch ihre Oeffnungen oder mit Durchbrechung ihrer Wände. Die Hyphen strecken sich durch die ganze Länge des Haares, manchmal verzweigen sie sich und bilden in einer Epidermiszelle einen Knäuel. Diese Hyphen sind sehr dünn und fein und haben zerstreute glänzende Körper. Nicht selten beobachtet man Conidienbildung dieses Pilzes, welche in der Weise vor sich geht, dass das Ende einer Hyphe Conidien abschnürt, manchmal bilden sich die Conidien auch mitten in einer Hyphe, indem eine Partie derselben anschwillt und sich zu Sporen umbildet. Die Conidien bilden sich massenhaft und eine Epidermiszelle und Haare waren völlig mit derselben erfüllt.

Die Zellen der Wurzelrinde haben incrustirte Cellulosemembranen von gelblicher Farbe, die äusseren sind dunkler als die inneren; auf den porösen Membranen sieht man sehr klar ohne Behandlung mit Reagentien eine Streifung. Die Rinde hat folgenden Bau: ihre erste Schicht besteht aus tafelförmigen Zellen, deren grosser Diameter auf Querschnitten radial gerichtet ist, bei anderen Schichten (4—6) der Rinde ist der grosse Diameter tangential gerichtet. Das Gefässbündel ist von einem gut entwickelten Sklerenchym geschützt. Die sklerenchymatischen Zellen sind dunkelbraun, mit sehr verdickten Wänden und von Porenkanälen durchzogen. Das sklerenchymatische Gewebe bildet im Querschnitt entweder zwei halbmondförmige Platten, welche den Phloëmtheilen gegenüber liegen, oder einen vollen Ring. Das diarche Gefässbündel ist mit gut entwickelter Endodermis umringt; auf die Endodermis folgt nach innen zu der Pericikel (oder Protophloëm), welcher beinahe aus drei Schichten Zellen besteht, von denen die der ersten Schicht fast doppelt so gross sind als die der anderen. Das Phloëm besteht aus zwei Partien, welche dem Xylem anliegen. Die mittleren Elemente des Xylems sind bisweilen unverholzt.

Bei *Asplenium* erfahren die Wurzelhaare keine solche Veränderung, wie bei *Platyserium*, und sterben bald ab. Die Rinde besteht aus Zellen von beinahe isodiametrischem Querschnitt, welche in der Mitte der Rinde grösser sind, als an ihren Grenzen. Ihre porösen Membranen sind in den innersten Schichten der Rinde am dicksten, nach aussen zu nehmen sie allmählich an Dicke ab; sie sind braun. Also bildet sich ringsherum um das Gefässbündel eine Röhre von dickwandigen Zellen. Das diarche Gefässbündel hat eine gut entwickelte Endodermis, einen Pericikel, welcher aus zwei Schichten von Zellen besteht, von denen die am Xylem anliegenden kleiner sind als die anderen.

Bei einigen so gebauten Wurzeln tritt zu einer Zeit, unter dem Einfluss noch nicht bekannter Bedingungen eine Veränderung der Theilung der tetraedrigen Scheitelzelle ein, d. h. sie beginnt nur nach drei Richtungen sich zu theilen, die Abgrenzung eines oberen Segmentes, welches zur Bildung der Wurzelhaube nöthig ist, unterbleibt, die Scheitelzelle zeigt also gleiches Verhalten, wie die des Sprosses, die Wurzel bildet sich also direkt in einen Spross um. Das ist das erste Stadium der Umbildung. Die Theilungen in der Scheitelzelle setzen sich in derselben Ordnung fort, aber die Sprosssegmente theilen sich auf andere Weise, als die der Wurzel, und dadurch ist die Grenze zwischen dem Sprosse und der Wurzel leicht zu bestimmen (Fig. 3). Die Sprosssegmente theilen sich durch Wände nach den drei Richtungen des Raumes und es bildet sich also ein Zellkörper, welcher bei *Asplenium* zugespitzt (Fig. 3), bei *Platyserium* (Fig. 4) anfangs etwas vertieft und nachher flach ist. Dieser Zellkörper besteht zuerst aus meristematischem Gewebe, aber schon früh tritt eine Differenzirung derselben ein. Die äusseren Zellen des Zellkörpers

nehmen parenchymatischen Charakter an (Fig. 3, 4), in dem Centrum des Körpers erscheinen langgestreckte Elemente, welche das Gefässbündel bilden; an der Spitze des Körpers rings um die Scheitelzelle befindet sich meristematisches Gewebe und bei *Platynerium* besteht die erste Schicht desselben aus tafelförmigen Zellen, welche perpendiculär zur Oberfläche angeordnet sind.

Die ersten Stadien der Wurzelumbildung sind ohne Schnitte sehr schwer zu erkennen. Es giebt nur ein Merkmal, und namentlich, wenn die Wurzelspitze sich in einen Spross umgewandelt hat, so verlängert sich die Wurzel nicht mehr so rasch und die Wurzelhaare stehen also näher an der Wurzelspitze, als auf den unveränderten Wurzeln, besonders beobachtet man das bei *Platynerium* (Fig. 2). Nachher, wenn der Zellkörper schon ausgebildet ist, kann man leicht die veränderten Wurzeln von den normalen unterscheiden, da sie an ihrem Ende fast kugelförmig angeschwollen sind (Fig. 1, 2).

Die Haube bleibt ziemlich lange an dem Sprosse hängen, man findet sie noch bei *Asplenium*, wenn schon das erste und zweite Blatt, bei *Platynerium*, wenn schon das Mantelblatt und 1—2 Laubblätter ziemlich entwickelt sind. Am Anfange der Wurzelumbildung theilen sich die jüngsten Segmente der Haube fort, wie bei einer normalen Wurzel (Fig. 3), bei *Platynerium* dauern diese Theilungen länger fort als bei *Asplenium*, da die Haube beim ersteren (Fig. 4) inniger mit der veränderten Wurzelspitze verbunden ist, als bei dem letzteren; bei diesem ist sie nur an ihrem unteren Theile mit der Wurzelspitze verbunden (Fig. 3), bei *Platynerium* dagegen mit ihrer ganzen unteren Fläche (Fig. 4).

Die Anlage des ersten Blattes, des Mantelblattes, bei *Platynerium* tritt sehr früh ein, und sowohl diese Anlagen, als auch der Vegetationspunkt des Sprosses, sind durch gegliederte und kopfförmige drüsige Haare geschützt, bei *Platynerium* finden sich nicht so viele wie bei *Asplenium*, bei *Platynerium* erscheinen zu diesem Zwecke noch so viele Schuppen (Paleae), welche in Spiralen angeordnet sind. Die Anlagen des Blattes, des Haars und der Schuppe sind eine einzige Zelle der meristematischen Oberfläche der Sprossspitze. Sie ragt empor und bei der Blattanlage ist sie viel grösser als bei Haaren und Schuppen. Diese primäre Zelle verhält sich verschieden bei der Blatt-, Haar- und Schuppenbildung; bei der Bildung des ersten Organs theilt sie sich nach drei Richtungen und bildet einen Zellkörper, bei der Haarbildung theilt sie sich nur durch quere Wände und bildet eine Reihe von Zellen, bei Schuppenentwicklung bildet sich eine einschichtige oder bisweilen mehrschichtige Lamelle. Die Schuppenanlagen bei *Platynerium* dringen in die Haube ein (Fig. 4), welche dadurch Zacken bildet und erscheint also eine feste Verbindung der Haube mit dem Sprosse. Deswegen verhält sich die Haube bei weiterem Sprosswachsthum bei *Asplenium* und *Platynerium* verschieden. Bei ersterem

spannt der wachsende Spross die Haube, welche dadurch allmählich abstirbt. Endlich wird dieselbe durch das starke Drängen des Sprosses zersprengt. Es werden dabei entweder einzelne Fetzen gebildet, welche noch einige Zeit lang an der Basis des Sprosses hängen bleiben (Fig. 5, 6), oder aber die Haube reißt mit einem Male an ihrer Anheftungsstelle los und wird in toto abgeworfen. Die junge Sprossanlage wird dort nackt, sie hat schon ein gut entwickeltes erstes Blatt, welches typisch schneckenförmig eingerollt ist und direct am Vegetationspunkte anliegt, sie hat auch die Anlage des zweiten Blattes. Die erste Wurzel durchbricht bald die Rinde des Sprosses, die Anlage dieser Wurzel erscheint sehr früh, gleichzeitig mit der Blattanlage oder vielleicht noch etwas früher. Diese Wurzel verlängert sich rasch und dringt in den Boden ein, fast gleichzeitig mit der ersten Wurzel erscheint die zweite und der Spross entwickelt sich weiter, das erste Blatt entfaltet sich und der Spross kann nun selbständig vegetiren (Fig. 7), sodann bilden sich, wie in gewöhnlichen Fällen, mehr Blätter und Wurzeln aus. Wie schon oben gesagt wurde, können sowohl Haupt- als Nebenwurzeln zu Sprossen umgebildet werden, und daher ist die Lage der Sprosse an der Wurzel verschieden. In einigen Fällen sitzt der Spross ganz am Ende der Wurzel (Fig. 1, 3, 5, 7, 8), in diesen Fällen wächst der Spross anfangs in der Richtung der Wurzel (Fig. 3, 5), aber bald tritt eine geotropische Krümmung ein (Fig. 5, 6, 7, 8). Wenn der Spross auf Hindernisse stösst, wie Steinstücke, Wände des Culturtopfes u. s. w., so nimmt er sehr verschiedene Gestalt an. Ich habe z. B. einen Spross gesehen, bei welchem das schon aufgerollte erste Blatt spiralig gekrümmt war. Der viel länger als gewöhnlich entwickelte Sprosshöcker (erster Zellkörper) war umbogen und nur der Theil des Sprosses mit dem zweiten und dem dritten Blatte hatte normale Lage und Gestalt. Fig. 8 stellt auch einen Spross dar, welcher auf ein Hinderniss gestossen war. Die umgewandelte Wurzel kann bisweilen Nebenwurzeln entwickeln, die um den Spross herum in der ursprünglichen Richtung der umgebildeten Wurzel weiter wachsen, so dass es bisweilen aussieht, als ob der Spross seitwärts aus der Wurzel hervorgewachsen sei.

Ganz verschieden von diesem Verhalten ist ein anderes Vorkommen von Sprossanlagen, welches man häufig beobachten kann und bei welchem der Spross thatsächlich seitlich an einer Wurzel entspringt. Dieser Umstand findet seine Erklärung dadurch, dass hier eine noch nicht ganz entwickelte Nebenwurzel in einen Spross umgewandelt ist (Fig. 9, 11). Solche Umbildung tritt an Nebenwurzeln entweder ziemlich weit von der Spitze der Hauptwurzel (Fig. 9, 10) oder ganz in der Nähe derselben (Fig. 11) auf. Im letzteren Falle hört die Spitze der Hauptwurzel grösstentheils auf weiter zu wachsen, beim ersten Falle wächst sie gewöhnlich weiter (Fig. 12) und es erscheinen dann neue Nebenwurzeln (Fig. 10), die sich bisweilen ebenfalls in einen Spross umbilden können. Da die in der

Nähe stehenden unveränderten Nebenwurzeln bisweilen den entstandenen Spross in dichtem Gewirre umgeben, ist es schwer, sich über die Insertion des letzteren zu orientiren.

In den Fällen, in welchen eine noch nicht entwickelte Nebenwurzel in einen Spross umgewandelt ist, kann häufig der Anschein erweckt werden, als ob hier eine Adventivknospen-Bildung vorläge. Dass das nicht der Fall ist, lässt sich durch anatomische Untersuchung oft sehr schwer feststellen; indess giebt es andere Gründe, welche darthun, dass hier die Umwandlung einer sehr jungen Nebenwurzelanlage stattgefunden hat. Es stehen solche Sprossanlagen stets in der Reihe der unveränderten Nebenwurzeln (Fig. 9, 10, 11), und ferner sehen wir, dass sonst die Umwandlung einer Nebenwurzel in einen Spross in jedem beliebigen Alter der Wurzel eintreten kann. Da fernerhin die Wurzeln bald kurz, bald lang sind, können wir wohl annehmen, dass sich die Sprossanlagen bereits dann gebildet haben, wenn die Wurzelspitze noch nicht das Rindengewebe durchbrochen hat.

Da die Wurzelhaube in den ersten Stadien der Sprossentwicklung noch vorhanden ist, sieht man keine äussere Grenze zwischen dem Sprosse und der Wurzel, erst später kann man sie bestimmen. Das ist dadurch bedingt, dass die Epidermis der Wurzel unterbrochen wird und dass der Sprosshöcker angeschwollen und seine seitliche Oberfläche aus parenchymatischen Zellen gebildet ist (Fig. 5). Die kreisförmige Erhebung, die Lachmann'sche »saillie circulaire«¹⁾, sieht man nur auf ganz entwickeltem Sprosse, wenn die geotropische Krümmung desselben schon eingetreten ist und sieht man das nur selten. An den Längsschnitten erkennt man die Grenze sehr deutlich, sowohl in den der jüngeren Stadien, als wie in den der älteren, da die Rinde und Gefässbündel des Sprosses anderen Bau haben, als die der Wurzel.

Bei *Platyserium* bietet die Wurzelumwandlung nicht solche Mannigfaltigkeiten dar, wie bei *Asplenium*. Hier habe ich niemals eine seitliche Sprossanlage beobachtet. In einen Spross aber können sehr kurze Nebenwurzeln sich umbilden, sie haben schon die Rinde der Abstammwurzel durchbohrt, manchmal liegen sie sehr nahe bei einander, also erscheint eine ganze Reihe von Sprossen (Fig. 2). Die Zahl der Sprosse, welche auf einem Exemplar der Pflanze erscheinen können, ist verschieden. Einige nicht sehr grosse Exemplare in den Marburger Gewächshäusern haben eine ganze Menge Sprosse in den verschiedensten Entwicklungsstadien (Goebel, Pflanzenbiolog. Schild. S. 227). Die Scheitelzelle bei der normalen Wurzel ist, wie schon erwähnt, ziemlich vertieft und der ganze Vegetationspunkt mit der Haube bedeckt. Die Scheitelzelle bleibt auch bei der Wurzelspitzenumbildung einige Zeit vertieft, aber nachher, wenn

1) L. c. p. 160.

die Sprossanlage schon gut entwickelt ist, in der Form eines cylindrischen Höckers (Fig. 4), liegt sie in der platten Scheitelfläche des Höckers. Das Auftreten der Schuppen und ersten Organanlagen am jungen Sprosse, sowie das Verhalten der Wurzelhaube, sind bereits oben geschildert worden. Die Scheitelzelle der umgebildeten Wurzel giebt nach drei Richtungen Segmente ab, die älteren von denen stellen eine rechtwinklig gebogene Tafel dar (Fig. 4). Die Segmente theilen sich nach allen drei Richtungen des Raumes, aber peripherische Zellen sind immer tafelförmig und geben die Anlagen der Schuppen und der Blätter. Die Blätteranlagen und einige Schuppen sind mit drüsigen und verzweigten sternförmigen Haaren bedeckt. Durch die Thätigkeit der Scheitelzelle und durch die der peripherischen Zellen der Segmente wird die Scheitelfläche des Sprosses vergrößert und etwas abgerundet, indem sich die mittlere Partie emporwölbt und die anfangs in gleicher Höhe liegende Randpartien der Scheitelfläche an die Sprosseiten gerückt werden. Die Schuppen, an welchen die Haube festhing, werden durch das Wachsthum des Stammscheitels nach abwärts gerückt, die Haube zerreisst und die einzelnen Fetzen derselben werden braun und sterben ab.

Der junge Vegetationspunkt und die jungen Blätter sind sehr gut durch die Schuppen geschützt. Diese Schuppen legen sich dicht aneinander an. Die mehrschichtigen unter ihnen enthalten viele verdickte, braune, sclerenchymatische Zellen, wodurch die Schutzthätigkeit der Schuppen sich vergrößert. Als Schutz des Sprosses spielt ohne Zweifel auch der Schleim eine grosse Rolle, von welchem jede lebende Zelle des Sprosses erfüllt ist.

Sowohl bei *Asplenium* als bei *Platyserium* geht das Gefässbündel der umgebildeten Wurzel direct in den Spross über. Diese Eigenthümlichkeit hält Lachmann¹⁾, welcher die ersten jungen Stadien der Sprossentwicklung nicht beobachtet hat, für den zweifellosen Beweis für die Umbildung der Wurzelspitze in den Spross. Aber seine Beobachtungen über den Gefässbündelübergang sind nicht ausführlich.

Bei den beiden untersuchten Arten ist der Gefässbündelübergang gleichartig. An Querschnittserien sieht man, besonders nach Behandlung mit Phloroglycin und Chlorzinkjod sehr klar diesen Uebergang. Die Strangscheide, welche bei *Asplenium* aus dickwandigen parenchymatischen, bei *Platyserium* aus sclerenchymatischen Zellen besteht, verschwindet allmählig im jungen Sprosse; die Endodermis geht ohne Veränderung in den Spross, der Pericykel wird bei dem Uebergang mehrschichtig. Noch grössere Veränderungen treten in den wichtigsten Theilen des Gefässbündels im Xylem und im Phloëm ein (Fig. 13—17). Das Gefässbündel ist, wie schon oben erwähnt, diarch. Die erste Veränderung besteht

1) L. c. p. 162.

darin, dass das Xylem nicht mehr mit dem Pericykel in Berührung steht, sondern zwischen ihnen enge Phloënzellen erscheinen. Ein grosser Theil des Xylems in der Mitte des Bündels bleibt unverholzt (Fig. 13), dann erscheinen die Xylemelemente rechts und links, indem das Xylem sich in zwei Stücke theilt und eine Drehung macht, in den Raum zwischen den Xylemstücken ragt das Phloëm hinein (Fig. 14, 15) und nachher nimmt das Gefässbündel concentrischen Aufbau an (Fig. 16). Das Phloëm ist auf beiden Seiten des Xylems ausgebildet, in der Mitte des Bündels liegt eine Partie parenchymatischer Zellen, welche bei *Platynerium* bald dunkelbraun werden und absterben. In der weiteren Umbildung, zur Zeit der Erscheinung des ersten Blattes, entsteht aus diesem ringförmigen Gefässbündel allmählich ein hufeisenförmiges (Fig. 17) und später theilt sich dasselbe in zwei Bündel, welche den normalen Charakter des Stammgefässbündels haben. Das Netz des Verlaufes des Gefässbündels im jungen Sprosse ist dasselbe wie im Stamm. Es kommt vor, dass das Gefässbündel, während es bei dem Uebergange die oben beschriebenen Veränderungen durchläuft, Seitenstränge an Nebenwurzeln abgibt.

Die Resultate dieser Arbeit sind folgende:

1. Bei *Asplenium esculentum* Pr. und *Platynerienarten* (*P. alcicorne*, *P. stemmaria*, *P. Hilli*, *P. Willinkii* Hr.) kann die Wurzel sich direct in einen Spross umbilden. Diese Umbildung kann in den verschiedenen Altersstadien der Wurzel vor sich gehen.
2. Bei dieser Umbildung wird die Scheitelzelle der Wurzel direct zur Scheitelzelle des Sprosses.
3. Das Gefässbündel geht direct in den Spross über, indem es ähnliche Veränderungen durchläuft, wie im hypocotylen Glied der Embryonen höherer Pflanzen.

Die sichere Nachweisung der ähnlichen Umwandlung der Wurzelspitze in einen Spross hat eine grosse Bedeutung in Betreff der Definition der morphologischen Dignität der Wurzel. Wir kennen jetzt nur wenige Eigenthümlichkeiten, durch welche wir die Wurzel von dem Sprosse unterscheiden können und in einigen Fällen sind sie nicht constant und absolut und können sich verändern durch einige Einflüsse und die Wurzel kann zum Spross werden. Hier ist zu erwähnen, dass die Angabe von Beijerinck¹⁾, wenn richtig, von grossem Interesse wäre. Er will beobachtet haben, dass bei *Rumex Acetosella* ein junger Spross, welcher aus einer adventiven Knospe der Wurzel entstanden ist, sich in eine Wurzel umbildet. Die Beijerinck'sche Beschreibung dieser Beobachtung und die dazu gegebenen Figuren (Taf. I, Fig. 8, 9, 10 u. s. w.) erweisen indess seine Meinung nicht. Aus den Wurzeln von *Rumex Acetosella* bilden sich viele Nebensprosse und Nebenwurzeln dicht beisammen. So

1) L. c. S. 39.

z. B. in Fig. 9 sieht man nicht klar, ob der Theil, den Beijerinck als Vorblatt bezeichnet hat, thatsächlich ein Blatt ist, oder ein Stück von der zerrissenen Rinde. Die Umwandlung einer Sprossanlage in eine Wurzel müsste also erst noch sicher erwiesen werden; bis jetzt ist es nur zweifellos bekannt, dass bei einigen Pflanzen eine Wurzelspitze zum Sprosse werden kann.

Erklärung der Figuren.

Die Buchstaben haben in allen Figuren die gleiche Bedeutung.

- Fig. 1. Ein Stück der Wurzel von *Asplenium esculentum*. Natürliche Grösse.
Sp = Spross am Ende der Wurzel, *Sp*₁ = an der Seite derselben.
- Fig. 2. Ein Stück der Wurzel von *Platycerium alcicorne* Natürl. Grösse.
*Sp*₁ = Spross mit Mantelblatt.
- Fig. 3. Längsschnitt eines jungen Sprosses von *Asplenium esculentum* 180/l.
Ep = Epidermis der Wurzel, *Hb* = Haube.
- Fig. 4. Längsschnitt eines jungen Sprosses von *Platycerium alcicorne* 100/l.
Pl = Paleae; *Schz* = Scheitelzelle; *jH* = junge Haare; *H* = Haare; *Gfl.* = Gefässbündel; *Sc* = Sclerenchymscheide. Die obere punktirte Linie = Grenze des Meristems des Sprosses. Die untere punktirte Linie = Grenze des Sprosses und der Wurzel.
- Fig. 5. Längsschnitt eines ziemlich entwickelten Sprosses von *Asplenium esculentum* 260/l. *Schz* = Scheitelzelle des Sprosses; *W*₁ = erste Wurzel des Sprosses; *B*₁ = erstes Blatt, schief geschnitten; *B*₁₁ = Anlage des zweiten Blattes.
- Fig. 6. Junger Spross von *Asplenium esculentum*. Vergröss. *Hb*₁ = innere Schichte der Haube; *G* = Grenze, an welcher die Haube abgerissen ist.
- Fig. 7. Junger Spross von *Asplenium esculentum* 5/l. *W* = Abstammwurzel; *W*₁₁₁ = Anlage der dritten Wurzel des Sprosses.
- Fig. 8. Junger Spross von *Asplenium esculentum* 5/l.
- Fig. 9. Ein Stück der Wurzel von *Asplenium esculentum* 10/l. *Nbw* = Nebenwurzel; *Rn* = Rinde.
- Fig. 10, 11. Wurzeln (*W*) von *Asplenium esculentum* mit Sprossen.
- Fig. 12. Junger Spross von *Asplenium esculentum*.
- Fig. 13–17. Querschnitte der Wurzel und des Sprosses bei *Platycerium alcicorne*. *Sc* = Sclerenchymscheide; *En* = Endodermis; *P* = Pericikel; *Ph* = Phloëm; *X* = Xylem; *Pr* = Parenchympartie.

Untersuchungen über normale und abnorme Marsilienfrüchte.

Von
M. Büsgen.

Die Resultate der Russowschen Untersuchungen über die Sporenfrüchte der Marsilien haben zum ersten Male die Möglichkeit nahe gerückt, die anscheinend endogene Bildung der Sporangien dieser Pflanzen mit dem Entstehungsmodus der Sporangien der homosporen Leptosporangiaten in Einklang zu bringen und so der Stellung der Marsiliaceen in der Nähe jener Farngruppe eine sichere Basis zu verschaffen. Russow (Vergl. Unter. etc. Mém. de l'acad. imp. d. sc. de St. Petersburg VII. sér. t. XIX No. 1 1872) fand auf der Bauchseite junger Früchte zwei Längsfurchen, in denen in acropetaler Folge Grübchen oder trichterförmige Einsenkungen auftreten, deren Zahl der der später sich bildenden Sori entspricht. Die letzteren entstehen aus je einer Reihe von Initialzellen, welche einwärts von jedem Trichter in der Richtung von dessen idealer Fortsetzung gelegen sind. Zwischen den dem dorsoventralen Längsschnitte der Frucht zugewandten Scheiteln dieser Initialzellen und dem mittleren Innengewebe der Frucht soll sich durch Trennung ein Intercellularraum bilden, der Soruscanal, der mit dem Grübchen in offener Verbindung steht. »Könnte nachgewiesen werden« sagt Alexander Braun in Anknüpfung an ein Citat der Russowschen Beobachtungen, »dass der Soruscanal selbst eine directe Fortsetzung des Grübchens ist, eine Annahme, mit welcher die Darstellung Russows vielleicht nur in scheinbarem Widerspruch steht, so würde das so sehr abweichende Verhalten in der Lage der Sori von Marsilia sich vollkommen anreihen an das der Farne mit eingesenkten Häufchen der Sporangien (Antrophyum, Vittaria, manche Polypodien etc).« Trotzdem Braun diese Aeusserung bereits im Jahre 1872 gethan hat (Monatsber. d. Berliner Acad. a. d. Jahre 1872 p. 653), ist erst Goebel 1882 wieder auf den betreffenden Punkt eingegangen. Gelegentlich seines Aufsatzes über die Frucht von *Pilularia globulifera* (Bot. Ztg. 1882 Nr. 45) theilt er kurz mit, dass nach den Bildern, welche er bei der Untersuchung sehr junger Früchte von *Marsilia macra* A. Br. erhalten habe, der Soruscanal schon wahrnehmbar ist, wenn die Placenta eben auftritt. Er findet in ihm thatsächlich eine directe Fortsetzung der Grübchen und gelangt in Folge dessen zu der Ansicht, dass bei der Fruchtbildung der Marsilien derselbe Vorgang statthabe, den er für *Pilularia* nachweisen konnte, d. h. »es bilden sich die Placenten in Vertiefungen der Fruchtanlagen, sie gehen aber überall aus Oberflächenzellen hervor, und die Fruchtbildung der Marsiliaceen schliesst sich ebenso der der homosporen Farne an, wie die der Salviniaceen«.

Die Angaben Goebels über *Pilularia* haben neuerdings durch Meunier (La cellule. Rec. de cytologie et d'histol. générale. t. IV. 2. fasc. p. 320)

eine ausführliche Bestätigung gefunden. Um so weniger Grund würde nach seinen eben citirten Aeusserungen über *Marsilia* vorgelegen haben, die Entwicklungsgeschichte von deren Früchten einer erneuten Untersuchung zu unterziehen, wenn nicht die Auffindung einer eigenthümlichen Metamorphose Anlass dazu gegeben hätte. Im vergangenen Herbst entdeckte ich bei *Marsilia hirsuta* im Uebrigen normale Blätter, deren Spreitentheile in verschiedenem Grade in Früchte umgewandelt waren, welche zweifellos endogen entwickelte Sporangien führten. Ein Vergleich dieser Missbildungen mit den normalen Früchten musste entweder zu einer veränderten Auffassung der letzteren führen oder ein neues und schlagendes Beispiel dafür liefern, wie sehr die Berücksichtigung derartiger Erscheinungen in morphologischen Fragen den wahren Sachverhalt verdunkeln kann.

I. Die Entwicklung der normalen Früchte einiger Marsilien.

Russow hat die Fruchtentwicklung bei *Marsilia Drummondii*, *M. elata* u. *M. salvatrix* untersucht. Von diesen drei Arten stand mir leider kein geeignetes Material zu Gebot. Alle für die Erkenntniss der Anlage der Sori wichtigen Entwicklungsstadien fand ich bisher nur bei *M. macra*; jedoch lieferten mir andere Arten wenigstens einzelne Zustände, welche den Schluss gestatten, dass sie sich ebenso verhalten wie die genannte Form.

Marsilia macra Al. Br. gehört zu den Arten, welche eine oder wenige nicht sehr lang gestielte Früchte an den fertilen Blättern entwickeln. Dieselben entspringen dem Blattstiele oft so nahe an der Basis, dass bei dem ersten Blicke nicht zu unterscheiden ist, ob ihre Stiele thatsächlich an dieser oder z. T. an dem die Blätter tragenden Hauptstamme inserirt sind. Mitunter ist ein Fruchtsiel verzweigt und jeder Zweig trägt eine Frucht. Die microscopische Untersuchung lehrt, dass die Tracheiden des Fruchtsieles, welcher der Blattinsertion am nächsten steht, sich entweder mit denen des Blattstieles vereinigen, ehe dessen Gefässbündel in das des Hauptstammes einmündet oder wenigstens gleichzeitig mit den beiden letzteren verschmelzen. Ein Theil der an einer Blattbasis stehenden Früchte kann übrigens zu nur wenige Millimeter hoch entwickelten Blättchen der nächsten Seitenknospe gehören. Auch am Hauptstamm kommt es vor, dass nur die Frucht sich entwickelt, während das sie erzeugende Blatt selbst ganz zurückbleibt; niemals aber kam mir eine Frucht vor Augen, welche nicht mit einem Blattstiele verbunden gewesen wäre. Die erste Anlage einer jungen Frucht zu sehen gelang mir nur zweimal mit einiger Sicherheit. Im einen Falle erschien dieselbe als eine scheinbare grosse Lücke im Zellgewebe des jungen Blattes, wenige Zellschichten unterhalb seiner Scheitelzelle, das andere Mal als stumpfe Vorwölbung. Beide Male war das Blatt selbst erst zu einem stumpfen Höcker

entwickelt, welcher noch keine Spur einer Spreitenanlage erkennen liess. Wenn die Blattfiedern eben hervorzutreten beginnen, ist an der jungen Frucht schon Stiel und fertiler Theil zu unterscheiden. Der erstere ist noch sehr kurz und gegen letzteren durch eine Krümmung abgesetzt; der fertile Theil wendet sich etwas nach aufwärts und bekommt einen schwach concaven Rücken, sodass nun die ganze Anlage nicht mehr mit einem jungen Blatte zu verwechseln ist, welches schon sehr frühe nach dem Stammscheitel zu eingekrümmt erscheint. In der allerersten Jugend verhalten sich Blatt- und Fruchtanlage ganz gleich. Beides sind mit grosser Scheitelzelle wachsende Höcker.

Aus dem Gesagten geht erstens hervor, dass die Früchte von *Marsilia macra* Auszweigungen der Blätter sind, zweitens aber, dass sie nicht etwa je einer älteren Blattfieder entsprechen, sondern, der Entwicklungsgeschichte nach, als dem gesammten sterilen Blatte äquivalente Blatttheile zu betrachten sind. Die Blattfiedern werden ganz anders angelegt. Sie besitzen in der ersten Anlage keine Scheitelzelle, sondern zeigen, wie schon Hanstein fand und ich bestätigen kann, von vornherein Randzellenwachsthum.

Am Stiel der jungen Frucht beginnt sehr bald die Bildung der bekannten langen Haare. Dieselbe stört aber die weitere Untersuchung zunächst nicht, da sie erst verhältnissmässig spät auf die Frucht selbst übergreift und auf dieser dann langsam vom Rücken her über die Flanken zum Bauche fortschreitet. Es gelingt ziemlich leicht, die Fruchtspitze aus dem Haarwalde des Stieles herauszuschneiden. Behandelt man sie dann mit Eau de Javelle, so erhält man Objecte, deren ganzer Bau, Zelle für Zelle ohne besondere Schwierigkeiten sich feststellen lässt.

Die zweischneidige Scheitelzelle der jungen Frucht ist so orientiert, dass die Durchschnittslinien ihrer beiden Innenwände nach dem Rücken und Bauch, die Segmente also nach den Flanken der Frucht hin zu liegen kommen. Schon nach den ersten Theilungen der Segmente durch longitudinale Antiklinen tritt ein Unterschied zwischen Rücken und Bauch der Frucht hervor. Die dem ersteren zugewandten Segmentstücke wachsen unter Theilungen nach verschiedenen Richtungen zu polygonalen Zellen heran, welche sehr rasch keine auf ihre Abkunft deutende Anordnung mehr erkennen lassen. Ihre weiteren Schicksale sind für uns ohne Interesse.

Die bauchsichtigen Segmenttheile dagegen erfahren sehr regelmässige Theilungen, von welchen die ersten bereits für die Anlage der wichtigsten Theile der Frucht von Bedeutung sind. Sie zerfallen durch weitere longitudinale Antiklinen in ungleiche Stücke, je ein kleineres bauchsichtiges und ein längeres mehr auf der Fruchtflanke gelegenes. Letzteres giebt weiterhin noch ein kleines bauchsichtiges Stück ab, so dass endlich die Mittelfläche der Fruchtbauchseite in der Oberflächenansicht vier parallele Längsreihen anfangs äquidimensionaler, später etwas längsgestreckter

Zellen zeigt. Die Glieder der beiden mittleren Reihen können sehr regelmässige Gestalt besitzen, während der Umriss der den äusseren Reihen angehörigen durch die in den angrenzenden Segmentstücken stattfindenden Wachsthumsvorgänge beeinflusst wird. (Fig. 1.)

Die genannten grösseren Stücke der bauchsichtigen Segmenttheile spalten sich durch Transversalwände in je zwei Scheiben, welche sich weiterhin verschieden verhalten (Fig. 4). Die eine der beiden Scheiben (*i* in Fig. 4) zerfällt durch Periklinen in mehrere annähernd gleich grosse Stücke, die andere (*s* in Fig. 4) in eine grössere bauch- und eine kleinere rücken-sichtige Zelle, von welchen die letztere sich am Aufbau des sterilen Gewebes betheiligt, während wir die erstere als Mutterzelle eines Sorus ansprechen dürfen. Sie wölbt sich etwas über ihre Nachbarzellen vor und entwickelt sich künftig in einer selbständigen, von der aller übrigen Fruchtzellen abweichenden Weise. Fig. 4 und die Oberflächenansichten Fig. 1 u. Fig. 2 zeigen, dass zunächst in ihr Transversalwände auftreten, welche etwas gegeneinander geneigt sind. Sie trennen schmälere seitliche Zellen von einer mittleren, welche allein in die Bildung des Sorus selbst eintritt, während wenigstens die äusseren von jenen nur Verbindungsglieder zwischen ihr und den gleich zu besprechenden Zwischenplatten vorstellen.

Die Zahl der in der bezeichneten Weise angelegten Sorus-Mutterzellen vermehrt sich, bis der Scheitel der Frucht sein Wachsthum einstellt. Ob er bis dahin die zweischneidige Scheitelzelle beibehält, kann ich nicht angeben. Einmal sah ich in derselben schon frühe eine Wand aufgetreten, welche zu den bisherigen Segmentwänden senkrecht stehend von ihr nach dem Rücken der Frucht zu ein kleines Stück abschnitt.

Die zwischen den Sorus-Mutterzellen liegenden Zellplatten und die vier Zellreihen des Fruchtablauches theilen sich vorläufig nur durch perikline Wände und erheben sich dabei um die Sorus-Mutterzellen herum wie ein Wall, der jede von ihnen von drei Seiten einschliesst. Dabei berühren die Bauchzellen wenigstens die Sorus-Mutterzellen nicht, sondern bleiben von ihnen durch allerdings sehr enge Intercellularspalten, die Grübchen oder trichterförmigen Einsenkungen Russow's, getrennt. Dieselben sind in Fig. 3, wo *s* eine Sorus-Mutterzelle, *b* die beiden angrenzenden Bauchzellreihen bedeutet, in der Oberflächenansicht zu sehen. Fig. 5 zeigt eine der Spalten im Längsschnitt. Diese Figur stellt einen Theil des Querschnitts einer jungen Frucht dar, der einem etwas älteren Stadium als Fig. 4 entspricht. Wie Oberflächenansichten lehren, liegen die Sorus-Mutterzellen beiderseits der Mittellinie des Fruchtablauchs einander nicht gerade gegenüber, was sich aus ihrer Bildung aus alternirenden Scheitelzellsegmenten erklärt. Man sieht daher in der Figur nur die links gelegene Sorus-Mutterzelle, während rechts die Zwischenplatte erscheint. Die Sorusmutterzelle ist durch das Wachsthum der hinter ihr auf der Fruchtflanke gelegenen Gewebepartien mehr nach dem Fruchtablauche hin-

gewandt worden, als wohl ohne dies der Fall sein würde. Man vergleiche die ein jüngeres Stadium darstellende Fig. 6 mit Fig. 5. Ausserdem hat sie sich nach einer Richtung in die Länge gezogen, senkrecht zu welcher sie in Abtheilungen zerfällt, von denen jede einem Sorustheil den Ursprung geben wird (vgl. Figg. 7 u. 8 und Russow l. c. Fig. 71 u. ff.). Zugleich auftretende weitere Transversalwände zeigt die Ansicht vom Fruchtbauche her (Fig. 3). Durch die Lücke *l* von der Sorusmutterzelle getrennt folgen nach rechts in der Fig. 5 die vier Bauchzellreihen, welche schon ca. fünfmal so hoch geworden sind, als sie zur Zeit ihrer Anlage (vgl. Fig. 6) waren, und unmittelbar an sie anschliessend die Zwischenplatte zwischen zwei Sorusmutterzellen. (Vgl. die Erläuterung zu Fig. 2).

Nicht verschweigen will ich, dass ich mich nicht völlig davon überzeugen konnte, dass jeder Sorus sich auf eine einzige Mutterzelle zurückführen lässt. Die Möglichkeit war nicht ganz auszuschliessen, dass die Sorus bildenden Zellreihen der Figuren 5, 7, 8 nicht durch Quertheilung einer Mutterzelle entstanden seien, sondern sich aus Elementen gebildet hätten, welche von der ersten Sorusmutterzelle aus nach dem Fruchtrücken hin lagen und mit ihr allmählich eingesenkt wurden. Die Weiterentwicklung der Frucht geschieht in der Weise, dass die Sorusmutterzellen, resp. ihre ersten Abkömmlinge, immer höher von ihrer Umgebung umwallt werden. Dabei erfahren sie selbst ihre Ausbildung in der angegebenen Richtung. Bei *Marsilia hirsuta* sah ich die im Querschnitt neben einander liegenden Sorusinitialen (*s* in Fig. 7) sich gegeneinander abrunden. Ein durch etwas geneigte Wände abgegrenzter mittlerer Abschnitt einer jeden wird zur Scheitelzelle, deren Gipfel nach Russows Beschreibung und Abbildungen schliesslich in der Bildung eines Macrosporangiums aufgeht, während ihre Segmente zu der von Placenta und Microsporangien schreiten. Dabei erweitern sich die Intercellularlücken, soweit die Sori ihnen anliegen, zu ansehnlichen Hohlräumen, während sie von dort bis zur Oberfläche der Frucht die Gestalt enger Gänge beibehalten. Diese Gänge sind die Russow'schen Sorus-Kanäle, welchen nach obiger Darstellung also eine andere Entstehung zukommt als Russow annahm. Später werden sie geschlossen, indem die Bauchzellreihen sich verbreitern und mit dem über die Sori hinausgewachsenen Gewebe der Fruch flanken in Verbindung treten.

Die Beobachtungen Russows bleiben übrigens auch bei der hier dargestellten Entwicklungsweise zu Recht bestehen. Der innere Theil der Soruskanäle kann zeitweise geschlossen werden, indem die Sorusinitialen sich eng an die ihnen angrenzende Reihe von Bauchzellen anschmiegen und diese selbst zusammendrücken. Ein derartiges Verhalten ist in Fig. 8 dargestellt. Wenn später dann an solchen Stellen die Sorus führenden Hohlräume auftreten, kann man ohne Kenntniss der Anfangsstadien in der That zu der Ansicht gelangen, dass man es hier mit schizogenen Neu-

bildungen zu thun habe. Die ganze Auffassung der Fruchtentwicklung vermögen diese Vorkommnisse nicht zu ändern. Nicht das innigere oder lockerere Aneinanderschliessen der in Frage kommenden Zellen, sondern die eigenthümliche Wachstumsweise der verschiedenen Theile der Frucht gibt hier den Ausschlag.

Die mitgetheilten Beobachtungen lösen die Frage nach der Abkunft der Sporangien zunächst für *Marsilia macra* im Goebel'schen Sinne. Die Entwicklung der Sporangien lässt sich hier zweifellos auf Oberflächenzellen der Fruchtanlage zurückverfolgen, wie bei den homosporen Filicinen.

Von anderen Arten konnte ich nur *M. Nardu*, *uncinata* und *hirsuta* untersuchen. Die letztgenannte Form zeigt nach diesjährigen gesunden Früchten Uebereinstimmung mit *M. macra* (Fig. 7). Von *M. Nardu* und *uncinata* hatte ich nur auf den Stufen der Figuren 7 u. 8 stehen gebliebene Früchte zur Verfügung, welche in den Gefässbündeln und auch an anderen Stellen braungefärbte Zellwände besaßen. Da indess die Anordnung ihrer Zellen, soweit untersucht, ganz dieselbe war wie bei entsprechenden gesunden Früchten der beiden anderen Arten, liegt kein Bedenken dagegen vor, sie in dieser Beziehung für normal zu halten und ihnen dieselbe Entwicklungsweise wie jenen Formen zuzuschreiben.

Ueber die muthmassliche ursprüngliche Gestalt des fertilen Abschnitts der Marsiliablätter und über etwaige Homologieen desselben mit der Spreite des sterilen Blatttheils dürfte mangels genügend nahestehender Formen, welche einen Aufschluss durch Vergleichung ermöglichten, nicht wohl zu streiten sein. Will man eine Vermuthung aufstellen, so hat wohl die von Russow (l. c. p. 74) ausgesprochene am meisten Berechtigung. Die reife Frucht wird beim Liegen in Wasser bekanntlich in drei Stücke zersprengt, zwei symmetrische Klappen und einen länglichen, knieförmig gebogenen Körper, der mit dem Stiele fest verbunden bleibt. »Letzteren Theil«, sagt Russow, »glauben wir der Entwicklung zufolge als zum Fruchtsiel gehörig, d. h. als directe die Fruchtklappen tragende Fortsetzung des Fruchtsiels und die Klappen als an diesem Theile (dem Ende des Stieles) hervorgesprossene Lamina betrachten zu müssen.« Danach hätten wir in jeder der beiden Fruchtklappen ein fertiles Fiederblättchen des Sporophylls zu erblicken. Thatsächlich gleicht in frühen Stadien die junge Frucht sehr einem jungen Blatte, an welchem zwei sehr breit inserirte Fiedern hervorwachsen. Mit Russows Auffassung liesse sich auch das Verhalten der Bauchzellreihen in Einklang bringen. Meunier (l. c. p. 273) hat neuerdings gegen Goebel die Meinung vertreten, dass das centrale Gewebe der *Pilularia*frucht und somit auch der diesem äquivalente Bauchzellcomplex der Marsilien Indusiumcharakter besitze, da die Spaltung derselben in die Theile, welche zur Bildung der die Sori einhüllenden Säckchen beitragen, schon in den jüngsten Stadien vorhanden sei und nicht erst durch spätere Differenzirung zu Stande komme. Bei *Marsilia hirsuta*, und

wohl auch bei den anderen Arten, geschieht indess die Theilung der Bauchzellreihen sicher erst spät, wie ein Vergleich der Figg. 5 und 7 erkennen lässt. Meiner Ansicht nach würde aber dieser Umstand bei der Beurtheilung der fraglichen Gewebepartieen weniger ins Gewicht fallen, als ihre Wachstumsweise. Die Indusien sind, wie Goebel hervorhebt, umgeschlagene Blattränder oder Wucherungen der Blattoberfläche. Eine solche Wucherung liegt nun in den Bauchzellreihen der Marsilia vor. Sie entwickeln sich aus den Oberflächenzellen, von welchen in Fig. 6 unter *b* vier nebeneinanderliegende zur Erscheinung kommen. Wenn sich also für die Marsilia eine phylogenetische Beziehung darböte, welche das Vorhandensein eines Indusiums verlangt, so könnte man jenem Gewebe wohl diesen Namen beilegen.

Reelleren Werth aber als diese immerhin etwas gekünstelte Betrachtungsweise hat A. Brauns Vergleich des Marsiliasporophylls mit dem von *Holcosorus pentagonus* Moore = *Grammitis bisulcata* Hooker, den auch Goebel herbeizieht. Goebel sieht in den Früchten der Marsiliaceen einfache Blattabschnitte, in welchen, wie bei *Grammitis*, die Sori in Gruben auftreten, die bei jenen später durch Wucherungen ihrer Ränder geschlossen werden, und dieser Auffassung trete ich bei dem dermaligen Stande unserer Kenntnisse vollkommen bei.

II. Ueber metamorphosirte Blättchen von *Marsilia hirsuta* R. Br.

Im botanischen Garten zu Jena werden *Marsilia hirsuta* R. Br. und *Marsilia macra* Al. Br. in einige Centimeter hohen weiten Thonschalen cultivirt, welche mit dem unteren Theile in Wasser stehen. An den langgestielten Luftblättern der reichlich fructificirenden erstgenannten Art beobachtete ich im vergangenen Sommer die Missbildungen, von welchen oben in der Einleitung die Rede gewesen ist, nämlich verschiedene Stufen der Umwandlung von Marsilia-Blättchen in Früchte. In der Litteratur habe ich keine Angaben über derartige Umwandlungen bei Marsilien finden können, während es eine bekannte Sache ist, dass sie bei andern Farnen nicht zu selten vorkommen. Goebel beschreibt z. B. in seiner vergleichenden Entwicklungsgeschichte der Pflanzenorgane (Schenk, Handbuch d. Botanik. III. 1. p. 111) das Fertilwerden sonst steriler Blattfiedern von *Botrychium Lunaria*. Dieser Erscheinung lassen sich die hier zu beschreibenden Vorkommnisse anreihen. Al. Braun hatte solche Missbildungen, von welchen er Aufschlüsse über die morphologische Natur des Sporocarps erwartete, bei seinen Arbeiten über *Marsilia* vergeblich gesucht; vielleicht darf man sagen zum Glück, denn aller Wahrscheinlichkeit nach würde ein derartiger Fund in der damaligen Zeit das Studium der Verwandtschaftsbeziehungen der Marsilien in ganz falsche Bahnen gelenkt haben. Al. Braun fand nur drei verbildete Früchte bei *Marsilia Drummondii*, welche zu

keinen weiteren Betrachtungen Anlass gaben: 1) eine im obersten Drittheil getheilte, in zwei nebeneinander liegende Spitzen auslaufende Frucht; 2) eine bis auf den Grund getheilte Frucht, so dass zwei divergirende Früchte auf der Spitze desselben Stieles standen; 3) einen Fruchtstiel, welcher an Stelle der Frucht eine schmal lanzettförmige, von einem einfachen Nerven durchzogene Spreite trug (Monatsber. d. Berliner Acad. 1870. p. 707).

Die vier keilförmigen Theilblättchen eines normalen Marsiliablattes sind bekanntlich zu zwei übereinander stehenden Paaren angeordnet, einem unteren älteren und einem in der Jugend von diesem eingeschlossenen jüngeren. Es ist für die zu beschreibenden Bildungen charakteristisch, dass die beiden einem Paare zugehörigen, also gleichalterigen Blättchen überall in ziemlich gleichem Grade verändert waren.

Folgendes sind die beobachteten Metamorphosen:

1. An Stelle der vier Theilblättchen fand sich auf einem Stiele von normaler Länge ein braunes, stark behaartes, rundliches Gebilde, welches bei näherer Untersuchung sich aus vier Theilen zusammengesetzt erwies. An Stelle des untersten Theilblättchenpaares waren zwei etwa eiförmige Körper von ca. 3 mm Länge getreten, an Stelle des oberen zwei etwas grössere muschelförmige Gebilde, welche namentlich an ihrem Vorderrand auf die mehrfache Dicke normaler Blättchen angeschwollen erschienen. Dieselben hatten einander ihre concaven Seiten zugewandt und sich so gekrümmt, dass das eine etwas über das andere übergriff (Fig. 9). Ihre Innenflächen sind kahl und heller gefärbt als die Aussenseiten, welche in Farbe und Behaarung ganz mit den eiförmigen Körpern übereinstimmen. Alle vier Stücke der Missbildung tragen die eigenthümlichen, ihrer Fläche parallel gerichteten Borsten der normalen Früchte, welche sich von den auf der Unterseite der Blättchen befindlichen nur durch stärker gebräunte Inhaltsmassen unterscheiden.

Die beiden muschelförmigen Körper, um diese zuerst näher ins Auge zu fassen, besitzen eine mehrschichtige harte Schale, welche, soweit sie ihrer Aussenseite angehört, ganz der Schale normaler Marsilienfrüchte gleicht, auf der Innenseite der Muscheln aber einige Abweichungen erkennen lässt. Die im Querschnitt isodiametrisch polygonalen Epidermiszellen, welche mit geraden Wänden aneinanderstossen und fast alle gelbe oder braune Membranen und z. Th. auch ebensolche Inhaltsmassen führen, sind auf der Innenseite der Muscheln von gleichmässiger Höhe; auf ihrer Aussenseite aber zeigt die Epidermis Einsenkungen, nach deren Centrum hin die Zellen an Höhe abnehmen. Am tiefsten Punkte der Einsenkungen finden sich die beiden Arten von Spaltöffnungen, welche Russow (l. c.) für die Marsilienfrüchte beschreibt, nämlich solche, welche in flaschenförmige Intercellularräume münden, und solche, unter denen das gleich zu beschreibende Sklerenchym ohne Unterbrechung weiter läuft. Dieses

Sklerenchym besteht zunächst aus einer Schicht senkrecht zur Epidermis gestreckter prismatischer Zellen, deren Seitenwände hier und da gebräunt und so stark verdickt sind, dass ihr Lumen auf einen ganz engen, oft anscheinend noch unterbrochenen Kanal, der sich nur an den Zellenden etwas erweitert, reducirt ist. Ungefähr in halber Höhe, etwas näher dem oberen Ende, verläuft über die Wände die sogenannte *linea lucida*, welche seit Mettenius und Russow von den Schalen der Marsilienfrüchte und Papilionaceensamen bekannt und von Mattiolo (*Mem. delle Reale Accad. d. sc. d. Torino Ser. II t. XXXVII*) und Meunier (*l. c. Ref. Bot. Ztg. 1889 No. 36*) neuerdings näher untersucht worden ist.

Auf der Aussenseite der Muscheln zieht sich unter der eben beschriebenen Prismenschicht eine zweite hin, welche aus längeren Zellen mit weniger stark verdickten, ebenfalls theilweise gebräunten Wänden ohne *linea lucida* zusammengesetzt ist (Fig. 11). Sie geht auf der Muschelinnenseite in pallisadenförmig angeordnete Zellen mit wenig auffallender Wandverdickung über (Fig. 12).

Den Uebergang zwischen Schale und Inhalt macht eine ebenfalls nur auf der Muschelaussenseite gut ausgebildete Schicht von Parenchymzellen, welche auf dem Querschnitt biconcave Form besitzen, so dass sie ovale Interzellularräume zwischen sich lassen (Fig. 11). Auch sie findet sich bei den normalen Marsiliafrüchten dicht unter der harten Schale. Ihr folgen nach Innen weitere Parenchymlagen, welche die Gefässbündel umschliessen, deren Hauptstränge bei unseren Metamorphosen unter der äusseren Schale der Muscheln von ihrer Ansatzstelle an den Blattstiel aus nach ihrem gegenüberliegenden Rande verlaufen. Der noch übrige Innenraum der Muschel stellt einen durch sehr zarte Septen in mehrere Querfächer getheilten Hohlraum dar, der nur nach dem Blattstiele hin von einem farblosen grosszelligen Schwellgewebe erfüllt ist. Die quellbare Substanz der betreffenden Zellen findet man an Spiritusmaterial dem contrahirten Plasma anliegend. Sie hebt sich bei Wasserzutritt von letzterem als faltige Masse ab und wird dann unter fortwährender Ausdehnung, welcher die anfangs eingefalteten Zellwände folgen müssen, undeutlich.

Der bemerkenswerthe Inhaltsbestandtheil der Muscheln sind die Sporangienhäufchen, welche über den Gefässbündeln entspringend in die Fächer des Hohlraums hineinragen. Die Placenten erheben sich als breite Höcker auf der Muschelaussenwand und tragen in grosser Anzahl die langgestielten Sporangien. Um zu einer richtigen Beurtheilung der letzteren zu gelangen, ist es nöthig, einen Blick auf die Sori der gleichzeitig entwickelten normalen Früchte zu werfen. Dieselben enthielten 1—3 Macrosporangien und eine grössere Anzahl von Microsporangien, welche zum Theil gebräunt und eingetrocknet waren.

Die Macrosporen erfüllten zur Zeit der Ernte des Materials (Ende Juli) fast den ganzen Innenraum ihrer Behälter und zeigten unter der Schleim-

hülle die bekannte aus senkrecht zur Sporenoberfläche gestellten Prismen bestehende Wandschicht wohl ausgebildet. Sie waren somit jedenfalls der Reife nahe. Die Microsporangien derselben Sori enthielten keine reifen Microsporen, sondern rundliche Körper verschiedener Grösse in grosser Anzahl neben 16 grösseren Zellen, welche augenscheinlich den Mutterzellen der Microsporen entsprachen. Jene rundlichen Körper bestanden aus einer farblosen Masse, welche an die aus Prismen zusammengesetzte Episoriumschiicht der Microsporen erinnerte, aber nicht überall radiale Streifung zeigte. Sie umhüllt einen oder mehrere Tropfen einer gelblichen Substanz, welche sich beim Aufkochen in Kalilauge braun, mit Jodtinktur, wie die Hüllmasse, gelb färbt. Jod- und Schwefelsäure rufen keine Blaufärbung hervor. Die ganzen Gebilde sind gegen Kalilauge und Schwefelsäure von grosser Resistenz. Zu äusserst umgibt die Körper eine hyaline Hülle, welche oft zwei Schichten erkennen lässt. Ihrer Natur nach müssen sie Derivate der Tapetenzellen sein. Die 16 grösseren Zellen erscheinen z. Th. annähernd kugelig, z. Th. aber besitzen sie Fortsätze und Ausbuchtungen, welche auf unvollständige Theilung schliessen lassen. Dass indess nicht normale Theilungszustände vorliegen, geht daraus hervor, dass die betreffenden Zellen bereits Prismenschicht und Gallertmantel zeigten.

Der ganze Sporangieninhalt erinnert an eine Beobachtung, welche Russow (l. c. p. 59) an im Spätsommer angelegten Früchten, wahrscheinlich von *Marsilia Drummondii* und *M. elata*, machte. Er fand in den Microsporangien der genannten Früchte neben den gewöhnlichen Microsporen eine Menge kleiner Bläschen, welche seiner Beschreibung nach mit meinen Tapetenzellderivaten übereinstimmen. Russow meinte, in diesen Gebilden Produkte einer wiederholten Theilung einiger Sporenzellen vor sich zu haben, da er in den sie enthaltenden Sporangien weniger Microsporen antraf als in den normal entwickelten. In den mir vorgekommenen Sporangien kann ihre Entstehung nicht auf diese Weise vor sich gegangen sein, da neben ihnen gewöhnlich alle 16 Microsporen-Mutterzellen gefunden wurden.

Die oben gegebene Darstellung des Microsporangieninhalts normaler Früchte könnte ebenso gut von den Sporangien der metamorphen Blättchen hergenommen sein, so genau stimmen beide in den in Rede stehenden Verhältnissen überein. Auffallend ist nur, dass in den Soris der Blättchen keine Macrosporangien zu finden waren. Es kann das darauf beruhen, dass die Sporen noch nicht die Entwicklungsstufe erreicht hatten, auf welcher sich Macro- und Microsporangien von einander unterscheiden lassen; doch wird man geneigt sein, als Gegengrund gegen diese Annahme den vorgeschrittenen Reifezustand der Sporangien in normalen Früchten gleichaltriger Pflanzen geltend zu machen. Schlagend wäre ein solcher Einwand nicht, da wir es ja mit Bildungsabweichungen

zu thun haben, deren Entwicklungsdauer uns unbekannt ist. Sie könnten recht wohl ihr eigenes Tempo besitzen.

Die beiden eiförmigen Körper, welche an Stelle des unteren Blättchenpaares des metamorphosirten Marsiliablattes getreten waren, besaßen je eine Längsfurche auf ihrer dem Centrum des Köpfchens zugekehrten Seite, welche der Concavität der muschelförmigen Körper entspricht. Ihre Struktur stimmte ganz mit der der letzteren überein. Nur fehlte die innere Prismenschicht blos an einer sehr schmalen Stelle im Grunde der Furche. Das Schwellgewebe war am stärksten in ihrer Nähe ausgebildet. Von hier aus durchzogen auch die Hauptsepten den Innenraum, Sorus führende Fächer bildend. Die Sori saßen wieder auf Placenten, welche von der der Furche entgegengesetzten Seite aus, wo auch die Gefäßbündel lagen, ins Innere vorsprangen. Interessant war, dass der Querschnitt senkrecht zur Furche nicht, wie man hätte erwarten sollen, zwei nebeneinander liegende Sori zeigte, wie die normalen Früchte, sondern eine grössere Anzahl (Fig. 13).

2. Einen ganz ähnlichen Aufbau, wie das beschriebene Köpfchen, zeigte ein zweites, welches auch äusserlich dem ersten sehr ähnlich war. Auch hier erschienen an Stelle der beiden untersten Theilblättchen eiförmige Körper mit rückenständiger Furche, während aber die beiden oberen durch einen einzigen muschelförmigen Körper vertreten wurden, an welchem nur eine tiefe Ringfurche verrieth, dass er aus zwei anfänglich getrennten Anlagen hervorgegangen sei. Im Inneren machte sich dieser Umstand nur insofern bemerklich, als an der eingeschnürten Stelle die Septen etwas dichter standen. Dies war indess wohl eine rein mechanische Folge der geringeren Weite des Lumens daselbst, wie aus dem unten Mitzutheilenden hervorgehen wird.

3. Den Schlüssel zum Verständniss der im Obigen dargestellten Erscheinungen liefert die in Figur 10 abgebildete Abnormität.

Statt der unteren Theilblättchen sind hier muschelförmige Körper aufgetreten, welche sich von denen der Abnormitäten 1 und 2 nur dadurch unterscheiden, dass ihr Innenraum keine Sporangien führende Lücken zeigt, sondern ganz von Schwellgewebe erfüllt ist, dessen Ausdehnung ihre Dicke ums Doppelte vergrössern kann. Die beiden oberen Theilblättchen besitzen nur an ihren Vorderrändern eine Einkrümmung nach der Blattoberseite hin, an welcher sich blos ein schmaler Streif auf jeder Seite des Blättchens nicht betheiligt. Die eingekrümmten Theile sind gleichzeitig braun gefärbt, anscheinend etwas stärker behaart und dicker als die unveränderten Partien, in welche sie nach dem Blattstiel zu allmählich übergehen. Die microscopische Betrachtung lehrt, dass auch sie keine Sporangien enthalten, im übrigen aber denselben Bau besitzen wie die muschelförmigen Körper. Specieell zeigten sie dieselben Unterschiede in der Wandstruktur auf der concaven und convexen Seite. Auf der

ersteren sind die Epidermiszellen alle gleich hoch; es fehlen die Spaltöffnungen und an Stelle der inneren Prismenschicht findet sich nur eine Lage weithumiger, wenig gestreckter, prismatischer Zellen ohne auffallende Wandverdickungen (Fig. 12).

Ihren besonderen Werth erhalten diese halbumgewandelten Blätter dadurch, dass sie es ermöglichen, die Theile der sämtlichen Metamorphosen mit denen der normalen Blätter in Beziehung zu setzen. Sie zeigen unmittelbar, dass ihre convexe Seite mit den spaltöffnungsführenden epidermalen Einsenkungen überall der Blattunterseite, die concave Fläche der Blattoberseite entspricht, welche bei den eiförmigen Körpern nur in Gestalt eines ganz schmalen Längsstreifens im Grunde der Furche zur Entwicklung gelangt ist. Die umwandelnden Einflüsse müssen sehr früh auf die Blattanlage gewirkt haben, denn die Epidermiszellen der metamorphosirten Stellen sind auf der embryonalen Form des Prismas stehen geblieben und haben sich in dieser vergrößert und wohl auch durch Theilung vermehrt, während die der normalen Blattpartieen ohne weitere Theilungen wachsen, wobei ihre Seitenwände sich wellig biegen. Die Prismenschichten entstehen aus der unter der Epidermis gelegenen Zellschicht, deren Glieder sich normaler Weise auf der Blattoberseite zu verzweigten Pallisaden mit senkrecht zur Blattoberfläche gestellten Armen, auf der Blattunterseite zu parallel der Epidermis etwas gestreckten, vielfach ausgebuchteten Zellen des Lückenparenchyms entwickeln. In den metamorphen Theilen treten bereits vor der Bildung der Intercellularen in den betreffenden Zellen vermehrte Theilungen und weiterhin starke Celluloseablagerungen auf, die zur Bildung der sclerenchymatischen Prismen führen. Die innere und äussere Prismenschicht scheinen durch Theilung einer einzigen subepidermalen Zelllage zu entstehen. Wenigstens weisen die Zellnetze an der Grenze zwischen den metamorphen und den nicht umgewandelten Blatttheilen darauf hin. Das Schwellgewebe geht aus den zwischen der zur Blattoberseite gehörigen subepidermalen Schicht und dem die Gefässbündel unmittelbar einhüllenden Parenchym gelegenen Zellen hervor. Dieselben erleiden keine vermehrten Theilungen, sondern strecken sich senkrecht zur Blattoberfläche, bis sie zum Theil zerreißen (Fig. 12). Es scheint fast, als ob sie dabei einem durch das Flächenwachsthum der Prismenschichten senkrecht zum Blattinnern ausgeübten Zuge folgten. Am wenigsten verändert das Parenchym der Blattunterseite mit den Gefässbündeln seine Entwicklungsrichtung. Es wird auch in den umgewandelten Blatttheilen zum Lückenparenchym, welches vom normalen namentlich durch die eigenthümliche Ausbildung abweicht, die seine äusserste, den Prismen angrenzende Schicht erfährt (Fig. 11).

Vergleicht man diejenigen der beschriebenen Bildungen, welche am weitesten von den Blättchen abweichen, mit normalen Früchten von *Marsilia hirsuta*, so findet sich in der anatomischen Structur ihrer ein-

zelen Theile, der Schale, des Schwellgewebes, der Placenten und Sporangien, vollständige Uebereinstimmung bis in die kleinsten Einheiten. Denkt man sich die eiförmigen Körper der Figur 9 etwas anders gestaltet und die rückenständige Spalte auf Null reducirt, so hat man das Gehäuse der normalen Frucht vor sich, welche hiernach einer einzigen der Fiedern des sterilen Blatttheils entsprechen würde. Unterschiede bestehen in dem Gefässbündelverlauf und der davon abhängigen Anordnung der Sori. Das Gefässbündelsystem der ächten Frucht besteht aus einem dorsalen Stamm, von welchem unter rechten Winkeln Seitenäste abgehen, die nach dem Fruchtbauche verlaufen, während in den Metamorphosen von einem Punkte, dem Stielansatz, ausstrahlende Bündel vorliegen. Könnte man nun auch ohne besondere Schwierigkeit das eine Schema aus dem andern ableiten, so warnt doch ein anderer Umstand davor, aus den Metamorphosen morphologische Schlüsse auf die normalen Früchte zu ziehen, nämlich die endogene Anlage der Sporangien, welche hier als ebenso zweifellos feststehend gelten muss wie der Ursprung der Sporangien der normalen Früchte aus Oberflächenzellen. Sie zeigt deutlich genug die Berechtigung der Zurückweisung, welche Goebel in seiner vergleichenden Morphologie der Teratologie als entscheidender Instanz in morphologischen Fragen zu Theil werden lässt.

Die Entwicklungsgeschichte der Metamorphosen direct festzustellen, gestattete das vorliegende Material nicht; doch giebt die Vergleichung der verschiedenen vorkommenden Umwandlungsstufen einige Fingerzeige für die Erkenntniss des Ganges, welchen die Abänderung genommen haben mag. Die am wenigsten umgewandelten Blättchen wiesen ausser einer Einkrümmung und auf Dilatation des Mesophylls beruhender Verdickung nur die Schalenbildung auf, bei anderen kamen dazu die inneren Hohlräume; die am weitesten veränderten endlich führten in diesen Höhlungen Sporangien. Wenn es erlaubt ist, jene Zustände *mutatis mutandis* als zeitlich aufeinander folgend auf ein Object zu übertragen, so kann man sich nachstehende Vorstellung über das Zustandekommen der Metamorphosen bilden.

Die Umwandlung beginnt mit vermehrten Zelltheilungen und abnormer Celluloseablagerung in den Initialzellen der Prismenschichten. Das Ausdehnungsbestreben der letzteren in tangentialer Richtung veranlasst einen nach dem Blatinneren gerichteten Zug, in Folge dessen abnormes Wachsthum und schliesslich Zerreiſsung gewisser Gewebspartieen eintritt. In die so entstehenden Höhlungen hinein bilden sich endlich die Sporangien, wenn sie überhaupt zur Anlage gelangen. Aus der angegebenen Entwicklungsfolge würde sich auch die so sehr auffallende Verschiebung der Sporangien ins Innere des Blattgewebes erklären. Da die Oberflächenzellen zur Zeit ihrer Anlage bereits in die Schalenbildung eingetreten sind, bietet für sie nur der centrale Hohlraum Platz, dessen Umgrenzungs-

zellen sich in ähnlicher Lage befinden, wie die calluserzeugende Umgebung einer Schnittwunde. Durch die in Folge der Zerreibungen im Blattinneren veränderten Spannungsverhältnisse wie durch die sie umspülende Luftmenge werden sie in gleicher Weise zu Neubildungen angeregt, deren Natur die Factoren bestimmen, welche die ganze Metamorphose veranlasst haben.

Ueber die Aetiologie der Metamorphosen kann ich nichts sagen. Es kamen an den umgewandelten Blättern meistens Pilze zur Beobachtung, welche sich in den vorhandenen Höhlungen angesiedelt hatten und oft auch das Schwellgewebe und selbst einzelne Zellen der Prismenschicht durchwucherten. Da sie indess nicht überall gefunden wurden, darf ihnen keine weitere Bedeutung zugeschrieben werden. Es müssen andere Agentien gewesen sein, welche Stoffwechsel und Wachsthum der Blättchenanlagen in die Bahn lenkten, die schliesslich zur Bildung der Sporangien hinführte.

Erläuterung der Abbildungen.

- Fig. 1. Oberflächenansicht des Bauches einer jungen Frucht von *M. macra*. *b* die vier Bauchzellreihen. Die Sorusinitialen *s* und die Zwischenplatten sind schon zu unterscheiden.
- Fig. 2. Etwas älteres Object in derselben Ansicht. Die Spitze des Pfeils zeigt nach der Fruchtspitze. Es sind nur 3 Bauchzellreihen gezeichnet. Die Sorusinitialen sind durch Transversalwände getheilt. An ihrer Grenze gegen die äusserste Bauchzellreihe beginnt die Bildung der »Grübchen«. *M. macra*. Die erste Anlage der Grübchen geschieht chizogen, indem die Sorusinitiale sich von den ihr angrenzenden Bauchzellen trennt. Vgl. auch Fig. 3. In Fig. 1 und 6 hat diese Trennung noch nicht stattgefunden.
- Fig. 3. Eine etwas ältere Sorusinitiale mit Grübchen und den beiden angrenzenden Bauchzellreihen. *M. macra*.
- Fig. 4. Spitze einer jungen Frucht im Profil. Einstellung wenig unter der Oberfläche. *s* Sorusinitialen, *i* Zwischenplatten. *M. macra*.
- Figg. 5—8. Querschnitte durch verschieden alte Früchte. 5, 6, 8 *M. macra*; 7 *M. hirsuta*; die nicht zum Sorus selbst gehörigen Zellen zum Theil schematisirt.
- Figg. 9 u. 10. Metamorphosirte Blättchen von *Marsilia hirsuta*. Wenig vergrössert.
- Fig. 11. Stück eines Längsschnitts durch die äussere Schale eines der muschelförmigen Körper der Fig. 9. (Blattunterseite.) Die Parenchymzellwände, mit Ausnahme der an die Interzellularen grenzenden Stellen, etwas zu stark gezeichnet.
- Fig. 12. Innere Schale derselben Muschel. (Blattoberseite.)
- Fig. 13. Querschnitt eines der eiförmigen Körper der Fig. 9. *p* Placenten. Die Sporangien der besseren Uebersicht wegen entfernt.

Zur Präparation der Agrumen-Früchte.

Von

Dr. M. Kronfeld (Wien).

Die saftigen Citrus-Früchte können, wenn anders man sie nicht bis zur Unkenntlichkeit einschrumpfen lassen will, nur in conservirenden Flüssigkeiten, so namentlich Alkohol, aufbewahrt werden. Allein, abgesehen davon, dass Alkohol die Farben ausblassen macht, ist die Verwahrung in demselben eine ziemlich kostspielige, da sie grössere Gläser erheischt.


In dem Bestreben, eine Reihe von Abnormitäten aufzubewahren, welche namentlich die Orangen darbieten — z. B. meridional gerichtete Wülste und Furchen, welche meist den Zwischenräumen zwischen den Schnitzen entsprechen — kam ich auf ein Verfahren zur Präparation der Früchte, welches sich wegen seiner Einfachheit und Zweckdienlichkeit von selbst empfehlen dürfte.

Die Frucht wird nämlich entzweigeschnitten und jede Hälfte für sich behandelt. Man räumt die gesammte pulpa aus, so dass nur die Schalenhälfte übrig bleibt. Diese Schalenhälfte wird mit heissem Paraffin ausgegossen, so dass nach dem rasch erfolgenden Erstarren desselben die Schale über einen Paraffinkern gespannt erscheint; in dieser Lage trocknet sie vollkommen aus, ohne merklich einzuschrumpfen oder die Farbe zu ändern. Da die teratologischen Besonderheiten gewöhnlich nur an einer Seite der Frucht vorkommen, genügt es, die entsprechende Hälfte zu präpariren. Will man übrigens die ganze Frucht aufbewahren, so klebt man die beiden vorgerichteten Hälften mit den Paraffinflächen aneinander. All dies geschieht leichter und schneller als es beschrieben werden kann. Bei einiger Uebung erhält man sehr schöne und unverwüstliche Präparate.

In den meisten Fällen genügt es, eine Längenhälfte der Frucht aufzubewahren. Befestigt man dieselbe mit der Paraffinseite auf ein Brettchen oder Cartonstück, so ist damit ein handsames und zugleich hübsches Präparat für die Sammlung gewonnen. Noch elegantere Präparate — förmliche Halbreiefs der Agrumen-Früchte — erhält man durch leichtes Einsenken der mit Paraffin ausgefüllten Fruchthälften in Gyps, der nahe dem Erstarren ist. Um gleich grosse Objecte zu bekommen, empfiehlt es sich, den Gyps in flache viereckige Formen auszugiessen.

Auf diese Weise lassen sich nicht nur Abnormitäten der Citrus-Früchte aufbewahren, sondern sämtliche ökonomisch wichtigen Agrumen zum Anschauungsunterrichte aufstellen.

Noch sei bemerkt, dass man, um mit dem Paraffin zu sparen, unter dasselbe, wenn es noch flüssig ist, Papierschnitzel mengen kann.



Die Lichenen der Insel Ascension

von

Dr. Ernst Stizenberger.

Die grosse Mehrzahl der afrikanischen Inseln, so wie auch die der Südspitze Afrika's mehr oder weniger benachbarten antarktischen Eilande sind in lichenologischer Beziehung durchaus keine terra incognita; ja manche derselben, wie Madera, die kanarischen Inseln, die Inseln des Meerbusens von Guinea, St. Helena, die Maskarenen, Sokotra u. s. w. gehören sogar zu den lichenologisch ziemlich gut bis sehr gut durchforschten Theilen der Erdoberfläche. Wer die hierüber von Acharius bis heute angewachsene (bis zum Jahre 1870 in v. Krempelhubers Geschichte der Lichenologie aufgeführte) Literatur durchzugehen sich die Mühe nehmen will, ist auch bezüglich der Mehrzahl der afrikanischen Inseln im Stande sich daraus ein lückenfreies Bild der bisher daselbst beobachteten Lichenenvegetation zusammenzustellen.

Diametral entgegengesetzt liegen diese Dinge für die Insel Ascension. (7° 55' südl. Br., 14° 25' westl. v. Greenw.) und zwar sonderbarer Weise ausschliesslich in Folge rein äusserer Zufälligkeiten.

Ich hatte bei meinen seit mehr denn 4 Jahren betriebenen Studien über die Flechten Afrika's Gelegenheit der Sache etwas näher zu treten und benütze meine diesfälligen Erfahrungen zur Aufklärung der (wie man wohl sagen darf) hier eingetretenen Verwirrung.

Ueber die Flechten der Himmelfahrtinsel liegen folgende literarische Notizen vor: 1. Ach. L. U. p. 422 (*Lecanora Ascensionis* Ach.); 2. Nyl. Syn. I p. 259 (*Rocella phycopsis* Ach.) und 407 (*Phycia flavicans* Sw., DC.); 3. Cromb. Chall. Exp. Addit. p. 83 (*Ph. flavicans* und *angustifolia* Mey.-Fw.); 4. Müll.-Arg. Exp. Gaz. und Nachtrag (siehe unten sämtliche von Dr. Naumann gesammelten Nummern) und 5. Mass. Lich. Cap. p. 58 (*Haematomma Fenzlianum* Mass.), p. 65 (*Buellia pachyospora* Mass.) und p. 81 (*Enterographa Capensis* Mass.). Bei diesen 3 Massalongo'schen Flechten ist neben dem Standorte: »Hab. ad saxa« oder »ad saxa vulcanica« das Wort »Ascension« (oder auch Adscension) in Parenthese beigesetzt und damit wohl zum mindesten, wenn auch wie es scheint unbewusst und ohne klare Absicht, angedeutet, dass nicht alle in Mass. Cap. beschriebenen (von Dr. Wawra gesammelten) Lichenen vom Kap der guten Hoffnung, sondern einzelne derselben von Ascension stammen. Hat man dann bei weiterem Vordringen das Glück durch das lebenswürdige Entgegenkommen der betr. Anstaltsvorstände die bei Mass. l. c. beschriebenen Lichenen im Original betrachten zu können, so wird man sofort durch das heterogene Aussehen der unorganischen Unterlagen der Steinflechten in der Ansicht bestärkt, dass ein grösserer Theil derselben der Gesteinsbeschaffenheit wegen nicht vom Kap stammen kann. Wollte

man aber aus den Fundortsbezeichnungen auf den Etiketten der betreffenden Exemplare sich eines Bessern belehren lassen, so stände man bei der wirklich grossartigen Unvollkommenheit und Unvollständigkeit der Mehrzahl derselben rathlos da. Und doch ist es für die Geographie der Flechten durchaus nicht gleichgültig, ob man die Lava bewohnenden Lichenen eines isolirt im atlantischen Ozean liegenden und dessen Spiegel als Insel überragenden Vulkanes zwischen Westafrika und Brasilien mit den Lichenen des um 26 Breitengrade südlicheren und um 35 Längengrade östlicheren Kaplandes zusammenwirft oder nicht. Um sicher und vollständig ins Reine zu kommen und von dem Umstande ausgehend, dass die im Herbar der botanischen Abtheilung des Wiener Hofmuseums vertretenen Exemplare der Wawra'schen Sammlung der von der Carolina-Expedition herrührenden Flechten Nummern trugen, die nicht von Massalongo's Hand, sondern offenbar vom Sammler herrührten, fragte ich in Wien nach den Tagebüchern des Dr. Ritters v. Wawra. Herr Dr. Zahlbruckner, welcher sich der Mühe der Untersuchung der betreffenden Tagebücher bereitwilligst unterzog, lieferte mir einen Auszug der maassgebenden Stellen derselben, aus welchem nicht länger unklar bleiben konnte, was vom Kap und was faktisch von der Insel Ascension, welche Wawra auf der Fahrt der Korvette Carolina berührt hatte, stammte; denn die erwähnten Nummern der Wawra'schen Lichenenexemplare entsprachen richtig den Nummern der Wawra'schen Tagebücher und es fanden sich in letzteren mehr als genügend spezialisirte Bezeichnungen der Fundorte für die Mehrzahl der von Mass. l. c. beschriebenen Lichenen der Carolina-Expedition.

Stellen wir nun in systematischer Ordnung die Lichenen zusammen, welche in der obenangeführten Literatur notirt sind und fügen wir denselben alles dasjenige aus Mass. Lich. Cap. bei, was sicher als von der Himmelfahrtinsel stammend constatirt werden konnte, so ergibt sich das nachfolgende, aus fast 30 Arten bestehende lichenologische Vegetationsbild, welches in seiner specifischen Zusammensetzung mit Sicherheit auf eine **kleine, vulkanische, den wärmern Erdgürteln zugehörige Insel** als seine Heimath schliessen lässt:

Leptogium diaphanum (Sw.) Mnt. — In Gesellschaft von *Physcia leucomelas* 2000 m: Dr. Neumann.

Ramalina dendriscoides Nyl. in Flora 1876 p. 412 var. *subnuda* Müll.-Arg. Gaz. Nachtr. p. 134. — Auf Baumrinden 2000 m: Dr. Neumann.

R. Bourgaeana Mnt. — Auf beschatteten, ganz nackten Lavablöcken am Fusse und auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 60 z. Th.

Roccella tinctoria DC. — Ebenda: Dr. Wawra No. 60 z. Th..

R. phycopsis Ach. — An Felsen des Meeresufers, (Nyl. Syn. I p. 259).

Evernia prunastri (L.) Ach. — Steril auf Lava 2000 m: Dr. Neumann.

- Parmelia perforata* (Jacq.) var. *cetrata* Ach. — Steril auf Baumästen mit *Physcia flavicans* 2000 m: Dr. Naumann. — Var. *ulophylla* Mey.-Fw. — Auf vulkanischem Gestein: Dr. Naumann.
- P. olivetorum* (Ach.) Nyl. — Steril an Baumästen 2000 m: Dr. Naumann.
- P. Soyauxii* Müll.-Arg. Afric. occid. p. 32. — Steril auf Lava: Dr. Naumann.
- Physcia flavicans* (Sw.) DC. — An nackten freien Felsblöcken auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 61, steril an Felsen: Moseley (Cromb. Chall. Add. p. 83), auf Baumästen 2000 m: Dr. Naumann. (Auch schon in Nyl. Syn. I p. 407 angezeigt.)
- P. leucomelas* (L., Sw.) Mich. — Steril an Felsen 2000 m: Dr. Naumann. — Var. *angustifolia* Mey.-Fw. — Auf Erde zwischen Felsen: Moseley (Cromb. Chall. Add. p. 83).
- P. hypoleuca* (Ach.) Nyl. — Steril auf Erde 2000 m: Dr. Naumann.
- P. Ascensionis* (Ach.) Nyl. in Cromb. Chall. p. 212. — Auf Lava (Mus. Swartz nach Angabe des Ach. L. U. p. 422).
- Lecanora scoriophila* Mass. Cap. p. 55. — Nachdem in Dr. Wawra's Tagebüchern unter No. 34—47 die Carolinalichenen vom Kap und unter No. 51—62 diejenigen von der Insel Ascension aufgeführt sind, ist *L. scoriophila* (mit No. 63) im Tagebuch nirgends zu finden. Die Gesteinsbeschaffenheit des Substrates zeugt für Ascension.
- L. murorum* (Hffm.) var. *obliteratum* (Pers.) Nyl. — Auf Basalt und von da auf thierische Excremente übergesiedelt: Dr. Naumann.
- L. Ascensionis* Müll.-Arg. Gaz. Nachtr. p. 136 unter *Dimelaena*. — Auf Basalt: Dr. Naumann.
- L. chlarona* Ach. — Auf Baumzweigen mit *Lecidea atlantica* und *Opegrapha aterula*: Dr. Naumann.
- L. dirinaeformis* Mass. Cap. 57. — An freien vorragenden Blöcken auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 56.
- L. Fenzliana* Mass. Cap. p. 58 unter *Haematomma*. — An gleichen Stellen wie die vorige: Dr. Wawra No. 58.
- L. tartarea* (L.) Ach. — Das in Wien aufbewahrte, von Dr. Wawra auf der Carolina-Expedition gesammelte Exemplar stammt laut Etikette von freien Blöcken am Green Mountain.
- L. gyalectella* (Mass. Cap. p. 62). — An freien vorragenden Blöcken auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 57.
- Lecidea cupularis* (Hdw.) Ach. — Von mir auf demselben Substrat mit *Lecanora Fenzliana* (Wawra No. 58) des k. k. Hofmuseums aufgefunden.
- L. atlantica* Müll.-Arg. Gaz. Nachtr. p. 137 unter *Patellaria*. — An dürren Zweigen: Dr. Naumann.
- L. anatolodia* (Mass. Cap. p. 67). — An freien vorragenden verwitterten Blöcken auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 58, 57.

- L. Carolinae* (Mass. Cap. p. 66). — Mit der vorhergehenden: Dr. Wawra No. 58.
- L. pachyospora* (Mass. Cap. p. 65). — An freien hervorragenden verwitterten Blöcken auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra No. 56.
- Opegrapha aterula* Müll.-Arg. Gaz. Nachtr. p. 139. — An dünnen Zweigen: Dr. Naumann.
- O. Zanei* Mass. Cap. p. 80. — An kleinen Höhlungen oder beschatteten Stellen der Felsen des Green Mountain: Dr. Wawra No. 55.
- Stigmatidium Capense* (Mass. Cap. p. 81). — An freien vorragenden verwitterten Blöcken auf halber Höhe des Green Mountain: Dr. Wawra (ohne Nummer, aber Fund- sowie Standort aus den Angaben in Mass. l. c., verglichen mit dem Tagebuchauszug Wawra's, hinreichend klar festzustellen). Die Benennung »*Capense*« für eine Pflanze, zu deren Standort Massalongo selber in Parenthese »(Ascension)« beifügt, lässt doch entweder über die geographischen Kenntnisse Massalongo's oder über seine Gründlichkeit beim Arbeiten gerechte Bedenken aufkommen.

Lichenologische Beiträge

von

Dr. J. Müller.

XXXIII.

1508. *Leptogium foliare* Krph. Lich. foliicol. p. 2 et Lich. Becc. p. 10, est species insignis e sectione *Stephanophori*. Apothecia evoluta 3 mm lata, lacinulis fertilibus turgidis brevibus podicellata, tota adnata et apicem occupantia, i. e. terminalia, infra marginem proprium lobulis exiguis thallinis crispulis coronata; sporae utrinque rotundato-obtusae, medio subconstrictae, 4-loculares, loculi duo intermedii vulgo cruciatim divisi. — Subsimile est *L. tremelloidi* Fr., sed monophyllum, arcte adpressum et totum crebre rugulosum. — Borneo: Beccari. (vidi specim. orig.)

1509. *Leptogium crispulum* Krph. Lich. foliicol. p. 1 et Lich. Becc. p. 9, quoad specimen ramulicolum ex ins. Sarawak, est parvum pulviniforme, fulvescenti-pallidum, laciniae confertae, margine undulato-crispae, saltem pro parte, caeterum integrae v. etiam leviter crenato-denticulatae, obsolete rugulosae. — Non diversum videtur a *Leptogio diaphano* Nyl. Syn. p. 125, at hoc ipse vix specificè differt a vulgatissimo et variabili *Lept. tremelloide* Fr. Planta Sarawakensis, sterilis, forte pro forma crispula hujus speciei habenda esset, sed specimina foliicola *L. crispuli* nondum vidi.

1510. *Coccocarpia epiphylla* Krph. Lich. foliic. p. 5, et Lich. Becc. p. 13 (excl. syn. Féean.), eadem est ac *Coccocarpia aeruginosa* Müll. Arg. Revis. Lich. Féean. p. 16. Sporae 6—8 μ longae (duplo longiores

vidi quam in descript. Krempelhuberi). — In insula borneensi Sarawak (vidi specim. orig. Krplh.).

1511. **Lecanora micrommata** Krplh. Lich. foliicol. p. 3, et Lich. Beccar. p. 16, sit **Lecania micrommata** Müll. Arg., juxta *Lecaniam heterochroam* Müll. Arg. L. B. n. 283 locanda, a qua differt thallo cinereo-glaucos, laevigato et disco fusco. Hypothecium crassum rufo-fulvum est. — Foliicola in Borneo: Beccari (vidi specim. orig.).

1512. **Biatora Phyllocharis** Montg. Cent. VI. n. 16 bis et Sylloge p. 340, eadem est ac *Gyalectidium dispersum* Müll. Arg. L. B. n. 252, et dein **Gyalectidium Phyllocharis** nuncupanda est. Specimen orig. Montg. pauperrimum est et apothecia nunc tantum juvenilia offert, et in iisdem foliis insuper occurrit similiter juvenile *Gyalectidium filicinum* Müll. Arg. L. B. n. 253, facile recedens thallo planiore, minus aeruginoso et minute granulato et margine apotheciorum haud integro. — In insula Taïti: Lépine n. 20 (vidi specim. orig. Montg.), et in Australia orientali: Bailey n. 436, 503.

1513. **Gyalectidium rotuliforme** Müll. Arg. Lich. Paraguay. n. 100, sit **Myxodictyon rotuliforme**. Gonidia l. c. perperam phyllactidialia indicata sunt. Hyphae ipsae pro parte dense radiantes fere *Phyllactidium* simulant, sed gonidia vera globosa vulgaria sunt (copiose visa). — In Paraguay.

1514. **Lecidea pallidula** Krplh. Lich. foliicol. p. 9, et Lich. Becc. p. 27, sit **Patellaria** (s. **Bilimbia**) **pallidula** Müll. Arg. — Cum *Lecidea pineti* Schrad. comparavit cl. Krempelhuber, sed gonidia non sunt chroolepoidea et planta dein ab hac generice diversa est. — Thalli granula $\frac{1}{10}$ mm lata et minora, i. e. minora quam in *P. galbinea*, et glauco-albida; apothecia bene evoluta diametro $\frac{2}{5}$ mm attingunt. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1515. **Lecidea galbinea** Krplh. Lich. foliicol. p. 8 et Lich. Becc. p. 27, sit **Patellaria** (sect. **Bilimbia**) **galbinea** Müll. Arg.; thalli granula hemisphaerica circ. $\frac{3}{20}$ mm lata, intus laete flava; apothecia $\frac{3}{5}$ – $\frac{4}{5}$ mm lata; sporae 12–14 μ longae, $3\frac{1}{2}$ – $4\frac{1}{2}$ μ latae, utrinque obtusae. — E sporis et colore flavido-fulvo disci proxima est *P. palmicola* (Tuck.). — In Borneo (vidi specim. orig.).

1516. **Lecidea palmicola** Tuck. in Proceed. Amer. Acad. v. 6, p. 277, North Amer. Lich. p. 158 (et Lich. Cub. n. 201); Krplh. Lich. foliicol. p. 10 et Lich. Becc. p. 26, sit **Patellaria** (sect. **Bilimbia**) **palmicola** Müll. Arg. — Similis *P. galbinae*, sed thallus laevissimus, continuus, haud granuliger, apothecia minus fulvo-flavicantia et sporae bene evolutae validiores, caeterum conformes. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1517. **Patellaria** (sect. **Bilimbia**) **fumoso-nigricans** Müll. Arg. Lich. epiph. nov. n. 14, v. **fulvescens** Müll. Arg.; apothecia fulvescenti-fusca. — Reliqua omni respectu conveniunt, sed planta primo intuitu satis discrepans. Inter apothecia plantae normalis speciei subinde occurrunt quaedam fusciscentia et transitum manifestum praebent. — Foliicola prope Apiaby in Brasilia meridionali: Puiggari n. 1456.

1518. **Patellaria** (sect. **Bilimbia**) **pellicula** Müll. Arg.; hoc sub nomine recipienda est planta, quam antea in Lich. Gazelle p. 56, neglectis gonidiis, sub **Arthonia pellicula** habui, quae forma apotheciorum et ascis late obovoideis optime *Arthoniae* speciem simulat, quae autem re vera

ab *Arthoniis* differt gonidiis globosis, nec chroolepoides et dein *Patellariis* adscribenda est. Juxta consimilem *P. fumoso-nigricantem* Müll. Arg. inserenda est, a qua recedit sporis majoribus, 22—30 μ longis et 8—11 μ latis et forma brevi ampliuscula ascorum. — In foliis Aurantiorum in insula Fidji: Naumann.

1519. *Lecanora epiphylla* Krplh. Lich. foliicol. p. 3 et Lich. Becc. p. 60 (non Fée), est *Patellaria* (sect. *Bilimbia*) *leucoblephara* Müll. Arg. L. B. n. 277. — Foliicola in Singapore (vidi specim. orig.).

1520. *Biatora tricholoma* Montg. Guy. n. 114, et Syllog. p. 339, sit *Patellaria* (sect. *Bilimbia*) *tricholoma* Müll. Arg. et eadem omnino est illa quam olim prope Caracas in foliis *Stanhopiae* lectam et a cl. Dr. Ernst missam sub *Patellaria cinnamotricha* in meis Lich. Beitr. n. 294 descripsi. Jam l. c. ambas valde affines credidi, at colore vestimenti apotheciorum, in descriptione Montg. l. c. haud bene indicato, diversas putare debui. Pili marginis cinnamomei, circ. 15—27 μ longi et 4—5 μ lati, haud stricti, nonnihil asperuli. — In Guyana gallica: Leprieur n. 1366, et prope Caracas: Dr. Ernst (vidi specim. orig. Montg.)

1521. *Patellaria* (sect. *Bilimbia*) *rufula* Müll. Arg. L. B. n. 299, var. *nigrata*; apothecia nigrata. — Est analogia *P. fusciculatae* β *nigricanti* Müll. Arg. L. B. n. 298, et species ambae vix inter se absolute diversae sunt nisi sporis, in priore latioribus et magis divisis vulgoque, non semper, longioribus. Reliqui characteres, colores marginis et hypothecii ludunt. — Foliicola prope Rio de Janeiro: E. Ule n. 18 pr. p.

1522. *Patellaria* (s. *Bilimbia*) *tomentosa* Müll. Arg.; thallus albidus-argillaceus, tenuissimus, continuus, superficie leprosulus v. obsolete tomentellus; gonidia globosa; apothecia circ. $\frac{1}{3}$ mm lata, depresso-hemisphaerica, basi subconstricta, novella undique vestimento cum thallo concolore breviter tomentoso-tecta, vertice dein punctis nonnullis discretis subnigris mox confluentibus v. simul toto vertice denudata, at persistenter late tomentoso-marginata; hypothecium nigro-fuscum; sporae ignotae, sed affinitas naturalis optime manifesta. — Valde affinis *P. leucoblepharae* Müll. Arg., sed apothecia juniora tota, etiam in disco, vestimento involuta, saepius sensim per puncta discreta in disco denudata et semper longe minus depressa quam in comparata specie. Punctula illa denudata bene *Chiodecton* simulant, sed lamina unica adest et gonidia globosa sunt, aut spermogonia jun. referre videntur, sed non sunt receptacula. — Foliicola prope Apiaty in Brasilia meridionali: Puiggari n. 2100.

1523. *Lecidea cinnamomea* Krplh. Lich. foliic. p. 7 et Lich. Becc. p. 27, sit *Patellaria* (sect. *Bacidia*) *cinnamomea* Müll. Arg.; thallus pulveraceo-furfuraceus, cinnamomeus; gonidia globosa, glomeruloso-cohaerentia, flavescenti-viridia; apothecia novella pallido-carnea, dein carnea, livido-fuscescentia et demum rufo-nigrata; margo primum pallidus, demum sensim in nigrum abiens et levissime tantum prominens; hypothecium rufum v. rufo-fuscum; sporae 4-loculares, 20—28 μ longae, 1 $\frac{1}{2}$ —2 μ latae. — Inter brachy-stenosporas thallo exinie distincta est. — In Borneo, foliicola (vidi specim. orig.).

1524. *Sporopodium Leprieurii* Montg. Guy. n. 116 in Ann. Sc. nat. 3, XVI, p. 54, et Syllog. p. 341; *Lecidea reveniens* Nyl. Enum. gén. p. 123 n. 99; thallus (e miserrimo specim. orig.) maculari-tenuis, flavescenti-glaucus, granulis $\frac{1}{10}$ mm latis acutiuscule hemisphaericis crebre ad-

spersus; gonidia globosa, circ. 5—6 μ lata, glomeruloso-cohaerentia; apothecia $\frac{1}{2}$ —1 mm lata, e depresso mox elatiuscula; discus nigro-fuscus et nudus, convexus; margo fuscus, primum latus sed non prominens, mox dein evolutione laminae exclusus; receptaculum extus ciliis retrorsis longiusculis dein evanescentibus cum thallo concoloribus ornatum; lamina fulva, inferne obscurior; paraphyses valde tenellae, intricatim connexo-ramosae; sporae in ascis solitariae, elongato-ellipsoideae, curvulae, juniores 70—80 μ longae (100 μ longae ex Montg.), locelli in series 30 transversales dispositae (nullomodo podicellatae). — Descriptio Montagneana multis gravissimis falsis obscurata est, et nomen genericum infelicissimum res falsas indicans haud admittendum est. E structura exposita verum *Lopadium* est et quidem species valde distincta ob apothecia extus ciliata. Sit dein **Lopadium Leprieurii** Müll. Arg. — In Guyana gallica: Leprieur (vidi specim. orig.)

1525. **Phlyctis? arachnoidea** Krph. Lich. foliic. p. 11, et **Phlyctis arachnoidea** ejusd. Lich. Becc. p. 16, e forma gonidiorum et apotheciis biatorino-marginalis non est hujus generis; sit **Lopadium arachnoideum** Müll. Arg.; gonidia globosa, vulgaria; apothecia $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{8}$ mm lata, arcte sessilia, extus tota altitudine pilis copiosis 5—6 μ crassis, simplicibus aut subpectinatim ramosis, rigidis, eximie pachydermeis, hinc inde fere solidis et latitudini disci circ. aequilongis aut eo longioribus radiatim strigoso-pilosa; margo pallidus, sed intus gonidiis destitutus, demum lividus aut nigricans, integer, pro more crassiusculus et prominens; discus e fusco demum nigricans; hypothecium pallide nigricans; paraphyses tenellae, molles, laxiuscule connexo-ramosae; asci 1-spori; sporae non bene evolutae mihi obviae, visae 65 μ longae et 17 μ latae (a cl. Krph. visae duplo longiores et latiores), copiose cubico-multicellulosae. — Est species insignis, quodammodo analoga *Patellariae leucoblepharae* Müll. Arg. — Borneo (vidi specim. orig.)

1526. **Echinoplaca epiphylla** Fée Ess. p. XCIII, t. 1, Fig. 29, cujus originalia nondum vidi, est, ut omnia suadent, *Lopadium vulgare* Müll. Arg. L. B. n. 276, in cujus thallus, apotheciis admixta, adest *Tricharia melanothrix* Fée. Haec *Tricharia* enim etiam similiter occurrit inter apothecia *Lopadii urceolati*, *L. carnei*, *L. epiphylli* Müll. Arg., quorum apothecia minus pallida et minus in thallo innato-sessilia sunt. — Genus *Echinoplaca* dein, e rebus inter se alienis compositum omnino recusandum est.

1527. **Lecidea (s. Biatora) Araucariae** Müll. Arg.; thallus albidus v. albo-virens, maculiformi-tenuis, laevigatus, demum leprosus; gonidia globosa, circ. 7—8 μ lata; apothecia $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{10}$ mm lata, flavescenti-pallida, convexa, immarginata, nonnihil pellucetia et demum pro parte livido-fuscescentia; lamina undique hyalina; paraphyses conglutinatae; asci elongato-obovoidei, 8-spori; sporae 12—14 μ longae, 3—3 $\frac{1}{2}$ μ latae, cylindrico-ellipsoideae, utrinque obtusae et longo tractu caeterum aequilatae, rectae aut incurvae. — Prope *L. tenuem* Müll. Arg. Lich. Afric. occid. n. 19 locanda est. — In foliis sublignosis vetustis *Araucariae* prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 2233 pr. p.

1528. **Byssocaulon niveum** Montg. Flor. Fernandez. p. 9, n. 52, Nyl. Enum. gén. p. 119, s. *Parmelia gossypina* v. *filamentosa* Montg. Guy. n. 95, et Syllog. p. 331, ex ins. Juan Fernandez (Bert.), non differt a normali *Byss. gossypino* (Sw., Ach.) Müll. Arg. Lich. Gazelle Nachtr. p. 138,

quod in Lich. Wrightian. Cub. sub n. 110 pulchre distributum fuit et in ins. Jamaica recenter a cl. Hart pulchre fructiferum lectum est.

1529. **Coenogonium tenuissimum** Krplh. Lich. foliic. p. 6, et Lich. Becc. p. 25, est proximum *C. depresso* Müll. Arg. L. B. n. 364, et ab hoc differt filamentis 6--7 μ crassis, fere albis, pluries longioribus, valde intricato-interplexis. — Borneo (vidi specim. orig.).

1530. **Aulaxina** Fée Ess. p. C. et XCIV. t. 2. Fig. 6, et Suppl. p. 47. t. 43, add. Fig. 18 bis; thallus crustaceus; gonidia globosa, laete viridia; apothecia gymnocarpica, lirellina, ex orbiculari oblongata et linearia, margine proprio lecideino praedita; paraphyses laminae irregulares (valde tenues), connexae; sporae hyalinae, transversim divisae. — Gonidia ut in *Lecanoreis* et *Lecideeis*, sed apothecia ut in *Opegrapha* (sed perithecium in speciebus notis dimidiatum) et genus diu diuque neglectum nunc inter *Xylographideas* (Xylographideos Th. M. Fries Scand. p. 634) inserendum est.

1531. **Aulaxina opegraphina** Fée. Ess. p. XCIV. t. 2. Fig. 6; thallus e fuscidulo aut obscure olivaceo dein in colorem virentem aut argillaceum abiens, late expansus, tenuissimus, maculiformis et laevigatus, demum circa apothecia minute orbiculatim decolorando-albescens (hoc statu in opere Féeano pictus et descriptus), orbillis his decoloratis demum confluentibus; gonidia 7—10 μ lata; apothecia primum orbicularia, mox centro late aperta; margo regulariter annularis v. mox plus minusve angulosus, demum ambitu oblongatus aut varie trigonus, obtuse aut acute angulatus, niger et semper prominens et nudus, diametro majore demum $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ mm aequans, caeterumque tamen longe minor; margines in sectione perpendiculari inferne patentes, sub lamina plane et late deficientes; discus planus, depressus, cinereo-pruinosis; lamina tota cum hypothecio hyalina; paraphyses valde tenellae et irregulariter connexae; asci elongato-obovoidei, 2—6-spori; sporae hyalinae, circ. 25—40 μ longae et 7—8 μ latae, longo tractu aequilatae, utrinque rotundato-obtusae, 4—9-loculares. — Apothecia saepissime incomplete evoluta, rotundata, et sporae ipsae saepissime immaturae inveniuntur. Lamina ut in *Lopadiis* et *Arthoniis*. — Foliicola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18104, 18075 pr. p.; in foliis *Psychotriae* ad Porto Estrella; prope Apiahy in variis foliis: Puiggari n. 310, 1736, 2650; et in foliis *Tabernaemontanae* prope Bahiam, in *Psychotria* ad Rio Negro.

1532. **Aulaxina velata** Müll. Arg.; thallus virenti-argenteus v. demum pure argenteo-albus, tenuissimus, minutissime ruguloso-v. subgranulato-inaequalis; gonidia globosa; apothecia nigra, usque ad rimam halone argenteo thallino velata, e brevi linearia, subsimplicia, recta et curvula, circ. $\frac{1}{10}$ mm lata v. leviter latiora, $\frac{1}{4}$ —1 mm longa, arcte adpresso-sessilia; labia in sectione perpendiculari conico-conniventia, demum superne nudata; perithecium basi deficiens; hypothecium olivaceo-fuscum; asci 1—2-seriatim 8-spori; sporae hyalinae, tenellae, 9—20 μ longae et $2\frac{1}{2}$ —4 μ latae, digitiformes, regulariter 4-loculares. — Foliicola prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 1515, 2673.

1533. **Rotula vulgaris** α *radians*; *R. radians* Müll. Arg. Lich. epiphyll. nov. n. 48, s. genuina *Strigula Rotula* Montg. Cub. p. 140 (fide specim. orig.); *Platygrapha Rotula* Nyl. Enum. gén. p. 139, est accurate *Platygrapha radians* Müll. Arg. Lich. Paraguay. n. 166, sed character sporarum in Montagnei Syllog. p. 375 amplius indicatus, sc. sporae pluries

septatae, evidenter (ut docent specim. hl. Montg.) e speciminibus guyanensibus Leprieurii n. 1358, 1359, desumptus, a planta primitiva cubensi hujus nominis recedit et species dein hucusque e scriptis Montagn. recte erui haud potuit. Sporae in vera planta cubensi circ. 20μ longae et $4\frac{1}{2}\mu$ latae sunt (non maximae), tantum 4-loculares (nec pluriseptatae), quarum locus superior intermediorum demum plus minusve manifeste ventricosus s. reliquis paullo latior est. — Foliicola in Cuba (hb. Montg., et in *Blechno* collectionis Wrightianae sub n. 864), ad flumen Amazonum (Spruce), et frequenter in Brasilia meridionali prope Rio de Janeiro: Glaziou, et prope Apiahy: Puiggari.

— — β **granularis** Müll. Arg.; thallus plus minusve copiose minute aut minutissime granuliger, granula sparsa. — Foliicola vulgaris in Brasilia meridionali, prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18083 pr. p., 18085 pr. p., et ibidem in Serra da Bica in foliis *Dactyloctenionis*: E. Ule n. 49; prope Apiahy: Puiggari n. 1038 pr. p., 2230, 2231 b, 2529, 2537.

— — — ***athallina** Müll. Arg.; thallus circa apothecia omnino v. fere omnino evanescens, vestigia thalli (quae raro adsunt) granuligera. — Sporae non differunt. Primo intuitu valde recedens, sed transitus adsunt. — Foliicola prope Apiahy: Puiggari n. 1038 pr. p.

— — γ **laevis** Müll. Arg.; thallus non granuliger, laevigatus, caeterum cum β *granulari* conveniens. — Foliicola prope Apiahy Brasiliae meridionalis: Puiggari n. 2670, 2692, et in monte Corcovado prope Rio de Janeiro in foliis *Artocarpus integrifolius*: E. Ule n. 21 pr. p. (pro magna parte spermogonifera).

1534. **Rotula emergens** Müll. Arg.; thallus fuscescenti-olivaceus, laevis; apothecia exigua, $\frac{2}{10}$ mm lata, modice tantum e thallo emergentia, truncato-plana et tenuiter marginata, margo subacutus; hypothecium olivaceum v. subhyalinum; sporae $13-23\mu$ longae, $3-4\frac{1}{2}\mu$ latae, 4-loculares, locus superior intermediorum leviter major. — Similis borneensi *R. minimae* Müll. Arg., sed hypothecium aliud, et *R. melanophthalmae*, sed sporae graciles. A *R. vulgari* dein differt apotheciis multo minoribus et magis depressis, margine tenuiore, colore thalli. — Foliicola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18078 pr. p., et in foliis *Artocarpus integrifolius* in monte Corcovado: E. Ule n. 21 pr. p.

1535. **Platygrapha minima** Krph. Lich. foliic. p. 12, et Lich. Becc. p. 39, sit **Rotula minima**; thallus olivaceo-fuscescens, laevigatus; apothecia circ. $\frac{1}{8}$ mm lata; discus toto apothecio circ. triplo angustior; hypothecium late nigricans; sporae $12-15\mu$ longae et $3\frac{1}{2}-4\mu$ latae. — Exiguitate apotheciorum et sporarum et insuper apotheciis leviter tantum emergentibus distincta est. A simili *S. emergente* Müll. Arg. recedit hypothecio crasso nigricante. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1536. **Platygrapha chlorochroa** Krph. Lich. foliic. p. 14, pr. p., et Lich. Becc. p. 40 pr. p., sc. thallo virente, est *Rotulae* species, et a simili *R. vulgari* v. *radiante* Müll. Arg. tantum sporis 6-locularibus, magis cylindraceis et apotheciis paullo minoribus differt et juxta *R. striguloidem* sub **Rotula chlorochroa** servanda est, sed ab hac excludenda sunt individua immixtim in eodem folio crescentia thallo albido v. saltem pallidiore, haud radiatim subplicato et sporis 4-locularibus praedita, quae ad *Rotulam melanophthalmam* Müll. Arg. referenda sunt. — Borneo (vidi specim. orig.).

1537. **Platygrapha striguloides** Krplh. Lich. foliicol. p. 15 et Lich. Becc. p. 41, cui referenda est *Strigula Rotula* Montg. Syll. p. 375 quoad sporas (et hb. Montg.), non autem ejusd. Cub. p. 140 (fid. hb. Montg.); *Opegrapha Rotula* Müll. Arg. L. B. n. 686 (exclus. syn. Nyl.). — Est similis *R. vulgari* β *granulari* Müll. Arg., saepe tamen validior et apotheciis vulgo magis emersis, margine crassiore et demum albido — decolorato cinctis et praesertim sporis multo et subduplo longioribus, 6—8—10-ocularibus (nec 4-ocularibus, nisi statu juvenili facile recognoscendo), ambitu tenuioribus, loculo nullo ventricosulo bene distincta est, at extus tantum nunquam tute recognoscenda. — Clar. Montg. Syll. l. c. essentialiter specimina guyanensia Leprieuriana (n. 1358, 1359), nec primitivum cubanum suae speciei ante oculos habuit, at thallus »lineis exstantibus radiantibus« ad primitivam suam *Strigulam Rotulam* pertinet. — Ob characterem sporarum in Montg. Syll. datum, sc. ob sporas magis divisas hanc olim pro vera *Strigula Rotula* Montg. habui, et dein veram *Str. Rotulam* Montg. pro nova specie habui, unde orta est *Opegrapha radians* Müll. Arg. l. c. — Nomen admissum, sub *Platygrapha*, jam antea in Enum. Nyl. p. 131 editum, sed nunquam stabilitum, i. e. nunquam characteribus specificis justificatum fuit. — Hanc vidi e Guyana gallica in foliis *Papayrolae*, e Cayenne: Leprieur n. 1358, 1359, e Brasilia meridionali prope Apiahy pluries lectam: Puiggari n. 378, 385, 1033 et al., ex insula borneensi Sarawak: Becc. n. 232 b (vidi specim. orig.).

1538. **Platygrapha mirifica** Krplh. Lich. foliic. p. 13, et Lich. Becc. p. 40, paraphysibus liberis, rectis, apice clavatis et apotheciis hinc inde retrorsum coronato-dentatis a genere *Platygrapha* recedit; sit **Thelotrema mirificum** Müll. Arg. — Species valde insignis, statu sterili in variis num. borneens. a cl. Beccari distributis, e. g. n. 905, 1836, occurrit. Habitu ad *Th. megalophthalmum* Müll. Arg. L. B. n. 520 accedit, at sporis et thallo valde differt. — In insula Borneo (vidi specim. fert. orig.).

1539. **Opegrapha Phylloporinae** Müll. Arg.; apothecia in thallo alieno parasitania, nigra, simplicia et stellatim 3—6-ramilligera, linearia, arcte adpressa et paullo depressa, circ. $\frac{1}{10}$ mm tantum lata, $\frac{1}{2}$ —1 mm longa; perithecium basi crassius aut tenuius completum, labia in sectione perpendiculari conico-conniventia; asci 8-spori; sporae 12—17 μ longae, 4—5 μ latae, late digitiformes, aequaliter 4-loculares. — Sporae statu turgido semper hyalinae visae, sed demum obfuscae et varie contracto-diformes sunt ut in reliquis congeneribus. Species quandam analogiam offert cum *Opegrapha medusuliza* Nyl., sed apothecia sunt valde tenuiora et sporae angustiores. — In thallo *Phylloporinae epiphyllae* Müll. Arg. prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 3033.

1540. **Opegrapha phyllobia** Nyl. in Flora 1874, p. 73, a cl. Leight. Amazon. Lich. p. 455 pro *Op. vulgata* Ach. (ad Spruce n. 276) determinata, est *Op. filicina* Montg. Cub. p. 184 t. 9. fig. 1, et Guy. n. 154, sc. nunc **Opegraphella filicina** Müll. Arg. Lich. epiph. nov. n. 49. — Latitudo lirellarum $9-14/100$ mm aequat, sc. haud parum ludit saepe in uno eodemque thallo, et adhuc magis ludit earum longitudo. Perithecium dimidiatum est et labia sicca apice quasi in cristam obtusam acutiuscule convergunt. Sporae 17—21 μ longae, 3—3 $\frac{1}{2}$ μ latae, evolutae 6-loculares, loculus unus intermedius demum nonnihil ventricosus et saepe longior. — Foliicola ad San Gabriel in Brasilia sept.: Spruce n. 276, et meridionali pluribus locis, in Guyanis, ad Caracas et in Cuba.

1541. **Micrographa** Müll. Arg.; thallus crustaceus; gonidia phyllactidialia; apothecia gymnocarpica, opegraphina (dimidiata), margine proprio lecideino praedita; laminae paraphyses non anastomosantes; sporae e hyalino fuscae, transversim divisae. — Omnia ut in *Melaspilea*, inclusa *Melanographa* Müll. Arg., sed gonidia phyllactidialia, nec chroolepoidea. — Species *Opegraphae* exiguas simulant.

Praeter novas duas sequentes hic pertinet: **Micrographa phaeoplaca**; *Melaspilea phaeoplaca* Müll. Arg. Lich. Paraguay. n. 155. Tota potius Fungum simulat, sub hyphis fuscis aut nigris vultu funginis autem adest systema gonidiale phyllactidiale. Primum in Paraguay et dein etiam prope Apiahy in Brasilia meridionali ab oculatiss. Puiggari sub n. 476, 489, 1519, 2210 lecta fuit.

1542. **Micrographa abbreviata** Müll. Arg.; thallus maculiformi-tenuis, obscure olivaceus, continuus et laevis; gonidia obscurato-phyllactidialia; hyphae fusco-nigricantes, squarrosulae; apothecia $\frac{1}{10}$ mm lata, ex orbiculari oblonga, 1–3-plo longiora quam lata, raro ambitu paullo longiora, clauso-lirelliformia, sulco perangusto; perithecium basi deficiens; asci obovoidei, superne pachydermei, 8-spori; sporae 23–27 μ longae, 7–8 μ latae, aequaliter 2-loculares, medio paullo angustiores. — Follicola prope Apiahy Brasiliae: Puiggari n. 341.

1543. **Micrographa anisomera** Müll. Arg.; thallus maculiformi-tenuissimus, fusco-griseus, continuus, laevigatus; gonidia fuscidulo-phyllactidialia, hinc inde directe in marginem lirellarum abeuntia; lirellae confertae, vix $\frac{1}{12}$ mm latae, $\frac{5}{10}$ mm longae, ambitu eximie ludentes, vulgo tamen angustae, emersae, nigrae, margo tenuissimus; discus demum subplanus, late apertus et niger; perithecium basi deficiens; hypothecium hyalinum; asci oblongato-obovoidei, 8-spori; sporae e hyalino fuscae, 8–13 μ longae, 4–6 μ latae, clavato-obovoideae, valde inaequaliter 2-loculares, locus superior inferiore multo latior et 2–4-plo longior. — Habitu ad *Opegraphellam filicinam* accedit. — Follicola prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 3034.

1544. **Myriostigma candidum** Krph. Lich. foliic. p. 22, et Lich. Becc. p. 45, est vera *Arthothelii* species et dein **Arthothelium candidum** Müll. Arg. nominandum est. — Thallus coerulescenti-albus, quasi halonis instar tenuissimus; gonidia chroolepoidea, circ. 6–8 μ lata; hyphae 2 μ latae; stromata auctoris sunt ipsa vera apothecia, irregularia, fere plana; asci magni, subglobosi et globosi, pachydermei, 50–60 μ longi, 8-spori (non 4-spori, saltem normaliter), paraphysibus spuris *Arthoniarum* tenellis connexo-ramosis copiose involuti; sporae 40–55 μ longae, 11–14 μ latae, evolutae 10-loculares, loculi transversim 2–3(–4)-locellati. — Apothecia candida, in superficie ob ascos obsolete velato-emergentes nonnihil inter ascos numerosos impresso-punctata. Haec punctula s. depressiones cl. auctor pro apotheciis habuit, unde genus *Myriostigma* erronee conditum fuit. Prope *Arthothelium leucocarpum* Müll. Arg. Diagn. Lich. Socotr. p. 15 inserendum est. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1545. **Pycnographa** Müll. Arg., gen. nov.; thallus crustaceus; gonidia phyllactidialia; apothecia in stromate nigro sita, circa centrum radiantia, lirellina, opegraphina; paraphyses liberae; sporae hyalinae, transversim divisae. — A *Glyphide* et *Sarcographa* differt gonidiis et simul sporis.

1546. **Pycnographa radians** Müll. Arg.; thallus olivaceo-virens, pertenuis, laevigatus; stromata orbicularia, tenuia, $1\frac{1}{2}$ —2 mm lata, nigra, centro altiora; lirellae late lineares, simplices, erga centrum stromatis ascendenti-convergentes, ex innato-sessili demum emersae, circ. $\frac{1}{7}$ mm latae; margines in sectione perpendiculari arcte conniventes, demum tamen hiantes, integri et nigri; lamina hyalina, basi in stroma commune abiens; asci oblongo-obovoidei, circ. 4-spori; sporae circ. 14μ longae et 6μ latae, 2-loculares, locus superior paullo latior et vulgo leviter brevior. — Follicola prope Apiahy in Brasilia meridionali: Puiggari n. 2542, 3051.

1547. **Phyllobathelium** Müll. Arg., gen. nov.; *Bathelii* sect. *Phyllobathelium* Müll. Arg. L. B. n. 680; omnia ut in *Bathelio*, sed gonidiorum systema primum phyllactidiale, sed radii mox hyphis percurrentibus segregati et valde intricati et tum spurie formam chroolepoideam, at cellulis magis cylindricis et longioribus, referentes. — Paraphyses liberae; sporae hyalinae, parenchymatosae. — Species unica nota brasiliensis: **Phyllobathelium epiphyllum** Müll. Arg., *Bathelium epiphyllum* ejusd. l. c., prope Apiahy: Puiggari n. 369, 1464, 1719, 2626, et prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18074, 18096, 18099, 18109 a.

1548. **Microtheliopsis** Müll. Arg., gen. nov.; thallus crustaceus; gonidia phyllactidialia; apothecia pyrenocarpica, simplicia; paraphyses pertenuis, verisimiliter connexae; sporae fuscae, simpliciter transversim divisae. — A genere *Microthelia* recedit systemate gonidiorum.

1549. **Microtheliopsis Uleana** Müll. Arg.; thallus fuscescenti-olivaceus, pertenuis, continuus et laevis; apothecia circ. $\frac{1}{10}$ mm lata, fusco-nigra, subdepresso-hemisphaerica, nitidula, basi saepe zonula angusta cincta; perithecium dimidiatum; asci valde exigui, obovoidei, 8-spori; sporae mox fuscae, 10—13 μ longae, 4—5 μ latae, fusiformi-ellipsoideae, aequaliter 4-loculares. — Exiguam *Phylloporinam* simulat. — Follicola in Morro da Nova Cintra prope Rio de Janeiro: E. Ule n. 22 pr. p.

1550. **Verrucaria virescens** Krplh. Lich. foliic. p. 21, et Lich. Becc. p. 53, est vulgatissima *Porina epiphylla* Fée Ess. Suppl. p. 75; Müll. Arg. L. B. n. 653, s. **Phylloporina epiphylla** Müll. Arg. Lich. epiph. nov. n. 50. — Sporae ab auctore vix liberae visae nimis longae indicatae, divisione ludunt, vulgo 7-septatae, sed etiam simul hinc inde 9—11-septatae adsunt. Ille Lichen autem, quem in meis L. B. n. 652 (ex divisione sporarum et falsis dimensionibus Krplh.) pro *Verrucaria virescente* Krplh. habui et sub *Porina virescente* enumeravi, distinctus est et specificè sub **Phylloporina virescente** Müll. Arg. Lich. epiph. nov. n. 50 servandus est. — Vidi specim. orig.

1551. **Verrucaria melanobapha** Krplh. Lich. foliic. p. 18, et Lich. Becc. p. 51, est pulchre evoluta *Rhacoplaca subtilissima* Fée Ess. p. XCIX. t. 2. fig. 5, nunc **Strigula subtilissima** Müll. Arg. L. B. n. 678. — In Borneo (vidi specim. orig.).

1552. **Verrucaria monocarpa** Krplh. Lich. foliic. p. 19, et Lich. Becc. p. 63, cujus sporae hucusque ignotae et cujus locus systematicus dein dubius, sit **Phylloporina** (s. **Segestrinula**) **monocarpa** Müll. Arg. — Est species eximie distincta. Thallus orbillas perexiguas, vix 1 mm latas, centro monocarpicas v. circa apothecium plus minusve obsoletas formans; gonidia phyllactidialia; apothecia $\frac{4}{10}$ mm lata, conico-hemisphaerica, dimidiata, fusco- v. rufo-nigricantia, primum magis fulva; paraphyses

tenellae; sporae in ascis cylindricis 8-nae, circ. $35\ \mu$ longae et $4-4\frac{1}{2}\ \mu$ latae, anguste digitiformes, utrinque subobtusae, regulariter 6-loculares. — Follicola ad Singapore: Beccari (vidi specim. orig.).

1553. *Verrucaria limbolata* Krplh. Lich. foliic. p. 17, et Lich. Becc. p. 54, sit *Phylloporina* (s. *Segestrinula*) *limbolata* Müll. Arg. — Thallus obscure olivaceus; gonidia phyllactidialia; apothecia rufescentia et fusca, inferne crassiuscule thallino-velata et, ostiolo excepto, undique subradiatim cellulosa, basi late in thallum abeuntia. — Sporae a Krplh. bene descriptae. — Cum *Ph. albicera* in iisdem foliis commixtim crescens, et statu sicco aegre ab ea recognoscenda, madefacta autem optime diversa thallo longe obscuriore, apotheciis intensius fusco-rufescentibus (in illa autem intensius flavescenti-pallida) et basi non contractulis. Sporae demum ambitu paullo latiores, magis fusiformes. A simili *Ph. rubicolore* Müll. Arg. differt colore thalli, apotheciis magis thallino-corticatis, paullo majoribus et sporis validioribus. — In Borneo (ins. Sarawak): Becc. (vidi specim. orig.).

1554. *Verrucaria albicera* Krplh. Lich. foliic. p. 16, et Lich. Becc. p. 53, sit *Phylloporina* (s. *Segestrinula*) *albicera* Müll. Arg.; thallus aeruginoso-virens, tenuissimus; gonidia phyllactidialia; apothecia $\frac{2}{10}$ mm lata, hemisphaerica, vitellino-pallida, ostiolo perexiguo prominente carneo ornata, sub microscopio virenti-flavicans; sporae ut in *Ph. rufula* et in brasiliensi et affini *Ph. fulvella* Müll. Arg., cujus apothecia sunt depressa. — Follicola in Borneo (ins. Sarawak): Beccari (vidi specim. orig.).

1555. *Verrucaria rufula* Krplh. Lich. foliic. p. 20, et Lich. Becc. p. 53 (1874), sit *Phylloporina* (s. *Segestrinula*) *rufula* Müll. Arg. — Descriptio auctoris infelix et falsis, e confusione aut potius transpositione quadam notularum ortis valde obfuscata est. — Maculae thallinae bene circumscriptae, phyllactidiales, ochraceo-flavae (nec testaceae); apothecia $\frac{1}{4}$ mm lata, grosse radiatim cellulosa, cum thallo fere concolora v. demum paullo obscuriora et leviter rufula, saltem inferne obsolete thallino-corticata; sporae 4-loculares (non 4—5-septatae, i. e. 5—6-loculares), $20-22\ \mu$ (nec $32-34\ \mu$) longae, $3\frac{1}{2}-4\ \mu$ (nec $8-9\ \mu$) latae, ut in *Ph. rubentior* Müll. Arg., sed thallus et apothecia alia. — Dimensiones et structura sporarum apud Krplh. e *Verrucaria ravidata* Krplh. depromptae videntur. — Juxta *Ph. fulvellam* Müll. Arg. locanda est, et eadem est ac vulgatissima *Verrucaria rubicolor* Stirt. Lich. on Leaves p. 9 (1878), s. *Porina rubicolor* Müll. Arg. L. B. n. 659. Thallus colore, ut jam antea in meis L. B. dixi, valde ludit, saepius argillaceo-flavicans, interdum olivaceo-virens aut decolorato-albescens, v. dein aurantiaco- v. ochraceo-flavicans. — Follicola in Borneo, et vulgaris in America calidiore.

Ph. ruf. v. *rhodoplaca*; *Porina rubicolor* v. *rhodoplaca* Müll. Arg. L. B. n. 659. — In Brasilia sept. ad San Gabriel: Spruce n. 466 pr. p., prope Apiaby: Puiggari n. 1453 pr. p., in Philippinis in Cumingii n. 829 *Myristicae bracteatae* v. *longifolia* A. DC.

Ph. ruf. v. *obscurata*; *Porina rubicolor* v. *obscurata* Müll. Arg. L. B. n. 659; cum planta normali vulgaris. — Ad hanc dein etiam *Porina leptospermoides* Müll. Arg. L. B. n. 658 revocanda est, cujus statum non omnino evolutum refert. Apothecia enim juniora ipsius plantae normalis sporas offerunt speciei suppressae.

1556. *Porina* (s. *Euporina*) *imitatrix* Müll. Arg.; thallus argillaceus v. argillaceo-virens, tenuis, sublaevis v. obsolete gibbosulus, margine hinc

inde latius in zonam argenteo-nigrescentem subplumosulam et pro parte interruptam abiens; gonidiorum chroolepoideorum articuli breves; apothecia $\frac{2}{3}$ mm lata, thallino-vestita, nano-hemisphaerica; ostiolum e fulvo-fusco demum nigricans, semper punctiformi-angustum; perithecium obscure tinctum; sporae 8-nae, $40-47\ \mu$ longae, $7-10\ \mu$ latae, late fusiformes, utrinque obtuse attenuatae, 8-loculares. — Apothecia illa referunt *Porinae Tetracerae* Müll. Arg. et *P. desquamescentis* Fée, sed thallus zona cinctus et sporae exacte ut in proxima *P. marginata* Fée, cujus apothecia superne late fulva. — Follicola prope Rio de Janeiro: Glaziou, inter n. 18072, 18085, 18086.

1557. **Porina** (s. **Euporina**) **verruculosa** Müll. Arg.; thallus carneo-argillaceus, tenuissime granularis, granula nano-hemisphaerica, $\frac{1}{20}-\frac{1}{15}$ mm lata, densa; gonidiorum articuli breves; apothecia $\frac{2}{10}$ mm lata, alte hemisphaerica, cum thallo concolora, granulis thallinis aliquot verruculosa, vertice haud prominente fulvo- v. pallido-ostiolata; perithecium pallidum; sporae 8-nae, $16-19\ \mu$ longae, $4-5\ \mu$ latae, digitiformes, 6-loculares. — Juxta paraguayensem *P. lecanorellam* Müll. Arg. locari potest, cui tamen non arcte affinis est. Apothecia quasi formam exiguum referunt *Pertusariae granulatae* Müll. Arg. (*Pert. verrucosae* Montg.), et habitu etiam ad *Porinam nuculam* Ach. accedunt, ubi sporae longe aliae. — Follicola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18103.

1558. **Phylloporina** (s. **Euphylloporina**) **macrospora** Müll. Arg.; thallus argillaceo-pallidus, tenuissimus, continuus et laevis; apothecia $\frac{1}{3}-\frac{1}{2}$ mm lata, hemisphaerica, thallino-corticata, apice obtuso fulvo-carnea; sporae 8-nae, circ. $80\ \mu$ longae et $15\ \mu$ latae, $18-22$ -loculares, loculi omnes subduplo latiores quam longi. — Extus satis *Phylloporinam epiphyllam* Müll. Arg. simulat, sed sporae longe majores, pluries latiores et loculi 3-plo numerosiores. — Thalli gonidia valde mixta visa sunt, alia simplicia globosa numerosa, alia pauciora depauperato-serialia et iterum alia dein regulariter phyllactidialia. Haec ultima, etiamsi minus numerosa, ex summa analogia huic speciei propria adscribenda videntur. — Juxta *Phylloporinam multiseptatam* Müll. Arg. inserenda est. — Follicola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18081.

1559. **Phylloporina** (s. **Euphylloporina**) **platyspora** Müll. Arg.; thallus pallido-virens, tenuissimus (aegre perspicendus); apothecia $\frac{1}{2}$ mm lata, truncato-hemisphaerica, lateraliter pallide thallino-corticata, apice late truncato nuda et fulvo-fuscescentia; sporae 4-6-nae, 2-seriales, late fusiformes, $55-80\ \mu$ longae, $14-17\ \mu$ latae, $10-16$ -loculares, loculi omnes multo latiores quam longi. — Gonidia adsunt mixta, partim globosa, partim phyllactidialia ut in *Ph. macrospora* Müll. Arg., cui affinis est. Apothecia de supra visa *Lecanoram* fere simulant. — Follicola prope Apiahy in Brasilia meridionali; Puiggari n. 2218 pr. p.

1560. **Phylloporina** (s. **Segestrinula**) **rubentior** Müll. Arg.; *Verrucaria rubentior* Stirt. Lich. on Leaves p. 9; thallus olivaceo-virens, tenuissimus (aegre distinguendus), continuus; gonidia irregulariter phyllactidialia, pro parte in filamenta soluta; apothecia $\frac{8-22}{100}$ mm lata, demum alte globoso-hemisphaerica, basi constricta, rufo-fusca, demum rufo-nigricantia, nuda, hinc inde demum apice late collapsa-concava; perithecium irregulariter cellulosum; sporae in ascis 8-nae, 1-2-seriales, obtuse fusiformes, $15-20\ \mu$ longae, $3\frac{1}{2}-4\ \mu$ latae, 4-loculares. — Sporae ut in

vulgari *Phyllop. rufula* Müll. Arg., sed apothecia insigniter superficiali-emersa et alte convexa, et praesertim aliter cellulosa. Apothecia juniora omnino simulant illa *Phyll. rufulae* et species hoc statu vix nisi cellulis peritheciis recognosci potest. — Foliicola in Brasilia meridionali prope Apiahy: Puiggari n. 2629 pr. p., 2681, et prope Rio de Janeiro: Glaziou (inter Miscellan.), in Paraguay: Balansa.

1561. **Phylloporina** (s. **Segestrinula**) **octomera** Müll. Arg.; thallus orbillas exiguas mox confluentes fusciscenti-pallidas et tenuissimas formans; gonidia pulchre phyllactidialia, cellulae elongatae; apothecia $2\text{--}3/10$ mm lata, alte hemisphaerica, basi thallino-vestita, caeterum nuda, sicca fusca, madefacta fulvo-fusca et paullo pellucida, sub microscopio marginem versus radiatim cellulosa; asci angusti, 8-spori; sporae $26\text{--}38\ \mu$ longae, $4\text{--}4\frac{1}{2}\ \mu$ latae, anguste fusiformes, basi longius angustatae, 8-loculares. — Juxta *Ph. monocarpam* Müll. Arg., e Borneo, cujus apothecia majora et magis depressa et cujus sporae ampliores, locanda est. — Foliicola prope Apiahy et Iporanga in Brasilia meridionali: Puiggari n. 368 pr. p., et prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18095, et E. Ule n. 47 pr. p.

1562. **Phylloporinae** sect. **Sagediastrum** Müll. Arg. Lich. Epiphyll. nov. n. 50; gonidia in systema phyllactidiale evoluta, i. e. in series dichotomas abeuntia quae ipsae tantum brevi v. etiam varie longiore tempore in membranam coalitae sunt; series hae non raro apice v. longiore tractu v. fere undique demum liberae evadunt et tum gonidia chroolepoidea simulant. Hoc respectu in una eademque specie valde variant, at a veris chroolepoideis in eo discernuntur quod cellulae longe magis regulares, cylindricae, non v. vix irregulariter ventricosae et propter originem semper valde numerosae. Subinde etiam, statu segregato, series valde intricatae et hyphis percursae observantur, hinc inde tamen ramificationem dichotomam clare ostendentes.

1563. **Phylloporina** (s. **Sagediastrum**) **Janeirensis** Müll. Arg.; thallus olivaceo-virens, tenuissimus, continuus et laevis, late effusus; apothecia $5\text{--}6/10$ mm lata, nigra, nano-pyramidalia, obtuse subacuminata, nuda, opaca, apice nitidula; perithecium dimidiatum, basi late apertum; nucleus albus; paraphyses tenuiter capillares; asci angusti, 4--6-spori; sporae $50\text{--}60\ \mu$ longae, circ. $7\ \mu$ tantum latae, utrinque obtuse angustatae, medio modice constrictae, anguste fusiformes, 2-loculares, loculi aequales. — Apothecia majora quam in vulgatissima *Ph. phyllogena*, et sporae longitudine pro hac sectione insignes. Systema gonidiorum phyllactidiale, cellulae breves, mox laxae et earum series dein plus minusve chroolepoideo-segregatae. — Foliicola prope Rio de Janeiro: Glaziou (inter miscell. parce).

1564. **Phylloporina** (s. **Sagediastrum**) **obducta** Müll. Arg.; thallus olivaceo-argillaceus, tenuissimus, laevis; gonidia irregulariter phyllactidialia; apothecia copiosa, $2/10$ mm lata, conico-hemisphaerica, acutata, praeter verticem nudum et atrum undique strato thallino cum thallo concolore obducta; perithecium dimidiatum; sporae in ascis linearibus imbricatim subuniseriales, 8-nae, circ. $10\text{--}12\ \mu$ longae, anguste fusiformes, 2-loculares. — Apotheciis minoribus fere omnino thallino-obductis magis elato-acutatis a communi *Ph. phyllogena* differt. — Foliicola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18085 pr. p., et 18086.

1565. **Phylloporina** (s. **Sagediastrum**) **caerulescens** Müll. Arg.; thallus olivaceo-virens, tenuissimus, laevis, ambitu in zonam latiusculam

plus minusve imove pulchre caeruleam abiens; gonidia irregulariter phyllactidialia; apothecia circ. $\frac{1}{3}$ mm lata, hemisphaerica, halone thallino tecta, cinerascenti-atra; perithecium dimidiatum; sporae in ascis linearibus imbricatim 1-seriatim 8-nae, circ. 10μ longae et 3μ latae, 2-loculares. — Cum vulgari *Ph. phyllogena* characteribus carpologicis congruit, sed thallus margine in zonam plus minusve coeruleam transit. Saepius inter alios Lichenes insulatim crescit raroque bene evoluta est, et subinde a *Phylloporina epiphylla* aut aliis pro parte oblecta est. — Follicola prope Rio de Janeiro: Glaziou, inter miscell. et n. 18078 pr. p., 18105 pr. p.

1566. **Strigula Nematora** Montg. Cub. p. 143 (non *Nematora argentea* Fée Ess. p. XCIX, nec *Strigula nemathora* Nyl. Pyr. p. 67), est **Strigula argyronema** Müll. Arg. Pyr. Cub. p. 379. Est longe validior quam *St. elegans* v. *nemathora* Müll. Arg. Pyr. Cub. p. 380, s. *Nematora argentea* Fée, a qua insuper differt apotheciis multo majoribus et thallino-oblectis, nec nudato-nigris. — In insula Cuba: Ramon de la Sagra (vidi specim. orig. Montg.).

1567. **Strigula Glaziovii** Müll. Arg.; *Strigula nitidula* Montg.? ex Krph. Lich. Glaz. p. 83 (non Montg.). — Plagulae $\frac{1}{3}$ — $1\frac{1}{3}$ cm latae, orbiculares, subregulares, tenuissimae et planissimae, argenteo-griseae, opacae, pilis griseis adpressis vestitae, in peripheria magis virides et in lobulos radiantes lineares obtusos solutae; gonidia pulchre phyllactidialia. — Apothecia ignota. — Hucusque pro *Strigula actinoplaca* Nyl. habui, sed haec non est vera *Strigulae* species. — Follicola prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 5407, 5408, et in foliis *Anonacearum* prope Caracas: Dr. Ernst.

1568. **Strigula actinoplaca** Nyl. Pyrenoc. p. 67; haec species minime ad genus *Strigulam* referenda est, gonidia enim globosa sunt, ut recenter etiam recognovit cl. Hariot (Notice sur le genre *Cephaleuros* p. 4, infra) et plantula verisimiliter *Lecaniae* aut *Gyalectidio* aut *Lopadio* adscribenda est, sed apotheciis caret et dein accurate enucleari haud potest. Nunc simpliciter e genere *Strigula* exclusa sit. — Prope Mexico: Fred. Mueller in hb. Mus. Parisiensi (vidi specim. orig.).

1569. **Strigula complanata** Montg. Cub. p. 140. t. 7. fig. 3 et Sylloge p. 375 (non allata *Phyllocharis complanata* Fée Ess. p. XCIX. t. 2. fig. 3, quae *Strigula complanata* Nyl. Pyrenoc. p. 65 pr. p., et *Strigula complanata* v. *genuina* Müll. Arg. Pyr. Cub. p. 381), est **Strigula pachyneura** Müll. Arg. L. B. n. 914. — Tota est longe validior et amplior quam *Strigula complanata* Nyl., plicae marginis plagularum magis irregulariter radiantes. — In insula Cuba: Ramon de la Sagra (vidi specim. orig. Montg.).

1570. **Strigula ciliata** Montg. Cub. VI. n. 19) et Sylloge p. 376, jam in Pyrenoc. cubens. p. 380 sub **Strigula complanata** v. **ciliata** Müll. Arg. enumeravi. Specimina 2 Montg. conveniunt, at lacinulae quam vulgo subtilius et hinc inde vix distincte longitrorsum costulatae sunt. Prima fronte a *Str. complanata* (Fée) valde diversa videtur, sed intercedente var. *mesotropa* Müll. Arg. Pyrenoc. Cubens. p. 380 omni jure cum ea conjungitur. — Vidi specim. Montg.

1571. **Strigula rugulosa** Müll. Arg.; plagulae prasino-virentes, orbiculares, 6—10 mm latae, planae, margine crenatae, mox tota latitudine valide et crebre rugulosae, superficie ipsa sub microscopio haud costu-

latae; apothecia $3\frac{4}{10}$ mm lata, hemisphaerica, nigra, nitidula; sporae in ascis linearibus 8-nae, $14\text{--}17\ \mu$ longae, $3\text{--}4\ \mu$ latae, 2-loculares; stylosporae sporis paullo longiores et tenuiores. — A proxima *St. nitidula* Montg. differt thallo undique ruguloso, non fere crustaceo-amorpho. Thallus in centro demum late evanescit. Species inter *St. prasinum* Müll. Arg. et *St. nitidulam* Montg. inseranda est. — Foliicola prope Rio de Janeiro: Glaziou (inter Miscell.), et prope Apiaty Brasiliae meridionalis: Puiggari n. 2629 pr. p.

— — v. *irregularis* Müll. Arg.; tota 2–3-plo minor, ambitu irregulariter obtuse lacero-lobata (et undique ruguloso-inaequalis). — Pycnidigera tantum visa est. — Foliicola prope Apiaty: Puiggari n. 1463.

1572. *Strigula tremens* Müll. Arg.; thallus virenti-albidus, e centro longe lineari-radians, laciniae fere undique distanter discretae v. centro confluentes, parce dichotome v. subpennatim divisae, aut breviores indivisae, omnes lineares et subflexuosae, circ. $5\text{--}15/20$ mm latae, majores $1\frac{1}{2}\text{--}2\frac{1}{2}$ mm longae, superne saepe iterum in rotulam abeuntes, omnes supra late et obtuse canaliculatae, margine leviter incurvae et tota longitudine alternatim latiores et angustiores, haud rectae et dein sub lente quasi flaccidotremes; gonidia phyllactidialia; apothecia $5\text{--}6/20$ mm lata, hemisphaerica, circa basin annulo alte thallino-corticata, apice late nuda et nitida; asci oblongato-obovoidei, 8-spori; sporae $18\text{--}22\ \mu$ longae, $4\frac{1}{2}\text{--}6\ \mu$ latae, 2-loculares, medio paullo angustiores, utrinque obtusae. — Specimina minora habitu ad *Str. subtilissimam* (Fée) accedunt, sed laciniae tremes, apothecia lateraliter thallino-corticata et sporae multo majores recedunt. Foliicola prope Apiaty in Brasilia meridionali: Puiggari n. 358 pr. p., cum *Opegraphella Puiggarii* Müll. Arg., 2070, 2071, et aliis n. admixta.

1573. *Strigula subtilissima* (Fée) Müll. Arg. L. B. n. 678, nunc copiose lecta evadit species insigniter variabilis. Thallus olivaceo-viridis aut-virens, vulgo mox fuscus v. olivaceo-fuscus v. etiam obscure fuscus, demum in nonnullis decolorando-cinerascens et pro parte albicans, in halone nigrescente plus minusve perspicuo situs, nunc fere undique integer et tantum margine in lobos varios, obtusos, aculos, bi-trifurcatos abiens v. margine ipso saltem pro parte fere integer et centro lato, quasi fissuris radiantibus interruptus est, nunc tota v. fere tota longitudine in lacinulas irregulariter v. regulariter lineares et dichotomas aut varie irregulariter ramosas, discretas aut partim varie superposito-imbricatas divisus occurrit et saepissime in uno eodemque folio valde ludit; apothecia demum juniora halone thallino velata, mox dein nigra et opaca v. etiam demum nitida observantur; sporae vulgo 2-loculares, at demum subinde simul 4-loculares inveniuntur, similiter ac in aliis quibusdam hujus generis. — Cum hac dein etiam jungenda est *Strigula amblyoloba* Müll. Arg. L. B. n. 679, quacum formis diverso modo intermediis optime coadunatur. — Foliicola in America calidiore tota vulgatissima, etiam in Borneo lecta et verisimiliter in reliquis regionibus calidis sat vulgaris sed ob minutiem hucusque praetervisa.

1574. *Strigula Babingtonii* Berk. Suppl. Engl. Bot. t. 2957; Leight. Angiocarp. Lich. p. 70; Lichenfl. of Great Brit. ed. 3. p. 498; Nyl. Pyrenoc. p. 68; Mudd Man. p. 309, in foliis Pruni Lauro-Cerasi, Arbuti et Buxi in Anglia, quam etiam prope Genevam in foliis Buxi ipse legi, a cl. Hariot (Note sur le genre Cephaleuros p. 5) ad Fungos relata fuit. Jam

antea (L. B. n. 925, Obs. I) haec species a me ipso e genere *Strigula* exclusa fuit, sed absentia non solum gonidiorum, sed etiam microgonidiorum, plantam absolute a Lichenibus separat et ad Fungos transfert.

1575. **Strigula Microthyrium** Montg. Cent. VI. n. 19, bis, et Sylloge p. 376, a cl. Hariot, Notice sur le genre *Cephaleuros* p. 5 simpliciter pro disculis decoloratis epidermidis habita, est status juvenilis asporus Fungi cujusdam, habitu depazeoideo. Perithecia in disculis orbicularibus convexis albidis, nec in reliqua parte folii crescunt. Thallus verus *Strigulae* omnino deest et species dein e genere, imo et classe Lichenum excludenda est. — In insula Taïti: Lépine (vidi specim. orig.).

1576. **Haplopyrenula** Müll. Arg. L. B. n. 606 (anno 1883), inter Lichenes pyrenocarpicos recepta, nunc definitive ad *Fungos* releganda est, sub thallo et in thallo *Lichenum* variorum epiphyllorum crescens. — In Puiggarii n. 1464 et C. Wrightii Lich. Cubens n. II. 197 pr. p., veram *Haplopyrenulam tunicatam* Müll. Arg. gerens, thallus madefactus saepe desquamescit, at solus desquamescit, apothecia ipsa nudissima, atra, nitida, immediate in epidermide folii stantia relinquens, unde thallus, gonidia globosa continens, evidenter alienus apparet. Si enim thallus et apothecia conjunctim unum Lichenem constituissent, tum etiam conjunctim, ut mos est, e folio delapsa fuissent, et thallus insuper dein, pro thallo incomplete sterili *Lecaniae heterochroae* Müll. Arg. recognosci potuit. — Hoc de organismo composito certioratus dein *Haplopyrenulae* species omnes (7) descriptas pro thalli structura iterato examini subjeci et sequentia observavi: Gonidia *H. microphorae* Müll. Arg. globosa sunt, et thallus re vera ad *Gyalectidium filicinum* Müll. Arg. pertinet. Reliquae species, e variis speciminibus, nunc gonidia globosa et chroolepoidea, nunc chroolepoidea et phyllactidialia, nunc etiam (*H. tunicata* Müll. Arg.) 3 formas gonidiorum ostendunt, unde ex omni generali experientia thallus omnium harum specierum pro alieno necessarie habendus est, nam genus naturale Lichenum, et eo fortius ipsa species, gonidia diversa habere nequeunt. Thallus ergo, qualis hucusque descriptus, ad varias *Lecanoreas* et *Lecideas*, ad *Graphideas* et *Pyrenocarpeas* pertinet, at apothecia e contra sunt Fungilli, nunc sub thallo nunc in thallo lichenino crescentia. — Cum hac interpretatione demum optime quadrat character mihi pretiosissimus, ob minutiam partium tamen hic aegrius statuendus, sc. absentia microgonidiorum in omnibus partibus apotheciorum. *Haplopyrenula* ergo omni jure ad Fungos pertinet.

1577. **Tricharia orbicularis** Krphl. Lich. foliic. p. 24, et Lich. Becc. p. 64, est duplex et supprimenda. Planta ab auctore essentialiter descripta est Fungus depazeoideus, in pagina superiore maculas albidas aut virenti-albidas, margine prominulas, gonidiis destitutas referens, quibus in pagina infera respondent maculae conformes, rite oppositae, pallidiores et steriles; apothecia in maculis prioribus sparsa, perexigua, primum integre clausa, haud piligera, demum fere dehiscenti-gyalectoidea (sporis destituta), desupra visa subclathratim pellucido-porosa. In iisdem foliis dein, sed in pagina supera tantum, simul occurrunt maculae magis effusae *Trichariae melanothrichos* Fée, cujus apothecia sunt piligera, et hae ambae ab auctore conjunctim pro nova *Trichariae* descriptae fuerunt. — Follicola ad Singapore: Beccari (vidi specim. orig.).

1578. **Trichoplacia microscopica** Massal. Alcuni Generi p. 9 (character. ap. Trev. et Mass. ex oper. seq. Montg. mutuati); *Biatora microscopica*

Montg. Guyan. n. 115, et Syllog. p. 339; *Bacidia microscopica* Trev. Brigant. p. 293, n. 12. — Specimina duo herbarii Montg. hodie in eo destructa sunt quod apotheciis omnino orbata sunt. Substratum nigrum, radially-filamentosum, mycelium sistit funginum; filamentorum ramosorum ramilli haud pauci adsunt obovoidei, tumidi. Sporae dein fusiformes, regulariter 3-loculares, quae inter Lichenes perrarae, quales ab auct. descriptae et in chartula adjuncta delineatae fuerunt, in fungillo versimiliter identico, foliicolo, hinc inde occurrunt inter Lichenes epiphyllous austro-americanos. — Species e Lichenibus excludenda est (vidi specim. orig. Montg.).

1579. *Orthidium* sit nomen novae fructificationis Lichenum. Est conforme *Campylidio* Müll. Arg. L. B. n. 281 (in Flora 1881), sed rectum, perfecte regulare, similiter superficiale et habitu biatorino-gyalectinum (carneo-pallidum); receptaculum latiuscule apertum et profunde concavum (marge crassus, obtusus, integer); discus concavus, lamina nana; basidia filiformia, simplicia; acrospora unicellulares (cylindrico-oblongatae). — Omnino *Gyalectam* aut *Biatorinopsin* simulat, sed basidia nec ascos profert. — Haec fructificatio ad *Patellariae* sect. *Bacidiam* spectat et in thallo viridi tenuiter crustaceo gonidia globosa gerente et demum tenuiter rimuloso nondum specificè recognito observata est. — Follicolum prope Rio de Janeiro: Glaziou n. 18085 pr. p.

Litteratur.

Boerlage, Dr. J. G., Handleiding tot de Kennis der Flora van nederlandsch Indie. Beschrijving van de families en geslachten der nederl. indische Phanerogamen. Eerste Deel, Dicotyledones dialypetalae, eerste Stuk Thalamiflorae-Disciflorae. Leyden, E. J. Brill. 1890.

In dem Werke, dessen erster Theil (Ranunculaceen-Moringaceen) hier vorliegt, begrüßen wir den Vorläufer einer neuen Flora von Niederländisch-Indien. Miquels bekanntes, verdienstliches Werk ist in mehr als einer Hinsicht veraltet; die Neuarbeitung eines Florenwerks, welches ein so reiches Gebiet zu umfassen hat, ist eine Arbeit von so grossem Umfang, und sie erfordert noch so zahlreiche Vorarbeiten durch Sammlungen, Monographien etc., dass eine baldige Fertigstellung desselben nicht zu denken ist. Boerlage's »Handleiding« wird unterdessen nicht nur dem Fachmanne ein willkommenes Hilfsmittel für das Studium der malesischen Pflanzenwelt sein, sondern auch Nichtbotanikern eine Orientirung ermöglichen, und so hoffentlich dazu beitragen, dass auch die letzteren durch Anlegung von Sammlungen weitere Bausteine für eine künftige Flora zu liefern. Vielleicht würde es sich empfehlen, zu diesem Zwecke noch eine speciell für Niederländisch Indien berechnete Einleitung in die systematische Botanik (womöglich mit einer Anzahl von Abbildungen und einer Anleitung zum Sammeln) der »Handleiding« beizugeben, um so die grosse Zahl von Pflanzern und Beamten, welche im indischen Archipel leben, für floristische Studien zu interessiren.

Die Anordnung des Boerlage'schen Werkes folgt im Wesentlichen den Bentham-Hooker'schen Genera plantarum. Die Kryptogamen sind nicht aufgenommen, da sie noch mehr als die Phanerogamen weiterer Untersuchungen bedürfen. Eine Bearbeitung wie die »Ferns of british India« von Beddome dürfte das Studium dieser auch dem Laien leicht zugänglichen Abtheilung mächtig fördern. — Dem verdienstvollen Unternehmen, dessen erster Theil jetzt vorliegt, wünschen wir gedeihlichen Fortgang und reichen Erfolg.

K. G.

Mayr, Dr. H., Die Waldungen von Nordamerika, ihre Anbaufähigkeit und forstlicher Werth. München, Rieger'sche Universitätsbuchhandlung. 1890. Preis 18 M.

Im Auftrage der bayrischen Regierung bereiste der Verf. die Waldgebiete Nordamerikas, und daran schlossen sich weitere Studien in den Waldungen Japans, Javas, Ceylons und Nordindiens. Das Werk, in welchem er die Resultate seiner Untersuchungen niederlegt, bietet nicht nur dem Forstmanne, sondern auch dem Botaniker vieles Interessante. Haben doch die Wälder Nordamerikas ein ungemein grosses pflanzengeographisches Interesse, es braucht nur an die dort erhalten gebliebenen Tertiärtypen, an die Verwandtschaft der atlantischen Flora Amerikas mit der des nordöstlichen Asiens u. a. erinnert zu werden. Dazu kommt als nicht minder interessantes, wenngleich sehr unerfreuliches Thema die schonungslose Vernichtung des Waldgebietes, wie sie heute an vielen Stellen der Union sich vollzieht. Mit lebhaften Farben schildert Mayr diese ausgedehnte Waldverwüstung und ihre traurigen Folgen; freilich ist diese Erscheinung nicht auf die Vereinigten Staaten beschränkt. Auch der Urwald der Tropen geht an vielen Stellen dem Untergang entgegen, wofür sich aus dem tropischen Asien Beispiele genug anführen lassen.

Das Mayr'sche Werk beschränkt sich nicht ausschliesslich auf die Waldungen Nordamerikas. Im Eingange werden »allgemeine Gesichtspunkte über die Existenzbedingungen der Wälder«, sowie eine allgemeine Betrachtung der Waldflora gegeben. Was speciell die Waldungen von Nordamerika betrifft, so wird besprochen der allgemeine Zustand des nordamerikanischen Waldes, Grösse und Vertheilung der Waldungen, die Walderzeugnisse, Zuwachs und Qualität der nordamerik. Waldbäume, Veränderungen in der Waldvegetation durch die Eingriffe der Menschen, forstliche Bestrebungen in Nordamerika. Dann folgt eine specielle Betrachtung der nordamerikanischen Waldflora nach Gebieten und Holzarten, eine Besprechung des Verhaltens der exotischen Holzarten in Nordamerika und der amerikanischen Holzarten betreffs ihrer Anbaufähigkeit in Europa (speciell in Deutschland), woran sich noch weitere Erörterungen von speciell forstwirtschaftlichem Interesse schliessen.

Es ist bei einem so vielseitigen Inhalt nicht möglich, hier auf Einzelnes näher einzugehen. Nicht unerwähnt mag bleiben, dass eine Anzahl der Abbildungen besser hätte wegbleiben können, da nicht wenige derselben durch ihre Ausführung ihrem Zwecke nicht entsprechen, wohl aber den Preis des Buches erhöhen. K. G.

Dr. Arthur Petry, Die Vegetationsverhältnisse des Kyffhäuser-Gebirges. Halle 1889:

Das kleine Florengebiet, mit welchem sich die vorliegende Arbeit beschäftigt, birgt, obgleich es auffallend wasserarm ist, eine reiche und interessante Flora. Petry stützt sich bei der Darstellung derselben hauptsächlich auf eigene, sorgfältige Beobachtung, nur mit Vorsicht werden die Angaben der ziemlich umfangreichen einschläglichen Litteratur verwerthet. — Entsprechend den lokalen Verhältnissen finden sich in dem Kyffhäuser-Gebirge vorwiegend solche Pflanzen, denen ein trockener, sonniger Stand und ein kalkhaltiger Boden zusagt. Der Verfasser zählt in dem kaum 1½ Quadratmeilen grossen Gebiete 918 Arten von Gefässpflanzen, darunter 26 Orchideen, verhältnissmässig viele Compositen und Papilionaceen, 9 Orobanchen, 8 Hypericum-Arten u. s. w. Natürlich treten der Wasserarmuth entsprechend die Wasser- und Sumpfpflanzen, die Cyperaceen und Juncaceen wie auch die Gefässkryptogamen an Zahl zurück.

Ein besonderes Interesse gewinnt die Arbeit dadurch, dass der Verfasser auf Grund der Zusammensetzung der Flora und ihrer Vertheilung in dem Gebiete einige

pflanzengeographische Fragen erörtert. Vorerst behandelt er die vielumstrittene Frage nach dem Einfluss des Bodens auf die Vertheilung der Pflanzen. Die Salzwiesen zwischen Auleben und der Numburg am Fusse des kleinen Gebirges bergen eine charakteristische Halophytenflora. Auf Bodenflächen mit sehr hohem Salzgehalt tritt die gewöhnliche Wiesenvegetation ganz zurück, an ihrer Stelle breiten sich die Salzpflanzen in üppigstem Wachsthum auf dem nackten Boden aus. Es wird dadurch der Satz bestätigt, dass ein grosser Salzgehalt des Bodens die Entwicklung unserer gewöhnlichen Wiesenpflanzen stört. Gewisse exquisite Halophyten wie *Obione pedunculata*, *Chenopodia maritima* und *Salicornia herbacea* kommen nur auf sehr salzreichem Boden vor, während andere, wie *Aster tripolium* und *Glaux maritima*, auch an weniger salzhaltigen Orten inmitten einer üppigen Wiesenflora gefunden werden. Daraus schliesst der Verfasser, dass die Menge des im Boden enthaltenen Chlornatriums für gewisse Halophyten eine wesentliche Bedeutung besitzt, und ferner, dass nicht etwa nur die mangelnde Concurrenz anderer Pflanzen, sondern eine directe Einwirkung des Chlornatriums die Entwicklung der Halophytenflora an salzhaltigen Standorten befördert. Gewiss wird der letztere Satz für einige Salzpflanzen Geltung haben; ob für alle, das erscheint sehr zweifelhaft und bedarf entschieden der experimentellen Prüfung.

Zu Beobachtungen über das Verhalten der Vegetation gegen Kalk- und Kieselboden bietet das Kyffhäuser-Gebirge ein günstiges Feld, da beide Bodenarten, in scharfem Gegensatze ausgeprägt, mit einander abwechseln. Die beiden Hauptcomponenten des Gebirges sind rother Sandstein und Zechsteinformation; das Verwitterungsproduct des ersteren ist äusserst kalkarm, aber sehr kieselreich, während der Zechsteinboden Kalk und Kiesel im umgekehrten Verhältnisse enthält. Die Pflanzendecke auf dem rothen Sandsteingebirge ist nun ausserordentlich einförmig und arm an Arten, auf dem Zechsteinboden dagegen findet sich eine abwechslungsvolle, artenreiche Flora, deren charakteristische Glieder zum grössten Theile zu den sogenannten Kalkpflanzen gehören. Der Gegensatz in der Vegetation ist so scharf, dass man in Wald und Feld sofort an den Pflanzen bemerkt, wenn man die Grenze zwischen den beiden Gebirgsarten überschritten hat. Es fragt sich nun, ob die chemische oder die physikalische Beschaffenheit des Bodens diesen Unterschied in der Pflanzenvertheilung bewirkt. Auf Grund der thatsächlichen Verhältnisse weist Petry nach, dass im Wesentlichen die chemische Zusammensetzung des Bodens allein von Einfluss ist. Sowohl auf dem rothen Sandstein, als auch im Gebiete der Zechsteinformation wechseln Bodenstrecken von der verschiedensten physikalischen Beschaffenheit mit einander ab, ohne dass dadurch die Zusammensetzung der Vegetation merklich beeinflusst würde.

Im letzten Abschnitt seiner Arbeit charakterisirt der Verfasser die pflanzengeographische Stellung der Kyffhäuser-Flora. Von typischen Glacialpflanzen fehlt in dem Gebiete jede Spur, vielleicht weil das kleine Gebirge in der Glacialzeit von Eis bedeckt war und also nicht gleich andern einen Zufluchtsort für die Vegetation bilden konnte. Eine andere Pflanzengenossenschaft aber von ganz entgegengesetztem Charakter hat im Kyffhäuser eine reiche Vertretung. Es sind das die südosteuropäischen Steppenpflanzen, von denen eine grosse Zahl in dem Gebiete den äussersten Punkt ihres Vordringens nach Nordwesten erreicht. Es ist klar, dass diese Pflanzen erst nach der Eiszeit von ihrem heutigen Standort Besitz ergriffen haben. Da nun die bebauten Felder und ebenso die Wälder und Sümpfe, welche vor der Zeit des Feldbaues in Deutschland vorhanden waren, für die Verbreitung der Pflanzen ein unüberwindliches Hinderniss bilden, so ist an eine so massenhafte Einwanderung der betreffenden Arten in historischer Zeit oder in der nächstvorhergehenden Epoche nicht wohl zu denken. Petry kommt daher zu der Ansicht, dass die Einwanderung jener Pflanzen in einer noch weiter zurückliegenden Zeit stattfand, in welcher weder

Ackerland noch Wald in Mitteldeutschland vorhanden waren. In der That ist es in neuerer Zeit durch geologische und paläontologische Befunde höchst wahrscheinlich gemacht worden, dass in postglacialer Zeit eine Epoche existirte, in welcher ein grosser Theil von Deutschland geradezu Steppencharakter besass. Die heute in Mitteldeutschland vorkommenden Steppenpflanzen sind nach des Verfassers Ansicht eine Reliktenflora aus jener weit zurückliegenden Zeit, in welcher sie ein zusammenhängendes, bis in unsere Gegend ausgedehntes Verbreitungsgebiet besaßen.

Auch die charakteristische Flora des Salzbodens spricht der Verfasser als Reliktenflora aus der postglacialen Steppenperiode an, weil ihm ein sprungweises Wandern dieser Pflanzen undenkbar scheint. Er sucht diese Annahme mit der interessanten Thatsache zu stützen, dass sich überall an den Standorten der Salzpflanzen eine Anzahl halophiler Insekten findet, von denen wenigstens einige sich nur von den Salzpflanzen nähren. Wenn nämlich, so schliesst er, von diesen Insekten auch nur einige von den Salzpflanzen direkt abhängig sind, so können letztere sich nur in der Weise verbreitet haben, dass die von ihnen lebenden Insekten ihnen zu folgen vermochten. Der Schluss ist richtig, es fragt sich nur, ob nicht etwa auch die Insekten sprungweise mit den Pflanzen gewandert sein können. Was hindert z. B. anzunehmen, dass zur Zeit der Völkerwanderung nordische Küstenstämme, welche mit ihrem gesammten Hausrath, mit Nahrung für sich und ihr Vieh die Länder durchzogen, bei ihrer Rast an Quellen und Bächen unabsichtlich keimfähige Samen ihrer heimischen Strandpflanzen und zugleich Eier von Insekten eingeschleppt hätten? Damit soll natürlich keine Erklärung für die Verbreitung der Halophyten gegeben sein, es soll nur gezeigt werden, dass ein gemeinsames Wandern von Pflanzen und Insekten auch über weite Strecken hin nicht undenkbar ist. Jedenfalls bedarf die Frage nach der pflanzengeographischen Bedeutung der Halophyten noch weiterer Prüfung.


Die Sorgfalt, mit welcher der Verfasser das kleine Florengebiet durchforscht und seine Befunde pflanzengeographisch verwerthet hat, sichert seiner Arbeit ein allgemeineres Interesse. Es ist sehr zu wünschen, dass recht viele Florengebiete in gleich eingehender Weise und mit gleichem Verständniss für allgemeinere Fragen behandelt werden.











Giesenhagen.

Eingegangene Litteratur.

- Beck v. Mannagetta, Zur Pilzflora Niederösterreichs. V. Aus den Verh. der k. k. zool.-bot. Gesellschaft in Wien, Jahrgang 1889.
- Bennett, Freshwater Algae and Schizophyceae of Hampshire and Devonshire. Reprinted from the Journal of the Royal Microscopical Society 1890.
- Boerlage, Handleiding tot de Kennis der Flora van Nederlandsch Indië. 1^e Deel, 1^e Stuk. Verl. von E. J. Brill, Leiden.
- Bornet et Flahault, Sur quelques plantes vivant dans le test calcaire des mollusques. Extr. du Bull. de la Soc. bot. de France. Tome XXXVI.
- Errera, L'aimant agit-il sur le noyan en division? Extrait du Compte-rendu du la séance du 11. janvier 1890 de la Société royale de botanique de Belgique. Bulletin, tome XXI.
- Garcke, Flora von Deutschland. 16. Auflage. 1890. Verlag v. Paul Parey, Berlin.
- Gravis, L'Agar-Agar comme fixatif des coupes microtomiques. Extr. du Bulletin de la Société belge de Microscopie, t. XV.
- Guignard, M. Van Beneden fils, au sujet de ses decouvertes sur la division nucléaire. Extr. des Comptes rendus de la Soc. de Biologie. Séance du 4. janvier 1889.
- — Sur les Anthérozoides des Marsiliacées et des Equisetacées. Extr. du Bulletin de la Société botanique de France. Tome XXXVI.
- Hanbury, Alphabetical Catalogue of Plants growing in the open air in the gardens of Thomas Hanbury F. L. S. Palazzo Prengo, La Mortola near Ventimiglia, Italy.
- — Systematic Catalogue of plants growing etc.

- Hirsch, Untersuchungen über die Frage: Welche Einrichtungen bestehen behufs Ueberführung der in dem Speichergewebe der Samen niedergelegten Reservestoffe in den Embryo bei der Keimung? Inaugural-Dissertation. Berlin 1890.
- Holzner, Die Bestandtheile und Gewebeformen des bespelzten Gerstenkornes. S.-A. a. d. »Zeitschrift für das gesammte Brauwesen« No. 23.
- Kanitz, Cardinal-Erzbischof Dr. Ludwig Haynald als Botaniker. S.-A. aus der »Ung. Revue« X, 1. Heft.
- Klebahn, Neue Untersuchungen und Beobachtungen über die Blasenroste der Kiefern. S.-A. aus »Hedwigia« 1890. Heft 1.
- — Erster Beitrag zur Schmarotzerpilz-Flora Bremens.
- Kühn, Untersuchungen über die Anatomie der Marattiaceen und anderer Gefäßkryptogamen. S.-A. aus »Flora oder allg. bot. Zeitung« 1889. Heft 5.
- Magnus, Moritz Winkler, Nachruf. S.-A. a. d. »Oesterr. bot. Zeitschrift«. Jahrg. 1890, No. 2.
- — Ueber eine neue Puccinia auf Anemone ranunculoides. S.-A. aus No. 2 der Sitzungs-Berichte der Ges. naturf. Freunde, Jahrg. 1890.
- — Carl Friedr. Wilh. Jessen. S.-A. aus »Leopoldina« XXV, No. 17—18.
- — Bemerkung über die Benennung zweier auf Alnus lebender Taphrina-Arten. S.-A. aus »Hedwigia« 1890. Heft 1.
- — Eine Pflanzenepidemie, beobachtet im Berliner Universitätsgarten im Juni und Juli 1889. S.-A. aus der »Naturw. Rundschau«. IV. Jahrg. No. 34.
- Masters, An erratic ivy. Reprinted from the »Journal of Botany« for June 1889.
- — Remarks on the morphology of Rosa Berberiflora, Pallas. Extr. du Bull. de la Soc. royale de bot. de Belgique, tome XXVIII, première partie.
- Reinke, Das botanische Institut und die botanische Meeresstation in Kiel. S.-A. aus dem Bot. Centralblatt No. 1/2. 1890.
- — Notiz über die Vegetationsverhältnisse in der deutschen Bucht der Nordsee. S.-A. aus den Ber. der Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrg. 1889. Bd. VII. Heft 9.
- Reiss, Ueber die Natur der Reservecellulose und über ihre Auflösungsweise bei der Keimung der Samen. Inaugural-Dissertation.
- Robinson, On the stem-structure of Jodes Tomentella Miq. and certain other Phytocreneae. Extr. des Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. Vol. VIII.
- Rosenthal, Zur Kenntniss von Macrocystis u. Thalassiophyllum. S.-A. aus »Flora oder allg. bot. Zeitung« 1890. Heft 1.
- Schäfer, Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Fruchtknotens und der Placenten. S.-A. aus »Flora oder allg. bot. Zeitung« 1890. Heft 1.
- Schenk, A., Jurassische Hölzer von Green Harbour auf Spitzbergen. S.-A. aus Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1890. No. 1. Stockholm.
- Schmitz, Systematische Uebersicht der bisher bekannten Gattungen der Florideen. S.-A. aus »Flora oder allg. bot. Zeitung« 1889. Heft 5.
- Solms-Laubach, Die Heimath und der Ursprung des cultivirten Melonenbaumes Carica Papaya L. S.-A. aus der »Bot. Zeitung« 1889. No. 44—49.
- Stapf, Die Arten der Gattung Ephedra. S.-A. aus dem LVI. Bande der Denkschrift der math.-naturw. Klasse der Kais. Akademie der Wissenschaften.
- Suringar, De Kruidkunde in Nederland. Openingsrede van het tweede Nederlandsch Natuur en Geneeskundig Congres te Leiden, 26. en 27. April 1889.
- — Nieuwe Bijdragen tot de Kennis der Melocacti van West-Indië. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, 3de Reeks, Deel VI.
- Tschirch, Indische Skizzen. I, II. Aus »Naturwissenschaftlich. Wochenschrift«. V. Bd. No. 2 u. 7.
- Wager, Observations on the structure of the Nuclei in Peronospora parasitica, and on their behaviour during the formation of the Oospore. S.-A. aus Annals of Botany Vol. IV. No. XIII. Nov. 1889.
- Szyszyłowicz, Zwei neue Weinmannien aus Südamerika. S.-A. aus der »Oesterr. bot. Zeitschrift«. Jahrg. 1890. No. 2.





Zur Frage der Assimilation der Mineralsalze durch die grüne Pflanze.

Von

A. F. W. Schimper.

Uebersicht der benutzten Litteratur.

- Aé, H. A., Flora 1869, p. 189 ff.
- Arendt, Das Wachsthum der Hafer-Pflanze. 1859.
- de Bary, Ueber einige Sclerotinien und Sclerotienkrankheiten. Bot. Zeitung 1886.
- — Vergleichende Anatomie der Vegetationsorgane der Phanerogamen und Farne. Leipzig 1877.
- Berthelot et André, Les azotates dans les végétaux und andere Aufsätze. Ann. de Chimie et de physique. 6e série. Bd. VIII. 1886.
- Boehm, J., Ueber den vegetabilischen Nährwerth der Kalksalze. Sitzber. d. Wien. Akad. d. Wiss. Pd. 71. 1875. Erste Abth.
- Borodin, Ueber einige bei Bearbeitung von Pflanzenschnitten mit Alkohol entstehende Niederschläge. Bot. Zeit. 1882. Sp. 589.
- Chareyre, J., Nouvelles recherches sur les Cystolithes. Revue des sciences naturelles 3e série. Bd. III. p. 523 und Bd. IV. p. 4.
- Church, Chemical News. Bd. XXXVI. 1887. p. 237.
- Dehérain, Nutrition de la plante. S.-A. aus Encyclopédie chimique. 1885.
- Emmerling, A., Beiträge zur Kenntniss der chemischen Vorgänge in der Pflanze. 2. Abth. Landwirthsch. Versuchsstationen. 1884. Bd. XXX.
- Engelmann, Th. W., Die Purpurbakterien und ihre Beziehungen zum Licht. Bot. Zeitung 1888.
- Frank, B., Untersuchungen über die Ernährung der Pflanze mit Stickstoff und über den Kreislauf desselben in der Landwirthschaft. Landw. Jahrb. 1888. p. 421 ff.
- — Bemerkungen zu der Mittheilung des Prof. Kreuzler. Landwirthsch. Jahrb. Bd. 17. 1888.
- Hansen, A., Ueber Sphärokrystalle. Würzburger Arbeiten. Bd. III.
- Hanstein, J., Versuche über die Leitung des Saftes durch die Rinde und Folgerungen daraus. Pringsheim's Jahrb. Bd. II. 1860.
- Hassak, C., Ueber das Verhältniss von Pflanzen zu Bicarbonaten und über Kalk-incrustation. Tübinger Arbeiten. Bd. II. p. 465.
- Haushofer, Mikroskopische Reactionen. Braunschweig 1885.
- Hilger, A., u. L. Gross, Die Bestandtheile einzelner Organe des Weinstocks. Landwirthsch. Versuchsstationen. 1887. Bd. 33.
- Hilgers, Pringsheim's Jahrb. Bd. VI. p. 285.
- Hölzner, Ueber die physiologische Bedeutung des oxalsauren Kalkes. Flora 1867.
- Hornberger, R., Chemische Untersuchungen über das Wachsthum der Maispflanze. Landw. Jahrb. Bd. 11. 1882.
- — Untersuchungen über Gehalt und Zunahme von Sinapis alba an Trockensubstanz und chemischen Bestandtheilen in 7tägigen Vegetationsperioden. Landw. Versuchsstationen. Bd. 31. 1885. p. 413.

- Hueppe, F., Die hygienische Beurtheilung des Trinkwassers vom biologischen Standpunkt. Schilling's Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung, 1888, und Tageblatt der Naturforscherversammlung zu Wiesbaden, 1887 (nach Th. W. Engelmann, s. o.).
- Klement, C., et A. Renard, Réactions microchimiques à cristaux et leur application en analyse qualitative. Bruxelles 1886.
- Kohl, G. F., Zur Kalkoxalatbildung in der Pflanze. Bot. Centralbl. 1889. Nr. 15.
- — Anatomisch-physiologische Untersuchung der Kalksalze und Kieselsäure in der Pflanze. Marburg 1889.
- Kreusler, Zum Nachweis von Nitraten im Erdboden etc. Landw. Jahrb. Bd. 17. 1888.
- Leitzel, H., Der Gehalt der Dahliaknolle an Asparagin und Tyrosin. Mittheil. des bot. Inst. zu Graz. Heft II.
- Mayer, Ad., Lehrbuch der Agriculturchemie. 3. Aufl. 1886.
- Meyer, Arth., Ueber die Assimilationsproducte der Laubblätter angiospermer Pflanzen. Bot. Zeit. 1885. Sp. 417.
- Molisch, H., Ueber einige Beziehungen zwischen anorganischen Stickstoffsalzen und der Pflanze. Sitzber. d. Wien. Akad. d. Wiss. Bd. 95. 1887.
- — Ueber die Ablagerung von kohlensaurem Kalk im Stamm dicotyler Holzgewächse. Sitzber. d. Wien. Akad. d. Wiss. Bd. 84. 1882.
- Monteverde, Ueber die Verbreitung und Vertheilung des Salpeters in der Pflanze und über einige chemische Verwandlungen unter dem Einfluss der Zellsäfte. Arbeiten d. St. Petersburger Gesellsch. d. Naturforscher. Bd. XII. 1882.
- Nobbe, Ueber die organische Leistung des Kalium in der Pflanze. 1871.
- Palladin, Bildung der organischen Säuren in wachsenden Pflanzentheilen. Ber. der d. bot. Ges. Bd. V. p. 325.
- Planta, A., Ueber die chemische Zusammensetzung des Blütenstaubs der Haselstaude. Landw. Versuchsstationen. Bd. 31. 1885. p. 97.
- Pringsheim, N., Ueber die Entstehung der Kalkincrustationen an Süßwasserpflanzen. Pringsheim's Jahrb. Bd. 29.
- v. Raumer, Kalk und Magnesia in der Pflanze. Landw. Versuchsstat. Bd. 19. 1883.
- v. Raumer u. Kellermann, Ueber die Function des Kalks im Leben der Pflanze. Landw. Versuchsstationen. 1880. Bd. 25.
- Sachs, J., Vorlesungen über Pflanzenphysiologie. Leipzig 1882.
- Schimper, A. F. W., Ueber Kalkoxalatbildung in den Laubblättern. Bot. Zeit. 1888.
- Schumacher, W., Die Ernährung der Pflanze. 1864.
- Streng, A., Ueber eine neue mikroskopisch-chemische Reaction auf Natrium. S.-A. aus dem XXIV. Ber. d. oberh. Ges. für Natur- und Heilkunde.
- — Ueber einige mikroskopisch-chemische Reactionen. Neues Jahrb. für Mineralogie etc. 1885. Bd. I.
- Vries, H. de, Ueber die Bedeutung der Kalkablagerungen in der Pflanze. Landw. Jahrb. 1881.
- — Ueber die Periodicität im Säure-Gehalte der Fettpflanzen. S.-A. aus Verslagen en Mededeel. d. koninkl. Ak. van Wetensch. Amsterdam 1884.
- Wagner, P., Einige praktisch wichtige Düngungsfragen etc. 6. Aufl. Berlin 1886.
- Wehmer, K., Das Verhalten des oxalsauren Kalkes in den Blättern von Symphoricarpos, Alnus und Crataegus. Bot. Zeit. und Ber. der bot. Gesellsch. 1889.
- Wolff, E., Aschenanalysen von land- und forstwirtschaftlichen Producten. 1. Thl. 1871 und 2. Thl. 1880.
- Zacharias, E., Ueber den Inhalt der Siebröhren von Cucurbita. Bot. Zeit. 1884.

Einleitung.

Die bisherigen Untersuchungen über Aufnahme und Verarbeitung der Mineralsalze durch die Pflanze sind, mit Ausnahme einiger rein anatomischen Untersuchungen, ausschliesslich von Chemikern ausgeführt worden. Die Arbeiten von Arendt, Nobbe, Hornberger, v. Raumer, Kellermann, Emmerling beschäftigen sich nicht bloss mit dem Bestimmen der Kohlehydrate und sonstiger verbrennlichen Stoffe, sondern enthalten meist auch genaue Daten über den Gehalt der ganzen Pflanze und ihrer einzelnen Organe an Aschenbestandtheilen während der verschiedenen Perioden der Vegetation. Schlüsse allgemeiner Art wurden aus diesen Befunden gezogen, die Beziehungen der Phosphorsäure zur Eiweissbildung, namentlich aber die Rolle der verschiedenen Basen discutirt. Berthelot und André verdanken wir ausführliche Mittheilungen über die Verbreitung der Salpetersäure im Pflanzenreich.

Ein irgendwie befriedigendes Bild der Schicksale der Mineralsalze in der Pflanze, der Betheiligung ihrer sauren und basischen Bestandtheile am Stoffwechsel, ist aus den genannten Arbeiten, trotz der grossen Sorgfalt, mit der sie ausgeführt wurden, nicht zu entnehmen, und es ist nicht wahrscheinlich, dass die bisher angewandten Methoden für sich allein uns viel weiter bringen werden. Letztere leiden an dem Uebelstand, dass sie nur an den Gliedern der Pflanze in toto Verwendung finden können, eine Trennung derselben in Meristeme und fertige Gewebe, leitende, speichernde, verarbeitende Zellen ausschliessen.

Eine tiefere Einsicht in den Stoffwechsel können wir natürlich nur dann erreichen, wenn wir die Thätigkeit der einzelnen Gewebearten für sich allein ins Auge fassen. Für die Kohlehydrate besitzen wir bereits in den Arbeiten von Sachs und Andern, für die Wanderung des Asparagins und anderer Amide in denjenigen von Th. Hartig, Pfeffer, Borodin, Leitgeb, sehr befriedigende Aufschlüsse, welche durch die ebenfalls in grosser Zahl vorhandenen makrochemischen Untersuchungen bestätigt und durch genaue quantitative Angaben unterstützt worden sind.

Das Gebiet, das ich mit der vorliegenden Arbeit betrete, ist dagegen für den Botaniker beinahe noch terra incognita. Es war meine Absicht, mit Hülfe mikrochemischer Methoden, die einzelnen Nährsalze von dem Moment ihres Eindringens in die Pflanze bis zu den Stätten ihres Verbrauchs zu verfolgen, die Bedingungen der Assimilation der Mineralsäuren, die Bedeutung der mit ihnen verbundenen Basen für den Stoffwechsel festzustellen. Ich bin sehr weit hinter meinem Ziele geblieben und zwar hauptsächlich wegen der Unvollkommenheit der Methoden. Ich bin jedoch zur Ueberzeugung gelangt, dass der letztere Uebelstand sich im Laufe der Zeit beseitigen lassen wird und ich hoffe, dass der Leser dieser Arbeit dieselbe theilen wird. Der Zweck des vorliegenden Fragments ist in erster Linie, durch Einführung einiger in der Botanik

bisher kaum oder gar nicht gebrachter mikrochemischer Methoden und durch präcisere Aufstellung der Fragen, neue Untersuchungen zu veranlassen.

I. Methodisches.

1. Mikrochemische Reactionen.

Der mikrochemische Nachweis von Mineralsäuren und Mineralbasen in der Pflanze ist bis jetzt wenig gepflegt worden. Nur für einzelne Fälle sind, meist in neuester Zeit, Methoden in Anwendung gekommen, so die Diphenylaminreaction der Salpetersäure (Bildung eines Anilinblau) und der Nachweis von Phosphorsäure durch molybdänsaures Ammoniak und Salpetersäure.

Im Gegensatz zu den Pflanzenphysiologen, pflegen die Mineralogen und Petrographen, bereits seit Jahren, den mikrochemischen Nachweis der meisten Elemente. Die diesbezüglichen, schon zu grosser Vollkommenheit gelangten Methoden bilden den Gegenstand zweier kleiner Handbücher; das eine, von Haushofer, ist mit zahlreichen, sehr naturgetreuen Figuren im Holzschnitt versehen, und ich habe daher, da es doch einem Jeden, der sich mit dem mikrochemischen Nachweis der Aschenbestandtheile beschäftigen will, unentbehrlich ist, es unterlassen, meinerseits auch die Niederschläge abzubilden. Das Werk von Klement und Renard ist nicht viel mehr als eine französische Bearbeitung des Haushofer'schen Buches mit einigen Zusätzen. Die Titel beider Werke sind im Litteraturverzeichniss ausführlich mitgetheilt. Selbstverständlich war die Uebertragung der genannten Methoden auf pflanzliche Objecte ohne gewisse Modificationen nicht möglich. Ich habe es daher für nothwendig betrachtet, dieselben, soweit sie in dieser Arbeit zur Verwendung kommen, einer ausführlichen Besprechung zu unterwerfen.

Die Reactionen habe ich theils an frischen Objecten, theils an den Aschen vorgenommen; es empfiehlt sich, wo möglich, immer beide zu untersuchen.

Die Niederschläge sind in den meisten Fällen sehr charakteristisch; bei einiger Kenntniss der Krystallographie ist eine Verwechslung in der Regel ausgeschlossen. Immerhin empfiehlt es sich, wo möglich, zwei verschiedene Reactionen anzuwenden, z. B. bei dem Nachweis von Natron, zuerst mit reinem Uranacetyl und dann unter Zusatz eines Magnesiasalzes zu verfahren.

Ausgezeichnete Dienste leistet bei schwer löslichen Niederschlägen die von Borodin zur Prüfung der Asparaginniederschläge empfohlene Methode. Man behandelt die bei der Reaction entstehenden Krystalle mit einer gesättigten Lösung der Substanz, die man als Niederschlag erhalten zu haben vermuthet. Ist letzterer z. B. Chlorthallium, so lässt man die Krystalle vorsichtig eintrocknen und setzt einen Tropfen ge-

sättigter Chlorthalliumlösung hinzu. Sie werden sich in derselben wie in reinem Wasser auflösen, falls man sich über ihre Natur geirrt, ungelöst bleiben und an Grösse zunehmen, wenn man wirklich Chlorthallium gefällt hat.

Allgemeines lässt sich übrigens über die Anwendung der Reagentien kaum sagen. Der Grad der Concentration der letzteren ist meist ziemlich gleichgültig, darf jedoch bei Salzen nicht zu gross sein; eine 5% Lösung wird in allen Fällen ausreichen.

Die Reagentien sind meistens nicht rein und enthalten manchmal, wenn auch nur in Spuren, gerade diejenige Substanz, zu deren Nachweis sie dienen sollen, z. B. ist das Platinchlorid des Handels stets kaliumhaltig. Man muss dann entweder das Reagens reinigen, was beim Platinchlorid sehr schwer, in andern Fällen leichter gelingt, oder sich ein vollkommen reines Präparat herstellen lassen.

Calcium.

Gyps. Die beste Reaction auf Calcium, namentlich bei der Untersuchung der Asche, ist die schon längst in der Mikrochemie gebräuchliche der Erzeugung von Gypskrystallen durch Zusatz von Schwefelsäure.

Die meisten Pflanzenaschen enthalten so viel Kalk, dass die Krystalle sich nach Zusatz des Reagens sofort bilden.

Bei geringem Kalkgehalt löse man die Asche in möglichst wenig Wasser auf, setze, am besten mit dem Platindraht, eine Spur verdünnter Schwefelsäure hinzu und lasse langsam eintrocknen. Auf diese Weise habe ich die Gypsnadeln in dem Rückstand eines Tropfens von 1 CaCl_2 in 50 000 H_2O noch erkennen können.

Ist der Kalk als Gyps in der Asche enthalten, so scheidet er sich schon aus der wässrigen Lösung in Form der bekannten Krystalle aus.

Calciumoxalat. Die auf der Entstehung der äusserst schwer löslichen Kalkoxalatkrystalle beruhende Reaction mit Ammoniumoxalat leistet namentlich da gute Dienste, wo es sich darum handelt, Kalk im Zellsafte nachzuweisen.

Bei gewöhnlicher Temperatur scheidet sich das Salz in Form winziger, ziemlich schwach doppelbrechender tetragonaler Pyramiden, deren Form bei starker Vergrösserung leicht erkennbar ist.

Um die monokline Form zu erhalten, lege ich die Schnitte in kochende Ammonoxalatlösung; die alsbald entstehenden Krystalle sind ebenfalls sehr klein, meist von schmal ovaler Gestalt und sehr stark doppelbrechend.

Man wird es nie unterlassen dürfen, beiderlei Krystalle hervorzurufen. Bei Anwendung einer reinen Lösung von Kalknitrat in der Concentration 1:20 000 fand ich die Reaction noch brauchbar.

Calciumcarbonat. Auch diese Reaction leistet manchmal gute Dienste, namentlich wenn der Zellsaft ziemlich kalkreich ist. Man legt

den Schnitt einfach in einen Tropfen Ammoncarbonat, dem man bei stark saurer Reaction des Zellsaftes etwas Ammoniak hinzugesetzt hat. Nach kürzerer oder längerer Zeit scheiden sich im Zellinhalt meist kleine, aber sehr regelmässig ausgebildete, stark doppelbrechende Rhomboëder.

Chlor.

Chlorsilber. Silbernitrat fällt lösliche Chlorverbindungen in Form eines reinen amorphen Niederschlags, der nichts Charakteristisches bietet. Lässt man aber diesen Niederschlag sich in etwas Ammoniak lösen, so scheiden sich bei Verdunsten des letzteren in den Zellen und in der umgebenden Lösung kleine Würfel und Oktaëder, auch Combinationen beider, die bei wässriger Beschaffenheit der Lösung sehr scharf und regelmässig ausgebildet sind, und, zunächst farblos, alsbald violett werden. Vielfach ist die durch Reduction von Silbermetall bedingte Violettfärbung an den Krystallen schon vorhanden, als dieselben deutlich erkennbar werden; die sonst langsam unter dem Lichteinfluss eintretende Reduction wird durch die Pflanzensäfte sehr beschleunigt.

Bei dickerer Beschaffenheit der Lösung, in Knollen, Samen, in Blattmesophyll etc., scheiden sich in der Regel mehr oder weniger regelmässige Krystallskelette, manchmal aber auch unregelmässige Körner, die namentlich wo Phosphate gleichzeitig vorhanden sind, zu wenig Charakteristisches bieten, um ohne weiteres als Beweis der Anwesenheit von Chlor zu dienen, aber an ihren Reactionen sichere Merkmale bieten. Das Chlorsilber ist nämlich leicht löslich in Ammoniak, Cyankalium, unterschwefligsaurem Natrium und einer conc. Lösung von salpetersaurem Quecksilberoxyd; es ist etwas löslich in concentrirten Lösungen der Alkalimetalle und in concentrirter Salzsäure. Den besten Nachweis liefert jedoch das Verhalten gegenüber einer gesättigten Chlorsilberlösung in concentrirter Salzsäure oder Kochsalzlösung.

Chlorthallium. In chloridhaltigen Pflanzentheilen scheidet sich bei Zusatz von Thalliumsulfat, sofort oder beim Verdunsten, das schwerlösliche Thalliumchlorid. Dasselbe stellt, wo die Lösung hinreichend dünn, reguläre Oktaëder, oder meist mehr oder weniger wohl ausgebildete Skelette des regulären Systems, von körnig unebener Oberfläche, die in Folge ihrer hohen Lichtbrechung im durchfallenden Lichte schwarz, im auffallenden hingegen weiss erscheinen. In dickeren Lösungen werden ganz unregelmässige körnige Gebilde erzeugt.

Die Reaction ist bei guter Ausbildung der Skelette sehr charakteristisch. Zur Controle kann man sich übrigens einer gesättigten Lösung von Chlorthallium in Wasser bedienen, die den Niederschlag nicht auflöst, während er in reinem Wasser verschwindet; diese Reaction, die zu voller Sicherheit führt, hat mir immer ganz klare Resultate gegeben.

Sowohl die Chlorsilber- wie die Chlorthalliumreaction lassen sich selbstverständlich auch für die Untersuchung der Aschen benutzen, und geben da, wo der Zellsaft dick ist, besser ausgebildete Formen als in diesem.

Directer Nachweis des Chlorkalium und Chlornatrium. Hat man Pflanzenasche mit Wasser behandelt, und lässt eintrocknen, so kommen häufig farblose reguläre Würfel zum Vorschein, deren Natur häufig direct festgestellt werden kann. Man setzt einen kleinen Tropfen Platinchlorid am Rande des Präparates und bewegt dasselbe mit einer Nadel vorsichtig bis zu einem der Würfel. Ist dasselbe Chlorkalium, so wird es in einen Haufen rother Körnchen zerfallen. In gleicher Weise wird man zum Chlornachweis Thalliumsulfat, zur Prüfung auf Natrium Uranacetyl verwenden (s. u.). Selbstverständlich kann ein und derselbe Würfel nur zu einer dieser Reactionen Verwendung finden.

Kalium.

Kaliumplatinchlorid. Der beste mikrochemische Nachweis des Kalium beruht auf der Bildung des Kaliumplatinchlorids, welches in regulären Oktaëdern und Würfeln krystallisirt, die in Wasser sehr schwer, in Alkohol noch schwerer löslich sind. Ganz ähnliche Salze liefern allerdings auch die entsprechenden Salze des Ammonium, Caesium und Rubidium. Die beiden letzten Elemente kommen für die Pflanze nicht in Betracht, da sie im besten Falle nur in Spuren vorhanden sind, die in den kleinen Fragmenten, wie sie bei der mikrochemischen Analyse zur Verwendung kommen, gar nicht nachweisbar wären. Das Ammonium ist bei der Untersuchung von Aschen ausgeschlossen. Uebrigens wird in zweifelhaften Fällen die Borodin'sche Methode zur Entscheidung führen.

Das Verfahren beruht darauf, dass man den zu prüfenden Schnitt mit einem Tropfen des Reagens versetzt und verdunsten lässt; um letzteres zu beschleunigen, kann man den Schnitt auf der Spiritusflamme bis zum Eintrocknen erwärmen und, während der Objectträger noch heiss ist, die Platinchloridlösung hinzufügen. Letzteres roheres Verfahren leistet da, wo viel Kali vorhanden, noch gute Dienste.

Ist Asche zu untersuchen, so löse ich letztere in einem angesäuerten Wassertropfen auf und erwärme auf der Spiritusflamme bis zum Trocknen. Auch hier kann das Reagens entweder vor, oder nach dem Erkalten zugesetzt werden.

In beiden Fällen bilden sich zuerst Krystalle am Rande des Tropfens, und zwar bei rascher Ausscheidung zunächst in Form von Skeletten; in der Mitte des Tropfens bilden sich allmählig wohl ausgebildete reguläre Oktaëder.

Das Reagens steht an Empfindlichkeit denjenigen auf einige andere Aschenbestandtheile vielleicht etwas nach. In dem Rückstande eines

Tropfens einer Lösung von PO_4K_3 in 40 000 H_2O konnte ich jedoch das Kali eben noch nachweisen.

Das Reagens ist ganz kalifrei im Handel nur auf Bestellung zu beziehen. Die Reinigung des gewöhnlichen Platinehlorids des Handels mit absolutem Alkohol führte zu keinen guten Resultaten. Die Prüfung ist sehr einfach; man braucht nur einen Objectträger etwas zu erwärmen und einen Tropfen des Reagens auf demselben langsam verdunsten zu lassen.

Magnesia.

Die besten Methoden zum Nachweis der Magnesia beruhen auf der Bildung der phosphorsauren Ammoniak-Magnesia und des Magnesia-Natron Uranat. Erstere eignet sich am besten für Gewebestücke, letztere für die Aschenanalyse.

Phosphorsaure Ammoniak-Magnesia. Das zu untersuchende Gewebestück wird in einem Tropfen phosphorsauren Natron oder phosphorsauren Natron-Ammoniak gelöst und etwas Ammoniak zugesetzt. Das Magnesia-Ammoniak-Salz scheidet sich innerhalb der Zellen in Form wohl ausgebildeter und höchst charakteristischer sargdeckelförmiger Krystalle. Dieselben gehören dem rhombischen Systeme an, sind hemimorph und zeigen die Combination zweier oder mehr Domen mit der Basis.

Pflanzenasche in derselben Weise behandelt gibt in den meisten Fällen keine wohl ausgebildeten Krystalle, sondern charakteristische X-förmige Krystallskelette, wie sie auf Haushofer's Fig. 74 in *d* und *e* abgebildet sind. Die Krystalle sind natürlich um so besser ausgebildet, je grösser die Verdünnung. Die Empfindlichkeit der Reaction ist eine ziemlich grosse. Wird ein Tropfen einer Lösung Magnesiumsulfat von 1:40 000 auf dem Objectträger getrocknet, so erhält man aus dem Rückstande bei der erwähnten Behandlung gut ausgebildete Sargdeckel, allerdings in geringer Anzahl und hauptsächlich in der Nähe des Saumes des Rückstands.

Uranacetylmagnesianatrium. Die Asche einer jeden Pflanze, die nicht bei Ausschluss von Natrium gezogen worden, wird, bei Behandlung mit Uranacetyl, kleine, schwach gelbliche oder farblose rhomboëdrische Krystalle ausscheiden, von der Combination $R_1 - 2R \cdot 0R$, gewöhnlich mit Vorherrschen der Basis. Dieselben bestehen aus einer Verbindung von Uranacetyl mit Natron und Magnesia. Ihre Zusammensetzung soll der Formel entsprechen:



Natrium.

Uranacetyl natrium. Wird ein natriumhaltiges Gewebestück bzw. ebensolche Asche mit Uranacetyl versetzt, so scheiden sich beim Verdunsten am Rande des Präparats sehr scharf ausgebildete Tetraëder, die bei geringer Grösse farblos, bei grösseren Dimensionen gelblich erscheinen. Bei sehr geringen Mengen Natrium bilden sich stets die nachher zu beschreibenden Krystalle des Uranacetylmagnesianatrium aus, da Magnesia in jeder Zelle vorhanden ist.

Das Uranacetyl des Handels ist stets natriumhaltig. Um es zu reinigen, löst man in absol. Alkohol in der Kälte und lässt das Filtrat bis zum Eintrocknen eindampfen.

Uranacetyl magnesianatrium. Diese Reaction ist weit empfindlicher als die vorige, indem das Salz nur 1,48 % Na enthält. Wie bereits erwähnt, tritt dieselbe bei geringerem Gehalt an Natrium oder bei grosser Menge Magnesia ausschliesslich auf; bei natriumreichen Präparaten treten gleichzeitig die Tetraëder des Uranacetyl natrium und die Rhomboëder des Uranacetylmagnesianatrium auf. Ueber letztere vergleiche das Nähere unter Magnesium. Für beide Reactionen leistet die Borodin'sche Methode gute Dienste.

Oxalsäure.

Kalkoxalat. Zur Erzeugung der tetragonalen und der monoklinen Krystalle bedient man sich am besten des Kalknitrats und verfährt übrigens genau so, wie beim Nachweis des Kalks durch Ammonoxalat.

Uranylloxalat. Versetzt man einen Tropfen Uranacetyl zu einem löslichen Oxalate in nicht zu geringer Menge enthaltenden Präparat, so scheiden sich prächtige Krystalle des rhombischen Systems aus, die meist rectanguläre Gestalt zeigen, bei hinreichender Grösse deutliche gelbe Färbung besitzen und zwischen gekreuzten Nicols in äusserst lebhaften Farben glänzen. Diese schöne Reaction ist weniger empfindlich als die vorige. Näheres über die Zusammensetzung dieser Krystalle, welche Haushofer bereits erwähnt, ist mir nicht bekannt.

Das saure oxalsäure Kali lässt sich bei hinreichender Concentration in eingetrockneten Präparaten, beim Vergleich einer eingetrockneten Lösung des Salzes, an Krystallform, lebhaften Polarisationserscheinungen, Borodin'scher Reaction etc. leicht erkennen.

Phosphorsäure.

Ammoniumphosphomolybdat. Diese von Hansen in die Mikrochemie eingeführte Reaction ist von sehr grosser Empfindlichkeit, wird aber durch gewisse organische Substanzen, z. B. weinsteinsaures Kali, verhindert; man wird daher nur bei der Analyse von Aschen sicher

sein, dass bei Nichteintreten derselben Phosphorsäure in nachweisbarer Menge nicht vorhanden ist.

Als Reagentien dienen molybdänsaures Ammoniak und Salpetersäure; das entstehende charakteristische Product ist phosphor-molybdänsaures Ammoniak in glänzend gelben Krystallen des regulären Systems, gewöhnlich Combinationen des Oktaëders und Würfels. Die ausserordentliche Empfindlichkeit der Reaction erklärt sich durch die sehr geringe Menge der im Salze ($11 \text{ Mo O}_3 + \text{PO}^4\text{H}^3 + 12 \text{ H}_2\text{O}$) enthaltenen Phosphorsäure.

Verwechslungen mit anderen Niederschlägen, so mit dem isomorphen arsensauren Salze und mit einem gelben Niederschlag, der durch Kieselsäure hervorgerufen wird, kommen für den Botaniker unter gewöhnlichen Umständen nicht in Betracht.

Will man ein Gewebestück untersuchen, so versetzt man dasselbe mit einem Tropfen der Ammonmolybdatlösung und setzt etwas Salpetersäure hinzu. Ist der Zellsaft rein an Phosphorsäure, so entsteht der Niederschlag sofort; ist letzteres nicht der Fall, so erwärmt man das Präparat bis zum Kochen und lässt, wenn die Reaction dann noch ausbleibt, einige Stunden liegen.

Die in eiweissartigen Substanzen (z. B. Siebröhrenschleim), in Nuclein und sonst organisch gebundene (Globoide) Phosphorsäure lässt sich nur in der Asche nachweisen.

Die Prüfung der Asche wird in ganz ähnlicher Weise vorgenommen, wie diejenige von Gewebestücken. Ich löse in Salzsäure auf, erhitze bis zu völligem Eintrocknen, und setze dann das Reagens zu.

Der Rückstand eines Tropfens von $1 \text{ PO}_4\text{K}_3$ in $60\,000 \text{ H}_2\text{O}$ gab mir bei dieser Reaction noch wohl erkennbare Krystalle. Die Grenze der Empfindlichkeit in diesem und anderen Fällen genau festzustellen, hielt ich für überflüssig, da geringe Spuren der nachzuweisenden Stoffe sich im destillirten Wasser stets befinden, und solche Resultate, wie bei künstlich hergestellten Lösungen von der Untersuchung pflanzlicher Präparate nicht zu erwarten sind.

Magnesium-Ammoniumphosphat. Diese Reaction auf Phosphorsäure steht der vorstehenden an Empfindlichkeit nicht nach und ist für den Nachweis in Geweben vorzuziehen, da der Niederschlag vielfach in den Zellen entsteht und durch organische Substanzen nicht verhindert wird; ein ähnliches Salz wird ausser durch Phosphorsäure nur noch durch Arsensäure gebildet.

Die Formen der Krystalle sind bereits unter Magnesia beschrieben worden.

Ich konnte die Anwesenheit von Phosphorsäure noch in Tropfen einer Lösung von $1:25\,000 \text{ PO}^4\text{H}^3$ bequem nachweisen, glaube jedoch kaum, dass in den Zellen noch bei solcher Verdünnung die Reaction erkennbar sein würde,

In dem Rückstande von Tropfen einer Lösung von 1:50 000 lässt sich, wenn man möglichst wenig der Reagentien, Magnesiumsulfat und Chlorammonium, verwendet, die Phosphorsäure noch sicher nachweisen. Auf noch geringere Mengen habe ich nicht geprüft.

Salpetersäure.

Diphenylamin. Dieses ausserordentlich empfindliche Reagens zum Nachweis von Nitraten (und Nitriten) hat für die Mikrochemie zwei Nachtheile. Erstens sind ausser der Salpeter- und salpetrigen Säure noch andere Stoffe bekannt, die dieselbe Reaction (Bildung eines Anilinblau) hervorrufen, andererseits wird letztere durch in der Pflanze enthaltene Stoffe geschwächt bis ganz verhindert. Trotz dieser Nachtheile liefert das Diphenylamin sehr gute Dienste, da wo man, z. B. bei künstlich mit Salpetersäure ernährten, vorher nitratfreien Pflanzen und Pflanzenorganen die Möglichkeit einer Verwechslung ausschliesst, andererseits festgestellt hat, dass etwaiges Ausbleiben der Reaction wirklich durch Verschwinden des Nitrats und nicht durch die reducirende Wirkung von Pflanzenstoffen herrührt. Am meisten wirken verholzte Gewebe hemmend auf die Reaction, aber beinahe sämtliche Pflanzentheile dürften in mehr oder weniger hohem Grade dem Zustandekommen derselben entgegenwirken; um sich dessen zu überzeugen, braucht man nur ein nicht zu nitratreiches Gewebestück einige Secunden in reiner Schwefelsäure liegen zu lassen und erst nachher die Diphenylaminlösung zuzusetzen; die Blaufärbung tritt weit schwächer auf, als bei unmittelbarem Legen in Diphenylaminlösung oder bleibt auch ganz aus. Man kann sie vielfach im letzteren Falle doch noch dadurch hervorrufen, dass man eine grössere Menge des Reagens verwendet. Hervorgehoben sei jedoch, dass die Bildung der reducirenden Stoffe in nicht verholzten Geweben weit langsamer vor sich geht, als die Oxydation des Diphenylamins durch die Nitrats, so dass die Reaction, wo letztere nicht zu spärlich, wenn auch etwas geschwächt, eintritt; dagegen ist an den Nachweis von Nitraten durch Diphenylamin, bei solchen Mengen, wie sie in der Pflanze vorkommen, in verholzten Geweben nicht zu denken.

Der Chemiker, der mit grösseren Mengen arbeitet, kann äusserst schwache Spuren von Nitraten durch Diphenylamin aufdecken. Bei der Mikrochemie hat man es mit sehr geringen Flüssigkeitsmengen zu thun, und schon dadurch ist die Empfindlichkeit der Reaction sehr herabgesetzt. Das Wasser unserer Wasserleitung nahm z. B. im Becherglase eine dunkelblaue Färbung an, während ein Tropfen desselben Wassers auf dem Objectträger erst nach mehreren Secunden eine schwache Reaction zeigte; während der gleichen Zeit würde die Schwefelsäure in einem Gewebestücke bereits reducirende Stoffe reichlich erzeugt haben.

Die Menge Nitrats, die durch Diphenylamin in Pflanzentheilen nachgewiesen werden kann, ist je nach der Gewebeart, vielleicht auch der

Pflanzenart, sehr schwankend. Einige diesbezügliche Versuche machte ich mit Schnitten aus der Rinde diesjähriger Zweige von *Hedera Helix*, dem Parenchym des Stiels etiolirter, in destillirtem Wasser cultivirter Maispflänzchen und den krautigen Endzweigen von *Medicago arborea*; diese Pflanzen wurden daher gewählt, weil sie für sich allein gar keine Reaction haben. Die Schnitte blieben 48 Stunden lang in Lösungen von 1:5000 und 1:10 000 Magnesianitrat, sowie in dem schon erwähnten Wasserleitungswasser. Die Schnitte von *Hedera* und *Medicago* nahmen gar keine Blaufärbung an, während die Flüssigkeiten deutlich, die 1:5000 sogar ziemlich stark reagirten. Anders die Maisstücke, die offenbar Nitrate aufgespeichert hatten. Wenigstens reagirten solche, die in der 1:5000 Lösung gelegen hatten, stärker als die letztere, während solche aus den schwächeren Lösungen nur eine noch eben sichtbare Färbung annahmen.

Die mit der Diphenylaminreaction verbundenen Fehlerquellen sind bereits von Molisch, der dieselbe zuerst in die Botanik einführte, für gewisse Fälle, spec. verholzte Gewebe, erkannt worden. Ich kam in meiner Arbeit über das Kalkoxalat zu dem Schluss, dass beinahe alle Gewebe Stoffe enthalten, die der Reaction entgegenwirken und sie zum Theil ganz verhindern. Ganz anders Frank, der in seiner viel später als diejenige von Molisch erschienenen grossen Arbeit, in welcher letztere doch citirt (p. 457 u.) und kritisirt wird, diese Befunde vollkommen ignorirt und behauptet, dass die Reaction durch die Gegenwart von keinem in der Pflanze vorkommenden Stoffe verhindert wird. Diese Behauptung stützt sich auf Versuche mit folgenden Substanzen: Traubenzucker, Dextrin, Inulin, arabisches Gummi, Mannit, Oxalsäure, Weinsäure und weinsaures Kali, Aepfelsäure, Citronsäure, Legumin, Gluten-Kasein, krystallisirtes Eiweiss aus der Paranuss, Albumin, Asparagin, Leucin, Tyrosin, Pepsin, Cumarin, Tannin, Solanin, Narcotin, Salicin. Hätte der Verf. ein mit Nitrat imprägnirtes Stück Holz benutzt, — und Holz ist doch ein mehr verbreiteter Bestandtheil der Pflanze als etwa das Cumarin, — so würde er vergeblich auf die Reaction gewartet haben. Der richtige Weg war nicht, alle möglichen isolirten Stoffe, sondern Stücke der Pflanze in ihrer Wirkung auf das Reagens zu prüfen.

Dass da, wo die Blaufärbung ausbleibt, kein Nitrat vorhanden sein soll, ist ebenso unrichtig, als die ebenfalls von Frank vertretene Ansicht, dass überall, wo in der Pflanze oder im Boden die Reaction eintritt, dieselbe als untrügliches Zeichen der Anwesenheit eines Nitrats zu betrachten ist. Durch dieses unverdiente Vertrauen wurde Frank verleitet, Oxyde des Eisens und Mangans, die die Oberfläche von Sandkörnern überzogen, trotz ihrer Unlöslichkeit als Nitrate zu betrachten ¹⁾. In der Pflanze ist

1) Vgl. Kreuzler, l. c.

es allerdings höchst wahrscheinlich, dass Blaufärbung bei Behandlung mit Diphenylamin wirklich auf Nitrate zurückzuführen ist. indem es weder Frank noch mir gelungen ist, bei nitratfrei gezogenen Pflanzen eine Spur solcher Reaction zu erhalten.

Directer Nachweis des Kaliumnitrats. Bereits Borodin und Monteverde haben das Kaliumnitrat direct in der Pflanze nachgewiesen. Man verfährt am besten, wie es die genannten Autoren empfohlen, indem man die Schnitte in einen Tropfen Alkohol legt und bis zur Trockniss, ohne zu erwärmen, eindampfen lässt. Die meisten Krystalle haben breit rhombische Umriss und gehören wohl der hexagonal rhomboedrigen Modification des Salzes an; ausserdem sind auch prismatische Formen, mit eigenthümlich gezackten Kanten vorhanden. Vergleiche mit dem Rückstand einer Kalinitratlösung und Anwendung von Diphenylamin werden zur Sicherheit führen; dagegen lässt hier die Borodin'sche Reaction, wie bei anderen leicht löslichen Körpern häufig, im Stiche. Dieselbe gestattet jedoch eine sichere Unterscheidung von den Krystallen des sauren oxalsauren Kali und des Asparagins, die übrigens bei genauer Untersuchung schon an ihrer Form von denjenigen des Kalisalpeters leicht kenntlich sind.

Schwefelsäure.

Wirklich brauchbare Reactionen zum mikrochemischen Nachweis der Schwefelsäure in pflanzlichen Geweben sind mir leider nicht bekannt. Auf Fehlen derselben kann man zwar bei Ausbleiben des Niederschlags nach Chlorbaryumbehandlung schliessen; wo ein solcher aber entsteht, ist die Entscheidung häufig schwer.

Manchmal leistet gute Dienste die Bildung von Strontiumsulfat nach Behandlung der zu prüfenden Gewebestücke mit Strontiumnitrat. Es bilden sich kleine, dicke Krystalle von meist rundlich-rhombischen, zuweilen aber scharfen und geradlinigen Umrissen, die sich in Wasser gar nicht mehr lösen.

Auch nach Behandlung mit Chlorbaryum habe ich zuweilen scharfe, rhombische Täfelchen erhalten.

In den Aschen lässt sich nach Zusatz eines Wassertropfens häufig schwefelsaures Kali direct nachweisen, — farblose, hexagonale Krystalltafeln, die, da sie ziemlich schwer löslich sind, schon am Rande des Tropfens sich zeigen und manchmal bedeutende Dimensionen erreichen. Bei Zusatz (nach dem Eintrocknen) eines Tropfens Platinchlorid, zerfallen sie in einen Haufen rother Körnchen, desgl. in farblose Körnchen nach Zusatz von Chlorbaryum.

Mit grösserer Sicherheit, manchmal auch an lebenden Geweben (*Crambe maritima*), lässt sich Kalisulfat, auch Natronsulfat, durch schwefelsaures Nickel nachweisen, das mit letzteren ein schön krystalli-

sirendes Doppelsalz $(\text{SO}_4)_2\text{NiK}^2(\text{s.Na}^2) + 6\text{H}_2\text{O}$ von sehr einfacher Gestalt (monoklines Prisma mit Basis) bildet. Allerdings ist das Salz leicht löslich.

Weinsäure.

Saures Kaliumtartrat. Versetzt man eine saure Lösung von Weinsäure oder eines ihrer Salze mit Kaliumacetat, so bildet sich sofort oder in pflanzlichen Objecten nach dem Verdunsten, das rhombisch hemiedrisch krystallisirende, schwer lösliche saure Kaliumtartrat.

Calciumtartrat. Diese Reaction, die mir in Pflanzen, z. B. bei Vitaceen, die besten Resultate gegeben hat, beruht in der Bildung von krystallinischem Calciumtartrat bei Behandlung neuraler Lösungen weinsaurer Salze mit Chlorcalcium. Die Krystalle gehören dem rhombischen System an und bestehen in der Regel aus der Combination eines langgestreckten Prisma mit einem Doma. Die Krystalle sind leicht in verdünnter, schwer in concentrirter Essigsäure löslich.

Ueber den directen Nachweis von Calciumtartrat bei Vitis-Arten ist der Abschnitt über die »organischen Kalksalze der Pflanze« zu vergleichen.

2. Uebersicht der zu Wasserculturen benutzten Lösungen.

Die nachfolgenden sind sämmtlich concentrirte Lösungen, die mit destill. Wasser im Verhältniss von 1:4,8 zur Verwendung kommen.

Normale Lösungen.

- 1) ^{Gr.} 6 Kalknitrat.
 1,5 Kalinitrat.
 1,5 schwefelsaure Magnesia.
 1,5 neutr. phosphorsaures Kali.
 1,5 Chlornatrium.
 600 destill. Wasser.
- 2) 7 Kalinitrat.
 1,5 schwefelsaure Magnesia.
 1,5 Chlornatrium.
 600 destill. Wasser.
 Neutrales Kalkphosphat in Ueberschuss.
- 3) 7 Kalinitrat.
 1,5 schwefelsaure Magnesia.
 1,5 Chlornatrium.
 1,5 neutr. phosphorsaures Kali.
 600 destill. Wasser.
 Gyps in Ueberschuss.

- 4) Kalkarm. ^{Gr.} 6 Kalinitrat.
 2 Kalknitrat.
 1,5 neutr. Kaliphosphat.
 1,5 Magnesiasulfat.
 1,5 Chlornatrium.
 600 destill. Wasser.

Tradescantia Selloi gedieh gleich gut in den Lösungen 1—3; Lösung 4 kam nur einmal, im Spätherbst, mit zweifelhaftem Erfolg zur Verwendung.

Kalkfreie Lösungen.

Die Lösungen 2 und 3 mit Ausschluss des Kalks.

Kalifreie Lösungen.

- 1) ^{Gr.} 7 Kalknitrat.
 1,5 Magnesiasulfat.
 1,5 Chlornatrium.
 1,5 neutrales Natronphosphat.
 600 destill. Wasser.

2) Dieselbe Lösung, aber anstatt des Natronphosphats Kalkphosphat in Ueberschuss.

Magnesiafreie Lösungen.

- 1) ^{Gr.} 6 Kalknitrat.
 1,5 Kalinitrat.
 1,5 neutr. Kaliphosphat.
 1,2 Kalisulfat.
 600 destill. Wasser.

2) Dieselbe, aber anstatt Kaliumsulfat Gyps in Ueberschuss.

Stickstofffreie Lösung.

- ^{Gr.} 1,5 neutr. Kaliphosphat.
 1,5 Magnesiasulfat.
 1,5 Chlorkalium.
 600 destill. Wasser.

Phosphorfreie Lösung.

- 0,5 Kalinitrat.
 1 Kalknitrat.
 0,5 Magnesianitrat.
 0,5 neutr. Kalisulfat.
 1000 destill. Wasser.
 NB. Diese Lösung erfuhr keine weitere Verdünnung.

II. Ueber Vertheilung und Leitung der Aschenbestandtheile in der Pflanze.

In meiner Arbeit »über Kalkoxalatbildung in den Laubblättern« habe ich bereits in aller Kürze gezeigt, dass die Nährsalze des Bodens meist nicht direct durch die Wasserbahnen nach den Orten ihres Verbrauches geführt, sondern in der Mehrzahl der Fälle mehr oder weniger lange in bestimmten Geweben aufgespeichert werden, welchen theilweise auch die Leitung derselben zukommt. Für den Salpeter war diese Aufspeicherung in bestimmten Fällen schon längst erkannt worden und in neuerer Zeit namentlich von Borodin, Monteverde, Berthelot u. a. näher untersucht oder doch berücksichtigt worden. Wie der Salpeter verhalten sich aber auch Phosphate, Sulfate und Chloride.

Die Aufspeicherung und Leitung der Aschenbestandtheile bildet eine Hauptaufgabe gewisser Gewebe und ist für eine nähere Einsicht der Beziehungen der Pflanze zu ihrer Umgebung von hervorragender Bedeutung. Hier werde ich wesentlich nur diejenigen Punkte berühren, die für das Verständniss der übrigen in dieser Arbeit besprochenen Erscheinungen von Belang sind.

1. Aufspeicherung von anorganischen Salzen in den Reservestoffbehältern und Auswandern derselben bei der Keimung bezw. der Entfaltung der Knospen.

Von einer Aufspeicherung anorganischer Salze im Samen kann kaum die Rede sein, indem die in demselben reichlich vertretenen Phosphate von Kali, Kalk und Magnesia mit organischen Bestandtheilen in lockerer Verbindung stehen. Es ist bekannt, dass phosphorsaures Kali einen Bestandtheil gewisser eiweissartiger Verbindungen des Samen bildet und die Phosphate von Kalk und Magnesia sind, wie Pfeffer zeigte, in den Globoiden mit einer organischen Säure gepaart. Es war mir unmöglich, aus Schnitten trockener oder zuerst einen bis zwei Tage aufgeweichter Samen ¹⁾ die Phosphorsäurereaction mit Magnesiasulfat, Chlorammonium und Ammoniak zu erhalten; auch die Molybdänreaction blieb ohne Erfolg, so dass die Anwesenheit anorganischer Phosphate ausgeschlossen ist. Ob anorganische Sulfate im Samen präexistiren, dürfte wohl noch nicht als feststehend betrachtet werden; die Anwesenheit einer beträchtlichen Menge Schwefelsäure im Samen behauptet Arendt für Hafer, Raps und Sau-
bohn. Ob die von dem genannten Verfasser beschriebene Methode des Nachweises (l. c. p. 33) wirklich einwurfsfrei ist, muss ich dahingestellt lassen. Die mikrochemischen Reactionen auf Schwefelsäure sind für Samen wegen der die Krystallbildung erschwerenden Stoffe nicht möglich.

1) Benutzt wurden *Lupinus albus*, *Phaseolus multiflorus*, *Cucurbita Pepo*, *Ricinus communis*, *Spinacia oleracea* und *Zea Mais*.

Jedenfalls bleibt es dahingestellt, ob die Schwefelsäure an anorganische Basen gebunden ist und ob sie sich in der Schale oder in den Reservestoffbehältern befindet. Aehnliche Zweifel bleiben auch in Betreff der stets spärlichen Chloride bestehen, während Nitrate bekanntlich in Samen nicht vorkommen.

Ganz anders als die Samen verhalten sich die Rhizome, in welchen die Mineralstoffe, zum grossen Theile wenigstens, in anorganischer Verbindung aufgespeichert sind ¹⁾. Phosphate sind sehr reichlich vorhanden, und zwar, in manchen Fällen wenigstens, zum Theile als lösliches Kalkphosphat, so in der Georgine, wo sich, wie Leitgeb zeigte, das Phosphat im Alkohol in Form von Sphaeriten ausscheidet und im Salomonssiegel. In manchen Fällen (Begonia, Kartoffel, Canna) konnte ich allerdings gelösten Kalk in den Zellen nicht finden; es ist aber doch möglich, dass hier sehr feinkörniges festes Kalkphosphat, ähnlich wie in den Globoiden, vorliegt. Sulfate konnte ich in den untersuchten Fällen nicht mit Sicherheit nachweisen, was allerdings auf die die Ausscheidung deutlicher Krystalle verhindernde Beschaffenheit des Zellsafts zurückgeführt werden könnte. Chloride liessen sich überall nachweisen, namentlich reichlich im Rhizom von Polygonatum. Salpetersäure fand ich reichlich bei der Kartoffel (äusseres Parenchym), bei der Georgine und Canna, bei Begonia nur in einem Theile der untersuchten Knollen, in Hyacinthenzwiebeln und Rhizomen von Polygonatum und Convallaria gar nicht. Ich lasse es dahingestellt, ob dieses Fehlen constant ist oder von der chemischen Beschaffenheit des umgebenden Bodens herrührte.

Aehnliches wie von Rhizomen gilt auch von perennirenden als Reservestoffbehälter fungirenden oberirdischen Organen, so namentlich von dem Holze unserer Sträucher und Bäume, das Phosphate aufspeichert. (Vgl. darüber Dehérain p. 23).

Bei der Keimung gleichen sich die Unterschiede zwischen Samen und anderen Reservestoffbehältern in Bezug auf die Phosphate aus; die organischen Verbindungen, in welchen letztere gleichsam verborgen waren, werden gespalten, so dass dieselben in der Keimpflanze auch in frischen Geweben nachweisbar werden.

Die Auswanderung der Phosphate ist vom Anfang der Keimung an, wie auch schon aus den makrochemischen Untersuchungen über die letztere hervorgeht, eine sehr beträchtliche, und zwar dient zur Leitung derselben, soweit sie als anorganische Salze wandern, das chlorophyllarme Rinden- und Markparenchym des Stengels und der Wurzel, sowie das Nervenparenchym der Blätter; ausserdem findet im Siebtheil der Gefässbündel eine Auswanderung phosphathaltiger organischer Körper statt,

1) Ich untersuchte Knollen der Kartoffel, Georgine, Begonia sp.; Rhizome von Polygonatum multiflorum, Convallaria majalis und Canna sp.

die uns hier nicht zu beschäftigen hat. In gewissen Fällen ist die wandernde Phosphorsäure nur oder beinahe nur an Kali gebunden, so beim Mais, wie sowohl aus den makrochemischen Untersuchungen Hornbergers, wie aus dem mikrochemischen Befunde hervorgeht. In anderen Fällen, so namentlich bei dem Treiben der Kaulome, wandern auch reichlich Kalk und Magnesia aus, ersterer in gewissen Fällen nachweisbar und wahrscheinlich überall ganz oder zum grossen Theile ebenfalls als Phosphat. Das weitere Schicksal dieser Phosphate wird uns im letzten Kapitel dieser Arbeit zu beschäftigen haben. Hier will ich nur hervorheben, dass in den Vegetationspunkten sehr reichlich, im Blattmesophyll etwas weniger Phosphorsäure in organischer, nur bei der Untersuchung der Asche nachweisbarer Verbindung sich anhäuft, während anorganische Phosphate gänzlich fehlen. Die Vegetationspunkte und das Blattmesophyll stellen demnach Endziele der Wanderung dar, Bildungsstätten phosphorsäurehaltiger organischer Verbindungen.

Die Nitrate und Chloride der Knollen wandern in denselben Geweben wie die Phosphate.

Das chlorophyllarme langzellige Parenchym der Kaulome und Blattnerven, in welchem bekanntlich Zucker und Amide geleitet werden, stellt demnach während der Keimung des Samen und anderer Reservestoffbehälter auch die Bahn dar, in welcher die Mineralsalze sich nach den Orten ihres Verbrauchs bewegen.

2. Aufspeicherung und Leitung der Mineralsäuren und Mineralbasen in der erwachsenen Pflanze.

Wie während der Keimung, so auch nachher, ist die Vertheilung der Mineralsalze keineswegs eine gleichmässige. Als Behälter derselben dienen vielmehr, unter normalen Umständen, beinahe ausschliesslich dieselben Gewebe, die wir auch während der Keimung diese Rolle übernehmen sahen, also das saftreiche und chlorophyllarme Parenchym von Mark und primärer Rinde der Wurzeln und Kaulome, sowie das sehr ähnliche Parenchym der Blattnerven. Hierzu kommt in vielen, aber nicht in allen Fällen, die Epidermis mit ihren Anhängen.

Das Blattmesophyll und die Holztheile der Gefässbündel enthalten unter gewöhnlichen Umständen meist weder Nitrate, noch anorganische Phosphate, noch Sulfate in nachweisbaren Mengen, Chloride dagegen habe ich auch im Blattmesophyll häufig gefunden. Wo das Substrat an den Salzen der einen oder der anderen der genannten Säuren reich ist, werden ihre Salze auch in den erwähnten Geweben nachweisbar.

Ausnahmslos frei von Mineralsalzen fand ich die Meristeme der Vegetationspunkte und secundären Zuwachszonen, die Pollenkörner, Ovula, Siebröhren, Milchröhren, cellularen und intercellularen Secretbehälter.

Das Vorkommen der Mineralsalze in den Pflanzen und die Art ihrer Vertheilung in den Geweben bietet grosse Unterschiede und erscheinen geeignet über manche Fragen des Stoffwechsels und der Biologie Licht zu werfen; ich werde daher im Folgenden die bisher darüber gesammelten Daten kurz zusammenstellen und dann auch den Aschenbestandtheilen der Mineralsäuren nicht enthaltenden Gewebe einige Zeilen widmen.

Vorkommen und Vertheilung der Mineralsäuren in der Pflanze.

Die Befähigung Salze der Mineralsäuren aufzuspeichern kommt wohl allen Pflanzen in geringerem oder grösserem Grade zu, wie sich bei der Cultur auf einem Substrat, das solche in sehr grosser Menge enthält, zeigt. Unter gewöhnlichen Umständen zeigen sich aber viele Pflanzen nahezu oder ganz frei von Mineralsalzen, während solche bei anderen, auf demselben Substrat wachsenden Pflanzen, sehr reichlich auftreten können.

Manche Pflanzen beschränken dementsprechend ihre Salzaufnahme ungefähr auf den augenblicklichen Bedarf. Hierher gehören viele, wenn auch keineswegs alle Holzgewächse, z. B. die strauch- und baumartigen Rosaceen, Amentaceen, Coniferen, unter den krautigen Gewächsen wiederum namentlich Rosaceen (Arten von *Fragaria*, *Potentilla*, *Poterieen* etc.), auch einige Ranunculaceen (*Aconitum* *Napellus*, *Helleborus foetidus* etc.) Gerade entgegengesetzt verhalten sich viele andere, hauptsächlich krautige Gewächse, welche von sämtlichen Nährsalzen des Bodens grosse Mengen aufspeichern, so namentlich sämtliche Chenopodiaceen, Amarantaceen, Cruciferen, krautige Solanaceen (*Datura* *Stramonium*, *Hyoscyamus*, *Solanum nigrum*) überhaupt alle Gewächse, die häufig auf Schutt und an anderen salzreichen Standorten wachsen; diese ihre Neigung, grosse Menge löslicher Salze aufzuspeichern, tritt aber auch auf salzarmem Boden in auffallender Weise zum Vorschein. Viele Pflanzen endlich zeigen nur zu bestimmten Mineralsäuren grosse Begierde: Lösliche Phosphate findet man z. B. in sehr grosser Menge angehäuft im Parenchym der Stiele und Blätter der Rosskastanie¹⁾, *Forsythia viridissima*, *Premna latifolia*, *Tectonia grandis*, *Vitex incisa*, *Allium Cepa*, *Ranunculus repens*, *Anemone japonica* u. a., während Nitrate, Sulfate und Chloride gar nicht oder nur in sehr geringer Menge nachweisbar sind.

Neigung, Chloride bei Ausschluss anderer Mineralsalze in ihren Blattgeweben aufzuspeichern, finden wir bei vielen Holzgewächsen, die unter natür-

1) Phosphatgehalt der Asche der Blätter nach Wolf 24,40 %.

lichen Bedingungen vorwiegend auf dem Strand wachsen, aber auch auf gewöhnlichem Boden sehr chlogierig bleiben, so, nach meinen Beobachtungen in Buitenzorg, bei *Bruguiera Rheedii*, *Sonneratia acida*, *Terminalia Catappa*, *Excoecaria Agallocha*, *Paritium tiliaceum*, *Climacandra obovata*. Dieselbe Eigenschaft, Chloride aufzuspeichern, bei Ausschluss anderer Mineralsalze, fand ich aber auch bei Holzgewächsen, die unter natürlichen Bedingungen nicht als Halophyten wachsen, aber meist mit Halophyten verwandt sind, so bei *Hibiscus Lampas*, *Abutilon atropurpureum*, *Brunfelsia americana*, *Derris sinuata*, *Clematis tubulata*, *Excoecaria bicolor*, *Terminalia Arjuna* und *bicolor*, *Sapium*-Arten und vielen anderen Euphorbiaceen. Auf dem Strande sind die Chloride zum grossen Theil in Form von Chlornatrium, an anderen weniger chlorreichen Standorten von Chlorkalium enthalten und befinden sich wohl vorwiegend in den Blättern.

Ob es Pflanzen giebt, die Nitrate oder Sulfate, bei Ausschluss anderer Mineralsalze, aufspeichern, ist mir nicht bekannt.

Der grosse Unterschied in Menge und Beschaffenheit des Vorraths an Mineralsalzen, den sich verschiedenartige Gewächse aus demselben Substrat verschaffen, trat z. B. in auffallender Weise bei der Pflanzengesellschaft hervor, die einen Composthaufen des Botanischen Gartens in Bonn überwucherte. So zeigten sich Nitrate in enormen Mengen bei *Impatiens parviflora*, *Fumaria officinalis*, *Atriplex hastata*, *Thlaspi arvense*, *Alliaria officinalis*, *Lamium purpureum*, *Datura Metel*, in geringer Menge dagegen bei *Vicia angustifolia*, sowie jungen Pflanzen von *Aesculus Hippocastanum* und *Acer* sp. Bei *Aesculus* und *Impatiens* waren grosse Mengen von Phosphaten aufgespeichert. Eine starke Reaction auf Chloride zeigten *Atriplex*, *Impatiens*, *Fumaria*, *Lamium*, während *Aesculus* und *Acer* kaum reagierten.

Instructiv war in derselben Hinsicht die Untersuchung der Gewächse, welche auf einigen Beeten der zu den Rosaceen gewidmeten Abtheilung des Botanischen Gartens wuchsen. Die auf ihren Salzgehalt geprüften Rosaceen ergaben eine auffallende Armuth an Salpetersäure, anorganischer Phosphorsäure und Chlor (*Fragaria vesca*, *Sanguisorba officinalis*, *Agri-monia Eupatorium*, *Acaena sarmentosa*, *Potentilla mollissima*), während einige zu anderen Familien gehörige Pflanzen, die als Unkräuter mit den Rosaceen wuchsen (*Impatiens parviflora*, *Calystegia sepium*, *Fumaria Vaillantii*, *Lamium album*, *Solanum nigrum*, *Euphorbia Peplus*, *Senecio vulgaris*), eine intensive Reaction auf Nitrate und Phosphate gaben und zum Theil auch sehr chlorreich waren (namentlich *Senecio*, *Euphorbia*, *Impatiens*, *Lamium*).

Der Modus der Vertheilung der anorganischen Salze im pflanzlichen Organismus zeigt, je nach der Qualität derselben, bedeutende Unterschiede. Zwar dienen zur Speicherung aller Salze, wie bereits früher erwähnt,

wesentlich nur das plasmaarme Parenchym der Rinde und des Marks, sowie dasjenige der Blattnerven und der Epidermalgebilde. Während aber Phosphate und Chloride in der Gesamtheit dieser Speicherzellen vorhanden sind, zeigen sich die Nitrate vielfach nur in einem Theile derselben. Auch sind die letzteren weit strenger an die Speichergewebe gebunden als die Phosphate und namentlich die Chloride. Nitrate sind im Mesophyll nur dann nachweisbar, wenn das Substrat sehr reich daran ist oder die Bedingungen für ihre Assimilation ungünstig sind; das Vorhandensein anorganischer Phosphate im grünen Blattgewebe ist schon eine gewöhnlichere Erscheinung, dasjenige von Chloriden, da wo die Pflanze zu ihrer Aufspeicherung neigt, die Regel. In Blüthentheilen, spec. in der Corolle, findet man häufig kleine Mengen Phosphate und grössere Mengen Chloride, während die Nitrate constant zu fehlen scheinen.

Die Vertheilung der Salze in der Pflanze zeigt auch je nach der Art mehr oder weniger grosse Unterschiede. So waren z. B. bei den jungen Exemplaren von *Aesculus* und *Acer*, die auf dem vorhin erwähnten Composthaufen gewachsen waren, Nitrate mit Diphenylamin beinahe nur in der Wurzel nachweisbar, während solche bei *Atriplex hastata* in der Wurzel ganz zu fehlen schienen, in sämtlichen Sprosstheilen dagegen massenhaft aufgespeichert waren. Die Phosphate zeigten sich bei allen drei Pflanzen hauptsächlich in der Wurzel, bei *Aesculus* auch in den Blattstielen angehäuft. Die Regel scheint jedoch für die Nitrate grösste Anhäufung im Stengelparenchym zu sein, während die Phosphate eine mehr gleichmässige Vertheilung, die Chloride eine Bevorzugung der grünen Organe zu zeigen pflegen.

3. Die Mineralbasen der anorganischer Säuren entbehrenden Gewebe.

Anorganische Salze fehlen, wie schon erwähnt, stets in den Urmeristemen, den Siebtheilen der Gefässbündel, den Milchröhren und Secretbehältern, den Pollenkörnern und Ovula und kommen im Blattmesophyll und Wassergewebe meist nur in geringer Menge vor. Die in diesen Geweben enthaltenen Mineralbasen befinden sich daher in organischer Verbindung, sind assimiliert.

Eine genauere Untersuchung des Gehalts dieser Zellen an anorganischen Basen würde gewiss dazu beitragen, die Rolle der letzteren im pflanzlichen Stoffwechsel zu beleuchten. Schon die noch unvollkommenen Methoden, deren ich mich bediente, haben Resultate ergeben, die einiges Interesse beanspruchen dürften.

Fangen wir mit den Meristemen an, so zeigten dieselben stets eine intensive Reaction auf Kali und Magnesia, während sich Kalk nicht nachweisen liess, so im Vegetationskegel der Sprosse von *Elodea cana-*

densis, *Hippuris vulgaris*, *Tradescantia Selloi*, der Luftwurzeln von *Philodendron canniifolium*, *Anthurium*-Arten und verschiedener Orchideen, im Cambium von *Aesculus Hippocastanum*, *Alnus glutinosa*, *Rosa centifolia*, *Brassica oleracea*. — Phosphorsäurereaction wurde im Cambium hier und da, so bei *Aesculus*, beobachtet, dürfte aber von den älteren Zellen herrühren. Die Asche des Cambium der erwähnten Pflanzen zeigte eine ganz schwache Reaction auf Kalk.

In den Blattmesophyllzellen wurden Magnesia und Kali stets sehr reichlich gefunden, während Kalk häufig nicht nachweisbar war. Für letzteren bestand das Verfahren in Behandlung der Schnitte mit Kalioxalat-Eau de Javelle, Auswaschen derselben mit Wasser und mit Alkohol, und Untersuchung bei starker Vergrösserung in *Origanum-Oel*. Bei *Prunus Laurocerarus*, *Dianthus chinensis* wurde in den Zellen, die kein Kalkoxalat schon vorher enthielten, solches gar nicht gefunden; dieselben enthielten also keinen Kalk, oder doch nicht in nachweisbarer Menge. Bei *Nymphaea alba* wurde bei der erwähnten Behandlung reichlich Kalkoxalat im Schwammparenchym, dagegen keines in den Palissadenzellen ausgeschieden.

Siebröhren. Der frische Saft der Siebröhren von *Cucumis sativus* (Stengel) und *Cucurbita Pepo* (Stengel und unreife Frucht) gab eine intensive Reaction auf Kali und Magnesia, eine sehr schwache auf Kalk. In der Asche war Phosphorsäure ausserordentlich reichlich, Kalk in Spuren vorhanden.

Bei *Wistaria sinensis* liessen sich in den Siebröhren an Schnitten Kalk und Magnesia nachweisen; die kleinen Tropfen des Querschnitts reagierten intensiv auf Kali. Die Schnitte waren ausserordentlich reich an anorganischer Phosphorsäure, die jedoch dem Siebröhren-Inhalt zu fehlen schien.

Bei *Aristolochia Sipho* liess sich im Siebröhreninhalt der frischen Schnitte Kalk und Magnesia, nach dem Eintrocknen der Schnitte in Platinchlorid eine sehr grosse Kalimenge nachweisen.

Bei *Menispermum canadense* liess sich in den Siebröhren des Stengels sehr reichlich Magnesia und, nach Eintrocknen der Schnitte in Platinchlorid, Kali nachweisen. Spuren von Kalk waren ebenfalls erkennbar, dagegen keine anorganische Phosphorsäure. Der veraschte Bast gab intensive Phosphatreaction.

Die Milchsäfte und Gummiharze gaben keine Reaction auf anorganische Säuren. Folgende waren die Ergebnisse meiner mikrochemischen Untersuchung der Asche:

Papaver somniferum, junge Früchte von der Grösse einer Wallnuss bis nahezu zum fertigen Zustande: Phosphorsäure (intensive Reaction), Schwefelsäure (id.), Kali, Kalk, Magnesia.

Opium-Patna (von der hiesigen Sammlung): Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kalk, Kali; Magnesia und Natron fehlen.

Lactucarium von *Lactuca virosa* (aus Zell): Phosphorsäure, Schwefelsäure, Chlor, Kali (intensiv), Magnesia (id.), Kalk (schwach). — Natron fehlt.

Euphorbia Lathyris: Schwefelsäure, Spuren von Phosphorsäure, Kalk (bildet als CO_3Ca die Hauptmasse der Asche), zweifelhafte Spuren von Kali und Magnesia.

Euphorbia procera: Stengel blühender Pflanzen. Die Asche besteht beinahe nur aus kohlensaurem Kalk, neben Spuren von Gyps. Kali, Natron, Magnesia, Phosphorsäure sind nicht nachweisbar.

Euphorbium des Handels. Die Asche besteht beinahe nur aus Carbonaten des Kalkes und der Magnesia. Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kali sind nicht nachweisbar.

Ficus elastica: Junger Trieb und Blattstiele desselben. Die Asche besteht vorwiegend aus kohlensaurer Magnesia, untergeordnet aus kohlensaurem Kalk; von Gyps sind Spuren vorhanden. Kali, Phosphorsäure, Chlor fehlen.

Ammoniacum: Sehr rein, milchweiss. Die massenhafte Asche besteht beinahe nur aus den Carbonaten des Kalks und der Magnesia; etwas Phosphorsäure ist nachweisbar.

Olibanum: Die sehr reichliche Asche besteht beinahe nur aus kohlensaurem Kalk; Schwefelsäure und Phosphorsäure sind eben nachweisbar. Keine Reaction auf Magnesia, Kali, Natron.

Gummi-Resina *Hederae*: Die Asche besteht wesentlich aus kohlensaurem Kalk; auch etwas Magnesiicarbonat ist vorhanden. Keine Reaction auf Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kali, Natron.

Pollenkörner. Der frische Zellinhalt des Pollens von *Hemerocallis fulva*, *Althaea rosea*, *Cucurbita Pepo* reagirt intensiv auf Kali und Magnesia; Kalk ist nicht nachweisbar. Nach der qualitativen Analyse von *Planta* enthält die Asche des Blütenstaubs von *Corylus Avellana* wenig Kalk, mehr Magnesia und Alkalien, viel Phosphorsäure, Spuren von Chlor.

III. Die organischen Kalksalze der Pflanze.

In meiner Arbeit über die Kalkoxalatbildung in Laubblättern habe ich gezeigt, dass dieselbe in der Regel nicht ihrer Gesamtmenge nach an gleiche Bedingungen gebunden ist. Unabhängig von Licht, Chlorophyll und Transpiration wird in wachsenden Pflanzentheilen das primäre Kalkoxalat erzeugt. Im ausgewachsenen Blatt hört die Bildung desselben und manchmal von Kalkoxalat überhaupt ganz auf; in den meisten Fällen aber fährt die Erzeugung fort, aber von nun an nur in chlorophyllhaltigen transpirirenden Zellen unter dem Lichteinflusse. Ich habe diese zweite

Art der Kalkoxalatbildung als secundäre bezeichnet. Tertiär habe ich endlich das Kalkoxalat genannt, das in vergilbenden Blättern durch Wechselzersetzung von Kalioxalat und Kalksalzen entsteht.

Wie eben erwähnt, bilden nicht alle Blätter, in welchen primäres Kalkoxalat erzeugt wird, auch secundäres. So scheint letzteres bei manchen Monocotylen, wie *Iris*, *Funkia*, aber auch bei Dicotylen, z. B. den Onagraceen, zu fehlen.

Die Resultate, zu welchen ich gelangt bin, sind von Kohl in der Hauptsache bestätigt worden. Ein Hauptunterschied beruht darauf, dass er einen vierten Modus der Kalkoxalatbildung unterscheidet, den er als tertiär bezeichnet, während mein tertiäres Kalkoxalat von ihm quartäres genannt wird. Da jedoch dieses Kohl'sche tertiäre Kalkoxalat in Laubblättern nicht oder in ganz untergeordneter Weise auftreten soll, so war hierin bisher ein Gegensatz unserer Anschauungen eigentlich nicht vorhanden. Ausserdem nimmt Kohl an, dass das Kalkoxalat weniger wanderungsfähig ist als ich es in meiner Arbeit darstelle, und sich nicht als solches bewegt, sondern zunächst eine Zersetzung erleidet.

Es war schon, als ich die Kalkoxalatbildung in Laubblättern untersuchte, meine Absicht, dieselbe später auch in den anderen Organen zu verfolgen. Die Resultate meiner diesbezüglichen Beobachtungen sind im Nachherigen mitgetheilt, und zwar, abgesehen von einigen Zusätzen in Anmerkungen, so, wie sie bereits vor Erscheinen des Kohl'schen Buches niedergeschrieben worden waren, da letzteres meine diesbezüglichen Anschauungen nicht modificirt hat. Diesem Abschnitt will ich aber einen solchen vorausstellen, in welchem ich die, ausser von Kohl, auch von Wehmer discutirte Frage der Wanderung des Kalkoxalats bespreche. Die vom letzteren Autor vertretenen Anschauungen sind von Kohl einer scharfen Kritik unterzogen worden, welcher ich mich in der Hauptsache anschliessen muss; die Thatsachen an sich bilden aber einen nicht werthlosen Beitrag zu der Kalkoxalatbildungsfrage.

Entstehung und Wanderung des Kalkoxalats.

Das Kalkoxalat tritt in der Pflanze in Krystallform auf und ist dementsprechend in dem Medium, wo es entsteht, etwas, wohl nur spurweise, löslich, da die Krystallisation eines Körpers einen gelösten Zustand desselben voraussetzt ¹⁾, ausser bei einigen molecularen Umlagerungen, wie sie beim Uebergang des monoklinen in rhombischen Schwefel stattfinden, — Fälle, die hier gar nicht in Betracht kommen können. Da die Kalkoxalatkrystalle häufig sehr gut ausgebildet und relativ gross sind, so muss das Salz im umgebenden Medium ziemlich leicht beweglich sein.

1) Auch die Krystallisation aus dem Schmelzfluss gehört, wie es O. Lehmann gezeigt, als Specialfall hierher.

Wehmer ist von der Ansicht ausgegangen, das Kalkoxalat wäre unlöslich und könnte dementsprechend nicht wandern. Es ist mir nicht eingefallen, in meiner früheren Arbeit die Löslichkeit des Kalkoxalats zu betonen, da sie ja bei einem krystallisirenden Körper ganz selbstverständlich ist.

In einer Salzlösung, deren Concentration sich nie rasch über den Sättigungspunkt erhebt, z. B. bei langsamem Eindampfen oder bei langsamer neuer Zufuhr des Salzes, werden relativ nur wenige Krystalle gebildet, die als Anziehungscentra auf eine mehr oder weniger grosse Entfernung wirken. Solche Krystalle zeigen nicht nur bedeutendere Grösse, sondern meist auch vollkommeneren Ausbildung, als solche, die beim plötzlichen Ueberschreiten des Sättigungspunktes gebildet werden.

Die Gesammtheit der Cystoplasten des grünen Blattgewebes, die ja ein zusammenhängendes Ganzes bilden, enthält höchst wahrscheinlich während der secundären Kalkoxalatbildung eine Lösung des Salzes, die meist ganz in der Nähe des Sättigungspunktes verbleibt; die Zahl der Krystalle ist dementsprechend relativ gering. In vielen Zellen finden wir nur einen Krystall (bezw. eine Druse); derselbe wächst nicht blos auf Kosten des in unmittelbarer Nähe gebildeten Salzes, sondern bildet den Mittelpunkt einer Anziehungssphäre, die sich weit über die Zelle hinaus erstrecken kann, ähnlich wie bei der Bildung des Inulins bei langsamer Ausscheidung. Wenn wir daher vielfach benachbarte grüne Zellen theils mit, theils ohne Kalkoxalatkrystalle sehen, so ist daraus nicht zu schliessen, dass die Kalkoxalatbildung nur bestimmten Zellen zukommt, sondern es ist die nothwendige Folge des Krystallisationsprocesses. Die Kalkoxalatbildung kann in allen Zellen gleich stark vor sich gehen und doch nur der zehnte, der hundertste oder noch ein viel geringerer Theil der Zellen Krystalle enthalten. Eine Wanderung des Kalkoxalats im Blatt muss stattfinden, da dasselbe sonst nicht in Krystallen, sondern als feinsten amorpher Staub auftreten würde.

Nun sehe ich in vielen Blättern das secundäre Kalkoxalat regellos im Mesophyll zerstreut, in anderen mehr oder weniger streng auf bestimmte Zellen, sogen. Krystallzellen bezw. Raphidenzellen, localisirt. In allen diesen Fällen ist seine Bildung aber an die gleichen Bedingungen gebunden, wir müssen also doch annehmen, dass sie in wesentlich gleicher Weise vor sich geht. Zumal ist die Erzeugung des Kalkoxalats an die Thätigkeit des Plasma, spec. an diejenige der Chlorophyllkörner, gebunden, und die Krystall- und Raphidenzellen sind plasmaarm und enthalten wenig oder gar kein Chlorophyll. Es wird uns daher wahrscheinlich dünken, dass diese Krystallzellen nur Speicherorgane für das in grünen Zellen gebildete Salz darstellen, und diese Annahme ist sowohl durch meine Beobachtungen, als durch diejenigen Kohl's und Wehmer's, wesentlich unterstützt worden. Der Unterschied

in unseren Ansichten besteht nur darin, dass Kohl, aus mir nicht recht verständlichen Gründen, eine Zersetzung und Neubildung des Salzes annimmt, anstatt dasselbe sich als solches bewegen zu lassen, während Wehmer, die von ihm in Anschluss an meine Befunde festgestellten Erscheinungen, die für meine Ansicht sprechen, als abnorm bezeichnet. Worin diese Abnormität aber eigentlich besteht, wird gar nicht erklärt, wie es auch Kohl hervorhebt.

Es fragt sich nun, wie wir uns die Thätigkeit dieser Krystallzellen vorstellen sollen. Wir könnten auf die Dunkelheit, welche die Vorgänge der Zucker- und der Asparaginwanderung umhüllt, hinweisen, wo im lebenden Organ die Fortbewegung eines gelösten Stoffes in bestimmten Bahnen nach bestimmten Orten stattfindet, ohne dass wir im Stande wären, dieselbe zu erklären. In dem uns beschäftigenden Falle ist aber die Erscheinung einer physikalischen Deutung zugänglich. Damit das Kalkoxalat sich in den Krystallzellen anhäuft, braucht es in denselben nur noch weniger löslich zu sein, als im grünen Blattparenchym. Das osmotische Gleichgewicht wird dann fortwährend zu Gunsten der Krystallzellen gestört und eine Anhäufung des gesamten Kalkoxalats in denselben würde schliesslich, bei hinreichend langer Lebensdauer des Blattes, eintreten können.

Ich möchte keineswegs behaupten, dass die gegebene Erklärung der Wirklichkeit entspricht; ich wollte nur zeigen, dass die Erscheinung nicht undenkbar ist, sondern sich sogar künstlich nachahmen liesse.

Ich habe an dem, was ich in meiner früheren Arbeit gesagt habe, dementsprechend nur wenig zu ändern, nämlich nur, dass ich mir damals die Wanderung des Kalkoxalats als intensiver vor sich gehend gedacht habe, als sie es wirklich sein dürfte. Dieser Punkt ist aber, obwohl an sich nicht unwichtig, für den Gegenstand dieser Arbeit irrelevant.

Die Kalkoxalatbildung ausserhalb der Blätter.

Bei krautigen Pflanzen ist es ein leichtes, sich zu überzeugen, dass die Kalkoxalatbildung in Stengel und Wurzel an ähnliche Bedingungen geknüpft ist, wie in den Laubblättern. Primäres Kalkoxalat wird bei Pflanzen, die solches in ihren Laubblättern erzeugen, auch in den Caulomen und meist in den Wurzeln erzeugt, und zwar nur in der wachsenden Region unterhalb der Urmeristeme. Nach vollendeter Streckung, wohl meist schon früher, hört die Kalkoxalatbildung in nicht grünen Zellen auf, während sich in chlorophyllführenden Zellen, und zwar vorzugsweise an der Peripherie, secundäres Kalkoxalat anhäuft.

Am geeignetsten zur Untersuchung sind langgestreckte Sprosse und Wurzeln, z. B. die Stengel von *Tradescantia Selloi* und habituell ähnlicher anderer Arten, besser noch diejenigen von *Begonia*- und die ungeheuer langen Wurzeln von *Philodendron*-Arten. Bereits Hilgers war

zu dem Ergebnisse gelangt, dass die Krystalle schon in noch in die Länge wachsenden Pflanzentheilen ihre definitive Grösse und Zahl erreichen; der genannte Autor hatte aber blos Pflanzen untersucht, welche ausschliesslich primäres Kalkoxalat bilden, während die vorhin zur Untersuchung empfohlenen Gewächse auch secundäres Kalkoxalat in grosser Menge erzeugen, in den Stengeln jedoch blos in der chlorophyllreichen Peripherie, während im Mark nur solange eine schwache Zunahme der Krystalle in den erwachsenen Internodien sich zeigt, als das Chlorophyll ziemlich reichlich bleibt und das Licht hinreichenden Zutritt erhält. In den von Stärke strotzenden älteren Zellen hört die Zunahme des Kalkoxalats gänzlich auf; ja, es kann sogar bei *Begonia* Wiederauflösung desselben stattfinden.

Weit complicirtere Erscheinungen zeigen sich in Pflanzentheilen mit ergiebigem Dickenzuwachs, also namentlich in den Holzgewächsen. Allgemein bekannt ist der grosse Reichthum der Mehrzahl der Baumrinden an Kalkoxalat, und dieser Umstand wurde von Sachs zu Gunsten der Annahme, dass die Siebröhren den Sitz der Eiweissbildung darstellen, benutzt ¹⁾.

Es ist, nachdem festgestellt wurde, dass das Längenwachsthum mit Kalkoxalatbildung verknüpft ist, a priori sehr wahrscheinlich, dass Aehnliches auch von dem Dickenwachsthum gelten wird. Nähere Untersuchung zeigte mir in der That, dass die Kalkoxalatbildung in der Rinde mit der Thätigkeit des Cambium, nicht mit derjenigen der fertigen Siebröhren, verknüpft ist. Die Feststellung dieser Thatsache war allerdings mit Schwierigkeiten verbunden, da hier, ähnlich wie in den Laubblättern, die Wanderungsfähigkeit des Kalkoxalats unter Umständen verwirrende Erscheinungen hervorruft. Der eben aufgestellte Satz ergab sich dennoch mit voller Sicherheit aus folgenden Erscheinungen:

1. Ist das Kalkoxalat ein Produkt der Siebröhren, so wird dasselbe auch da von den letzteren erzeugt, wo secundäres Dickenwachsthum nicht stattfindet. Nähere Untersuchung zeigt jedoch, dass in Organen ohne secundäres Dickenwachsthum Kalkoxalatbildung im Siebtheil der Gefässbündel nicht stattfindet, auch da, wo solche in anderen Geweben reichlich auftritt (*Tradescantia*, *Araceen* etc.). Auch fehlt es in der Regel in den Gefässbündeln dicotyler Blätter, auch solcher Gewächse, die in ihrem secundären Baste reichlich Kalkoxalat erzeugen; da, wo solches auch in den Siebtheilen der Blätter auftritt, ist ebenfalls eine Cambiumzone dauernd thätig (*Eucalyptus* etc.).

1) Diese Sachs'sche Annahme wird auch von Kohl, l. c. p. 44 ff., bestritten, jedoch, wie mir scheint, nicht widerlegt.

2. Ist die Annahme, dass die Stoffwechselvorgänge in den Siebröhren mit der Ausscheidung von Kalkoxalat verbunden sind, richtig, so wird letztere in Baumrinden von Innen nach Aussen zunehmen müssen. In manchen Rinden kann man sich leicht überzeugen, dass die Krystalle in definitiver Grösse und Zahl schon in der Nähe des Cambium auftreten, so z. B. in schematischer Deutlichkeit in der Granatrinde; unter Umständen kann sogar, wie noch nachher des Näheren erwähnt werden soll, eine rasche Abnahme durch Wiederauflösen von Innen nach Aussen stattfinden.

In vielen alten Rinden, z. B. bei Nadelhölzern, in der Condurango-Rinde u. s. w., ist hingegen eine Zunahme der Krystalle von Innen nach Aussen erkennbar, so dass die Annahme, dass Kalkoxalatbildung mit der Thätigkeit fertiger Siebröhren stattfindet, beim ersten Blicke eine Bestätigung zu erfahren scheint. Nähere Untersuchung zeigt jedoch, dass die Krystalle in Zonen des Bastes zunehmen, in welchen die Siebröhren längst ganz zusammengedrückt sind, so dass auch diese Befunde sich nicht zu Gunsten der Eiweissbildungshypothese verwenden lassen. Dagegen werden uns dieselben leicht verständlich, wenn wir annehmen, dass das nur zum kleinsten Theil in den Stoffwechsel zurückkehrende Kalkoxalat nach den äusseren, alternden und bald abfallenden Rindenschichten wandert, um aus dem Wege geschafft zu werden. Derartige Wanderungen habe ich früher für die Blätter beschrieben, und der Umstand, dass die Krystallkammern Begleiter der Fasern sind, wurde bereits von Sanio in ähnlicher Weise gedeutet.

Zur Gewissheit konnten jedoch solche Vorstellungen, soviel sie auch für sich a priori haben mochten, nicht führen; ich wandte mich daher an Objecte, von welchen eine bestimmte Beantwortung der Frage zu erwarten war.

Als sichergestellt muss nämlich die Unabhängigkeit der Kalkoxalatbildung von den Siebröhren betrachtet werden, wenn es gelingt, den Nachweis zu liefern, dass auch in siebröhrenfreiem secundärem Baste Kalkoxalat gebildet wird. Dieser Nachweis befindet sich aber bereits in de Bary's Vergl. Anatomie p. 595.

Bekanntlich befinden sich bei Arten der Gattung *Strychnos*, wie es de Bary zuerst erkannte, die Siebröhren, begleitet von ihren Geleitzellen und anderen zartwandigen Elementen, in Form dünner Stränge im Holze eingesprengt, während der nur wenig entwickelte Bast der Siebröhren ganz entbehrt. Bereits de Bary betont den Reichthum dieses siebröhrenfreien Bastes an Kalkoxalat, und zwar für eine unter dem Namen *Str. nux vomica* (?) bezogene Art.

Ähnliche Verhältnisse fand de Bary in dem Stamme einer Art der zu den Malpighiaceen gehörenden Gattung *Dicella*. Hier wird von der Rinde hervorgehoben, dass »in ihren schmalen zerstreuten Fasern und

viele kleine Krystalldrüsen führenden Bastseicht Siebröhren nicht gefunden werden konnten«, während solche sich, wie bei *Strychnos*, im Holze befanden.

Mir standen zur Verfügung Stammstücke von *Strychnos triplinervia*, die theils von mir bei Blumenau, theils von Dr. Schenck bei Rio gesammelt worden waren. Der Freundlichkeit des letzteren verdanke ich ausserdem ein Stammstück von *Str. brasiliensis* (Blumenau) mit normaler Holzstruktur und ein solches einer unbekannten, von ihm bei Pernambuco gesammelten Art, die sich, bei sonst wesentlich gleicher Structur wie *St. triplinervia*, als krystallfrei erwies. Die von de Bary für *Str. nuxvomica* (?) festgestellten und die jetzt von *Str. triplinervia* zu schildernden Verhältnisse sind demnach nicht für alle Arten der Gattung gültig.

Allem Anscheine nach verhält sich *Strychnos triplinervia* in Bezug auf das Kalkoxalat ganz ähnlich wie die von de Bary untersuchte Art. Auch hier strotzt der Bast von Kalkoxalatkrystallen. Solche, aber von geringerer Grösse, befinden sich auch in den Siebröhren führenden Strängen, die ich nicht ohne weiteres als Siebbündel bezeichnen möchte, da sie aus zwei wohl unterscheidbaren Theilen zusammengesetzt sind, von welchen der innere Siebröhren führt, während der äussere nur aus Stärke- und krystallführenden Zellen besteht. Krystalle fehlen den fertigen Strängen in dem eigentlichen Siebtheile ganz oder sind auf eine einzige Zellreihe beschränkt, und auch da nur in geringer Menge vorhanden; ausserdem liegen sie in grosser Menge an der Peripherie des Stranges. Noch in Bildung begriffene Stränge enthalten Krystalle auch zwischen den Siebröhren; es findet also eine nachträgliche Umlagerung statt.

Eine Zunahme der Krystalle findet in den siebröhrenführenden Strängen, sobald dieselben fertig sind, nicht mehr statt. Das Vorkommen von Kalkoxalat in diesen Strängen ist also keineswegs auf synthetische Vorgänge in den Siebröhren zurückzuführen, da sonst eine Zunahme der Krystalle stattfinden würde. Die Erscheinung findet vielmehr höchst wahrscheinlich darin ihre Erklärung, dass die Elemente des Bastes den wachsenden Theilen Stoffe zuführen, deren Bearbeitung mit der Ausscheidung von Kalkoxalat verbunden ist; näheres darüber wird in einem späteren Kapitel enthalten sein.

Noch eine Reihe anderer Erscheinungen haben die Richtigkeit meiner Annahme bestätigt, nämlich die Kalkoxalatbildung in Stämmen mit abnormem Dickenwachsthum, wo die Wanderung nach Aussen erschwert ist. Zu dieser Untersuchung geeignetes Material boten die von Dr. Schenck und von mir aus Brasilien mitgebrachten Sammlungen. Die Namen verdanke ich meinem genannten Freunde.

Auf wiederholter Cambiumbildung beruht das Dickenwachsthum der zu den Polygalaceen gehörigen Liane *Securidaca Selloana*. Die successiven Bastzonen enthalten reichlich grosse Prismen von Kalkoxalat, und zwar

sind die Krystalle ebenso gross und zahlreich in den allerneuesten grössten, wie in den älteren tieferen Bastzonen; ganz ähnlich verhält es sich mit dem Kalkoxalat in der Euphorbiacee *Fragariopsis scandens*, wo dasselbe jedoch weniger reichlich ist.

Bei *Gomphrena holosericea* (Amaranthaceae) findet eine wiederholte Bildung von Gefässbündelringen statt. Hier wird in den Siebtheilen kein Kalkoxalat erzeugt, reichlich dagegen in dem dazwischen liegenden Parenchym. Die Drusen haben schon in der Nähe des Cambium ihre maximale Anzahl und Grösse; sie nehmen nach Innen nicht nur nicht zu, sondern ab, und verschwinden gänzlich, mit Ausnahme des im Mark enthaltenen.

Es geht aus diesen Befunden mit voller Sicherheit hervor, dass die Kalkoxalatbildung im Bast, bezw. in ausserhalb des Basts liegenden Siebgruppen, ganz ähnlich wie in in die Länge wachsenden Pflanzentheilen, mit den Vorgängen des Wachstums, nicht mit der Bildung organischer Stoffe durch die Siebröhren zusammenhängt. Das bei dem secundären Dickenwachsthum gebildete Kalkoxalat ist dementsprechend dem primären zu rechnen.

Man könnte sich vielleicht wundern, dass das Kalkoxalat im Bast, nicht auch im Holze ausgeschieden wird. Es ist jedoch dagegen einzuwenden, dass es thatsächlich zahlreiche Fälle von Kalkoxalatbildung im Holze gibt (z. B. in den Markstrahlen des Holzes von *Camellia*, der Maserrinde des Rhabarbers etc.)¹⁾; die Bevorzugung des Basts ist übrigens aus zwei Gründen wohl begreiflich. Erstens wird durch eine Ausscheidung des zum grössten Theile nutzlosen Produkts nach aussen dessen baldige gänzliche Beseitigung erreicht, zweitens liefert, wie wir später sehen werden, der Bast die Stoffe, aus welchen das Kalkoxalat oder wenigstens das demselben vorausgehende Kalioxalat erzeugt wird.

Die Richtigkeit unserer Ansicht über die Kalkoxalatbildung im Baste geht endlich auch aus dem Umstande hervor, dass auch die Peridermbildung in vielen Fällen mit Kalkoxalatbildung verknüpft ist, und zwar vornehmlich da, wo neben Kork auch Phelloderm erzeugt wird. Das Kalkoxalat liegt dann in den Zellen des Phelloderms.

Ein ausgezeichnetes Beispiel des Vorkommens von Kalkoxalat im Phelloderm zeigte die schon erwähnten *Strychnos triplinervia* und *Securidaca Selloana*, ferner *Bignonia unguis* (Raphiden), eine nicht bestimmte Dalbergiacee von Rio de Janeiro, *Canella alba* und *Cinnamodendron corticosum*, wo sie schon de Bary hervorhebt, u. a. m. Wahrscheinlich würde eine diesbezügliche genauere Untersuchung eine ungefähr ebenso

1) Mehrere Beispiele bei Kohl, S. 36.

grosse Verbreitung des Kalkoxalats im Phelloderm, wie im Bast, ergeben. Herr Geheimrath Strasburger hatte, unabhängig von mir, bei Coniferen die gleiche Beobachtung gemacht.

Da, wo nur Kork gebildet wird, ist die Kalkoxalatbildung weniger ergiebig und schwerer zu constatiren, da eine Ablagerung in dem Korne nur selten stattfindet und eine Bildung in der primären Rinde als Zuwachs der schon in derselben abgelagerten Krystalle, wenn sie nicht sehr reichlich ist, sich nur schwer feststellen liesse.

Das reichlichere Auftreten bei gleichzeitiger Phellodermbildung ist übrigens leicht begreiflich, da letztere mit der Erzeugung von Nuclein und diese, wie wir nachher sehen werden, mit derjenigen von Kalkoxalat verknüpft ist, während bei ausschliesslicher Korkbildung jedenfalls nur sehr wenig neue Kernsubstanz entsteht.

Pflanzen ohne Kalkoxalat.

Die Kalkoxalat bildenden Pflanzenarten sind bekanntlich sehr zahlreich; es gibt aber dennoch viele Gewächse, die desselben entbehren, und da wo es vorhanden, wird es häufig nur im Zusammenhang mit dem Wachsthum, also primär, nicht auch in den grünen Geweben, als Nebenprodukt bei der Verarbeitung der Bodensalze erzeugt.

Diese Unterschiede können wir auf zwei Ursachen zurückführen. Entweder ist die Bildung von Kalkoxalat eine Eigenthümlichkeit gewisser Gewächse, ohne Analogon bei den anderen, oder es wird bei den des Kalkoxalats entbehrenden Pflanzen, im Zusammenhang mit den gleichen Processen, ein anderes Kalksalz erzeugt. Die letztere Hypothese ist a priori die wahrscheinlichere, da wir wissen, dass kohlensaurer, äpfelsaurer und weinsaurer Kalk bei vielen Pflanzen nachgewiesen worden sind.

Es ist namentlich durch die Untersuchungen Neubauer's und Hilger's festgestellt worden, dass die Weinblätter, ausser oxalsaurem, sehr reichlich weinsauren und äpfelsauren Kalk enthalten. Das Kalkoxalat wird aber in Weinblättern bei weitem der Hauptmasse nach, wenn nicht ausschliesslich, primär erzeugt; nichtsdestoweniger nimmt der Gehalt der Asche des erwachsenen Blattes an kohlensaurem Kalk beständig und sehr bedeutend zu. So enthalten nach Hilger die frischen Blätter im Juli 2,03 % ihrer frischen Substanz an Asche, wovon 34,26 % aus kohlensaurem Kalk bestehen, während im Oktober der Gehalt an Asche 2,89 %, derjenige an kohlensaurem Kalk in derselben 50,44 % beträgt.

Es findet demnach, ähnlich wie in Blättern, die secundäres Kalkoxalat erzeugen, eine bedeutende Zunahme des Kalkgehalts mit dem Alter statt, die durch die geringe secundäre Kalkoxalatbildung nicht erklärt werden kann.

Nähere Untersuchung zeigt uns, dass diese Zunahme, zum grossen Theile derjenigen der im Zellsafte löslichen Kalksalze, also des wein- und äpfelsauren Kalkes zuzuschreiben ist. Dass gleichzeitig eine beträchtliche Zunahme ungelösten Kalks, als Einlagerung in der Membran, stattfindet, ist mindestens sehr wahrscheinlich.

Die mikrochemische Untersuchung von Blättern des Weinstocks oder der sich ganz ähnlich verhaltenden wilden Rebe zeigt, dass der Zellsaft sämtlicher Zellen des Mesophylls, des Nervenparenchyms und der Epidermis reich ist an gelösten Kalksalzen (Tartrat und Malat), während in Blättern, wo secundäres Kalkoxalat gebildet wird, in den Mesophyllzellen wenigstens, lösliche Kalksalze nicht nachweisbar sind. Diese gelösten Kalksalze verhalten sich ganz ähnlich wie secundäres Kalkoxalat; sie nehmen mit dem Alter an Menge zu; sie sind in stark beleuchteten Blättern weit reichlicher vorhanden als in Schattenblättern.

In den vergilbenden Blättern von *Vitis vinifera* und *V. Labrusca*, sowie in *Ampelopsis*, wird als Ersatz für das tertiäre Kalkoxalat, tertiäres Kalktartrat krystallinisch ausgeschieden. Die Krystalle haben die beim Kalktartrat gewöhnliche Form eines rhombischen Prisma mit Mikrodoma, selten Makrodoma. Sie sind sehr ungleich gross, am grössten im Blattstiele zwischen den Gefässbündeln und an der Markseite der letzteren, dagegen aber klein, meist in Form winziger Körnchen, in den peripherischen Stielzellen. Gut ausgebildete Krystalle sind in den Rippen vorhanden, während das Mesophyll nur kleine Körnchen enthält. Die Krystalle waren in den untersuchten Blättern von *V. Labrusca* grösser als bei *V. vinifera*, ob dieses durchgehend der Fall, mag dahingestellt bleiben.

Das Kalktartrat ist wenig löslich in Wasser, sehr leicht in Kalilauge, leicht in verdünnter, schwer in concentrirter Essigsäure. Auf der ungleichen Löslichkeit in Essigsäure, je nach der Concentration derselben, beruht eine höchst eigenartige Erscheinung. Legt man einen Schnitt mit unversehrten Zellen in mässig verdünnte Essigsäure, so sieht man die Krystalle in den Zellen sich zuerst zum Theil auflösen; da aber im Zellinhalt die Concentration der Säure sich allmählich steigert, so scheidet sich nach und nach das Salz wieder aus, und zwar durch Heranwachsen der unvollständig gelösten grösseren Krystalle. Auf diese Weise wird eine geringere Anzahl modellartig ausgebildeter Krystalle ausgeschieden.

Ob ausser dem Kalktartrat auch Kalkmalat tertiär entsteht, ist mir nicht bekannt. Bei der unvollkommenen Krystallisation des letzteren Salzes muss es dahingestellt bleiben, ob ein Theil der Krystallkörner aus diesem oder dem Tartrat besteht.

Auch kohlensaurer Kalk wird wohl in vielen Fällen als Ersatz des Kalkoxalats erzeugt. Dafür sprechen die Beobachtungen von Chareyre und Kohl über die Cystolithen und diejenigen von Hassak über die Bildung der Kalküberzüge von Wasserpflanzen, spec. von *Chara foetida*.

Die Cystolithenbildung der Artocarpeen scheint an ähnliche Bedingungen geknüpft zu sein wie diejenige des secundären oxalsauren Kalks; sie findet nur in der chlorophyllhaltigen Zelle unter Lichteinfluss statt. Ganz anders bei den Acanthaceen, wo sie sich ähnlich wie diejenige des primären Kalkoxalats verhält, schon dicht unterhalb des Vegetationspunktes beginnt und sowohl in etiolirten als in grünen Theilen normal vor sich geht.

Die Ueberzüge an der Oberfläche von Wasserpflanzen sind jedenfalls theilweise, wie es Pringsheim nachgewiesen, auf die Zersetzung des doppelkohlensauren Kalks des Medium zurückzuführen. Wie aber Hassak an *Chara foetida* nachgewiesen hat, ist diese Pflanze im Stande, auf Kosten anderer anorganischer und organischer Kalksalze ebenfalls, und zwar nur unter Lichteinfluss, Kalkcarbonat zu erzeugen. Wenn die Annahme des genannten Beobachters, dass diese Kalkcarbonatbildung auf Wechselzersetzung mit einem von der Pflanze ausgeschiedenen kohlensauren Alkali beruht, sich bestätigt, so hätten wir darin, wie im nächsten Capitel dieser Arbeit gezeigt werden soll, eine weitere Stütze zu Gunsten der Analogie zwischen der Bildung von Kalkcarbonat und secundärem Kalkoxalat.

Es gibt endlich eine Anzahl Pflanzen, bei welchen der organische Kalk in keiner der erwähnten Formen auftritt, z. B. bei vielen Gefäßkryptogamen, Gräsern, Cruciferen, Compositen. Es wäre höchst wünschenswerth, dass uns ein Chemiker mit der Natur der in diesen Pflanzen gelöst vorkommenden oder in der Membran eingelagerten organischen Kalksalze bekannt mache, ähnlich wie es z. B. Hilger für den Weinstock gethan. Dann wird es vielleicht auch möglich werden, auf mikrochemischem Wege das Verhalten dieser Salze genau zu prüfen. Nach den vorliegenden Analysen und meinen Beobachtungen kann es schon kaum einem Zweifel unterliegen, dass hier auch ganz ähnliche Verhältnisse, wie bei Kalkoxalatpflanzen, vorhanden sind. Dass auch hier mit dem Alter eine bedeutende Zunahme der organischen Kalksalze stattfindet, geht aus den Analysen von Church für *Ilex Aquifolium* hervor und lässt sich beim Mais, bei Cruciferen, Compositen etc. an der höchst ungleichen Menge des kohlensauren Kalks in der Asche leicht nachweisen. Die Abhängigkeit der Bildung nicht näher bestimmbarer organischer Kalksalze vom Chlorophyll konnte ich an panachirten Blättern von *Zea Mais*, *Petasites* sp., *Funkia ovata* feststellen, welche letztere zwar primäres, aber kein secundäres Kalkoxalat erzeugt, während die beiden erstgenannten überhaupt kein Kalkoxalat enthielten. Die Fähigkeit kalkoxalatfreier Gewächse,

in ihren Blättern organische Kalksalze aus anorganischen (Kalknitrat, Kalkphosphat und Gyps kamen zur Verwendung) herzustellen, zeigten Wasserculturen von *Zea Mais*.

Dass in allen diesen Fällen erst genauere Untersuchungen zu definitiver Entscheidung führen werden, liegt auf der Hand. Mit grösster Wahrscheinlichkeit lässt sich jedoch aus der Gesamtheit unserer Beobachtungen und derjenigen der citirten anderen Forscher schon schliessen, dass Vorgänge, die der primären, secundären und tertiären Kalkoxalatbildung entsprechen, auch in kalkoxalatfreien Pflanzen vor sich gehen, mit dem Unterschiede, dass die Oxalsäure durch andere organische Säuren ersetzt wird.

Es soll jedoch keineswegs behauptet werden, dass alle Ablagerungen organischer Kalksalze sich auf die eben erwähnten Processe zurückführen lassen werden. Einen ganz anderen Ursprung zeigen vielmehr die Kalküberzüge bei Wasserpflanzen, soweit sie aus der Zersetzung des doppelkohlensauren Kalks herrühren, und die grossen Mengen kohlensauren Kalks, die von Molisch im Kernholze vieler Bäume nachgewiesen worden sind, dürften ebenfalls in ihrer Entstehung keine Analogie zum Kalkoxalat zeigen. Das Gleiche gilt vielleicht auch von den Kalkschuppen der Saxifrageen, sowie mancher anderen Arten des Auftretens des kohlensauren Kalks und anderer organischer Salze derselben Basis.

IV. Zur Kenntniss der Rolle des Kalks und des Kali im Stoffwechsel.

Unsere mikrochemischen Methoden gestatten die Vertheilung der Basen im pflanzlichen Organismus weit genauer zu verfolgen als die makrochemischen. Während der Chemiker stets mit grösseren Mengen Substanz zu verfahren hat, die aus den verschiedenartigsten Geweben bestehen, können wir Kalk und Magnesia innerhalb der Zellen nachweisen, und wenn auch letzteres für das Kali meist nicht gelingt, so können wir dessen Anwesenheit oder Fehlen doch am kleinsten Gewebestück feststellen.

Die mikrochemische Untersuchung der Vertheilung der drei erwähnten Basen hat einen auffallenden Unterschied zwischen Kalk einerseits, Kali und Magnesia andererseits erwiesen. Die beiden letzteren sind gelöst in jeder Zelle vorhanden, namentlich in den Meristemen, während der Kalk dem Zellinhalt bestimmter Gewebecomplexe ganz fehlt. Als kalkfrei erwiesen sich namentlich die Zellen der Meristeme. Kalk finden wir auch in vielen Mesophyllzellen in nachweisbaren Mengen nicht. Für die Vorgänge der Assimilation scheint er daher unnöthig zu sein und diese Entbehrlichkeit ist thatsächlich schon von Böhm, dessen Angaben ich bestätigen kann, an kalkfrei gezogenen Pflanzen festgestellt worden. Hiergegen sind die Mesophyllzellen stets sehr kali- und magnesiareich. Die wichtigsten Vorgänge des pflanzlichen Stoffwechsels,

Synthese der Kohlehydrate, der Eiweisskörper und Nucleine und Bildung der organisirten Plasmagebilde scheinen daher ohne Anwesenheit von Kalk stattfinden zu können, dagegen des Vorhandenseins reichlicher Mengen von Kali und Magnesia zu bedürfen.

Nichtsdestoweniger ist der Kalk ein unbedingt nothwendiger Bestandtheil der Pflanzennahrung und wir wollen nun, theils auf Grund der im vorhergehenden festgestellten Thatsachen, theils noch zu mittheilenden Beobachtungen, die Ursache dieser Unentbehrlichkeit festzustellen versuchen. Eine rege Betheiligung des Kalks am Stoffwechsel ist, auf Grund der Ausscheidung seiner organischen Salze, in wachsenden Pflanzentheilen, jedoch nur ausserhalb der Urmeristeme und in den grünen Theilen, jedoch nicht bei der Assimilation der Kohlensäure, anzunehmen. Wir werden zuerst die ersteren Vorgänge einer näheren Betrachtung unterziehen.

Rolle des Kalks bei den Wachsthumsvorgängen.

Die ungleiche Bedeutung des Kalks und des Kali für die Neubildungsvorgänge, auf welche schon die ungleiche Vertheilung beider Basen hinweist, geht in deutlichster Weise aus ihrem ungleichen Verhalten bei der Keimung hervor. In den Anfangsstadien der letzteren wandern reiche Mengen von Kali in die junge Pflanze ein, während der Kalk zunächst meist beinahe ganz in den Reservestoffbehältern verbleibt und die junge Pflanze erst viel später, theils aus den Samen, theils aus dem Boden, grössere Mengen dieser Basis entnimmt ¹⁾.

Das Kali wandert aus den Samen in Form von Kaliphosphat. Die Anwesenheit reichlicher anorganischer Phosphorsäure lässt sich, mit Kali zusammen, in den leitenden Geweben stets nachweisen, und zwar ist das Salz eines der sauren. Es ist demnach klar, dass schon bei den frühesten Entwicklungsvorgängen chemische Processe vor sich gehen, die eine grosse Menge Phosphorsäure und Kali beanspruchen. Wozu die erstere, wenigstens zum grossen Theile, Verwendung findet, ist, seitdem wir über die Constitution der Zellkerne näher unterrichtet sind, ohne weiteres klar. Die Thätigkeit der Meristeme ist mit der Bildung von Nuclein verknüpft und Nuclein ist bekanntlich eine Phosphorsäureverbindung.

Ganz ähnliches wie von der Keimung gilt auch von dem Treiben der Rhizome. Auch hier wandert Phosphorsäure massenhaft aus, und zwar auf den ersten Stadien in Form von saurem Kaliphosphat, später auch in derjenigen von saurem Kalkphosphat, welches letzteres bei manchen Pflanzen in sehr grosser Menge nachweisbar ist.

1) Vgl. darüber die citirten Arbeiten von Arendt, Hornberger, Schröder.

Bei der Nucleinbildung wird die Phosphorsäure von den Basen, mit welchen sie gewandert, abgespalten; es wird sich fragen, was aus letzteren wird, ob sie ebenfalls ganz in die Bildung der organischen Gebilde eingehen oder ausgeschieden werden.

Ein durchsichtiges Verhalten zeigten mir in dieser Hinsicht die treibenden Rhizome von *Polygonatum multiflorum*. Dieselben sind, und zwar im ruhenden Zustande, reich an Phosphorsäure, zum grossen Theil in Form eines sauren Kalksalzes. Letzteres lässt sich durch Alkohol als feines in Wasser lösliches Pulver ausscheiden, in deren Lösung ich weder Kali noch Magnesia finden konnte. Dieses Kalkphosphat dringt in grosser Menge in die jungen Triebe, ohne jedoch das Scheitelmeristem zu erreichen. Letzteres ist zwar reich an Kali und Magnesia und sehr reich an Phosphorsäure in organischer Verbindung, entbehrt aber, wie andere Meristeme, des Kalks in seinem Zellinhalt gänzlich. Dicht unterhalb des Scheitelmeristems aber, ungefähr da, wo das Kalkphosphat verschwindet, findet reiche Bildung von Kalkoxalatrapihen statt.

Es ist demnach kaum zweifelhaft, dass das Scheitelmeristem aus dem zugeführten Kalksalz die zur Bildung des Nuclein nöthige Phosphorsäure entnimmt, während der Kalk an die bei der Synthese des Nuclein entstehende Oxalsäure als Nebenprodukt verbunden verbleibt.

Dass bei der Bildung des Nuclein aus Amiden und Glycose, Oxalsäure oder andere organische Säuren gebildet werden, scheint mir aus den in den Berichten der Botanischen Gesellschaft veröffentlichten Betrachtungen Palladin's über die Synthese der Eiweissstoffe hervorzugehen. Proteinstoffe und Nucleine können dabei nur unter Ausscheidung sauerstoffreicher Körper gebildet werden. Nach der von Lieberkühn angenommenen Formel für das Albumin könnte, wie Palladin darstellt, letzteres in folgender Weise aus Glycose und Asparagin entstehen:



Zu ähnlichen Ergebnissen würde auch die Synthese des Nuclein, welchem Miescher die Zusammensetzung $\text{C}_{29}\text{H}_{49}\text{N}_9\text{P}_3\text{O}_{22}$ zuschreibt, führen.

Ist es bei *Polygonatum* zum grossen Theile Kalk, der zum Transport der Phosphorsäure aus den Knollen in die jungen Triebe dient, so kommt in den treibenden Knollen von *Begonia*-Arten diese Rolle fast ausschliesslich saurem Kaliphosphat zu. Schon dicht unter dem Scheitelmeristem und in ganz jungen Blättern finden wir äusserst reichlich saures oxalsaures Kali, und es ist daher anzunehmen, dass letzteres, in ähnlicher Weise wie bei *Polygonatum* das Kalkoxalat, als Nebenprodukt bei der Phosphorsäureassimilation erzeugt wird.

Die Stoffmetamorphosen lassen sich da, wo anstatt oxalsaure andere organische Salze erzeugt werden, weniger deutlich verfolgen als in den bisher besprochenen Fällen. Einige Beobachtungen habe ich an Keimlingen des Mais angestellt, für welche makrochemische Untersuchungen von Hornberger vorliegen. Leider geben uns letztere, wie die vorhandenen analytischen Untersuchungen überhaupt, Auskunft nur über einige wenige Punkte, aus welchen ein zusammenhängendes Bild der Stoffwechselvorgänge sich auch nur vermuthungsweise nicht entnehmen lässt.

Von Wichtigkeit ist, dass nach den Untersuchungen des genannten Forschers aus dem Samen von Aschenbestandtheilen wesentlich nur Kali und Phosphorsäure auswandern. Die Menge des gleichzeitig in den Keimling eintretenden Kalks und Magnesia war so gering, dass Verf. auf ihre Bestimmung verzichten zu müssen glaubte. Erst gegen das Ende der zweiten Woche beginnen Aschenbestandtheile aus dem Boden, darunter auch Kalk, in die junge Pflanze einzuwandern.

Ich liess Maissamen in destillirtem Wasser keimen und erhielt Resultate, die mit denjenigen Hornberger's in Einklang standen. Die langgestreckten Parenchymzellen des Stengels und der Blattrippe waren überreich an Phosphorsäure und Kali, enthielten aber auch Magnesia in Lösung, während Kalk sich nicht nachweisen liess; nur in der Asche war die Anwesenheit von Spuren solches festzustellen. Es geht aus dem Vorhergehenden wieder der grosse Unterschied in der Bedeutung des Kali (und Magnesia) einerseits, des Kalks andererseits für die Entwicklungsvorgänge hervor. Nebenbei erwähnt zeigen auch diese Befunde, dass die wandernde Glycose, wenigstens beim Mais, an Kalk nicht gebunden ist, ein Schluss, auf welchen auch alle anderen Keimungsgeschichten schliessen lassen. Ich werde übrigens nachher noch auf diesen Gegenstand zurückzukommen haben.

Die im Vorhergehenden aus dem Verhalten keimender Samen und treibender Rhizome gezogenen Folgerungen können beinahe unmittelbar auf die autonom sich ernährenden Gewächse übertragen werden. Die Stoffwechselvorgänge in den wachsenden Spross- und Wurzelspitzen der letzteren sind denjenigen von Keimpflanzen und jungen Trieben vollkommen ähnlich. Vegetative Sprosse und Wurzeln sind Reservestoffbehälter, die sich von Samen und Rhizomen ernährungsphysiologisch wesentlich nur dadurch unterscheiden, dass sie ihre Vorräthe selbst erzeugen und fortwährend erneuern und daher nur bei unterbrochener Zufuhr von aussen, bezw. vor dem Absterben, eine ähnliche Entleerung zeigen wie die Reservestoffbehälter im eigentlichen Sinne.

Aus dieser vollkommenen Analogie in den Bildungsherden der Keimlinge und Rhizomtriebe einerseits, derjenigen autotropher Pflanzen andererseits, dürfen wir wohl auf eine ganz ähnliche Bedeutung der mit dem Wachstumsprocess verbundenen Ausscheidung organischer Kalk-

und Kalisalze schliessen. In der That setzen sich die Vorgänge in der wachsenden Spitze beim Uebergang des Keimungsstadium in das autotrophe ohne jede Unterbrechung in vollständig gleichmässiger Weise fort; nach wie vor finden wir unterhalb des Vegetationspunkts anorganische Phosphate des Kalks und des Kali, in der Zone, wo sie verschwinden, die Bildung von Kalkoxalatkrystallen bzw. oxalsaurem Kali vor sich gehen, und wir dürfen daher ebenfalls letztere als Nebenprodukte bei der Bildung des Nuclein aus Phosphaten und organischen Stoffen betrachten.

Wie berechtigt diese Uebertragung der an Keimpflanzen und Rhizomtrieben gewonnenen Ergebnisse auf die wachsenden Spitzen autotroph gewordener Pflanzen ist, zeigt sich durch die mikrochemische Untersuchung wachsender Sprosse und Wurzeln.

Ein sehr instruktives Object boten mir die raphidenreichen Luftwurzeln des im hiesigen Botanischen Garten cultivirten *Philodendron canniifolium*. Die Schnitte wurden, wie gewöhnlich, mit einer Lösung von Kalkoxalat in Eau de Javelle zur Zerstörung der Eiweisskörper und Fällung des Kalks behandelt und dann zur Entfernung des Reagens und des Fetts mit Wasser und Alkohol gewaschen und mit Aether extrahirt.

Die langgestreckten Parenchymzellen der Rinde sind reich an gelöstem Kalkphosphat; andere anorganische Säuren waren nicht nachweisbar. In den eben erwähnten Präparaten zeigten sich diese Zellen reich an Krystallkörnern von Kalkoxalat, während das vollkommen wasserhelle Meristem keine Spur eines körnigen oder sonst geformten Zellinhalts, auch bei der Untersuchung mit der Oelimmersion $\frac{1}{16}$ von Leitz, zeigte.

Das Verschwinden des phosphorsauren Kalks in der Nähe des Vegetationspunktes ist ein rasches und coincidirt mit dem Auftreten der Raphiden. Wie für die ganz ähnliche Erscheinung, die ich vorher für die jungen Triebe von *Polygonatum* beschrieben, müssen wir annehmen, dass das Kalkoxalat als Nebenprodukt der Assimilation des Kalkphosphats bei der Synthese des Nucleins gebildet wird.

Aehnliche, jedoch in Folge ihres viel geringeren Gehalts an löslichen Kalksalzen weniger auffallende Resultate, lieferten die Luftwurzeln der untersuchten Orchideen.

Die Untersuchung der Sprosse von *Tradescantia pilosa* und *Tr. Selloi* führte zu ganz ähnlichen Resultaten, jedoch mit dem Unterschied, dass bei letzterer neben Phosphaten im Stengel auch Nitrate nachweisbar waren. Da aber letztere, auch in nitratfreier Lösung, unter Bildung von Raphiden am Gipfel lange Zeit fortwächst, während Ausschluss von Phosphorsäure ein rasches Eingehen der Pflanze zur Folge hat, so werden wir die Bildung des primären Kalkoxalats ebenfalls ohne weiteres auf das Phosphat zurück-

führen können, ganz abgesehen davon, dass unserer Annahme nach eine Verarbeitung der Nitrates in wachsenden Spitzen überhaupt nicht stattfindet.

Die Entstehung des primären Kalkoxalats in der Nähe des Cambium und anderer secundärer Zuwachszonen ist auf die gleichen Vorgänge zurückzuführen. Das Cambium ist, wie andere Meristeme, ein Bildungsherd von Nuclein. Phosphorsäure ist in dem angrenzenden Bast, namentlich in ausserordentlicher Menge im Siebröhreninhalt sammt Kali, Kalk und Magnesia vorhanden. Die vollständig gleichen Bedingungen lassen auf eine ganz ähnliche Bedeutung des beim Dickenwachsthum entstehenden Kalkoxalats schliessen.

Wir dürfen demnach das primäre Kalioxalat und Kalkoxalat als Nebenproducte bei der Nucleinbildung, ev. der Bildung noch anderer organischer Phosphate, betrachten. Die Phosphorsäure wird den Bildungsherden des Nucleins, sammt den anderen Bildungsstoffen dieser Substanz, Glycose und Amiden, zugeführt, die anorganische Basis abgespalten und an die beim selben Process entstehenden organischen Säuren gebunden ausgeschieden. Dass da, wo anstatt Oxalsäure eine andere organische Säure entsteht, die Vorgänge ganz entsprechend sein werden, dürfte keinem Zweifel unterliegen.

Der Kalk spielt bei der Zufuhr der Phosphorsäure zu den Meristemen, ähnlich wie nach meinen früheren Untersuchungen, bei der Zufuhr anorganischer Säuren in die grünen Zellen, wesentlich nur die Rolle eines Vehikels. Es ist a priori nicht einzusehen, warum diese Rolle nicht von einer anderen Basis übernommen werden kann, und die Beispiele des Mais, der treibenden Begoniaknollen, zeigt uns dieselbe in der That vom Kali vollzogen. Wir dürfen demnach in der Zufuhr der Phosphorsäure nach den Bildungsstätten der Nucleine noch nicht die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks betrachten.

Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks.

Wie schon von den meisten früheren Autoren wurde zur Lösung der Frage, warum der Kalk für die Existenz der Pflanze unentbehrlich ist, die Cultur in kalkfreien Lösungen benutzt. Gleichzeitig wurden auch magnesiafreie und kalifreie Culturen hergestellt.

Der Wuchs der in kalkfreier Lösung cultivirten Trad. Selloi wich meistens in den ersten fünf oder sechs Wochen von demjenigen normal gezogener nicht ab. Die neu entstandenen Internodien und Blätter waren durchaus kräftig und gesund. Die Folgen des Kalkmangels zeigen sich zuerst an den jüngsten Internodien und den Blättern, die braunfleckig werden und absterben. Bald darauf gehen auch die älteren Blätter unter Fleckigwerden zu Grunde, während der Stengel, ausser an seiner Spitze, noch lange gesund bleibt und wiederholt neue Seitensprosse erzeugt, die alsbald zu Grunde gehen.

Die Prüfung auf Kalk ergab, dass die zuerst entstandenen Blätter solchen in geringer Menge enthalten, und zwar sowohl in Form von Raphiden als in der Membran. Nach einiger Zeit werden Blätter erzeugt, die in ihrem Zellinhalt gar keinen Kalk mehr führen, und deren Asche sich als kalkfrei oder nur Spuren solchen enthaltend erweist, während die Blätter normal gezogener Tradescantien äusserst kalkreich sind. Dennoch unterscheiden sich solche kalkfreie Blätter, ausser durch grösseren Stärkereichthum, in gar nichts von normalen; sie besitzen gleiche Grösse und Dicke, gleiche Chlorophyllkörner und Zellkerne wie diese, assimiliren auch ungestört fort. Dieser Befund, sowie die bereits erwähnte wiederholte Entwicklung von Seitenknospen, die nach kurzer Zeit zu Grunde gehen, stimmt vollständig zu den Anschauungen, zu welchen die Vertheilung des Kalkes in der Pflanze uns geführt hatte. Kalkverbindungen sind weder nothwendige Bestandtheile des Plasma, noch bei der Anlage neuer Organe, noch, wie es bereits Boehm erkannte, an der Assimilation nothwendig. Die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks ist in seiner Betheiligung an Vorgängen zu suchen, die sich in der wachsenden Region, aber ausserhalb des Urmeristems, sowie in den grünen Zellen, aber unabhängig von der Assimilation, abspielen.

Ganz anders gestaltete sich die Entwicklung der in kali- und in magnesiafreier Lösung cultivirten Pflanzen, und zwar zeigte sich dieselbe wiederum mit dem Modus der Vertheilung in Einklang. Die kalifreien und die magnesiafreien Pflanzen waren einander sehr ähnlich, doch traten die Folgen der unvollständigen Ernährung bei den ersteren weit früher und heftiger ein, als bei den letzteren. Während die Knospen der kalkfrei gezogenen Pflanzen bald absterben, bleiben sie bei den kali- und den magnesiafreien sehr lange leben und erzeugen fortwährend neue Blätter, die jedoch bald unter Schwarzwerden zu Grunde gehen. Die mikrochemische Untersuchung der Endknospen und jungen Blätter zeigt, dass dieselben an Kali bzw. Magnesia reich bleiben. Es werden daher Kali und Magnesia bei Fehlen dieser Elemente in der Lösung, in grosser Menge den älteren Theilen entzogen und den jüngsten zugeführt. Während die in kalkfreier Cultur neu entstandenen Blätter und Internodien sich von normalen nicht unterscheiden, werden diejenigen kali- oder magnesiafrei gezogener Pflanzen immer kleiner und dünner, schliesslich von winzigen Dimensionen. Stets aber sind Kali und Magnesia in der wachsenden Spitze reichlich nachweisbar, wenn sie derselben auch in abnehmender Menge zufließen, indem die absterbenden älteren Blätter einen Theil des Vorraths an diesen Elementen behalten. Schliesslich stirbt die Endknospe ab und darauf der grössere Theil des Stengels.

Diese Versuche zeigen, im Einklang mit den Befunden über die Vertheilung des Kali und der Magnesia, dass Verbindungen dieser Elemente an den Vorgängen bei Anlage und Entwicklung der Organe derart theilnehmen, dass eine Abnahme derselben eine solche der Organe und endlich den Tod zur Folge hat. Bei den kalifrei gezogenen Pflanzen hört schliesslich auch die Assimilation auf, wie es Nobbe schon erkannte und ich es auch in einer früheren Arbeit ¹⁾ hervorhob; jedoch tritt die Abnahme in der Grösse der Blätter und der Dicke des Stengels schon zu einer Zeit in auffallender Weise zum Vorschein, wo die Blätter noch reichlich assimiliren und von Stärke und Zucker strotzen, sodass sie nicht auf den Mangel an verfügbaren Kohlehydraten zurückgeführt werden kann, wenn auch letzterer auf späteren Stadien die Erscheinungen verstärken dürfte.

Es ging aus den eben geschilderten Befunden mit grosser Wahrscheinlichkeit hervor, dass die Bedeutung der Kalkverbindungen für den Stoffwechsel sich weit leichter feststellen lassen würde, als diejenige des Kali oder der Magnesia, die ebenso constante Bestandtheile der Zelle sind, als die unentbehrlichen Metalloide, und bei den dunklen Vorgängen in den embryonalen Regionen eine Hauptrolle spielen. Durch die Fortsetzung meiner Versuche wurde diese Annahme vollkommen bestätigt; es wird uns daher das Verhalten des Kalks weit mehr als dasjenige des Kali und namentlich der Magnesia zu beschäftigen haben.

Die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks ist bekanntlich in einer Betheiligung an der Wanderung der Assimilate gesucht worden; man glaubte früher, auf Grund der Untersuchungen Böhm's und anderer, dass bei Kalkmangel der Zucker nicht im Stande ist, sich in der Pflanze fort zu bewegen, dass sich in Folge dessen die Stärke in den Blättern anhäuft, während die Endknospe aus Mangel an Nährstoffen ihr Wachsthum einstellt und zu Grunde geht.

Gegen diese letzte Annahme, die ich in meiner Arbeit über Kalkoxalat noch als wahrscheinlich richtig bezeichnete, erhoben sich mir, nachdem ich diesem Punkte in erster Linie meine Aufmerksamkeit zu widmen anfang, wichtige Bedenken. Das Schwarzwerden ist nämlich nicht auf die Endknospe beschränkt, sondern trifft auch die stärkeführenden jüngeren Internodien und Blätter, wenn die Pflanzen gut beleuchtet sind. Besonders gegen die Böhm'sche Ansicht sprach der Umstand, dass bei gut beleuchteten Pflanzen auch die älteren, von Stärke strotzenden Blätter, unter Schwarzwerden zu Grunde gehen, während die entsprechenden Theile des Stengels gesund bleiben. Endlich stellte Dehérain fest, dass das Absterben der Organe in Folge

1) Bot. Zeit. 1888 Sp. 104.

von Kalkmangel bei höherer Temperatur ausbleibt, sodass Zunahme der Temperatur gleichsam die Wirkung des Kalks ersetzt.

Es gab einen directen Weg, sich zu überzeugen, ob die Anhäufung der Stärke in den assimilirenden Organen, bei Ausbleiben des Kalks, durch die Unfähigkeit der Assimilate zu wandern bedingt wird oder nicht. Ich legte Blätter kalkfrei gezogener *Tradescantien*, die die pathologische Stärkeanhäufung im höchsten Maasse zeigten, auf eine 2% Lösung ganz reinen, krystallisirten Cayennezuckers, den ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. Schuchardt in Görlitz verdankte. Gleichzeitig wurden auch normale Blätter auf dieselbe Lösung gelegt. Das Resultat war, dass sowohl bei den kalkfreien wie bei den normalen Blättern, Zucker reichlich in die Gewebe eindrang, wo er in Glycose umgewandelt wurde. Die Wanderung von Glycose ist demnach von der Anwesenheit von Kalk unabhängig, und die Anhäufung von Stärke kann daher nicht auf eine Betheiligung des Kalks an der Stoffbewegung zurückgeführt werden. Zu ganz ähnlichen Ergebnissen führt übrigens auch die Keimungsgeschichte des Mais, wo der nur in sehr geringem Maasse auswandernde Kalk in den zuckerreichen Zellen gar nicht nachweisbar ist.

Dass übrigens Mangel an Zufuhr von Kohlehydraten nicht die Ursache des Absterbens der Endknospen ist, geht ohne weiteres aus dem Umstande hervor, dass neue Knospen sich darauf entwickelten, und dass nach dem Zugrundegehen dieser dasselbe sich häufig noch zweimal wiederholte, und zwar vornehmlich oder ausschliesslich an im Schatten gezogenen Pflanzen. Es hört dementsprechend die Wanderung von Kohlehydraten nicht vollständig auf, wenn sie auch stark beeinträchtigt ist. Endlich ist mit der genannten Annahme das Fleckigwerden und Absterben der Blätter nicht erklärbar.

Die Folgen der Kalkentziehung zeigen vielmehr alle Symptome einer Vergiftung und zwar durch einen Stoff, der vornehmlich in den wachsenden Spitzen und den Laubblättern erzeugt wird. Suchen wir wodurch die Bestandtheile des Zellinhalts kalkfrei gezogener Pflanzen sich von denjenigen normal ernährter unterscheiden, so finden wir, dass die Zellen der kalkfreien Gewächse einen enormen Gehalt von meist saurem Kalioxalat führen, während solches unter gewöhnlichen Umständen, wenn auch beinahe stets erkennbar, doch nur in geringer Menge vorhanden ist.

Schon der Umstand, dass die wachsende Spitze und die Laubblätter, die Bildungsstätten des Kalioxalats, zuerst zu Grunde gehen, machte es höchst wahrscheinlich, in der Anhäufung dieses Stoffes die Ursache der patho-

logischen Erscheinungen zu erblicken. Entsprechende Versuche erhoben diese Annahme zur Gewissheit.

1) Zweige von *Tradescantia Selloi* wurden in Lösungen von neutralem und von saurem oxalsaurem Kali¹⁾ gestellt, in der Concentration von 1, 2 und 3 ‰. Sie gingen allmählich zu Grunde, und zwar unter Bildung ganz ähnlicher brauner Flecken an den Blättern, wie wir sie vorher für kalkfrei gezogene Pflanzen beschrieben, manchmal sogar unter Absterben der Endknospen. Die Untersuchung zeigte, dass das Salz in grosser Menge in die Blätter gelangt war. Die sauren Lösungen wirkten viel energischer als die neutralen.

2) Stellt man kalkfrei gezogene Pflanzen in kalkhaltige Lösungen, so werden schon nach einigen (5–6) Tagen die normalen Verhältnisse hergestellt. Die Untersuchung zeigt, dass das Kalioxalat beinahe ganz und gar durch Kalkoxalat ersetzt ist.

Endlich ist mit unseren Befunden die sonst so verwirrende Entdeckung Dehérain's, dass durch Kalkmangel erkrankte Keimpflanzen durch blosse Temperaturerhöhung hergestellt werden, begreiflich, indem letztere, wie bekannt, eine Zerstörung von Säure hervorruft.

Die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks in der *Tradescantia* liegt darin, dass bei Fehlen desselben, die im Stoffwechsel entstehende Oxalsäure nur an Kali gebunden wird, und dass eine Anhäufung der Kalioxalate, speciell des sauren Salzes, giftig wirkt. Die verhinderte Lösung der Stärke ist nur eine secundäre pathologische Erscheinung.

Da bei anderen Pflanzen Kalkmangel ähnliche Erscheinungen hervorruft (Mais, Bohne), so dürfte wohl die Bedeutung des Kalks, die wir für *Tradescantia Selloi* festgestellt haben, allgemeine Gültigkeit haben. Da wo keine Oxalsäure gebildet wird, werden andere organische Kalisalze in schädlicher Weise angehäuft.

Die soeben ausgesprochene Ansicht über die Ursache der Unentbehrlichkeit des Kalks erinnert an diejenige einiger älterer Physiologen, z. B. W. Schumacher's, die dieselbe in der Abstumpfung der Säuren erblickten. Ich glaubte früher, diese Annahme, die als blosse Hypothese ohne Versuche aufgestellt worden war, im Anschluss an H. de Vries verwerfen zu müssen, und zwar namentlich deswegen, weil wir eine Anzahl Pflanzen kennen, die ohne Schaden in ihren Geweben grosse Mengen von saurem oxalsaurem Kali führen. Dieser Einwand hat jedoch, seitdem ich begonnen habe, mich mit der Salzaufspeicherung in der Pflanze zu beschäftigen, seine Beweiskraft für mich verloren. Nichts ist, je nach der Art, mehr wechselnd, als der von verschiedenen Pflanzen ertragene

1) Das in Pflanzensäften vorkommende Salz C_2O_4HK , das ich der Freundlichkeit des Herrn Dr. Schuchardt verdanke, nicht das gewöhnliche Kleesalz des Handels,

oder gar zu ihrer normalen Entwicklung gehörige Concentrationsgrad bestimmter Salze. Die Befähigung grosse Mengen von Chlornatrium oder Salpeter ohne Schaden zu entragen, ist eine nur bestimmten Pflanzen zukommende Anpassung an bestimmte äussere Bedingungen. *Datura Metel*, *Chenopodiaceen*, sah ich üppig gedeihen in einem Substrat, das mit Salpetersäure begossen wurde, deren Concentration von 1 bis auf 4% erhöht wurde, und in welchem andere Pflanzen, wie *Urtica dioica*, *Lychnis vespertina* u. a., nach wenigen Tagen zu Grunde gegangen waren.

In der Anhäufung des Kalioxalats haben wir es mit einer ähnlichen, auf wenige Gewächse beschränkten Anpassung zu thun, und zwar, wie von Stahl gezeigt wurde, wahrscheinlich gegen Schneckenfrass. Warum diese Eigenschaft bestimmten Pflanzen zukommt, während andere durch angehäuftes Kalioxalat bald zu Grunde gerichtet werden, ist ebensowenig zu beantworten, als warum sich gewisse Thiere, z. B. Schneckenarten, ausschliesslich von gewissen Pflanzen, wie Euphorbien, Schwämmen, ernähren, die für andere, sogar verwandte Thiere, starke Gifte sind. Wie bei manchen Vorrichtungen ist mit dem Vortheil auch ein Nachtheil verbunden, nämlich die Anhäufung von Kali, eines Stoffs, mit dem die Pflanze sehr sparsam umgeht, in unthätiger Form. Schon dieser Umstand wird der Entwicklung einer solchen Anpassung bei zahlreichen Gewächsen entgegengewirkt haben können. Uebrigens ist auch die Fähigkeit der Kleesalz speichernden Gewächse, solches zu ertragen, nicht unbegrenzt, wie die grosse Anhäufung von Kalkoxalat, z. B. beim Sauerampfer, zeigt.

Wechselzersetzung der Kali- und Kalksalze.

Wir haben vorher gesehen, dass wenn wir einer kalkfreien Pflanze ein Kalksalz zuführen, letzteres in Wechselzersetzung mit dem in derselben angehäuften organischen Kalisalz geräth. Ist letzteres Kalioxalat, so wird einerseits Kalkoxalat, andererseits, je nach der Natur des zugeführten Kalksalzes, ein schwefelsaures, salpetersaures, phosphorsaures etc. Kalisalz erzeugt. Nähere Untersuchung zeigt, dass nicht bloss bei kalkfrei gezogenen Pflanzen, sondern auch unter normalen Umständen, die Kalkoxalatbildung in solcher Weise vor sich geht; es lassen sich nämlich neben dem ungelösten Oxalat beinahe stets auch geringe Mengen gelösten nachweisen, in den meisten Fällen vorwiegend oder ausschliesslich Kalioxalat, da Natronoxalat bei der grossen Mehrzahl der Pflanzen nur sehr wenig gebildet wird, andere lösliche Oxalate aber in der Regel ausgeschlossen sind. Dieses lösliche Oxalat muss sich aber mit den Kalksalzen in ganz ähnlicher Weise umsetzen, wie wir es vorhin für die kalkfrei gezogenen Pflanzen nachweisen konnten. In anderen Worten, es kann kein Kalksalz in die grüne Zelle eindringen, ohne seine Säure an Kali abzugeben.

Als erstes sichtbares Nebenproduct bei der Assimilation der Mineralsalze in grünen Zellen wird demnach nicht Kalkoxalat, sondern Kalioxalat erzeugt. Das secundäre Kalkoxalat ist nur ein Product der Wechselersetzung des Kalioxalats mit anorganischen Kalksalzen.

Unsere Ansicht über die Entstehung der organischen Kali- und Kalksalze ist demnach folgende: Die hauptsächlich als Kalksalze in die grüne Zelle gelangenden Mineralsäuren werden in Form von Kalisalzen assimiliert. Als Nebenproduct bei der Bildung der Eiweisskörper wird eine organische Säure, sehr häufig Oxalsäure erzeugt; diese wird an dem bei der Assimilation abgespaltenen Kali gebunden ausgeschieden. Das organische Kalisalz tritt unter gewöhnlichen Umständen alsbald in Wechselersetzung mit einem anorganischen Kalksalz; es wird ein organisches Kalksalz gebildet, während das Kali an anorganische Säuren gebunden in den Stoffwechsel zurücktritt u. s. w. Bei kalkfrei gezogenen Pflanzen bleibt die Wechselersetzung aus; das organische Kalisalz häuft sich an. Treten wieder Kalksalze ein, so wird bald der normale Zustand wiederhergestellt.

Das secundäre Kalkoxalat, und ähnliches müssen wir auch für die anderen entsprechenden Kalksalze, wie secundäres Kalktartrat, Carbonat etc., annehmen, entsteht demnach, wenn unsere Ansicht richtig ist, ganz ähnlich wie das tertiäre, durch Wechselersetzung mit einem Kalisalz derselben organischen Säure.

Es drängt sich die Frage auf, ob das Gleiche nicht für das primäre Kalkoxalat anzunehmen ist. Schon der Umstand spricht dafür, dass das Kalkphosphat schon vor seinem Eintritt in die Urmeristeme zersetzt, dass der Kalk in dieselben gar nicht gelangt, während Kali sich in denselben massenhaft nachweisen lässt. Es erscheint daher wahrscheinlich, dass die Phosphorsäure nach der Abspaltung des Kalks, in Form eines Kalisalzes ihren Weg fortsetzen wird. Thatsächlich fand ich bei *Tradescantia Selloi*, wenigstens in Wasserculturen, neben Kalkoxalat auch in geringer Menge Kalioxalat unterhalb des Vegetationspunktes, und die Anhäufung des Kalioxalats war es, ganz ähnlich wie in den Blättern, die bei fehlender Kalkzufuhr den Tod der Gewebe herbeiführte. Auch hier wurde durch Zufuhr von Kalksalzen der normale Zustand durch Wechselersetzung bald wieder hergestellt. Dass in diesen Fällen die Phosphorsäure nicht an Kalk, sondern an Kali gebunden, assimiliert wurde, kann keinem Zweifel unterliegen. In anderen Fällen, z. B. in den Luftwurzeln des *Philodendron carnifolium*, konnte ich allerdings unterhalb des Vegetationspunktes kein Kalioxalat nachweisen; ein solcher negativer Befund ist aber natürlich nicht beweisend. Für die erwähnte Ansicht spricht auch besonders der Umstand, dass bei der Keimung zuerst beinahe nur Kaliphosphat auswandert.

Man könnte gegen meine Ansicht, dass die Kalkoxalatbildung stets auf Wechselersetzung mit einem Kalisalz beruht, vielleicht geltend machen, dass die in den Zellen enthaltene Oxalsäure theilweise ganz frei sein, und direct auf die organischen Kalksalze einwirken könnte. Abgesehen jedoch davon, dass freie Oxalsäure mit der zweifelhaften Ausnahme der Brennnessel und einiger Pilze, noch nie in der Pflanze nachgewiesen worden ist, lässt sich der Nachweis leicht liefern, dass nicht freie Oxalsäure, sondern nur oxalsaures Kali (neutrales und saures), im Stoffwechsel erzeugt wird. Man braucht dazu nur eine *Tradescantia Selloi* aus der normalen in eine kalifreie Lösung zu übertragen. Drei oder vier Wochen lang, auch länger, wird die Pflanze ganz normal fortvegetiren und doch ist schon nach fünf Tagen lösliche Oxalsäure in ihren Zellen nicht mehr nachweisbar. Es ist aber wohl anzunehmen, dass die Kalioxalatbildung fortgesetzt wird, dass aber die Umsetzung mit den Kalksalzen zu schnell erfolgt, um direct nachweisbar zu sein.

In dem Vorhergehenden ist weder der *Magnesia* noch des *Natron* Erwähnung gethan, und doch ist das Verhalten beider interessant genug. Es ist eben ganz negativ. In kalifreier, aber natronhaltiger Nährlösung wird Natronoxalat nicht gebildet; da wo solches in der Pflanze auftritt, ist es dementsprechend auf Umsetzung mit Kalioxalat zurückzuführen. Auch *Magnesiaoxalat* wird nicht gebildet, weder in Form eines unlöslichen noch eines löslichen Salzes. Dass letzteres nicht der Fall, geht aus demselben Grunde hervor, den wir für das Natronoxalat erwähnten, und in kalkfreier Lösung treten unlösliche Oxalate nicht auf.

Eine wesentliche Stütze besitzen die im Vorhergehenden vertretenen Ansichten in einigen bereits bekannten Erscheinungen, nämlich in der Kalkoxalatbildung bei den Pilzen, wie sie von de Bary für die *Peziza Sclerotiorum* klargelegt worden ist und in der Bildung der Kalkcarbonatüberzüge bei einigen Wasserpflanzen, über welche Hassak neue Untersuchungen angestellt hat. Wir wollen aber gleich gestehen, dass die Resultate des letzteren Forschers uns einer kritischen Prüfung noch zu bedürfen scheinen.

Aus de Bary's Angaben entnehme ich folgende für unser Thema besonders wichtige Stellen: »In den Nährlösungsculturen findet sich dieselbe (d. h. die Oxalsäure), wenn der Lösung ein Calciumsalz zugesetzt war, als Calciumsalz an den jüngeren Theilen der Mycelhäute — nicht den jüngsten Hyphenenden — niedergeschlagen in einzelnen Krystallen. Die älteren Hyphen sind mit Calciumoxalat oft dicht incrustirt. In den klaren Flüssigkeitstropfen, welche aus den in Bildung begriffenen Sclerotien austreten, ist Oxalsäure ebenfalls reichlich enthalten und zwar als Kaliumsalz; ob daneben noch in kleineren Mengen in anderer Verbindung, konnte nicht entschieden werden. In der Nährflüssigkeit selbst konnte ich bei Gegenwart von Calciumsalz weder gelöste Oxalate noch freie

Oxalsäure nachweisen. In calciumfreier Nährlösung (7,5procentige Lösung von Traubenzucker mit Zusatz von je 0,5 Procent sauren Kaliumphosphat, Magnesiasulfat und Chlorammonium) war dagegen Oxalsäure an Kalium gebunden, sowohl in der Lösung wie in den Sclerotientropfen nachweisbar. Es mag gleich hervorgehoben werden, dass die Oxalsäure bei parasitischer Vegetation des Pilzes nicht minder reichlich auftritt (Sp. 401)«. »Nach alledem kommen wir zu dem an der obersten Grenze der Wahrscheinlichkeit stehenden Resultat, dass die Oxalsäure innerhalb den lebenden Sauerstoff aufnehmenden Zellen des Pilzes aus dem Zucker gebildet und alsdann von demselben — gleich der bei der Respiration entstehenden Kohlensäure — ausgestossen wird, dass, mit anderen Worten, der Process dieser Oxydationsgährung sich im Innern der lebenden Zelle des gährungserregenden Pilzes abspielt. Nach dem Befunde bei der Sclerotienflüssigkeit ist es wahrscheinlich, dass die Oxalsäure nicht nur hier, sondern auch an den Mycelfäden an Kalium gebunden ausgeschieden wird, und dass der Niederschlag von Calciumoxalat an dem Mycel seinen Ursprung einer Umsetzung des ausgeschiedenen Kaliumsalzes in der Calcium enthaltenden Nährlösung verdankt. Dass sich diese Umsetzung in den Sclerotien nicht oder nur wenig vollzieht, erklärt sich aus dem geringen Calciumgehalt des Pilzes selbst. Eine Aschenanalyse reifer (auf Rüben erzogener) Sclerotien ergab nur 0,39 % Ca O auf 25,87 K₂ O, 18,89 Na₂ O, 48,67 P₂ O₅ u. s. w. Einzelne Krystalle und Krystallaggregate von Calciumoxalat finden sich übrigens in den Sclerotien nicht selten«.

An einem höchst durchsichtigen Beispiele zeigen uns die von de Bary geschilderten Verhältnisse ein vollständiges Analogon zu den Vorgängen, wie wir sie für grüne Pflanzen annehmen zu dürfen glauben; der einzige Unterschied ist der, dass bei den Pilzen besondere reducirende Organe nicht vorhanden sind, sodass der Unterschied zwischen primärer und secundärer Kalkoxalatbildung wegfällt.

Ganz ähnlich, wie bei grünen Pflanzen, beginnt die Kalkoxalatbildung erst in einiger Entfernung vom Vegetationspunkte und beruht auf der Einwirkung des beim Stoffwechsel, offenbar als Nebenprodukt der Phosphorsäureassimilation, ausgeschiedenen Kalioxalats auf Kalksalze. Während aber bei den grünen Pflanzen diese Vorgänge sich sämtlich innerhalb der Pflanze abspielen, tritt hier das oxalsäure Kali in das umgebende Medium heraus, und dieses gerade ist es, das die ganze Erscheinung so instructiv macht. Hier zeigt es sich in überzeugender Weise, dass Kalioxalat dem Kalkoxalat vorausgeht, dass letzteres durch Umsetzung von anorganischen Kalksalzen mit ersterem entsteht. Sehr instructiv ist auch der Umstand, dass Natronoxalat in nachweisbarer Menge in den Sclerotiumtropfen nicht gebildet wurde, obwohl das Verhältniss des Natron zu dem Kali in der Asche dem von 3 zu 4 ungefähr entsprach und dass Magnesioxalat bei der Cultur in kalkfreier Lösung ebenfalls fehlte. Vergleichen

wir diese Befunde mit den von uns bei grünen Pflanzen gewonnenen, so werden wir wohl mit Recht dem Kali eine besondere Bedeutung für die Assimilation der Mineralsäuren zuschreiben müssen, während der Kalk nur als Vehikel der letzteren dient.

Endlich erhalten die Schlüsse, zu welchen wir für die Bedeutung des Kalks als nothwendiger Nährbestandtheil der grünen Pflanze gelangt waren, durch die Stoffwechselvorgänge bei der *Peziza* eine weitere Stütze. Bei letzterer findet nämlich derjenige Process, bei welchem der Kalk thätig ins Pflanzenleben eingreift und für letzteres unentbehrlich ist, nämlich die Wechselersetzung mit Kalioxalat, der Hauptsache nach wenigstens, ausserhalb der Pflanze statt. Innerhalb derselben wird sich daher, wenn unsere Ansicht über die Rolle des Kalks richtig ist, eine irgendwie erhebliche Kalkmenge nicht befinden. In der That enthalten die Sclerotien von *Peziza* in ihrer Asche nur 0,39% CaO gegen nahezu 26% K₂O und 19% Na₂O. Dadurch wird der Schluss, zu welchem wir für die grünen Pflanzen gelangt waren, dass der Kalk einen wesentlichen Bestandtheil der lebenden Zelle nicht bildet, sehr befestigt. Die äusserst geringe Menge Kalk der Sclerotienasche dürfte, ähnlich wie bei höheren Pflanzen, in der Membran eingelagert oder in Form winziger Oxalatkristalle im Zellinhalt vorhanden gewesen sein, da solche sich manchmal in den Sclerotien von *Peziza* direct nachweisen lassen.

Hassak fand, dass bei der Cultur von Süsswasserpflanzen (*Ceratophyllum*, *Elodea*, *Oedogonium*, *Chara foetida*) in durch Kochen von seiner Kohlensäure befreitem Regenwasser, letzteres im Lichte alkalisch wird, ebenso wie es Klebs bekanntlich für normale Culturen angegeben hatte. Hassak nimmt an, dass die Pflanze ein kohlensaures Alkali ausscheidet, und will die Anwesenheit desselben dadurch nachweisen, dass er entkalkte Exemplare von *Chara foetida* in Lösungen von verschiedenen Kalksalzen (Nitrat, Acetat, Chlorid, Sulfat) cultivirt. Steht die Kalkincrustation von *Chara* mit der Ausscheidung von Alkali im Zusammenhang, so muss hier auch Kalkcarbonat erzeugt werden, indem das kohlensaure Kali sich mit den Kalksalzen umsetzen wird. In der That wurde in allen diesen Fällen im Lichte eine Kalkincrustation, wie unter normalen Umständen, gebildet.

Die Erscheinung würde, wenn die Erklärung Hassak's richtig ist, ein vollständiges Analogon zu den von de Bary bei *Peziza* beobachteten und eine wichtige Bestätigung unserer Ansichten bilden.

V. Die Rolle des Mesophylls bei der Assimilation der Mineralsalze.

In meiner Arbeit über Kalkoxalatbildung in den Laubblättern gelangte ich u. a. zu dem Schlusse, dass Nitrate in grünen Zellen, spec. im Mesophyll, in grosser Menge verarbeitet werden. Ungefähr gleichzeitig

kam Frank zu gerade entgegengesetzten Resultaten; nach ihm nimmt das Mesophyll an der Assimilation der Salpetersäure, deren Sitz er in Stengel und Wurzel verlegt, keinen Antheil.

Die Ursache dieses Unterschiedes ist in der Ungleichheit der von uns angewandten Methoden zu suchen. Für Frank war überall die Diphenylaminreaction massgebend, während ich, der die mit dieser Methode verbundenen Fehlerquellen erkannt hatte, dieselbe wohl mit benutzte, das Hauptgewicht aber auf Versuche legte, bei welchen solche Fehlerquellen ausgeschlossen waren.

Frank hält nicht bloss das Eintreten der Blaufärbung bei Behandlung pflanzlicher Objecte mit Diphenylamin-Schwefelsäure für ein untrügliches Zeichen des Vorhandenseins von Nitraten, sondern auch ihr Ausbleiben für ein solches ihres Fehlens. Ich bin wohl geneigt, mich der ersteren Ansicht anzuschliessen; dagegen ist die letztere unzweifelhaft unrichtig, da es bei Nichteintreten der Reaction möglich ist, entweder dass die Lösung zu verdünnt sei oder dass sie durch die in jeder Zelle unter dem Einfluss der Schwefelsäure entstehenden reducirenden Stoffe verhindert werde. Dass Nitrate sich in der Pflanze befinden können, ohne mit Diphenylamin nachweisbar zu sein, zeigt jeder beliebige Versuch mit einem in verdünnte Nitratlösung getauchten Stück Holz. Dasselbe geht übrigens auch aus den Angaben von Frank selbst hervor, der in den Blattstielen von *Vitis vinifera* und den Blattgelenken von *Robinia Pseudacacia* Nitrate findet, während sie nach ihm in den Zweigen, die doch den einzigen Weg darstellen, durch welche dieselben nach den genannten Orten gelangen können, vollständig fehlen sollen. Das gleiche gilt von dem von mir im zweiten Capitel erwähnten *Atriplex hastata*, dessen Wurzel auf Nitrate nicht reagirte, während Stengelschnitte beinahe schwarz wurden.

Frank nimmt an, dass die Nitrate da verarbeitet werden, wo er sie mit Diphenylamin aufdecken kann, nämlich in der Wurzel, dem Stengel, ev. wohl auch in Blattstielen und Rippen. Um nachzuweisen, dass dieselben im Mesophyll nicht assimilirt werden, stellte er folgende Versuche an:

Erster Versuch. Frank nimmt aus dem Boden Pflanzen von *Helianthus annuus* und verpflanzt sie in Wasserleitungswasser und »stickstofffreie Normallösung«. »Bis zum Ende der vierten Woche blieben die Pflanzen am Leben; der ihnen nicht zusagende Aufenthalt in der Wassercultur ist die Ursache ihres früheren Absterbens«. Es handelt sich also um einen Versuch mit ungesunden Pflanzen, dem schon deswegen keine Beweiskraft zugeschrieben werden kann. Während dieser Zeit verschwindet das Nitrat aus der Wurzel, verbleibt aber im Stengel bis zum Tode der Pflanze in anscheinend unveränderter Menge. Verf. nimmt an, »dass der Nitratstrom innerhalb der vier Wochen sich in die Blätter ergossen haben und versiecht haben müsste«. Wenn die Pflanzen gesund gewesen wären

und länger gelebt hätten, so wäre auch wohl der Nitratstrom schliesslich versiecht, vielleicht in mehr, vielleicht in weniger als vier Wochen. *Tradescantia Selloi* lebt in nitratfreier Lösung und in Wasserleitungswasser, je nach der Länge der Sprosse, zwei bis vier Monate, indem die neu gebildeten Blätter sich gleich nach ihrem Auswachsen zu Gunsten der wachsenden Region wieder entleeren und absterben. Schon nach kurzer Zeit, unter Umständen schon einer Woche, ist in den Sprossen keine Spur der vorher reichlichen Nitrate mehr zu finden.

»Bei einem zweiten Versuch . . . handelte es sich darum, die vermeintliche Zersetzung von Salpetersäure im grünen Blattgewebe näher zu prüfen. . . . Wenn die bisherige Deutung richtig sein sollte, dass man in diesem Gewebe deshalb keine Salpetersäure findet, weil dieselbe dort angelangt, sogleich assimiliert wird, so müsste es gelingen, dieselbe dort sich ansammeln und nachweisbar werden zu lassen, wenn die Bedingungen der Assimilation aufgehoben sind«. Verf. liess in nitrathaltiger Lösung Pflanzen von *Phaseolus nanus* wachsen, und fand, dass das Mesophyll keine Nitratreaction zeigte, obwohl sämtliche Rippen in Diphenylamin intensive Blaufärbung annahmen. Die im Dunkeln entstandenen kleinen etiolirten Blätter zeigten eine schwächere Reaction als die normalen Laubblätter.

Es wird schwerlich ein Pflanzenphysiologe noch der etwas naiven Meinung sein, dass die Nitrate nur deswegen im Blattmesophyll unsichtbar seien, weil sie sofort zersetzt werden. Die nächstliegende Annahme ist vielmehr, dass die Mesophyllzellen Stätten der Verarbeitung, nicht der Aufspeicherung, darstellen und daher verhältnissmässig weit weniger Nitrate aufnehmen als die als Speicherorgane für Salze dienenden benachbarten Rippenparenchym- und z. Th. Epidermiszellen. Dass die Mesophyllzellen die Fähigkeit besitzen, Nitrate aufzunehmen, geht ohne weiteres aus der Cultur bei reichlicherer Nitratzufuhr, etwa bei Begiessen mit 0,1 bis 1 % Lösung; dann wird man in dem Mesophyll der meisten Pflanzen, z. B. *Tradescantia Selloi*, *Datura Metel*, *Amarantaceen* etc., eine intensive Nitratreaction erhalten.

Das sind die einzigen Versuche, auf welche Frank seine Ansicht stützt, dass Nitrate im Blattmesophyll nicht verarbeitet werden.

Sehen wir dagegen, welche Gründe wir haben, den Sitz der Assimilation der Nitrate, zum grossen Theil wenigstens, in das Blattmesophyll zu verlegen. Da dieselben bei Frank eine Diskussion nicht erfahren haben, so sei wiederum auf die alten Ringelungsversuche, auf die Arbeiten Hornberger's und Emerling's, aus welchen die Abhängigkeit der Anhäufung von Amidn im Stengel von der Thätigkeit des Blatts so klar hervorgeht, auf die von Arth. Meyer nachgewiesene Auswanderung von Albuminstoffen aus Blättern bei Verdunkelung, hingewiesen. Diese Angaben sind in meiner citirten Arbeit discutirt.

Endlich sei es mir erlaubt, auf meine eigenen Versuche zurückzukommen, damit der Leser in der Lage sei, sich in der Streitfrage ein Urtheil zu bilden, und weil ich Einiges hinzuzufügen habe.

Tradescantia Selloi und *Fagopyrum esculentum* in einer Nährlösung, die die Salpetersäure und den Kalk nur als Kalknitrat enthält, oder auch in kalifreier Lösung (*Tradescantia*) cultivirt, nehmen das Kalknitrat in ihre Blätter reichlich auf und erzeugen in ihrem Mesophyll enorme Mengen von Kalkoxalat.

In einer kalkfreien Lösung, wo die Salpetersäure als Kalinitrat geboten wird, bildet *Tradescantia* in ihrem Blattmesophyll, das reichliche Mengen von Salpeter aufnimmt, Kalioxalat aber kein Kalkoxalat. In destillirtem Wasser wird weder Kalk noch Kalioxalat gebildet.

Abgetrennte junge etiolirte Blätter von *Pelargonium zonale* und *Chenopodium Bonus Henricus* wurden in einer Nährlösung cultivirt, in welcher die Salpetersäure als Kalknitrat enthalten war; ausserdem wurden ähnliche Blätter in (kalkhaltigem) Leitungswasser und in destillirtem Wasser cultivirt. Es wurde sehr reichlich Kalkoxalat in den Blättern gebildet, die Kalknitrat erhalten hatten, sehr wenig in solchen, die in Leitungswasser gestanden, keine nachweisbaren Mengen in denjenigen, die in destillirtem Wasser gezogen worden waren. Details über diese und andere Versuche sind in meiner citirten Arbeit enthalten.

In allen diesen Fällen konnten die Nitrate auch im Blattmesophyll nachgewiesen werden, da die Lösungen relativ reich daran waren.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass in den erwähnten Fällen die Assimilation der Nitrate im Blatt stattgefunden hat, und da letztere sich im Mesophyll nachweisen liessen und ein Nebenprodukt ihrer Verarbeitung, Kalk- oder Kalioxalat, vom Mesophyll erzeugt wurde, so dürfen wir wohl letzteres als den Sitz dieses Assimilationsprocesses betrachten.

Auf andere Versuche, durch welche ich das Verschwinden der Nitrate in abgetrennten Blättern direct nachwies und die in meiner Arbeit ebenfalls beschrieben sind, will ich hier nicht näher eingehen, da sie häufig nicht gelingen, ohne dass es mir zur Zeit möglich wäre, die Bedingungen für ihr Gelingen anzugeben.

Dass wir die Ergebnisse der eben erwähnten Versuche auf Pflanzen, die in natürlichem Boden wachsen, ausdehnen dürfen, wird wohl keinem Zweifel unterliegen. Die Nährstoffe sind die gleichen; sie lassen sich bis in das Blatt verfolgen, häufig auch bis in das Mesophyll, und in letzterem sehen wir ebenfalls das Kalk- und Kalioxalat auftreten.

Dass eine Verarbeitung der Nitrate im Mesophyll stattfindet, darf als feststehend betrachtet werden. Es fragt sich nun, ob andere Gewebe die gleiche Funktion verrichten.

Es ist klar, dass mit der Verarbeitung der Mineralsalze eine Ausscheidung von Aschenbestandtheilen verbunden ist, da nur ein Bruch-

theil der an Säuren gebundenen Basen im Stoffwechsel verbleibt. Ausserordentlich belehrend sind in dieser Hinsicht die von Wolff angegebenen Durchschnittszahlen der Aschenmengen:

1 und 2 jährige Pflanzen:	Perennirende Gewächse:
Samen 3 ‰	Samen 3 ‰
Wurzeln 5 ‰	Holz 1 ‰
Stengel 4 ‰	Rinde 7 ‰
Blätter 15 ‰	Blätter 10 ‰

Schon beim ersten Blicke fällt es auf, dass die Blätter, namentlich bei krautigen Pflanzen, weit mehr Asche enthalten, als die übrigen Theile, und zwar beruht der grosse Unterschied hauptsächlich auf ihrem Reichthum an Kalk, einem Stoffe, dem in erster Linie die Rolle eines Vehikels zukommt. Der Aschenreichthum der Blätter wird uns aber noch weit bedeutsamer erscheinen, wenn wir bedenken, dass die Rinde, speciell bei krautigen Pflanzen, chlorophyllhaltig und dem Blattmesophyll gleichzusetzen ist. Ferner sind Wurzeln und Kaulome Speicherorgane und Wanderbahnen für die Rohstoffe, und, in anderen Geweben, für die assimilirten, stets aschenreichen Reservestoffe, während die erstere Function nur in geringem Grade, die letztere gar nicht, den Blättern zukommt. Endlich ist der grössere Theil des Kalks in Wurzeln und Kaulomen, namentlich in der Rinde der Holzgewächse, an Oxalsäure als primäres Kalkoxalat gebunden, und wir wissen, dass dieses Salz ein Nebenproduct der Phosphorsäureassimilation in wachsenden Pflanzentheilen darstellt. Der relativ grosse Reichthum der Baumrinde an Aschenbestandtheilen erklärt sich ferner daraus, dass sie weit länger mit dem Stamm verbunden bleibt, als das alljährlich abfallende Laub, und so das beim Dickenwachsthum mehrerer Jahre gebildete primäre Kalkoxalat in sich speichert.

Die enorme Menge Aschenbestandtheile, die im Laube enthalten ist, stellt übrigens nur einen Bruchtheil derjenigen, die der Transpirationsstrom demselben zugeführt hatte, nämlich einerseits die als integrirende Bestandtheile den Plasmagebilden gehörigen, andererseits die aus dem Stoffwechsel als Kalkoxalat u. s. w. geschiedenen. Es geht nämlich aus vielen Erscheinungen mit voller Sicherheit hervor, dass Aschenbestandtheile, namentlich Phosphorsäure und Kali, fortwährend aus dem Blatte in den Stengel wandern.

Dass aus den Blättern eine Wanderung von Kali stattfindet, zeigen z. B. die Untersuchungen von Arendt an der Haferpflanze. Während der Jugend nimmt das Kali in derselben sehr rasch zu, bleibt dann bei mehr oder weniger grossen Schwankungen im Durchschnitt gleich, um schliesslich während der Fruchtreife abzunehmen. Diese Resultate, welche für andere Pflanzen auch Gültigkeit haben, können entweder dahin gedeutet

werden, dass das Blatt nur während der Jugend Kalisalze aufnimmt, später solche nicht mehr erhält, und schliesslich einen grossen Theil seines Kali in den Stengel ergiesst, oder dahin, dass das aufgenommene Kali zuerst zum Aufbau des Blattes Verwendung findet, später aber mit den assimilirten Stoffen wieder auswandert, schliesslich in viel grösserem Maassstabe, als es zugeführt wird. Diese letztere Annahme allein erklärt uns die zum Theil bedeutenden Schwankungen. Dass sie der Richtigkeit entspricht, geht aber auch aus verschiedenen Experimenten hervor. Um zu beweisen, dass den ausgewachsenen Blättern die Fähigkeit keineswegs abgeht, Kalisalze aufzunehmen, brauchen wir nur Topfpflanzen mit einer 0,1—1 procentigen Kalisalpeterlösung zu begiessen; wir werden das Salz in grosser Menge in den Blättern wiederfinden. Wir wissen übrigens und können direct zeigen, dass die Blätter fortwährend anorganische Kalisalze, spec. Salpeter, erhalten und verarbeiten. Es müsste also eine Anhäufung von Kali stattfinden, wenn letzteres nicht fortwährend wieder abginge. Eine solche Anhäufung können wir übrigens hervorrufen, wenn wir die Bildung einer für den Stoffwechsel unbrauchbaren Kaliverbindung in den Blättern veranlassen, wie bei der Cultur von *Tradescantia Selloi* in kalkfreier Lösung, wo das Kalioxalat sich nicht mit Kalksalzen umsetzen kann und daher im Blatte verbleibt.


Ganz ähnliches wie vom Kali, gilt auch von der Phosphorsäure. Auch sie nimmt bis zum Auswachsen des Blatts zu, um nachher relativ stationär zu bleiben und schliesslich abzunehmen. Aus ganz ähnlichen Gründen wie beim Kali, muss man auch hier schliessen, dass eine fortwährende Auswanderung der Phosphorsäure aus dem Blatt in den Stengel stattfindet.

Wir sind zur Annahme gedrängt in den grünen Zellen, spec. denjenigen des Mesophylls, die Laboratorien zu erblicken, in welcher beinahe sämtliche Rohstoffe der Pflanzennahrung ihre erste Verarbeitung erfahren. Die nur als Vehikel dienenden Bestandtheile, wie der grösste Theil des Kalks, die wohl hauptsächlich als Kalisilikat eintretende Kieselsäure, werden, ebenso wie der überschüssige Sauerstoff der Kohlensäureassimilation, im Blatte ausgeschieden, während die brauchbaren Producte das Blatt verlassen, um nach den Verbrauchsorten transportirt zu werden.

Nicht von allen Rohstoffen der Pflanzenernährung möchten wir jedoch behaupten, dass sie ihren Weg über die Blätter nehmen, und sich erst dann nach den Verbrauchsorten bewegen. Wir haben namentlich keinen Grund, das vom sauren Kalk- und Kaliphosphat anzunehmen, die sich nach den wachsenden Regionen begeben, um dort zur Bildung von Nuclein, Kali- und Kalkoxalat etc. Verwendung zu finden. Dieses dürfte aber der wichtigste synthetische Process sein, der sich auf Kosten von Rohmaterial ausserhalb der grünen Zelle abspielt.

Man könnte der Meinung sein, dass, da die Phosphorsäure auch ausserhalb des Mesophylls assimiliert wird, das Gleiche mit Wahrscheinlichkeit, wenn auch in geringem Grade, von der Salpeter- und Schwefelsäure gelten dürfte. Es handelt sich aber in beiden Fällen um wesentlich andere Vorgänge; die Phosphorsäure nimmt nämlich als solche Theil an dem Aufbau der organischen Substanz, wird nicht reducirt, während Salpeter- und Schwefelsäure, ganz ähnlich wie die Kohlensäure, reducirt werden. Ich habe für die Salpetersäure nachgewiesen, dass ihre Assimilation an ähnliche Bedingungen gebunden ist, wie diejenige der Kohlensäure, nämlich an Chlorophyll und Licht. Es ist mir daher höchst wahrscheinlich, dass das Chlorophyllkorn nicht bloss bei der Kohlensäureassimilation, sondern auch bei derjenigen der Salpetersäure, und wohl der Schwefelsäure, als reducirendes Organ wirkt, dass die Assimilation der beiden genannten Säuren an dessen Thätigkeit ebenso gebunden ist, wie die längst bekannte der Kohlensäure. Die Assimilation der Phosphorsäure dagegen findet auch ausserhalb der grünen Gewebe und unabhängig vom Lichte statt, da sie von der Mitwirkung eines reducirenden Organes nicht direct abhängig ist.

Nehmen wir mit Emmerling an, dass bei der Assimilation der Salpetersäure die Bildung von Amiden derjenigen von Eiweiss vorausgeht, so könnte dieselbe nach folgender Gleichung stattfinden:



Die geringe Menge freien Sauerstoffs wird auf die Constanz der Volumina bei der Kohlensäureassimilation nur einen unbedeutenden Einfluss haben können: zudem ergeben die kleinen Abweichungen von derselben stets einen Ueberschuss an Sauerstoff. Es ist übrigens auch möglich, dass eine grössere Menge organischer Säure gebildet werde, als nach der natürlich nur ganz provisorisch aufgestellten Gleichung der Fall sein würde.

Unserer Ansicht nach wird aus den Blättern ein Strom von Assimilaten abgeleitet, der nicht bloss aus Kohlehydraten besteht, wie man es bisher annahm, sondern auch aus organischen Stickstoff-, Schwefel-, Phosphorsäure-, Kali- und wahrscheinlich Magnesia-Verbindungen. Als Wanderform der Stickstoffverbindungen können wir zum grossen Theile unzweifelhaft die Amide und Amidosäuren betrachten, die sich im leitenden Parenchym der Blätter nachweisen lassen. Eine grosse Rolle für die Fortleitung der durch das Blatt zubereiteten Stoffe wird aber allem Anscheine nach den Siebröhren zukommen, deren Bedeutung für die Pflanze nach unserer Annahme vollkommen klar wird, während es nach der bisherigen Ansicht unverständlich war, warum es Leitungsorgane für

die Eiweisskörper gäbe, da dieselben doch überall entstehen sollten. Die Zusammensetzung des Siebröhreninhalts zeigt grosse Aehnlichkeit mit demjenigen der Aleuronkörner, die ebenfalls das vorbereitete Material für die Bildung der Albumine und Nucleine darstellt, nämlich Reichthum an denjenigen Stoffen, die wir in den Meristemen reichlich finden: eiweissartige Körper, Phosphorsäure, Kali, Magnesia, Zurücktreten des Kalks, Fehlen der Kieselsäure, des Chlor, des Natrium. Dass auch Phosphorsäure reichlich vorhanden ist, obwohl sie den Orten ihres Verbrauchs auch direct zugeführt wird, kann uns nicht auffallend erscheinen, wenn wir bedenken, dass phosphorsaures Kali die Löslichkeit sonst unlöslicher Eiweissstoffe, z. B. der Aleuronkörner, bedingt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich noch hervorheben, dass die Bezeichnung »Schleim« für den Inhalt lebender Siebröhren unzutreffend ist, indem letzterer im frischen Zustande wässerig flüssig ist und erst an der Luft schleimig bis gallertig wird.

Man wird vielleicht gegen die hier vertretenen Anschauungen die Assimilation der Salpeter- und Schwefelsäure durch gewisse Pilze, unabhängig von Licht und Chlorophyll, geltend machen. Ein Vergleich zwischen den Reductionsvorgängen bei Pilzen und grünen Pflanzen ist jedoch nicht zulässig; die Reductionsvorgänge beruhen in beiden Fällen auf ganz ungleichen Vorgängen. Die Purpurbakterien assimiliren die Kohlensäure, wie Engelmann gezeigt hat, in der Dunkelheit, indem ihre Kraftquelle im Ultraroth liegt und Hüppe hat sogar festgestellt, dass gewisse ganz farblose Bakterien im Dunkeln aus kohlen-saurem Ammoniak ein der Cellulose sehr nahestehendes Kohlehydrat herzustellen vermögen. Die Zahl der Pilze, welche Salpetersäure assimiliren, ist eine relativ geringe; die Sprosspilze thun es, nach Nägeli's Untersuchungen, nicht, und was die Spaltpilze betrifft, denen diese Fähigkeit theilweise zukommt, so »ist zu bemerken, dass die Salpetersäure als solche nicht assimilirt, sondern vorher in Ammoniak umgewandelt wird, und dass es somit wesentlich von dem Reductionsvermögen der Pilze abhängt, ob sie dieselben ernähren kann oder nicht« ¹⁾. Man ersieht daraus, dass die Assimilation der Salpetersäure bei Pilzen und grünen Pflanzen in ganz ungleicher Weise vor sich geht. Letzteres wird wohl auch von der Schwefelsäure gelten; Pilze können ihren Schwefel auch aus schwefliger und unterschwefliger Säure aufnehmen, und es scheinen sogar die beiden letzten Verbindungen bessere Resultate zu geben, als die Schwefelsäure ²⁾. Auch hier sind demnach ganz andere Ernährungsvorgänge im Spiele, als bei grünen Pflanzen.

1) Nägeli, l. c. p. 399.

2) Nägeli, l. c. p. 459.

Litteratur.

K. Goebel, Morphologische und biologische Studien. Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. Vol. IX, pag. 1–126.

Die neuesten Arbeiten Goebels, welche eine Fortsetzung seiner in den Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg veröffentlichten Abhandlungen bilden, liegen als Separatabzug aus der genannten Zeitschrift in Gestalt eines stattlichen Bandes mit 16 Figurentafeln vor. Das Werk, welches drei gesonderte Abhandlungen enthält, bietet eine Anzahl neuer Studien über die Morphologie und Biologie der Pflanzen. Der Wunsch, dem Leser den Inhalt der nicht Allen leicht zugänglichen Originalarbeit möglichst eingehend anzudeuten, möge die grosse Ausdehnung des Referates entschuldigen.

Die erste Abhandlung beschäftigt sich mit einigen neuen oder wenig bekannten javanischen Lebermoosen.

1) *Treubia insignis* Goeb. ist eine neue Art, welche an einem genau bezeichneten Standort bei Tjibodas auf vermodernden Baumstämmen vorkommt. Das stattliche Lebermoos gehört zu den Formen, welche wie *Blasia*, *Fossombronia*, *Androcryphia* und *Petalophyllum* den Uebergang von den thallosen zu den foliosen Formen vermitteln. *Treubia* wächst dem Substrate dicht angeschmiegt. Die bis 16 cm. langen Sprosse sind monopodial verzweigt und zweizeilig beblättert. Amphigastrien fehlen. Die Blätter, bis 1 cm. lang und fast ebenso breit sind an der Basis mehrschichtig und schwach unterschlächtig inserirt. Die Seitensprosse stehen zwischen je zwei Blättern einer Zeile. Auf der Dorsalseite des Stammes verläuft ein zickzackförmiger Kamm, welcher durch zwei Reihen kleiner Schuppen (Dorsalschuppen) gebildet wird. An der Unterseite, welche häufig eine seichte, mit Schleim erfüllte Rinne zeigt, stehen lange Haarwurzeln. Sporogonien fanden sich an den untersuchten Pflanzen nicht.

Am Vegetationspunkt findet sich eine dreiseitig pyramidale Scheitelzelle. Jedes seitliche Segment derselben theilt sich zunächst in drei Zellen aus deren unterster die freie Stammoberfläche der Unterseite gebildet wird. Die mittlere entwickelt sich zum Blatt, die oberste zur Dorsalschuppe, welche fast senkrecht zur Blattfläche emporwächst. Jedes Blatt besitzt an seinem unteren Rande einen Flügel mit reichlichen schleimabsondernden Papillen. Letztere sind theils einfache Zellen theils mehrzellige Gebilde. Die Archegonien stehen in dem Winkel zwischen Dorsalschuppe und Stammoberseite. Die zwischen ihnen befindliche Schleimmasse wird von Papillen der Dorsalschuppen abgesondert. Die Papillen stehen hier nicht selten auf schmalen, schuppenförmigen Zellflächen, welche eine höhere Ausbildung der Schleimhaare darstellen. Antheridien fanden sich leider nicht, dagegen an manchen Exemplaren 3 bis 4 zellige kurzgestielte Brutknospen. Einzelne Zellen der *Treubia* führen Oelkörper. Alle untersuchten Exemplare zeigten Pilzinfektion, durch welche indess eine eingreifende Schädigung des Wirthes nicht herbeigeführt wird. — Fasst man die Dorsalschuppen als selbstständige Gebilde auf, so lässt sich der Aufbau der *Treubia* in gewisser Beziehung mit *Blasia* vergleichen. Will man dieselben als Theil des Blattes betrachten, so können *Fossombronia*, *Androcryphia* u. a. zum Vergleiche herangezogen werden besonders hinsichtlich des Verhaltens der Scheitelzelle. Der Vergleich mit *Blasia* scheint indess der näherliegende zu sein.

2) *Calobryum Blumii* Nees, welches Nees v. Esenbeck vor nahezu 60 Jahren unter den *hepaticae javanicae* auführte, ist bisher äusserst unvollständig bekannt gewesen. Goebel fand es in Java in isolirten kleinen Rasen an der Buitenzorger Seite des

Salak, ausserdem kommt es auch am Pangerango vor. Nees hatte *Calobryum* mit *Monoclea* zusammengestellt, weil die Columella-lose Kapsel mit einem Längsriss aufspringe. Die Dehiscenz der Kapsel kann indess, wie schon Gottsche und Leitgeb für *Monoclea* betonen, hier nicht als systematisches Unterscheidungsmerkmal dienen. Schon die habituelle Vergleichung zeigt, dass *Calobryum* mit *Haplomitrium* verwandt ist. Beide sind aufrecht wachsend und radiär gebaut, beide besitzen eigenthümliche unterirdische Organe und ermangeln der Haarwurzeln. Scheinbar besitzt *Calobryum* ein einheitliches Rhizom, aus dem die beblätterten Sprosse entspringen, bei genauerer Betrachtung zeigt sich, dass das Rhizom ein Sympodium ist. An der Basis der beblätterten Triebe entstehen blattlose Zweige, welche nach unten wachsen, im Boden kriechen, später an der Spitze Blätter bilden, sich erheben, an der Spitze Geschlechtsorgane erzeugen, und ihrerseits an ihrer Basis durch blattlose Seitensprosse das Rhizom fortsetzen. Die Rhizomsprosse, welche hinsichtlich ihrer Stellung in keiner Beziehung zu den Blättern stehen, werden schon am Scheitel durch Endverzweigung angelegt und ruhen dann längere Zeit. Wahrscheinlich wird bei *Haplomitrium* entgegen der Leitgeb'schen Ansicht derselbe Fall vorliegen. Die Rhizomäste von *Calobryum* sind mit einer Schleimhülle bedeckt, welche von besonderen Keulenpapillen zwischen Cuticula und Cellulosehaut abgesondert wird. Am Vegetationspunkt stehen die schleimbildenden Papillen besonders dicht. Die dreiseitig pyramidale Scheitelzelle liegt in einer seichten, von Schleim erfüllten Versenkung. Die meist ganzrandigen Blätter der aufrechten Sprossenden sind in drei Reihen angeordnet und nehmen nach oben hin an Grösse zu. Sie sind in ihrem unteren Theile mehrschichtig von fast fleischiger Beschaffenheit. In dem Stämmchen sind die äusseren Zellbogen stärkereich, die inneren langgestreckt und stärkeelos, wahrscheinlich dienen die letzteren der Wasserspeicherung. Das Wachsthum der Laubsprosse wird durch die Bildung der Geschlechtsorgane abgeschlossen, welche zu terminalen Inflorescenzen vereinigt sind. Die Inflorescenzen sind von Hüllblättern umgeben, von denen drei sich durch besondere vor den Stengelblättern auszeichnen. Zwischen den Archegonien resp. Antheridien der Inflorescenz stehen nur Schleimpapillen, nicht Blätter, wie es bei *Haplomitrium Hookeri* der Fall ist. *Calobryum* stimmt in Bezug auf die Archegonienbildung also mit den akrogynen Lebermoosen überein, ein Umstand, welcher indess keineswegs dazu berechtigt, die durch andere Thatfachen hinlänglich bewiesene Verwandtschaft von *Haplomitrium* und *Calobryum* zu leugnen, sondern vielmehr beweist, dass der Vorgang des Akrogynwerdens, des Hinaustrückens der Geschlechtsorgane gegen den Sprossscheitel im Laufe der phylogenetischen Entwicklung sich mehrmals vollzogen hat. *Calobryum* stellt den Endpunkt einer solchen Reihe, der »*Calobryaceen*« dar, als deren Glieder wir bisher *Haplomitrium* und *Calobryum* kennen gelernt haben.

Die eigenthümliche geographische Verbreitung der *Calobryaceen* weist darauf hin, dass wir es mit einer Gruppe zu thun haben, welche die Reste einer vormals weit verbreiteten und formenreichen Sippe darstellt.

3) *Colura ornata* Goebel ist eine neue Species der interessantesten Lebermoosgattung, welche sich durch die charakteristische Wassersackbildung der Blätter auszeichnet (vergl. Goebel, Morph. u. biol. Studien I. Ann. du Jard. Bot. Buitzg. Vol. VII p. 38 ff). Die neue Art gehört, wie die schon bekannten, zu den vorzugsweise blattbewohnenden *Epiphyten*. Von den übrigen Arten unterscheidet es sich dadurch, dass die Blätter, deren Zellwände Verdickungsleisten besitzen, zierlich gebuchtet sind und dass der Wassersack von einer ebenfalls gebuchteten Zellfläche überragt wird. In dem auf einem Laubblatt ausgebreiteten Rasen der *Colura ornata*, welcher dem Verfasser zur Untersuchung vorlag, fanden sich zahlreiche keimende Sporen, welche

gestatteten die Entwicklung von Anfang an zu verfolgen. Aus der Spore geht durch Quer- und Längstheilungen eine Zellfläche hervor, welche aus zwei neben einander liegenden Zellreihen besteht. Das junge Pflänzchen entsteht, indem sich nahe dem Vorderende des Vorkeims am Rande eine dreiseitige Scheitelzelle bildet. Das erste Blatt einer abgebildeten Keimpflanze bestand nur aus drei Zellen, von denen zwei dem Oberlappen eine dem Unterlappen des Blattes entsprechen. Letzterer ist stets durch eine Papille gekennzeichnet. Amphigastrien und sackförmige Blätter treten erst später auf. Letztere sind zuerst einfacher gestaltet; der Kamm ist schwach entwickelt und die noch umgekehrte Mündung des Schlauches steht offen. Beim ausgebildeten Schlauchblatt ist die Mündung durch eine Klappe geschlossen, welche auf einem Rahmen von vorspringenden, theilweise schwanzartig verlängerten Zellen der Schlauchunterseite ruht. Die Entwicklung der Schlauchblätter geht in der Weise vor sich, dass sich der Blattunterlappen gegen den Oberlappen einrollt und dadurch die auf den Wassersack zuführende enge Röhre bildet. Zugleich wird der Oberlappen durch ein gesteigertes Flächenwachsthum an der inneren Seite kapuzenförmig ausgehöhlt und bildet dadurch den Sack. Der dem Wassersack aufsitzende Kamm entsteht als ein Auswuchs aus einer Zellreihe der Blattfläche. Die Klappe geht aus einer Randzelle des Blattunterlappens hervor. An manchen Blättern von *Colura ornata* unterbleibt die Ausbildung des Sackes ganz. Die Seitenäste und auch die Aeste, welche die Sexualorgane tragen, stehen an der ventralen Insertion von Oberblättern. Das Perianth ist oben dreikantig und etwa 1 mm. hoch. Der Stiel des Sporogoniums ragt nur wenig darüber hervor. Die Elateren, welche oben an den Rändern der vier Kapselklappen angeheftet sind, besitzen ringförmige Verdickungen.

4) Eine javanische *Plagiochila* mit Wassersäcken. Den meisten Arten der umfangreichen Gattung *Plagiochila* fehlen die Wassersäcke. Die hier zu besprechende mit Wasserbehältern versehene Art gehört zu der in der *Synopsis hepaticarum* von Gottsche, Lindenbergh und Nees v. Esenbeck als *cucullatae* bezeichneten Unterabtheilung der adiantoiden Plagiochilen, vielleicht ist es *Pl. blepharophora* Nees. Der Archegonienstand ist terminal, unterhalb desselben entspringen zwei gegenständige Innovationssprosse. Die Hauptsprosse sind mit Haarwurzeln dem Substrate angeschmiegt, die Sprosse, welche Archegonien tragen, erheben sich frei. Die länglich eiförmigen Blätter sind am ganzen Rande mit Wimperzähnen besetzt. Die Wassersäcke kommen durch Umrollung des ventralen Blattrandes zu Stande. Aus der Blattfläche entspringen oft durch zahlreiche Adventivsprosse. Dass das Vorkommen von Wassersäcken in der Gattung *Plagiochila* noch weiter verbreitet ist, bewies die Untersuchung der columbischen *Pl. curvifolia* Jack. Leider reichte das von dieser Form vorhandene Material zu einer eingehenden Prüfung nicht aus.

5) »*Kurzia crenacanthoidea*«. Die von v. Martens als Alge betrachtete javanische Pflanze ist in Wirklichkeit ein Lebermoos, wie die Untersuchung Martens'scher Originalexemplare und in Java gesammelten Materials zweifellos ergab. Es sind zwei seitliche Blattrihen und Amphigastrien vorhanden. Die seitlichen Blätter bestehen aus drei an der Basis verbundenen Zellreihen. Die Amphigastrien bestehen gewöhnlich nur aus vier Zellen. Die Verzweigung ist überwiegend seitlich, die Sexualsprosse aber stehen immer ventral. An den letzteren werden wohl entwickelte, am Rande zerschlitzte Blätter ausgebildet. Perianthien und Früchte kamen nicht zur Beobachtung. Trotzdem lässt sich erkennen, dass die Pflanze zu *Lepidozia* zu stellen und also die Gattung *Kurzia* zu streichen ist. Ob die Form als *Lepidozia crenacanthoidea* zu bezeichnen oder ob sie etwa mit *L. gonyotricha* identisch ist, bleibt vor der Hand unentschieden.

Die zweite Abhandlung beschäftigt sich mit einer eingehenden Untersuchung der Morphologie der Gattung *Utricularia*. Verfasser giebt zunächst einen Ueberblick über die bisher vertretenen Anschauungen. Es werden dabei nach einander die Auffassungen der Systematiker, die aus den Stellungsverhältnissen, aus der Entwicklungsgeschichte und aus den anatomischen Verhältnissen abgeleiteten Deutungen der *Utricularia*-Organe kritisch besprochen. Sodann wendet sich der Verfasser zur Einzelbeschreibung des Aufbaues einer Anzahl genau untersuchter Species.

A. Landformen.

I. Landformen mit blasenlosen Blättern.

1) *Utricularia orbiculata* Wall. ist im südlichen Asien weitverbreitet. Sie besitzt kriechende zwischen Moos etc. verborgene Stämmchen, deren Vegetationspunkt nicht eingerollt ist. An dem Stämmchen stehen seitlich Blasen und gestielte, 2—3 mm. breite fast kreisrunde Blätter mit gabelig verzweigter Nervatur. Die Blasen stehen in zwei Reihen auf den Flanken, die Blätter in einer Längsreihe auf dem Rücken des Stämmchens die organische Blattoberseite und dem entsprechend auch der Achselspross sind vom Sprossscheitel abgekehrt. Die Blütenstände sind mit Ausnahme des ersten an der Keimachse Achselsprosse der Laubblätter. An ihrer Basis stehen Laub- und Schuppenblätter, welche secundäre Inflorescenzen in ihren Achseln tragen und weiter oben zarte schildförmige Deckblätter der Blüten. Die Anordnung der seitlichen Organe an der Inflorescenz ist eine radiäre, sie beginnt mit zwei seitlich gestellten Laubblättern ohne Achselsprosse. Statt dieser Laubblätter können Ausläufer auftreten, welche sich wie die kriechenden Hauptsprosse verhalten. Weiter oben an der Inflorescenz treten weitere Laubblätter auf, welche seitliche Inflorescenzen in ihren Achseln haben können. Die Blätter besitzen zwei sehr dünne Vorblätter. An manchen Ausläufern schwellen die Internodien tonnenförmig an und bilden so Wasserbehälter. Die Blasen von *Utricularia orbiculata* haben zwei mit Drüsenhaaren besetzte Antennen. Auch auf den übrigen Theilen der Pflanze finden sich Drüsenhaare, welche stets unterhalb der kugeligen Endzelle eine kurze Scheibenzelle besitzen.

Die sehr kleinen Samen tragen am hinteren Ende haarförmige Ausstülpungen der Samenschalenzellen mit Widerhaken besetzt. Der Embryo besitzt keine Wurzelanlage, oben erkennt man zwei sehr kleine meristematische Colyledonaranlagen, deren eine bei der Keimung wahrscheinlich zum Laubblatt, die andere zur ersten Blase oder zum Ausläufer sich entwickelt.

2) *Utricularia reniformis* A. de St. Hil. hat langgestielte nierenförmige Blätter. Die Anordnung der seitlichen Organe an den dicken im Moose kriechenden Ausläufern ist ähnlich wie bei voriger Art, nur stehen an Stelle der Blasen reichverzweigte, blasentragende Ausläufer ohne Blätter. Der Vegetationspunkt der stärkeren Ausläufer ist schneckenförmig eingerollt.

3) *Utricularia montana*. Bei der Keimung entsteht ein wurzelloser radiärer Keimspross, an welchem Blätter, Blasen und Ausläufer auftreten. Letztere tragen zwei seitliche Reihen von Blasen und blasentragende Ausläufer und auf dem Rücken Blätter mit Achselsprossen oder statt dessen Ausläufer. Auf den Blättern der Keimpflanzen treten häufig Adventivsprosse auf.

4) *Utricularia longifolia*. Die bis 17 cm. langen Blätter dieser Art können an ihrer Spitze als Ausläufer weiterwachsen, andererseits können auch Ausläufer sich an der Spitze einer Blastfläche verbreitern. Die Anordnung der seitlichen Organe an den Ausläufern lässt keine allgemeine Regel erkennen.

5) *Utricularia bryophila*. Auch bei dieser Form kommen Uebergänge zwischen Blatt und Ausläufer häufig vor. An den Ausläufern stehen Blasen, Ausläufer und Blätter in zwei seitlichen Zeilen.

II. Landformen mit blasentragenden Blättern.

6) *Utricularia Warburgi* Goebel. nov. spec. Blätter lineal-spatelförmig, einnervig bis 15 mm. lang. Blasen an Ausläufern und Blättern. Länge derselben bis 2,3 mm. An den 6—9 cm. langen Blüthenschäften 4—6 gelbe Blüten, Blütenstiele kurz, Deckblätter lanzettlich, der untere Theil derselben über den Insertionspunkt hinaus verlängert. Auch die beiden Vorblätter besitzen einen solchen Fortsatz. Kelchblätter $1\frac{1}{2}$ mm. lang, fast kerisrund. Oberlippe der Blumenkrone ausgerandet. Gaumen der Unterlippe rahmenförmig aufgetrieben, am vorderen Rande mit zwei kurzen Aussackungen. Der Sporn aufsteigend, wenig länger als die Unterlippe, an der Spitze zweispaltig oder ganz. Frucht bei der Reife von den Kelchblättern umhüllt. Samen kurz eirund, mit kurzen stumpfen Warzen bedeckt.

Bei dieser Art stehen seitliche Ausläufer nur an der Basis des Blüthensprosses. An den kriechenden Achsen stehen zwei seitliche Reihen von Blasen und auf dem Rücken Blätter mit Achselsprossen. Das Blatt trägt 2 bis 3 Blasen. Die Inflorescenz bildet das Ende der Keimachse. Ausserdem entstehen Inflorescenzen als Achselprosse bei den Blättern der Ausläufer.

7) *Utricularia bifida* ist in Indien weitverbreitet. Die Keimung erinnert an die von *Utr. montana*. Der Embryo besitzt keine Cotyledonen. Eine Wurzel wird nicht gebildet. Die beiden ersten Organe sind ein Blatt und ein langer Ausläufer. Letzterer dringt in das Substrat ein. Der Keimspross ist radiär und schliesst mit einer Inflorescenz ab. Die langen, schmalen Blätter wachsen sehr lange an der Spitze fort. Der Keimspross entwickelt Blätter und Ausläufer, letztere in Stellung und Entstehung ersteren durchaus entsprechend. Die Ausläufer tragen Blasen, Blätter und Ausläufer höherer Ordnung. Die Blätter stehen auf dem Rücken, Blasen und Ausläufer auf den Flanken. In der Nähe der Blätter entstehen noch Inflorescenzanlagen. An den radiären Inflorescenzachsen stehen ausser den Deckblättern der Blüten an der Basis Ausläufer gewöhnlicher Art. Oberhalb derselben entstehen an der Achse deckblattlos, exogen Rhizoïden mit kurzen Seitenzweigen, welche als Ausläufer ohne Blatt- und Blasenbildung anzusehen sind.

8) *Utricularia affinis*. Der radiäre Keimspross verlängert sich zur Inflorescenz. An demselben stehen Ausläufer, Rhizoïden und einige Blätter. Die Stellung der seitlichen Organe an den Ausläufern ist wie bei *Utr. bifida*. Nicht selten findet sich in der Achsel der Rhizoïden eine Knospe. Auch in der Achsel kleiner an der Inflorescenzachse stehender Schuppenblätter sind Achselknospen vorhanden, an denen statt der Vorblätter Rhizoïden entstehen können.

9) *Utricularia rosea*. Am freigelegten Vegetationspunkt erkennt man zweizeilige Blasenstellung. Rechtwinklig dazu stehen die Blätter, deren manche Achselprosse besitzen. Auf den Blättern entspringen sehr häufig Adventivprosse, welche in radiärer Vertheilung Blätter und blasentragende Ausläufer hervorbringen.

10) *Utricularia elachista*. Goebel n. spec. ist eine sehr kleine Form mit ausschliesslich kleistogamen Blüten. Die Blätter stehen auf dem Rücken der Ausläufer, ihnen annähernd gegenüber die Ausläufer. Letztere können auch von den Blättern entfernt auftreten. Die Blüthenschäfte entspringen normal in dem Zwischenraum zwischen Blatt und Ausläufer. Dieselben tragen nur eine Schuppe und eine scheinbar terminale Blüthe mit Vorblättern. Die zur Seite gedrängte Spitze der Inflorescenzachse stellt ein kleines Höckerchen dar. Die Blüten haben einen tief zweitheiligen

Kelch und eine zarte spornlose Blumenkrone. Die beiden Staubblätter haben je eine einfächrige Anthere. Die Narbe des Fruchtknotens ist trichterförmig vertieft. Die Frucht enthält nur 2—7 Samen. Bei der Keimung entsteht ein radiärer Keimspross der mit einer einblüthigen Inflorescenz abschliesst. An der Basis desselben entspringen Ausläufer der oben beschriebenen Form.

11) *Utricularia reticulata* Sm. Das lange Blatt trägt zahlreiche Blasen nahe am Rande und daneben Adventivsprosse, an deren Basis sehr frühe eine Anlage auftritt, welche gewöhnlich zum blasentragenden Ausläufer, seltener zu einem Blatt wird. Weiter oben entwickelt der Adventivspross noch mehrere radiär gestellte Seitenorgane und wird schliesslich zum Blüthenspross. An den dünnen Achsen von *Utr. retic.* stehen die Blätter dorsal in einer Reihe, seitlich zwei Blasenreihen und Ausläufer. Die zum Winden befähigten Inflorescenzen besitzen an der Basis ein stark entwickeltes System von Rhizoiden, an denen gelegentlich auch Blasen auftreten. An den bei Nuwara Elyia gesammelten Exemplaren fanden sich an den Blüthenstielen statt der normal vorhandenen 2 Vorblätter blasentragende Ausläufer, welche bisweilen auch Seitenzweige und Blätter hervorbrachten.

III. Utricularien mit Blättern, welche normale Ausläufer tragen.

12) *Utricularia coerulea* L. Die Blätter sind hier nicht in einer Zeile angeordnet, sie stehen unregelmässig auf der oberen, selten auf der unteren Seite der Ausläufer, ihnen annähernd gegenüber meist je ein Ausläufer. Blätter und Ausläufer können auch einzeln stehen. Die Grösse der Blätter ist sehr unbestimmt. Auf der Unterseite der Blätter stehen theils Blasen, theils zahlreiche Ausläufer, welche den Ausläufern zweiter Ordnung gleichwerthig sind. Bisweilen steht an Stelle eines blattbürtigen Ausläufers ein Blatt, so dass also ein Blatt direct aus dem andern entspringt. In den Achseln der Blätter und der blattständigen Ausläufer entspringen die Inflorescenzachsen, welche an ihrem unteren Theil Rhizoiden und Ausläufer produciren.

B. Wasserformen.

13) *Utricularia flexuosa* Vahl. Der Vegetationspunkt der schwimmenden Sprosse ist stark eingerollt, auf seinen Flanken steht je eine Blattrihe, auf der Sprossoberseite entspringen ziemlich viele rankenähnliche Sprosse mit eingerollten Vegetationspunkt und zwei Blattrihen. Die Inflorescenzen stehen ebenfalls auf der Sprossoberseite etwas mehr gegen die Flanken hin, aus ihrer Basis entspringt stets ein beblätterter Spross. Da der letztere ziemlich gleichzeitig mit der Inflorescenz angelegt wird, so bleibt zweifelhaft, welches von beiden Organen als das primäre anzusehen ist.

14) *Utricularia stellaris*. Aehnlich wie bei *Utr. inflata*, einer nordamerikanischen Art, findet sich bei dieser Form am Inflorescenzstiel ein Kranz von Schwimmorganen mit grossen Lufträumen. Diese Schwimmorgane sind an den an der Inflorescenzbasis von *Utr. flexuosa* entstehenden Ausläufern homolog. Der der Stengeloberseite zugekehrte Blattstrahl der vielzertheilten Blätter von *Utr. stellaris* ist kleiner als die übrigen Blatttheile, und erscheint als ein flossenförmiges Anhängsel.

15) *Utricularia exoleta*. Gewöhnlich entwickeln sich bei der Keimung der flachen breitgeflügelten Samen zwei einfache Primärblätter (Kolyledon) und dazwischen ein Ausläufer, welcher sich zu einem schwimmenden zweizeilig beblätterten Stamme entwickelt. Der Ausläufer ist als seitliches Organ an dem sich nicht weiter entwickelnden radiären Keimspross aufzufassen. In selteneren Fällen entstehen am Keimling statt der Primärblätter Ausläufer. Die ersten Blätter der Ausläufer sind

entweder einfach oder gegabelt; im letzteren Falle ist einer der Gabelzweige häufig als Blase ausgebildet. Verglichen mit den vorher geschilderten Landformen weicht *Utr. exoleta* hauptsächlich insofern ab, als der Keimspross sein Wachsthum sehr früh einstellt, ohne eine Inflorescenz zu bilden. Die schwimmenden Ausläufer der Pflanze besitzen einen stark eingerollten Vegetationspunkt. Die aus fadenförmigen Segmenten bestehenden Blätter sind spärlich verzweigt und tragen nur wenige Blasen, sie stehen zweizeilig an den Flanken. Die Verzweigung ist axillär, die Achselspresse verzweigen sich gleich an der Basis. Ausser den gewöhnlichen Sprossen giebt es auch solche, bei denen die Blase aus der Umwandlung eines ganzen Blattes hervorgegangen ist, und Uebergänge zwischen diesem und dem normal ausgebildeten. An der Basis der Inflorescenzen stehen Ausläufer in radiärer Vertheilung und weiter oben eigenartige den Rhizoïden der Landformen entsprechende Sprosse, welche besetzt sind mit zweizeilig gestellten, krallenförmigen Organen. Diese Krallensprosse können in gewöhnliche Ausläufer übergehen. Die Inflorescenzen sind Achselspresse, von ihnen können z. B. aus der Achsel eines Krallensprosses secundäre Inflorescenzen entspringen.

Aus den gegebenen Einzelschilderungen sucht nun der Verfasser allgemeine Schlüsse über den Aufbau der Utricularien abzuleiten. Es zeigt sich, dass zunächst die Landformen sehr leicht auf einen Typus zurückzuführen sind. Bei allen Arten tritt eine radiäre Keimpflanze auf, deren Achse mit einem Blüthenstand abschliesst. An dieser Keimachse entstehen Blätter, Blasen und Ausläufer und diese letzteren bringen in den Achseln der Blätter neue Blüthenstände hervor, die in ihrem Verhalten dem radiären Keimpross entsprechen. Alle diese landbewohnenden Arten sind wurzellos. Auch die Wasserformen lassen sich auf diesen Typus zurückführen. Nur bleibt bei ihnen die Achse des radiären Keimprosses sehr kurz und entwickelt gewöhnlich nur einen Ausläufer.

Um die Homologieen in der Bildung der Organe zu besprechen, gibt der Verfasser zunächst einen kurzen Ueberblick über die äussere Gestaltung derselben.

I. Blätter.

A. Wasserbewohnende Arten.

Es giebt hier viererlei Blattformen:

1. Die feingetheilten gabelig verzweigten Blätter, welche in zwei Reihen auf den Flanken der fluthenden Wassersprosse stehen.
2. Die krallenförmigen blasenlosen Blätter der oberen aus der Inflorescenzbasis entspringenden Sprosse.
3. Die ganzrandigen Blätter, welche an den rankenartigen Sprossen stehen.
4. Die Schwimmorgane der Inflorescenzen von *Utr. inflata* und *stellaris*, welche als Mittelformen zwischen Blättern und Ausläufern gelten können.

B. Landbewohnende Arten.

Die Blätter stehen hier meist auf der Oberseite der kriechenden Sprosse und kehren dem Vegetationspunkt ihre Unterseite zu, während an den radiären Sprossen die normale Blattorientirung statthat. Es giebt:

1. Blätter ohne Anhangsgebilde.
2. Blätter mit Anhangsgebilden; Blasen und Ausläufern.

II. Ausläufer.

1. Beblätterte Ausläufer.

a) Bei Wasserformen schwimmende, zweizeilig beblätterte, axillär resp. supra-axillär verzweigte Sprosse.

b) Bei Landformen Sprosse mit weniger regelmässiger Stellung der seitlichen Organe. Meist stehen die Blätter dorsal, die Ausläufer seitlich oder ventral.

2. Blasentragende Ausläufer, welche in das Substrat eindringen.

3. Rhizoïden ohne Blätter und Blasen, nur mit kurzen Seitenästchen versehen. Ihnen entsprechen bei den Wasserformen die Krallensprosse.

III. Blasen.

Blasen kommen an dem radiären Keimspross, an Ausläufern und an Blättern vor. Sie lassen sich als umgebildete Blattorgane betrachten. Die Form der Blasen ist sehr eigenthümlich und innerhalb der Arten constant, sodass dieselbe bei der Species-Charakteristik sehr vortheilhaft verwendet werden könnte. Es werden drei Blasenformen eingehend geschildert.

1. Die Blasen der Wasserarten, welche im allgemeinen denen von *Utr. vulgaris* ähnlich sind.

2. Blasen mit langen Antennen und verlängerter oberer Trichterwand z. B. bei *Utr. orbiculata*, *coerulea*, *bifida*, *elachista* u. a.

3. Blasen mit weitem, trichterförmigem Eingang und Rüsselbildung z. B. *Utr. rosea* und *Warburgi*.

Die sehr eingehenden Schilderungen der Blasenformen zeigen, dass diese kleinen Organe eine sehr hohe Ausbildung besitzen.

Was nun das gegenseitige Verhältniss von Ausläufern, Blättern und Blasen betrifft, so ergibt sich zunächst mit grosser Sicherheit, dass Blätter und Ausläufer homologe Organe sind. Diese Homologie kann in verschiedener Weise aufgefasst werden:

1. Die Ausläufer sind Sprosse und demgemäss die Blätter *Phyllocladien*.

2. Die Ausläufer sind umgebildete Blätter.

3. Die morphologische Differenzirung der *Utricularien* ist so wenig durchgreifend, dass Blätter und Sprosse in einander übergehen können.

Die Ansicht, dass die Blätter der *Utricularien* *Phyllocladien* seien, wird durch die Keimung widerlegt. Bei *Utr. montana* tritt zuerst ein Laubblatt und eine Blase auf, bei *Utr. bifida* und *affinis* ein Laubblatt und ein Ausläufer. Wären diese Gebilde Sprosse, so hätten wir den sonst unerhörten Fall, dass am Embryo gleich zwei Sprosse ohne jede Blattbildung entstehen. Ferner stehen die angeblichen *Phyllocladien* und die Ausläufer selbst an den radiären Sprossen stets deckblattlos. Endlich wurde gezeigt, dass Ausläufer an Stelle von Vorblättern von Blüten auftreten können. Daraus folgt, dass wenn man die übliche Unterscheidung von Blatt und Spross beibehalten will, die Ausläufer als umgebildete Blattorgane anzusehen sind. Nun ist aber gezeigt worden, dass diese umgebildeten Blattorgane in vieler Beziehung vollständig Charaktere zeigen, die man sonst als den Sprossen eigenthümlich betrachtet. Es ergibt sich daraus, dass bei den *Utricularien* die Grenze zwischen Blatt und Spross vollständig verwischt ist.

In der dritten weniger umfänglichen Abhandlung behandelt Goebel die Morphologie und Anatomie einiger *Limnanthemum*-arten. Bei *Limnanthemum indicum* und *cristatum* entspringen die Blütenstände aus dem Stiele eines Schwimmblattes. Die Ansicht Eichlers, dass hier die Inflorescenzen ihrem Deckblatt angewachsen seien, ist nicht zutreffend. Vielmehr stehen die Inflorescenzen terminal an einem unten scheidenförmig verbreiterten Spross, an welchem dicht unterhalb des Blütenstandes das nur kurzgestielte Schwimmblatt inserirt ist. Die ganze Pflanze ist sympodial gebaut. Jede Inflorescenz beginnt mit zwei einander annähernd gegenüberstehenden Vorblättern. Das eine ist ein Niederblatt, welches als Achselspross eine neue Inflorescenz besitzt, das andere ein Laubblatt. Das Laubblatt drängt schon frühe den Vegetationspunkt der Inflorescenz zur Seite und stellt sich terminal, so dass der

Anschein erweckt wird, als ob der Vegetationspunkt seitlich am Blattstiel entstände. Der Vegetationspunkt bringt dann zunächst ein weiteres Blatt hervor, deren Achselknospe mit der des Schwimmblattes und mit der Spitze der Inflorescenzachse bei der Blütenbildung betheiligt ist. Aus dem Winkel zwischen dem schwimmenden Blatt und der Inflorescenz geht regelmässig ein vegetativer Spross hervor. In biologischer Beziehung ist zu bemerken, dass die Länge der Inflorescenzachse sich nach der Tiefe des Wassers regelt. Das Schwimmblatt gibt der Inflorescenz Halt und bildet einen Hintergrund, von dem sich die weissen Blüten den Insecten weit sichtbar abheben. Die Assimilationsproducte des Schwimmblattes können den reifenden Früchten auf kurzem Wege zugeführt werden.

Hinsichtlich des anatomischen Baues der Inflorescenzachse und des Blattstieles unterscheiden sich die beiden Sectionen von *Limnanthemum* wesentlich. Während in der Section *Waldschmidtia* ein normaler dicotyler Bau vorhanden ist, zeigen diese Organe in der Section *Nymphacanthæ* ähnliche Verhältnisse wie sie sich bei den *Nymphaeaceen* finden. Ein stärkeres zusammengesetztes Gefässbündel verläuft central; die peripherischen Bündel anastomisiren unter einander und mit der centralen Bündelgruppe.

Limnanthemum aurantiacum bildet lange im Wasser fluthende Sprosse, indem die in der Achsel des Laubblattes der Inflorescenz stehende Knospe die Inflorescenz fortsetzt. Er bildet ebenfalls ein Hochblatt und ein Laubblatt, dessen Achselknospe wieder gleiches Verhalten zeigt, während die Sprossspitze und die Achselknospe des Hochblattes jedesmal mit einer Blüthe endigen. G h g n.

Th. Bokorny, Die Wege des Transpirationsstromes in der Pflanze. Jahrb. f. wiss. Botanik. Bd. 21. Heft 3. 1890.

Sachs hat das Verdienst, die Fehlerquellen der früheren, zur Bestimmung der Transpirationsgeschwindigkeit angewandten Methoden durch ausführliche Untersuchungen festgestellt zu haben. Dieselben sind bekannt. Es liegt kein Grund vor, diese erledigten Fragen noch einmal, dazu mit einer bedauernswerthen Oberflächlichkeit, wie dies in der vorliegenden Abhandlung geschehen, zu behandeln. Wie bekannt, ist schon von Sachs der naheliegende Gedanke zum Versuch gestaltet worden, anstatt der als unbrauchbar erkannten Farbstofflösungen, von transpirirenden Pflanzen Salzlösungen aufnehmen zu lassen, welche durch eine Farbenreaction sich später in den Geweben nachweisen lassen. Er verwandte z. B. Ferrocyankalium, dessen Nachweis durch Eisen- oder Kupferlösung leicht ist. Ohne der Priorität und dem Scharfsinn B.'s Abbruch thun zu wollen, sei die Bemerkung erlaubt, dass das umgekehrte Verfahren in mehreren Laboratorien eingeschlagen wurde, nämlich eine Eisenslösung aufnehmen zu lassen und nachher mit Ferrocyankalium zu reagieren. Der Anlass zur Publication einer Abhandlung wurde darin freilich nicht erblickt. Die hier berührten Versuche wurden auch ganz ausschliesslich zur Demonstration verwendet, dass die genannten gelösten Stoffe in die Holzzellwände eintreten. Wissenschaftliche Folgerungen konnten daraus nicht mehr gezogen werden, nachdem Sachs nachgewiesen, dass mit abgeschnittenen Zweigen oder Pflanzen angestellte Transpirationsversuche ein ganz fehlerhaftes Resultat geben und nachdem derselbe Forscher ferner festgestellt, »dass es ganz unzulässig ist, aus der Färbung gewisser Gewebeschichten zu folgern, dass nur diese allein bei der Fortleitung der färbenden Lösung betheiligt sind«. Damit sind B.'s Versuche eigentlich schon vollständig hinfällig.

Bokorny, welcher die Aufnahme einer Eisenvitriollösung mit dem nachträglichen Nachweis des Eisens durch Ferrocyankalium als eine neue Methode hier der Oeffent-

lichkeit übergibt, begründet die Nothwendigkeit derselben zunächst durch folgende Ausführungen. Ferrocyankalium sei deshalb als Aufnahmelösung unbrauchbar, weil diese Verbindung durch Eiweisstoffe, welche in den Membranen nachgewiesen seien, der wässerigen Lösung entzogen und festgehalten werden können. Abgesehen davon, dass der Eiweisgehalt der Membranen noch viel zu unvollkommen nachgewiesen ist um damit rechnen zu können geht das Eisen, wie bekannt, ebenfalls Verbindungen mit Eiweisstoffen ein. Ausserdem ist gerade der Eisenvitriol eine so leicht veränderliche Substanz, dass das Umwechseln der beiden Salze in Bokorny's Versuchen gar nichts bedeutet. Es ist nur das Zweckmässigere mit dem Unzweckmässigeren vertauscht worden.

Die Rückkehr zu diesen Versuchen überhaupt, welche Sachs nach Benutzung des Lithiums als des besten Indicators, vollständig verworfen, hält der Verf. wegen der zu geringen Genauigkeit der Lithiumversuche für geboten. Das Lithium lässt nach B.'s Ansicht nur Steighöhen in einer gewissen Querzone des Stengels erkennen, während er das Ziel erstrebe, bis auf die einzelne Zelle die Bahnen des Wasserstromes zu verfolgen (p. 470). Wir müssen zu dem Zwecke voraussetzen, dass die Eisensalzmoleküle der Bokorny'schen Lösung in gleicher Geschwindigkeit mit dem Wasser wandern. Nach B.'s eigenen Angaben ist dies aber nicht der Fall. Es wird (p. 472) mitgetheilt, dass an einem in Eisenlösung tauchendem Streifen Filtrirpapiers das Eisensalz auf eine Strecke von 13 cm schon einen ganzen Centimeter zurückgeblieben sei. In welchem Verhältniss diese Genauigkeit zu derjenigen des Lithiumversuches steht, wo die Differenz der Querzonen vielleicht 1 oder 2 Millimeter beträgt, überlassen wir dem Leser zu entscheiden. Bokorny hält die von ihm beobachtete Bindung des Eisenvitriols für nicht erheblich (p. 472). Der Verf. hätte bei seiner ganzen Auffassung dieses Versuches natürlich schliessen müssen, dass der Eisenvitriol in der lebenden Pflanze noch bedeutend mehr hinter dem Wasser zurückbleibe. Für uns hat dieser Filtrirpapierversuch freilich überhaupt gar keinen Werth, da dies Papier allerdings aus Pflanzenfasern, lebendige Pflanzengewebe aber nicht aus Filtrirpapier bestehen und Bokorny offenbar durch einen solchen directen Vergleich zu erkennen giebt, dass er die äusserlich ähnlichen, aber zu ganz anderen Zwecken angestellten Versuche von Sachs vollständig missverstanden hat.

Bokorny hat eine grössere Anzahl Pflanzen, theils abgeschnitten, theils mit den Wurzeln in die Eisenvitriollösung gestellt und auf die Steighöhe des Wassers aus der Reaction mit Ferrocyankalium geschlossen. Die Resultate haben, wie oben erörtert für die Wissenschaft keinen Werth.

Es kam dem Verf. aber vorwiegend darauf an, die Wege des Wassers selbst zu bestimmen. Durchgehends ergab die Reaction mit Ferrocyankalium die Aufnahme des Eisens in die Wandungen des Xylems besonders auch der Gefässe, ferner des Sklerenchyms und Collenchyms. B. hält es für ausgeschlossen, dass das Eisen nur in die Zellwände eingelagert werde, ohne dass diese auch das Wasser leiten. »Diese Befürchtung«, sagt er, »ist nicht zu hegen da eine derartige Zerlegung der Lösung in kaum nennenswerthem Maasse stattfindet (siehe Einleitung)«.

Durch das »siehe Einleitung« enthebt sich B. in bequemer Weise jeder Beweisführung, ohne dass man dort mehr findet als jenen feuchten Streifen Filtrirpapier. Es ist aber ausserdem auch weniger wahrscheinlich, dass gefärbte Gewebe das Wasser nicht leiten, als dass thatsächlich wasserleitende Gewebe sich gar nicht färben, wie Sachs schon nachgewiesen hat. Die ungemeine Feinheit der Bokorny'schen Absicht bis auf Zellen und Zellenbestandtheile die Wasserwege zu erkennen wird durch die völlig verfehlte Methode zum blossen Schein.

Der Verf. hebt wiederholt als Resultat seiner Versuche hervor, dass besonders die Zellwandungen einen Eisengehalt erkennen lassen. Man hält daher seine Versuche zunächst für Beweise für die Imbitionstheorie. Allein p. 500 sagt B. »da die Tracheiden im Sommer Wasser und Luft führen, wie R. Hartig gezeigt hat, so braucht nicht weiter bewiesen zu werden, dass eine Wasserbewegung im Lumen der Organe möglich ist«. — Es wird also ausdrücklich diese der Imbitionstheorie entgegengesetzte Ansicht als richtig anerkannt, von B. aber gleich hinterher gesagt, nach seinen Versuchen gestatte auch die Wand die Fortleitung des Wassers.

Im darauf folgenden Satze heisst es dagegen: »wenn sich das Eisen auch im Lumen vorfindet, lässt sich natürlich aus dem Eisengehalt der Zellwände nicht schliessen, dass das Wasser in diesen emporgestiegen sei! — Diesem haltlosen Gerede gegenüber fragt man wohl mit Recht, was B. denn eigentlich mit seinen Versuchen beabsichtigt.

Unter wasserleitenden Geweben versteht B. solche, welche das Wasser zur Deckung des Transpirationsverlustes leiten. Dieser Erklärung folgt der Satz: »Es ist dabei nicht entscheidend, ob die betreffenden Gewebe als Wassertransportwege in der lebenden unverletzten Pflanze wirklich benutzt werden«. — Der Autor erklärt also Gewebe für Wasserwege, wenn dieselben auch gar nicht in der Pflanze als solche fungiren, womit er sich beiläufig zum Titel seiner Abhandlung in einen vollständigen Gegensatz stellt.

Mit welcher verblüffenden Oberflächlichkeit B. an die ernstesten wissenschaftlichen Fragen herantritt, beweist der mit »Ursachen des Saftsteigens« überschriebene Absatz, in dessen Text sich nicht ein Sterbenswörtchen über diese Ursachen findet. B. hält 20 inhaltlose Zeilen der Bände umfassenden Behandlung dieser Fragen durch die namhaftesten Forscher für gleichwerthig.

Fassen wir die Kritik zusammen, so lässt sich nur sagen: Die Methode kann von vornherein nur zu unsicheren, unklaren oder nichtssagenden Resultaten führen. Thatsächlich ist auch weder für die Ansicht der Wasserbewegung in den Zellwänden noch für diejenige eines Transportes in den Höhlungen der Zellen irgend ein Anhaltspunkt geliefert. Ebensowenig ist es aber möglich aus den Färbungen zu entnehmen, ob noch andere Gewebe als das Holz, wie z. B. das Collenchym etc. sich an der Wasserleitung betheiligen oder nicht. Was aber die nichtgefärbten Gewebe thun, bleibt selbstverständlich im Dunkel. Das Resultat beschränkt sich also nur auf einige blaue Flecke, welche wohl nur in B.'s Augen eine wissenschaftliche Bedeutung haben.

Dr. A. Hansen.

Gustav Hempel und Karl Wilhelm, Die Bäume und Sträucher des Waldes in botanischer und forstwirthschaftlicher Beziehung geschildert. Lief. 1—3. Wien und Olmütz, Verlag von Ed. Hölzel.

Nachdem von diesem Werke die ersten drei Lieferungen vorliegen, ist es möglich sich eine zuverlässige Vorstellung über die Gestaltung des Ganzen zu machen. Es ist dasselbe der Forstbotanik gewidmet, Bäume und Sträucher des Waldes sollen in naturgeschichtlicher und forstwirthschaftlicher Richtung besprochen werden, und zwar so, dass der Text in weitgehendem Maasse durch die bildliche Darstellung unterstützt wird. Demgemäss finden sich in dem Werke nicht nur Holzschnitte (im Texte beigegeben) sondern vor Allem eine grosse Zahl vorzüglicher Farbentafeln. Während die Holzschnitte namentlich anatomische und morphologische Einzelheiten wiedergeben, sind die Farbentafeln den Habitusbildern gewidmet. Diese Tafeln gehören zu den besten Leistungen auf diesem Gebiet, die meisten derselben sind vor-

zöglich gelungen und verleihen deshalb dem Werke einen ganz besonderen Werth. Nur das Grün der Blätter ist in mehreren Fällen nicht ganz natürlich ausgefallen, ganz besonders schön ausgeführt ist dagegen die Darstellung der Coniferenzapfen.

Auch der Text zeigt eine eingehende und sorgfältige Bearbeitung. Dem allgemeinen Theile hätte Referent eine lebensvollere, weniger lehrbuchhafte Darstellung gewünscht. Die Einzelbeschreibungen der einzelnen Waldbäume sind kleine, treffliche Monographien der betreffenden Formen, welche in Verbindung mit den Abbildungen sicher viel zur Verbreitung forstlicher und botanischer Kenntnisse beitragen werden.

K. G.

Dr. Eug. Warming, Handbuch der systematischen Botanik. Deutsche Ausgabe von Dr. Emil Knoblauch. Mit 573 Abbildungen. Berlin 1890.

Eine Uebertragung ausländischer botanischer Werke in das Deutsche hat in den letzten Jahrzehnten nur äusserst selten stattgefunden. In der That ist ja auf den meisten Gebieten, auch dem der Lehr- und Handbücher die »home-production« bei uns eine so ausgedehnte, dass ein Bedürfniss nach Uebersetzungen nicht besteht. Das vorliegende Handbuch füllt aber trotzdem eine Lücke in sehr erwünschter Weise aus. Es ist eine unter Mitwirkung des Verfassers zu Stande gekommene deutsche Bearbeitung des »Handbog i den systematiske botanik«, welches den Fachleuten zwar schon durch seinen sorgfältig und methodisch bearbeiteten reichen Inhalt bekannt, weiteren Kreisen aber wegen der Sprache, in der das Original erschien, nicht zugänglich war. Die neuere Litteratur hat bei der vorliegenden deutschen Bearbeitung eingehende Berücksichtigung gefunden; auch sind zahlreiche morphologische und biologische Angaben aufgenommen worden. Die Anordnung erfolgte in der Weise, dass Formen, welche als weniger einfach, mit reicherer Arbeitstheilung ausgestattet oder als reducirt erscheinen, als jünger angesehen und den »einfacheren« vollzähligeren oder reicheren Formen nachgestellt werden; ein Princip, welches als ausserordentlich lehrreich bezeichnet werden muss, wenn auch natürlich nicht überall die Entscheidung über die Anordnung eine zweifellose ist¹⁾. Von kleinen Ausstellungen, welche dem Ref. bei Durchsicht des Buches aufgestossen sind und wie man sie ja wohl in jedem Werke, welches auf so zahlreiche Einzelheiten Rücksicht zu nehmen hat, wird finden können, seien hier genannt:

pag. 2. Der Generationswechsel der Muscineen ist nicht glücklich charakterisirt wenn gesagt wird I. Vorkeim und das ganze Ernährungssystem II. ein kapselartiger Sporenbehälter mit Sporen. Wesentlich für I ist ja bekanntlich der Besitz von Geschlechtsorganen.

pag. 135. Die Angabe, dass die Schachtelhalme Sporen haben, welche zwei Arten von Vorkeimen entwickeln, ist in dieser Allgemeinheit nicht richtig. Man kann, wie Buchtien gezeigt hat, aus antheridientragenden Vorkeimen archegonientragende erziehen und umgekehrt.

pag. 138 Die Ansicht, die Sporangien seien »eigenthümlich ausgebildete Haare« dürfte denn doch eine veraltete sein. Unrichtig ist die Angabe über die Insertion der Cilien der Farn-Spermatozoiden, dieselben stehen nicht »auf einer Kante des Vorderendes«, wie früher angenommen wurde.

Dass die Farnblätter (pag. 142) zu ihrer Entwicklung mehrerer Jahre bedürfen, gilt nur für eine Anzahl Formen, keineswegs für alle; *Osmunda* trägt die Sporan-

1) Bei den Ranunculaceae z. B. würden wohl die Anemoneae vor die Ranunculeae zu stellen sein, welche letztere viel mehr umgebildete Blüten zeigen.

gien nicht nur »auf dem Rande« der fertilen Blattabschnitte, sondern auch auf der Ober- und Unterseite derselben. Nicht klar ist es Ref. geworden, warum für *Musa Ensete* pag. 226 angeführt ist, »gedeiht auch im Freien, z. B. im Schlossgarten zu Friedrichshafen am Bodensee«. Denn dass *Musa Ensete* im Sommer ausgepflanzt wird, und dann auch recht gut gedeiht¹⁾, ist wohl in jedem botanischen Garten und auch an zahlreichen andern Orten üblich, und anders dürfte es wohl auch in Friedrichshafen nicht sein.

Die Abbildungen (von denen viele Copieen sind) sind mit wenigen Ausnahmen gut und instructiv. Als solche Ausnahmen seien genannt: Fig. 267 (*Colchicum*), 384 (*Nepenthes*), 479 (*Pisum*), 532 und 533 (*Utricularia*; letztere Figur, eine Copie der bekannten Cohn'schen Abbildung, stellt einen schiefen, nicht medianen Blasenlängsschnitt dar, und ist auch bezüglich des Blaseneingangs nicht richtig).

Alles in Allem hält Ref. das vorliegende Buch für die beste Einführung in die systematische Botanik, welche wir derzeit haben.

K. G.

Dr. Ferd. Pax, Allgemeine Morphologie der Pflanzen, mit besonderer Berücksichtigung der Blütenmorphologie. Mit 126 in den Text gedruckten Abbildungen. Stuttgart, Verlag von Ferdinand Enke. 1890. Preis 9 Mark.

Der Verfasser stellt sich als Aufgabe, die Hauptergebnisse der pflanzlichen Morphologie in einem für die Studirenden bestimmten Buche zusammenzufassen. Nach einer kurzen, die allgemeine Differenzirung des Pflanzenkörpers und die Methode der Untersuchung besprechenden Einleitung wird im ersten Theil die Morphologie der Vegetationsorgane geschildert, im zweiten die der Reproductionsorgane.

Was die Art und Weise der Behandlung des Stoffes betrifft, so kann Ref. die Eintheilung des Ganzen nicht für eine glückliche halten. Von den Angiospermen auszugehen und Gymnospermen und Pteridophyten mehr anhangsweise zu betrachten, das mag für die allererste Einleitung in die Morphologie berechtigt sein, weil dieser Gang gestattet an allgemeiner bekannte und leicht zugängliche Verhältnisse anzuknüpfen. Für ein Handbuch aber, welches eine allgemeine Orientirung schon voraussetzt, ist der umgekehrte Weg der richtige. Der Schlüssel für das Verständniss der Blütenbildung liegt bekanntlich bei den Pteridophyten. Eine vergleichende Schilderung von Sporophyll und Sporangium, eine eingehende Darlegung der Blütenbildung der Cycadeen wird dem Studirenden ein klares Verständniss der Verhältnisse der angiospermen Blüten vermitteln, welche keineswegs die einfachsten, sondern die complicirtesten sind, welche wir kennen. Hätte der Verfasser diesen Weg eingeschlagen, so würde er auch wohl kaum die veraltete Ansicht beibehalten haben, dass man (pag. 6) »alle Organe der höher entwickelten Gewächse den morphologischen Begriffen, Wurzel, Achse, Blatt, unterordnen kann«. Das sind eben die Vegetationsorgane, von denen die alte Morphologie die Fortpflanzungsorgane nicht gehörig unterschied. Es ist aber diese Unterscheidung gerade eines der nicht am wenigsten wichtigen Ergebnisse der neueren Morphologie; ist denn z. B. das Archegonium von *Pinus* vielleicht ein Trichom? Oder der Pollensack von *Cycas* eine »Emergenz«? Das wären doch reine Spielereien mit Worten, welche gegenüber den klarerkannten Homologien nicht in Betracht kommen können. Der Verf. versteht ferner unter all-

1) Auf dasselbe kommt es natürlich heraus, wenn die *Musa* im Boden bleibt, aber im Winter unter ein Glasdach kommt.

gemeiner Morphologie offenbar etwas Anderes, als heutzutage wohl die meisten übrigen Botaniker. In einer allgemeinen Morphologie erwartet man die allgemeinen Regeln der Gliederung des Pflanzenkörpers zu finden. Wir finden nirgends z. B. etwas von der Correlation der Organe, von der »Polarität«, von der Einwirkung äusserer Factoren, von der Vererbung, den Rückschlagserscheinungen, von der enge damit zusammenhängenden Frage, inwieweit allen Zellen ursprünglich gleiche Eigenschaften zukommen etc.¹⁾. Dagegen setzt der Verf. auseinander, was man unter einem gelappten, einem gespaltenen, getheilten, geschnittenen etc. Blatte versteht. Das sind Dinge, die meiner Ansicht nach in eine allgemeine Morphologie nicht gehören, es sind das Definitionen, die man sonstwo leicht nachschlagen kann; früher bestand wohl die »Morphologie« in einer blossen Terminologie, welche dem Studirenden das Verständniss der in den Diagnosen verwendeten Kunstausrücke vermitteln sollte, heute ist der Inhalt dieser Disciplin aber ein andrer tieferer geworden.

Im Uebrigen hat der Verf. ohne selbst Neues zu bieten, sich bemüht, das ihm wichtig erscheinende fleissig zusammenzustellen, wobei namentlich anzuerkennen ist, dass er auch ihm ferner stehenden Richtungen, wie der Entwicklungsgeschichte, gerecht zu werden sucht. Nicht zu billigen ist der Ballast von unnöthigen Fremdwörtern, welche es schliesslich noch dahin bringen werden, dass man Botanik nicht ohne Hilfe eines besonderen Lexikons studiren kann. Dahin gehören Proanthesis (pag. 36), Opsigonie und Metanthesis (pag. 37) Thallidien (pag. 45) und Anderes.

Auf einzelne Ausstellungen soll hier nicht weiter eingegangen werden. Erwähnt sei nur, dass die Art und Weise, wie der Verf. die Blattstellung zu erklären versucht, nicht geglückt ist. Er sagt (pag. 64) »daraus würde zunächst eine zweizeilige Anordnung folgen; indess ist ebenso leicht einzusehen, wie bei grösserer Zahl der Blattanlagen am Vegetationspunkt und bei rascher Aufeinanderfolge derselben, die consecutiven Anlagen sich mehr oder minder schief gegenüberstellen müssen, woraus eben eine spirale Anordnung sich mit Nothwendigkeit ergibt«. Das ist ganz unklar.

Dass die Ansicht von Müller über die einfachen Cucurbitaceenranken, welche Pax auf pag. 110 wiedergibt, nicht richtig ist, hätte der Verf. aus meinen und Kaufholz's Angaben ersehen können; bezüglich der Mikrosporen scheinen ihm die neueren Arbeiten entgangen zu sein, welche zeigen, dass die Entwicklung derselben bei allen heterosporen Pteridophyten im Wesentlichen gleich erfolgt.

Die Abbildungen stellen zum grössten Theil Copien dar, deren technische Ausführung (wie es scheint durch Zinkographie) nicht als schön bezeichnet werden kann.

Im Ganzen betrachtet, ist das vorliegende Buch eine recht fleissige Compilation, die in keiner Richtung etwas Neues bringt, allgemeinere Fragen vermeidet, viel zu wenig ausführlich ist, um etwa als Nachschlagewerk dienen zu können und methodologisch theilweise auf einem veralteten Standpunkt steht.

Wir können somit nicht sagen, dass es eine Lücke in der botanischen Litteratur ausfülle.

K. G.

1) Man wende nicht ein, derartige Fragen gehörten in die »Physiologie«. Die Entwicklung der Wissenschaft in den letzten Jahren hat zur Genüge gezeigt, dass Morphologie und Physiologie sich nicht trennen lassen, und auf das Grenzgebiet beider verzichten, heisst gerade den Theil der Morphologie ignoriren, welchem eine reiche Zukunft gehört.

Dr. Carl Müller, Medicinalflora. Eine Einführung in die allgemeine und angewandte Morphologie und Systematik der Pflanzen, mit besonderer Rücksicht auf das Selbststudium für Pharmazeuten, Mediciner und Studirende bearbeitet. Mit 380 in den Text gedruckten Figuren. Berlin, Verlag von Julius Springer. 1890. Preis 8 Mark.

Einem neuen Lehrbuch wird man zunächst — bei der Menge der schon vorhandenen — mit einem gewissen Misstrauen entgegenkommen. Das vorliegende Buch hat indess die Aufgabe, die es sich stellte, in trefflicher Weise gelöst, und kann den auf dem Titel genannten Kreisen bestens empfohlen werden. Es soll dem Selbststudium der Botanik (namentlich für Pharmazeuten) in der Zeit vor dem akademischen Studium dienen und es erfüllt diesen Zweck, indem es — ohne »höhere« wissenschaftliche Prätensionen — in klarer präziser Weise das vorträgt, was dem Pharmazeuten etc. vor Allem zu wissen wichtig ist. Auch die Abbildungen sind, wenn auch vielfach nicht gerade schön ausgeführt, zum grössten Theil recht zweckentsprechend; bei einer zweiten Auflage wäre eine ausgedehntere Beigabe von Habitusbildern erwünscht, die aber nicht zu klein sein dürfen. Wer z. B. die Sagopalme (*Metroxylon Rumphii*) nach der (einem andern Lehrbuch entlehnten) Fig. 107 erkennen wollte, würde sich unter den Fiederpalmen wohl schwer zu einer Wahl entschliessen können. Auch einige andere Habitusbilder, z. B. die der Ophrydeen, lassen zu wünschen übrig. Im Texte würden einige Streichungen (namentlich von terminologischen Anführungen und morphologischen Einzelheiten) von Vortheil sein.

Es ist dem Buche in pharmazeutischen Kreisen (die in der That, wie der Verf. in dem Vorwort richtig bemerkt, das grösste und strebsamste Contingent der Hörer botanischer Vorlesungen stellen) eine weite Verbreitung zu wünschen, da es dem Zwecke, der auf dem Titel angegeben ist, gerecht wird, und eine gute Grundlage für weitere Studien darbietet.

K. G.

Eingegangene Litteratur.

- Beck v. Mannagetta, Einige Bemerkungen zur systematischen Gliederung unserer Cruciferen. S.-A. aus d. Sitzungsberichten der k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft in Wien. Bd. XL, 5. März 1890.
- — Die Nadelhölzer Niederösterreichs. S.-A. aus den Blättern des Vereins für Landeskunde von Niederösterreich. Jahrgang 1890.
- Bennet, Reproduction among the lower forms of vegetable life. From Trans. Biol. Soc., L'pool. Vol. IV. 1890.
- Büsgen, Untersuchungen über normale und abnorme Marsilienfrüchte. S.-A. aus »Flora«. Heft II. 1890.
- Burck, Ueber Kleistogamie im weiteren Sinne und das Knight-Darwin'sche Gesetz. Aus dem Holl. Manuskript übersetzt von Dr. P. Herzson. Extrait des Annales du Jardin Botanique de Buitenzorg. Vol. VIII.
- Coulter and Evans, A Revision of North American Cornaceae. I. From the Botanicae Gazette. vol. XV. No. 2.
- Denkschriften der kgl. bayr. bot. Gesellschaft zu Regensburg. 6. Bd. Inhalt: Singer, Geschichte der k. b. bot. Gesellschaft in Regensburg. Arnold, Die Lichenen des fränkischen Jura. Weiss, Beiträge zur Kenntniss der Korkbildung.

- Fischer, Emil, Synthese der Mannose und Lävulose. S.-A. aus d. Ber. der deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XXIII. Heft 3.
- — Synthese des Traubenzuckers. S.-A. aus d. Ber. d. deutschen Chemischen Gesellschaft. Jahrg. XXIII. Heft 5.
- Fritsch, Beiträge zur Kenntniss der Chrysobalanaceen. II. Descriptio specierum novarum Hirtellae, Conepiae, Parinari. S.-A. aus den Annalen des k. k. naturhist. Hofmuseums. Bd. V.
- Garcke, Was ist aus *Astropus tomentosus* Spr. geworden? S.-A. aus Engler's bot. Jahrbüchern. 11. Band. 5. Heft. 1890.
- — Ueber *Cassine domingensis* Spr. S.-A. aus Engler, bot. Jahrbücher. XI. Band. 4. Heft.
- Gibson u. Miss Warham, Note on the stinging hairs of *Urtica Dioica*. S.-A. aus Proc. L'pool Biol. Soc. vol. IV. Pl. I.
- Guignard, Sur la localisation dans les amandes et le laurier-cerise des principes qui fournissent l'acide cyanhydrique. Extr. du Journal de Pharmacie et de Chimie. 1890.
- — Réponse à la dernière note de M. Van Beneden fils. Extrait des comptes rendus des séances de la Société de Biologie. 1er mars 1890.
- — Etude sur les phénomènes morphologiques de la fécondation. Extrait du Bulletin de la Société botanique de France. Tome XXXVI.
- Haberlandt, Das reizleitende Gewebesystem der Sinnpflanze. Leipzig, Wilh. Engelmann.
- Hansen, A., Die Ameisenpflanzen. Aus: »Prometheus« No. 25.
- Hegelmaier, Ueber einen Fall von abnormer Keimentwicklung. S.-A. aus »Jahreshefte des Vereins für vaterl. Naturkunde in Württ.« 1890.
- Heinricher, Ueber einen eigenthümlichen Fall von Umgestaltung einer Oberhaut und dessen biologische Deutung. S.-A. aus den Sitzungsberichten der kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien. Math.-naturw. Classe; Bd. XCIX, Abtheilung 1. Febr. 1890.
- Jost, Die Erneuerungsweise von *Corydalis solida* Sm. S.-A. aus der Bot. Zeitung 1890. No. 17—19.
- Kamiencki, Recherches sur la famille des Lentibulariées (Utriculariées). Odessa 1890. (Russisch).
- Kihlmann, Bericht einer naturwissenschaftlichen Reise durch Russisch Lappland im Jahr 1889. S.-A. aus Fennia, Bulletin de la Société de Géographie de Finlande, 3, No. 6.
- und Palmén, Die Expedition nach der Halbinsel Kola im Jahr 1887. S.-A. aus Fennia, Bulletin de la Société de Géographie de Finlande, 3, No. 5.
- Klein, L., Ueber den Formenkreis der Gattung *Volvox* und seine Abhängigkeit von äusseren Ursachen. S.-A. aus »Hedwigia«. 1890. Heft 1.
- — Vergleichende Untersuchungen über Morphologie und Biologie der Fortpflanzung bei der Gattung *Volvox*. S.-A. aus Berichte der Naturforschenden Gesellschaft zu Freiburg i. B. Band V. Heft 1.
- Koch, L., Die Paraffineinbettung und ihre Verwendung in der Pflanzenanatomie. S.-A. aus Pringsheim's Jahrbüchern für wissensch. Botanik. Bd. XXI. Heft 3.
- Koehne, Die Gattungen der Pomaceen. Wissenschaftl. Beilage zum Programm des Falk-Realgymnasiums zu Berlin. Ostern 1890.
- Krabbe, Untersuchungen über das Diastaseferment unter specieller Berücksichtigung seiner Wirkung auf Stärkekörner innerhalb der Pflanze. S.-A. aus Pringsheim's Jahrbüchern für wissensch. Botanik. Band XXI. Heft 4. 1890.
- Lindberg, Eine merkwürdige *Euphorbia*. S.-A. aus »Gartenflora«. 37. Jahrgang.
- — *Rhipsalis pulvinigera* G. A. Lindberg u. sp. S.-A. aus »Gartenflora«. Jahrgang 1889. Heft 7.
- — *Rhipsalis Regnelii* G. A. Lindberg u. sp. S.-A. aus »Gartenflora«. Jahrgang 1890. Heft 5.
- — *Lepismium* (?) *dissimile* G. A. Lindberg u. sp. S.-A. aus »Gartenflora«. Jahrgang 1890. Heft 7.
- Mattiolo, Sulla funzione della Linea lucida nella cellule Malpighiane. Estr. dagli Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino. vol. XXV.
- — Sul valore sistematico della *Saussurea depressa* Gren., nuova per la Flora Italiana. Aus: Malpighia, anno III. vol. III.

- Migula, Die Characeen. Rabenhorst's Kryptogamen-Flora. 5. Bd. 2. u. 3. Lieferung.
- Müller, Ferd. v., Second systematic census of Australian plants, with chronologic, literary and geographic annotations. Part. I. Vasculares. Melbourne 1889.
- — Inaugural adress. Reprinted from the Transactions of the Australasian Association for the Advancement of Science
- — Brief report on the Papuan Highland plants, gathered during Sir William Macgregor's expedition in May and June 1889.
- Pax, Allgemeine Morphologie der Pflanzen. mit bes. Berücksichtigung der Blütenmorphologie. Verl. v. Ferdinand Enke, Stuttgart. 1890.
- Proceedings of the California Academy of Sciences. Vol. II.
- v. Sachs, History of Botany (1530—1860). Authorised translation by Henry E. F. Garnsey, M. A. Oxford, Clarendon Press.
- Schiffner, Lebermoose (Hepaticae) mit Zugrundelegung der von Dr. A. C. M. Gottsche ausgeführten Vorarbeiten. Aus »Forschungsreise S. M. S. »Gazelle«. IV. Theil: Botanik (Lebermoose).
- Schütt, Ueber Peridineenfarbstoffe. S.-A. aus den Berichten der Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrgang 1890. Band VIII.
- Schwendener, Die Mestomscheiden der Gramineenblätter. S.-A. aus d. Sitzungsberichten der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin. XXII.
- Scott, On some recent progress in our knowledge of the anatomy of plants. Annals of Botany. Vol. IV. No. XIII.
- Setchell, Concerning the structure and development of *Tuomeya fluviatilis*, Haro. Reprinted from the Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. XXV.
- Solms-Laubach, Die Sprossfolge der *Stangeria* und der übrigen Cycadeen. S.-A. aus der Bot. Zeitung. 1890. No. 12—15.
- Staes, De Korstmossen (Lichenes). Overgedrukt uit Botanisch Jaarboek uitgegeven door het Kruidkundig genootschap *Dodonaea* te Gent. Tweede Jaargang. 1890.
- Stitzenberger, *Lichenaea Africana*. St. Gallen. In Commission bei A. und J. Köppel. 1890.
- Strasburger, Die Vertreterinnen der Geleitzellen im Siebtheile der Gymnospermen. 1890. XIII. S.-A. aus den Sitzungsberichten der kgl. preuss. Akademie der Wissenschaften zu Berlin.
- Sturgis, On the carpologic structure and development of the Collemaceae and allied groups. Reprinted from the Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences. Vol. XXV.
- Volken, Ueber Pflanzen mit lackirten Blättern. S.-A. aus d. Ber. d. Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrg. 1890. Band VIII.
- Warming, Handbuch der systematischen Botanik, deutsche Ausgabe mit 573 Abbildungen. Berlin, Gebrüder Bornträger.
- — Om Caryophyllaceernes Blomster. Særtryk af den botaniske Forenings Festskrift. Kjøbenhavn 1890.
- Weiss, J. E., Beiträge zur Kenntniss der Korkbildung. S.-A. aus »Denkschriften der kgl. bayr. Botanischen Gesellschaft zu Regensburg«. VI. Band.
- Zimmermann, Beiträge zur Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle. Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung, Tübingen.
- — Ueber die Chromatophoren in panachirten Blättern. S.-A. aus d. Ber. der Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrgang 1890. Band VIII. Heft 3.
- — Botanische Tinctiionsmethoden. S.-A. aus der Zeitschrift für wissensch. Mikroskopie u. für mikr. Technik. Band VII. 1890.



Die Nährschicht der Samenschalen.

Von

△ J. Holfert.

(Hierzu Tafel XI und XII.)



Der Bau der Samenschalen, einzelner Arten sowohl, wie ganzer Gattungen, ist bereits häufig Gegenstand eingehender Untersuchung gewesen. Alle darauf bezüglichen Arbeiten jedoch, mögen dieselben monographischer Natur sein oder die Systematik einzelner Gattungen zum Zweck haben; oder mögen ihnen principielle Fragen zu Grunde liegen, sind im Wesentlichen rein anatomisch. Nur hier und da finden sich, besonders unter den Arbeiten der letzteren Art, Andeutungen über die Physiologie der Samenhülle. Dieselben sind im Verhältniss zu der übrigen, reichen Samenschalen-Litteratur jedoch nur spärlich zu nennen. Es kommen von diesen Notizen die in den Arbeiten von Marloth ¹⁾, Tschirch ²⁾, Haberlandt ³⁾ enthaltenen Angaben allein in Betracht. Alles daselbst erwähnte jedoch bezieht sich auf die Funktion der Hartschichten (Sclereïdenschichten Tschirch).

Ueber die übrigen, dünnwandigen Gewebeparthieen der Samenschale sind zusammenhängende Untersuchungen überhaupt noch nicht vorgenommen worden. Wenngleich sich auch hierüber gelegentliche Bemerkungen allenthalben vorfinden, so hat man doch planmässig diese Gewebe auf ihre physiologische Bedeutung noch nicht studirt und alle später zu erwähnenden Bemerkungen in entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten sind nur gelegentliche. Die Bedeutung der im reifen Samen oblitterirten oder nicht oblitterirten, zartwandigen Gewebeelemente erwähnt erst Tschirch. Auch der Name »Nährschicht bez. Nährgewebe der Samenschalen« wurde diesem Gewebe von Tschirch gegeben. Derselbe sagt darüber ⁴⁾ folgendes:

»Wenn man Samen anatomisch untersucht, so findet man fast regelmässig, meist unter der sogenannten Hartschicht, d. h. der sclerenchymatischen Hülle, eine Zone, die in den Lehrbüchern als »collabirt, oblitterirt« oder dergleichen beschrieben wird (*Lupinus luteus*). Diese Zone oblitterirter Zellen ist aber nur im reifen Samen in diesem Zustande vorhanden, im unreifen Samen sind die Zellen ganz normal ausgebildet,

1) Marloth, Mechanische Schutzmittel der Samen. Engler's botan. Jahrb. 1883, IV. Bd., III. Heft.

2) Tschirch, Beitr. z. Kenntn. d. mech. Gew.-Systems. Pringheim's Jahrb. Bd. 16, S. 312.

3) Haberlandt, Physiologische Pflanzenanatomie, S. 275. Leipzig 1884. — Haberlandt, Schutzeinrichtungen d. Entw. der Keimpflanze.

4) Tschirch, Angewandte Pflanzenanatomie S. 459. Wien 1889.

führen reichlich Wasser, Stärke, ja sogar Chlorophyllkörner. Diese Schicht, der ich den Namen »Wassergewebe« oder, da sie im unreifen Samen stets ¹⁾ transitorische Stärke führt, »Nährschicht« gegeben habe, dient dazu, den reifenden Samen mit Wasser und Nährstoffen zu versorgen und seine völlige Entwicklung zu sichern. Sobald der Same reif geworden ist, fällt diese Schicht für gewöhnlich so stark zusammen, dass — wie beim Keratenchym — die Zelllumina nur als zarte Linien noch erkennbar sind. Bei *Lupinus luteus*, wo ich ihr Verhalten beim Reifen genau verfolgt habe, sinkt in Folge dessen die Dicke der Samenschale beim Reifen des Samens auf die Hälfte herab«.

Im Anschluss hieran ertheilte mir Herr Professor Tschirch die Aufgabe, einestheils über die Verbreitung der Nährschicht bei den Samenschalen einzelner Pflanzenfamilien Untersuchungen anzustellen und andernteils an der Hand eines so gewonnenen, umfangreichen Materials die anatomischen Verhältnisse sowie die physiologische Bedeutung der Nährschicht weiter zu studiren.

Dass die Lösung meiner Aufgabe in dem gesteckten Rahmen nicht im Entferntesten erschöpfend sein kann, da ich nur die hauptsächlichsten Familien und aus diesen nur je einige, oder gar nur einen Vertreter heranziehen konnte, liegt auf der Hand; doch glaube ich, nichtsdestoweniger ein Bild zu geben, welches in Combination mit dem über Samenschalen der einzelnen Familien bereits Bekannten, Folgerungen auf verwandte Arten und selbst Gattungen in allgemeinen Umrissen nicht unberechtigt erscheinen lässt. Andererseits jedoch enthalte ich mich, bezüglich der Verbreitung der Nährschicht, jeder Muthmassung und Verallgemeinerung, denn die Erfahrung hat gelehrt, dass der Bau der Samenschalen innerhalb einzelner Familien ein sehr verschiedener sein kann. Während bei manchen Familien (Papilionaceen, Dipsaceen, Compositen, Umbelliferen, Gramineen) ein allgemeiner Bauplan in allen untersuchten Fällen zur Erscheinung kommt, sind bei anderen die Verschiedenheiten so gross, (Rosaceae, Papaveraceae, Ranunculaceae) dass selbst von Andeutungen eines gemeinsamen Bauplanes nicht mehr die Rede sein kann.

Nächst der Verbreitung der Nährschicht interessiren zunächst Art und Wesen derselben und sodann die Fragen: Welche Aufgabe fällt dieser Schicht während der Entwicklung des Samens und welche Aufgabe nach der Reife desselben zu? sowie zweitens: Wodurch wird die Nährschicht bei denjenigen Samenschalen, denen sie mangelt, ersetzt, beziehentlich warum ist hier ihre Anwesenheit nicht nothwendig?

Beide Fragen werden durch eine grosse Anzahl von Nebenfragen complicirt, welche sich in logischer Folge aus den Hauptfragen entwickeln und ihre Beantwortung greift stellenweise ineinander.

1) Wir werden unten sehen, dass es einige wenige Ausnahmen giebt.

Die principielle Lösung dieser Fragen wird die Aufgabe des folgenden Allgemeinen Theiles meiner Arbeit sein. In dem zweiten Speciellen Theile finden sich dann die Belege dafür. Mit der im zweiten Theil enthaltenen Wiedergabe meiner Einzelbeobachtungen beantwortet sich gleichzeitig die Frage nach der Verbreitung der Nährschicht, soweit ich diese feststellte, von selbst.

Allgemeiner Theil.

Um in allen Punkten richtig verstanden zu werden, ist es nöthig, folgende Definition der Nährschicht vorzuschicken.

»Die Nährschicht der Samenschalen ist ein (transitorisches) Speichergewebe und besteht aus Parenchymzellen, deren Inhalt während des Reifungsprocesses zu secundären Membranverdickungen anderer Gewebeparthien der Samenschale verbraucht wird. Die Nährschicht tritt in einer oder in zwei, durch Hartschichten getrennten Lagen auf. Im reifen Samen hat das Gewebe der Nährschicht seine Bestimmung erfüllt und ist meist ganz oder theilweise obliterirt«.

Ferner muss ich vorausschicken, dass meine Untersuchungen, hiervon ausgehend, folgende drei Typen ergaben, welche dem zweiten, Speciellen Theile zu Grunde gelegt sind.

Typus I. Es sind einerseits eine, beziehentlich mehrere Nährschichten und andererseits Zelllagen mit secundären Membranverdickungen (Hart- oder Schleimschichten oder starkwandige Zelllagen) vorhanden.

Typus II. Es ist eine Nährschicht vorhanden, dagegen fehlen Zelllagen mit secundären Membranverdickungen.

Typus III. An Stelle der Nährschicht ist ein nicht obliterirendes Parenchym vorhanden. Zelllagen mit secundären Membranverdickungen fehlen.

Die Erfahrung lehrte, dass in den weitaus meisten Fällen Typus I auftritt und zwar vertheilen sich die 174 untersuchten Samenschalen nach der Proportion: Typus I : II : III = 139 : 19 : 12, also rund etwa wie 14 : 2 : 1. Da die Wahl des Untersuchungsmaterials eine durchaus unbeeinflusste war, und nur von dem Bestreben geleitet wurde, die verschiedensten Familien heranzuziehen, da ferner aber von umfangreichen Familien auch eine entsprechende Anzahl Gattungen zur Verwendung kam, so steht zu erwarten, dass das hier gefundene Verhältniss auch annähernd das in der Natur thatsächlich obwaltende sein dürfte.

Beiläufig muss ich noch erwähnen, dass ich den Begriff »Samenschale« im entwicklungsgeschichtlichen Sinne gebrauche und darunter nur die

aus dem, bez. aus den Integumenten hervorgegangenen Schichten verstehe, nicht wie Marloth und Haberlandt, von denen Ersterer¹⁾ die Fruchtschalen der Caryopsen, Letzterer²⁾ auch das Endosperm der Samen zur Samenschale rechnet.

Anatomisch richtig ist das Parenchym der Nährschicht zwar in den meisten entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten beschrieben worden, nicht so aber bei den Untersuchungen reifer Samen; denn wie schon Schleiden darauf hinwies, dass eine Beschreibung der fertigen Samenschalen bezw. deren einzelnen Schichten ohne Berücksichtigung der Entwicklungsgeschichte derselben eine unzulängliche sei³⁾, so hat auch in der That die Nährschicht in allen Fällen, wo reife Samenschalen beschrieben wurden, eine falsche Beurtheilung erfahren. Zum Mindesten aber hat sie wegen ihrer unscheinbaren, oft ohne Quellungsmittel kaum erkennbaren Form, eine meist nur nebensächliche Berücksichtigung gefunden. Von entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten sind zu nennen diejenigen von Bachmann⁴⁾, Lohde⁵⁾, Fickel⁶⁾, Haberlandt⁷⁾, Röber⁸⁾, Kudelka⁹⁾, sowie auch ferner die von Uloth¹⁰⁾ und Chatin¹¹⁾.

Beschreibungen reifer Samenschalen lieferten unter Anderen Harz¹²⁾, Nobbe¹³⁾, Chalon¹⁴⁾, Schroeder¹⁵⁾, Sempolowski¹⁶⁾, Strandmark¹⁷⁾. Ferner

1) Marloth, Ueber mechan. Schutzmittel d. Samen.

2) Haberlandt, Die Schutzzeitr. in der Entwickl. der Keimpflanze. — Haberlandt, Ueber d. Entw.-Gesch. u. d. Bau der Samenschale bei Phaseolus.

3) Schleiden, Grdzge. d. wissensch. Botan. Leipzig 1850. S. 386.

4) Bachmann, Darstlg. der Entw.-Gesch. u. d. Baues d. Samensch. d. Scrofularineen. Halle 1881 und Nova acta der Kaiserl. Leop. Carol. Deutsch. Acad. d. Naturforsch. Bd. XLIII. No. 1.

5) Lohde, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau einiger Samensch. in: Schenk-Luerssen Mittheilungen. II. 1.

6) Fickel, Ueber die Entw.-Gesch. d. Samensch. einiger Cucurbitac. Bot. Ztg. 1876, S. 738.

7) Haberlandt, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau d. Samensch. bes. d. Gattung Phaseolus. Sitzber. d. Acad. d. Wissensch. Wien. Bd. LXXV. 1. Abth. 1877.

8) Röber, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau einiger Samensch.

9) Kudelka, Ueb. d. Entw.-Gesch. u. d. Bau der Frucht- u. Samensch. unserer Cerealien.

10) Uloth, Ueb. Pflanzenschleim u. s. Entst. i. d. Samenepid. v. Plantago maritima u. Lepidium sativum. Flora 1875.

11) Chatin, Etudes sur le développement de l'ovule et de la graine dans les Scrofularinées, les Solanées, les Borraginées et les Labiées. Annales des sciences natur. Ser. V. 1. 19. 1874.

12) Harz, Landwirtschaftliche Samenkunde.

13) Nobbe, Handbuch der Samenkunde.

14) Chalon, La graine des Légumineuses.

15) Schroeder, Landw. Versuchstationen. Bd. XIV. S. 179.

16) Sempolowski, Landw. Jahrbücher des Preuss. Staats. Bd. III. 1874. S. 854.

17) Strandmark, Bidrag till kännedom om fröskalets byggnad. Lund 1874.

finden sich Abbildungen in Tschirch's Anatomie und anderen Handbüchern.

Die Beschreibung der obliterirten Nährschicht ist in diesen Arbeiten, wie schon erwähnt, theilweise unzutreffend zu nennen. So bezeichnet beispielsweise Nobbe¹⁾ die obliterirte Nährschicht der Papilionaceen als »aus flachen, etwas schwellkräftigen, korkähnlich verzerrten Zellen« bestehend.

Harz nennt das obliterirte Gewebe theilweise »gequollenwandig«. Ich habe dies in den betreffenden Fällen unzutreffend gefunden und vermuthet, dass diese Täuschungen auf den Zusatz von Quellungsmitteln (Kalihydrat oder zuweilen schon Wasser) zurückzuführen sind.

Sempolowski behandelt die Nährschicht der Papilionaceen und Cruciferen sehr kurz. Er scheint derselben keinerlei Bedeutung zuzuschreiben und enthält sich jeder Vermuthung über deren physiologische Funktion.

Bachmann bezeichnet die Nährschicht im obliterirten Zustande in ihrer ganzen Mächtigkeit als eine »dünne Lamelle« und glaubt an ihre Resorption. An anderer Stelle²⁾ nennt er sie (bei *Rhinanthus*) eine Lage mit paralleler Strichelung.

Auch physiologische Deutungen wurden, wie schon erwähnt, gelegentlich, meist anhangweise versucht. Als im Allgemeinen richtig sind darunter diejenigen von Lohde und Röber zu bezeichnen.

Lohde sagt am Schlusse seiner Arbeit: »Findet man in der reifen Samenschale Zelllagen, deren Beschaffenheit nicht auf einen physiologischen Zweck schliessen lässt, so sind es Ueberreste von Zellparthieen, welche durch die Produktion von Bildungstoffen einen bedeutenden Antheil an denjenigen Theilen der Testa nahmen, welche für den reifen Samen so wichtig wurden. Sie bereiteten das, was die anderen Zellparthieen zum Besten des ganzen verwertheten«.

Röber äussert sich über die Nährschicht folgendermassen: »Auffallend ist die Erscheinung, dass alle mit homogenem Plasma erfüllte Zellen während den mittleren Entwicklungsstadien eine bedeutende Grösse erreichen, aber dünnwandig bleiben, oft bis zum Verschwinden zusammengepresst werden und überhaupt für den reifen Samen ohne Werth sind«.

Bachmann dagegen äussert sich am Schlusse seiner Arbeit (Ueber die Samenschalen der Scrofularineen), welche sich sonst durchaus im Rahmen dieser Ueberschrift hält, merkwürdigerweise folgendermassen: »Fast in jedem Samen, gleichviel aus welcher Familie er stammt, ist ein Theil des ehemaligen Gewebes des Integuments zu einer dünnen Lamelle zusammengepresst oder resorbirt worden. Der Zusammendrückung und Resorption seitens des Endosperms oder Embryos gehen allerlei Veränderungen in

1) a. a. O. S. 80.

2) a. a. O. S. 160.

dem betreffenden Gewebe voraus, welche unter dem Namen des Degenerationsprocesses zusammengefasst werden können. Derselbe besteht in einer allmählichen Abrundung der Zellen, womit das Auftreten von Inter-cellularräume zusammenhängt und in einem damit Schritt haltenden Verluste des Inhalts und schreitet stets centrifugal vorwärts, d. h. so, dass zuerst die innerste Schicht davon ergriffen wird und schon völlig zusammengepresst sein kann, während die Zellen der äusseren Lagen noch ihre geraden Conturen und all ihren Inhalt haben; denn diese werden zuletzt zusammengedrückt. Es verdient das umsomehr der Hervorhebung als es von manchem derjenigen Forscher, welche Samenschalen untersucht haben, gar nicht erwähnt worden ist, obwohl aus den Abbildungen, die sie ihren Schriften beigegeben haben, ersichtlich ist, dass sie den centrifugalen Fortschritt des Degenerationsprocesses wohl bemerkt haben«.

Auf die Wiederlegung dieses »Degenerationsprocesses« komme ich an anderer Stelle zurück.

Nach diesem historischen Exkurs komme ich nunmehr zu der Entwicklungsgeschichte der Nährschicht.

Das Gewebe der Nährschicht ist meist in einer oder mehreren Zellreihen, welche sich von den übrigen nach Form und Inhalt nicht unterscheiden, am Integumentartheile der unbefruchteten Samenknospe bereits vorhanden. In anderen Fällen entsteht es erst nach der Befruchtung durch tangential Theilungen aus Zellreihen, denen später eine andere Funktion zufällt. Fast in allen Fällen aber vermehrt sich die Anzahl ihrer Zellreihen nach der Befruchtung, und zwar zuweilen sehr bedeutend. So kommen bis dreissig Zellreihen vor bei *Lupinus*¹⁾ und *Paeonia*; andererseits aber besteht die Nährschicht aus nur zwei Zellreihen bei den Gramineen und der Mehrzahl der Umbelliferen, endlich aus einer einzigen Zellreihe bei *Stellaria*.

Das Gewebe der Nährschicht besteht, entsprechend seiner physiologischen Aufgabe, stets und ausnahmslos aus Parenchymzellen typischer Form, mit Inter-cellularen und dünnen unveränderten tüpfellosen Cellulosemembranen, welche eine rasche Füllung, bezüglich Entleerung durch Osmose ermöglichen. Die Zellen haben zur Zeit der Höhe ihrer Funktionsdauer einen deutlichen Zellkern und sind mit einem mehr oder weniger feinkörnigen Protoplasma erfüllt²⁾.

Dasselbe enthält oft Chlorophyllkörner, welche theilweise im obliterirten Gewebe der reifen Samenschale als schwarzbräunliche Massen noch vorhanden sind (*Cannabis*, *Lupinus*, *Brassica*, *Sinapis*, *Carum*, *Foeniculum*, *Cyclanthera*, *Cucurbita*).

1) Fig. 1, 2, 3.

2) Fig. 1.

Sehr häufig ist das Auftreten von transitorischen Stärkekörnern, durch welche oft das Lumen bis zur völligen Verdrängung des plasmatischen Inhalts erfüllt wird (*Cuscuta*, *Vincetoxicum*, *Linum*).

In einigen Fällen hat die Bildung transitorischer Stärke bereits vor der Befruchtung begonnen (so bei *Linaria*, *Triticum*), in den meisten Fällen aber fällt der Beginn ihres Auftretens kürzere oder längere, zuweilen auch beträchtliche Zeit nach der Befruchtung.

Auch die Speicherdauer ist eine sehr verschiedene, indem, je nachdem der Ausbau der Hartschichten früher oder später stattfindet, die Entleerung eine raschere oder langsamere ist. Im reifen Samen ist das obliterirte Gewebe bis auf vereinzelte Chlorophyllkornreste völlig leer.

Die Grösse der Stärkekörner beträgt durchschnittlich 0,7 bis 17 μ . Am häufigsten vorkommende Werthe sind 2 bis 6 μ . Diese Grösse pflegen die Körner in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu haben, wo eine Nährschicht vorhanden ist. Wo mehrere Nährschichten vorliegen, sind die Stärkekörner der innersten meist am kleinsten; die äusseren sind grösser und haben Formen, welche man sonst bei transitorischer Stärke meist nicht, sondern nur bei Reservestärke anzutreffen gewöhnt ist.

So sind bei *Linum* die Stärkekörner der innersten Nährschicht 1 bis 2,7 μ gross, die der äusseren 3 bis 8 μ und die der Epidermis 6 bis 10 μ .

Bei *Cuscuta* sind die Körner der Nährschicht sowohl wie die der Epidermis bis 17 μ gross. Die Körner sind in beiden Geweben einfach oder zu zweien und auch häufig zu dreien zusammengesetzt, ohne Schichtung, mit meist fehlender, doch wo vorhanden, spaltenförmiger Kernhöhle. Bei *Cuscuta*, wo der Stärkevorrath ein so ausserordentlicher ist, fand ich übrigens auch Stärkekörner noch vereinzelt in der obliterirten Nährschicht des reifen Samens. Es ist also hier der Fall eingetreten, wo die Zufuhr der Baustoffe etwas zu reichlich bemessen war.

In allen Fällen nimmt der Stärkegehalt von innen her ab, und in dem Maasse wie dieser Reservestoff einerseits verschwindet, wachsen die Membranverdickungen der Sclereiden- oder Schleimschichten. Die dieselben versorgende Nährschicht liegt meist in radialer Folge innerhalb der Orte des Verbrauchs und die Wanderung der Baustoffe entspricht in den meisten Fällen völlig der osmotischen Strömung, welche von dem an der Chalaza sich meist in die Samenschale verzweigenden Gefässbündel der Raphe in der Richtung der Längsachse der Samenknospe einmal und zweitens in radialer Richtung innerhalb der parenchymatischen Elemente stattfindet. Dem entsprechend wurden die ersten Stärkekörner stets in der Nähe der Chalaza wahrgenommen, von wo aus die Füllung der Zellen bis zur Mikropyle ringsum fortschreitet. Ausnahmslos auch konnte ich, wo Gefässbündel in der Samenschale vorkommen, die Nährschicht als die dieselben führende Schicht identificiren. Dass auch alle anderen,

nicht so deutlich wie Stärke in Erscheinung tretenden Stoffe den gleichen Weg verfolgen, steht ausser Zweifel.

Das Auftreten der Stärke ist in die Augen springend und weist am deutlichsten auf die physiologische Funktion der Nährschicht hin. Würden die peripherischen Sclereidenreihen sofort zum Ausbau gelangen, so würde rückwirkend die Zufuhr weiteren Kohlehydrat-Materials abgeschnitten werden. Denn diese Zufuhr ist nicht allein durch den Wurzeldruck, sondern durch die Verdunstung der das Material herbeischaffenden Wassermenge andererseits bedingt. Um diese nicht zu hemmen, finden die secundären Membranverdickungen der peripherischen Hartschichten und Schleimschichten erst dann statt, wenn das Material in unmittelbarer Nähe und in genügender Menge abgelagert ist. So gehört die Nährschicht in die Reihe der transitorischen Reservebehälter, wie die Wurzelknöllchen der Leguminosen und die Stärkescheide (Heine).

In den meisten Fällen ist es die secundäre unveränderte nicht quellende Membran der Sclereiden, welche in erster, zweiter, dritter oder vierter Schicht als Makro-, Brachy- und zuweilen Osteosclereiden¹⁾ einfach oder mehrreihig den Samen umschliessen oder die oft nur einseitig verdickte Epidermis, welche aus dem Kohlehydratmaterial der Nährschicht hervorgeht. In anderen, wenigen Fällen dagegen entsteht daraus die äusserst quellungsfähige Membran der Schleimepidermis²⁾ (*Linum*, *Sinapis* und andere Cruciferen, *Cydonia*, *Plantago*, *Cuscuta*) oder anderer, innerer Schleimschichten (*Berberis*). Hier wird Stärke in grossen Mengen als Material zur Bildung der Schleimmembran herbeigeführt und ebenfalls eine geraume Zeit hindurch bis zum Verbrauch aufgespeichert. Diese Stärkekörner zeichnen sich, wie schon erwähnt, meist von denen der inneren Nährschichten durch auffallende Grösse aus (bei *Linum* bis 10 μ). Es liegen deshalb ausnahmslos unmittelbar unter den Schleimschichten mehr oder weniger mächtige Nährschichten. Dieselben obliteriren (*Linum*, *Sinapis*) oder verdicken ihre Wendungen und bleiben resistent (*Cydonia*).

Cramer³⁾ hat deshalb gar nicht Unrecht, wenn er sagt, dass bei *Linum* die Stärkekörner sich in Schleim verwandeln, denn sie thun es thatsächlich, indem sie den Baustoff zur Schleimmembran der Epidermiszellen liefern, wie Frank⁴⁾ und Hofmeister⁵⁾ bereits bewiesen

1) Tschirch, Angew. Pflanzenanatomie. Wien 1889. S. 301. — Tschirch, Beitr. z. Kenntn. d. Mechan. Gewebesystems. Pringheim's Jahrb. Bd. 16.

2) Tschirch, Angew. Pflanzenanatomie. Wien 1889. S. 251.

3) Cramer, Ueber die Entstehung einiger Pflanzenschleime. Naegeli-Cramer, Pflanzenphysiologische Untersuchungen. Zürich 1855.

4) Frank, Ueber die anatomische Bedeutung und die Entstehung der vegetab. Schleime. Jahrb. f. wissensch. Botanik 1865. Bd. 5. S. 162.

5) Hofmeister, Ueb. die zu Gallerte aufquellende Membr. der Aussenfläche von Samen u. Pericarprien. Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wissensch. Leipzig 1858.

haben. Lohde's¹⁾ Vorwurf gegen Cramer ist deshalb durchaus ungerechtfertigt.

Die Entstehung der Schleimmembran bei *Linum* und *Plantago* wurde ausführlich bereits von Frank²⁾ beschrieben. Der Vorgang ist der gleiche bei *Sinapis* und *Cuscuta*. Auch bei *Cydonia* fand Frank, dass Stärke theilweise das Material zur Bildung der Schleimmembranen abgebe. Wenn Frank meint, dass hier die Stärke der Epidermiszellen nur einen Theil des Schleimmembranmaterials liefere, so klärt sich die Sache dadurch, dass hier eine starke Nährschicht an die Epidermis angrenzt.

Ueberall, wo Stärke nicht wahrgenommen wurde, dagegen Hart-schichten, beziehentlich secundäre Membranverdickung überhaupt, dennoch in der Samenschale auftreten, muss angenommen werden, dass das in löslicher Form herbeigeführte Cellulosematerial direct aus löslicher Form in secundäre Membran übergehe und nicht erst als transitorisches Reservematerial dem Auge zur Erscheinung komme. Zuweilen werden Vorrichtungen angetroffen, welche die Zufuhr weiteren Cellulosematerials trotz der verdunstungshemmenden Sclereidenreihen ermöglichen, wie die Spaltöffnungen der Samenschalen von *Viola*, *Canna*.

Zu erforschen, welcher Art die lösliche Form des Cellulosematerials sei, ist hier natürlich ein sehr naheliegender Gedanke. Einen Aufschluss darüber auch nur mit einiger Sicherheit zu geben, war mir jedoch unmöglich, da ich ausschliesslich mit Alcoholmaterial arbeiten musste.

Auch fettes Oel gehört sehr häufig zu den transitorischen Inhaltsstoffen der Nährschicht-Zellen, und es steht ausser Zweifel, dass dasselbe Reservestoff ist.

Anders verhält es sich mit dem transitorischen Auftreten von Calciumoxalat, welches bei *Lupinus* und *Nuphar* beobachtet wurde. Das Vorkommen definitiv als Excret ausgeschiedener Calciumoxalatcrystalle oder Raphiden ist in den Samenschalen ausserordentlich häufig (so u. a. bei *Phaseolus*, *Oenothera*, *Epilobium*, *Beta*, *Euphorbia*, *Viola*, *Reseda*, *Chelidonium*). Die Crystalle liegen meist einzeln in Sclereiden, deren ganzes Lumen sie ausfüllen, die Raphiden meist in dünnwandigen Parenchymzellen. Ob das Calciumoxalat hier nur ein durchaus unnützes Exkret ist, oder nicht vielmehr zur Festigung und Erhöhung der Widerstandsfähigkeit des Samens beizutragen bestimmt sei, zumal häufig auch die Pallisadenschicht damit inkrustirt gefunden wird, ist eine schon häufig erörterte, hier nicht zu entscheidende Frage.

Ich komme auf das transitorische Vorkommen dieses Salzes innerhalb der Nährschicht zurück. Kohl's³⁾ Hypothese angenommen, dass Kalk-

1) Lohde a. a. O. S. 6.

2) Frank a. a. O. S. 2 bis 5.

3) Kohl, Zur Kalkoxalatbildung in der Pflanze. Bot. Centralbl. Bd. 38. No. 2.

Glycose die lösliche Form des Cellulosematerials sei, würde die Anwesenheit von Kalk in der Nährschicht einerseits erklären. Die Beobachtung Wehmer's¹⁾ andererseits, nach welchem an Orten, wo ein lebhafter Verbrauch plastischer, besonders Stickstoffhaltiger Substanzen stattfindet, andauernde Oxalsäurebildung auftritt, lassen in der Nährschicht, wo diese Bedingungen gegeben sind, die Entstehung von Oxalsäure gleichfalls erklärlich erscheinen. Es wäre dann, wenn bei reichlicher Stärkebildung und gleichzeitigem Schwinden des Stickstoffhaltigen Plasmas in der Nährschicht Kalkoxalat transitorisch auftritt, eine Reaktion herbeigeführt, welche die Folge des Zusammentreffens von Säure und Base an Ort und Stelle ist. In den Fällen aber, wo das transitorische Auftreten von Calciumoxalat nicht in Crystallformen zur Erscheinung kommt, kann man annehmen, dass der Zeitpunkt der Entstehung von Säure und Base nicht in gleicher Weise coïncidirt, oder aber hinreichende Wassermengen das Salz noch gelöst nach den Orten der definitiven Ausscheidung befördern, welche meist die benachbarten peripherischen Sclereidenreihen sind. Bei *Lupinus luteus* fällt das Auftreten der ersten Calciumoxalatcrystalltäfelchen beträchtlich vor die Halbreife der Samen und bald nach Erscheinen der ersten Stärkekörnchen. Die Crystalle wachsen dann schnell und fangen mit dem Verschwinden der Stärke an, corrodirt zu werden (Fig. 4. *a, b, c, d*), bis sie mit zunehmender Obliteration des Gewebes ganz verschwinden.

Die Art des Verschwindens der Calciumoxalatcrystalle stimmt im Allgemeinen mit den hierüber gemachten Beobachtungen überein. Tschirch²⁾ beobachtete den Vorgang bei den Blättern der Begonien und in Aleuronkörnern, Frank³⁾ in den Knollen von *Orchis majalis*, Van der Ploeg⁴⁾ im Blatte von *Vicia Faba*, N. J. C. Müller⁵⁾ in der Fichtenrinde, De Vries⁶⁾ und Sorauer⁷⁾ endlich in den Körnenschläuchen der Kartoffelknollen.

Jedenfalls steht fest, dass das transitorische Vorkommen von Calciumoxalat in der Nährschicht eine erhebliche ernährungsphysiologische Bedeutung für die benachbarten Gewebepartien nicht hat, sondern eine mehr zufällige ist.

Die Obliteration der Nährschicht ist eine natürliche Folge des Umstandes, dass der auf Null herabsinkende hydrostatische Druck des Zellinhaltes der Nährschichtzellen von den mächtig anschwellenden Gewebe-

1) Wehmer, Das Calciumoxalat der oberird. Theile v. *Crataeg. oxyacanth.* L. i. Herbst u. Frühjahr. Ber. d. Bot. Ges. Bd. 7. 1889. Heft 5.

2) Tschirch, Ueber die Kalkoxalatcrystalle in den Aleuronkörnern d. Samen und ihre Funktion. Sitzungsber. d. Ges. d. naturf. Freunde. No. 4. 1887.

3) Frank, Pringsheims Jahrb. 5. S. 181.

4) Van d. Ploeg., Akad. Preisschrift. Leiden 1879.

5) N. J. C. Müller, Botan. Unters. 4. 1875.

6) De Vries, Landw. Jahrb. 10. S. 80 und 6. S. 648.

7) Sorauer, Annalen der preuss. Landwirtschaft 3. S. 156.

massen des Nucleartheiles einerseits und der durch Wasserabgabe sich zusammenziehenden Hartschicht andererseits überwunden wird. Das Nährgewebe wird nach Erfüllung seines Zweckes gegen die Wand der Hartschicht gedrückt. Welcher der beiden Kräfte in den einzelnen Fällen der Hauptantheil bei der Obliteration zuzuschreiben ist, ist schwer zu entscheiden. Durchschnittlich scheint die von innen nach aussen wirkende Kraft zu überwiegen.

Messungen an *Lupinus luteus* ergaben als Durchschnittszahlen von je zehn Samen gleicher Stadien folgende Resultate in Millimetern:

	Mittel aus Länge und Breite des Nucleartheiles.	Dicke der Schale.	Umfang des ganzen Samens.
Halbreif, vom Stock	3,3	1,1	17
Reif vom Stock, nicht getrocknet (Wachsreife)	6,1	0,4	22
Getrennt vom Stock ausgereift (Trockenreife)	5,7	0,2	16

Der Nucleartheil weist also während des Wachsthum's von der Halbreife bis zur Wachsreife eine Zunahme von 2,8 mm auf, während gleichzeitig die Dicke der Samenschale sich um 0,7 mm verringert. Ursache davon ist die Obliteration, welche ausschliesslich durch centrifugalen Druck bewirkt wird, da der Umfang des ganzen Samens ja gleichfalls um 5 mm zugenommen hat. Die von diesem Stadium ab jedoch erfolgende weitere Reduction der Samenschalendicke um abermals 0,2 mm ist allein auf Rechnung des centripetalen Druckes der austrocknenden Hartschichten zu setzen, da der Umfang des ganzen Samens sich sogar noch weiter als bis zu den Dimensionen des halbreifen Samens verringert hat, während der Nucleartheil selbst um 0,4 mm in seiner Ausdehnung reducirt wird, also selbst dem centripetalen Drucke nachgiebt.

Die Reduction des Durchmessers der Samenschale von der Halbreife bis zur Wachsreife ist ein physiologischer Vorgang, diejenige von der Wachsreife bis zur Trockenreife jedoch ein vorwiegend mechanischer. Die Kraftäusserungen beider stehen im geraden Verhältniss der Differenzen der Samenschalendurchmesser, verhalten sich also, wenn numerische Vergleiche zulässig wären, wie 0,7 zu 0,2 oder wie 3,5 zu 1, ungerechnet der Reduction, welche der Nucleartheil selbst im zweiten Stadium erleidet.

Bei *Paeonia officinalis* reducirt sich unter gleichen Verhältnissen die Samenschale von 1,5 auf 0,3 mm, also um $\frac{4}{5}$ ihrer eigenen Stärke.

Hieraus geht nun auch hervor, dass an allen den Stellen, auf welche ein radialer Druck von innen oder aussen nicht ausgeübt wird, die Nährschicht nicht obliterirt, sondern nach ihrer Aufsaugung luftführend bestehen bleiben muss, oder Obliteration nur in den inneren Reihen eintritt, wenn innerer (centrifugaler) Druck allein vorhanden ist. Dieser Fall hat

statt an den Schmalseiten aller Samen von platter Form (*Capsicum*, *Lycopersicum*, *Cucurbita*, *Cyclanthera*, *Vincetoxicum*), in den Flügeln der geflügelten Samen (*Scrofularineen*) und oft an gerippten oder behöckerten Samen (*Oenothera*, *Convolvulus*). Desgleichen pflegt das Gewebe der Nährschicht in der Gegend der Chalaza nicht obliterirte Form zu besitzen und zwar bei den *Papilionaceen* und anderen Samen anatroper und campylotroper Form.

Aber auch in ihrem ganzen Umfange bleibt die Nährschicht zuweilen, ohne zusammengedrückt zu werden, bestehen und das Parenchym zeigt noch im Zustande der Samenreife seine ursprüngliche Form (viele *Caryophyllaceen*, *Mirabilis*, *Ruta*, *Viola*). In anderen Fällen erstarken die Wandungen ihrer Zellen selbst dermassen, dass eine Obliteration unmöglich ist (*Gaultheria*).

Nicht immer jedoch liegt die Nährschicht innerhalb der Hartschicht. Sie liegt ausserhalb derselben bei *Beta*, *Acer* und den *Gramineen*. Ihre Obliteration erfolgt in diesen Fällen durch Druck gegen die Fruchtschale.

Die Form der obliterirenden Parenchymzellen der Nährschicht ist in der Regel dieselbe wie sie Haberlandt¹⁾ am Wassergewebe des Blattes von *Peperomia trichocarpa* abbildet. Die Radialwände verbiegen oder knicken sich bei beginnender Obliteration zuerst knieförmig ein, während die Tangentialwände gespannt bleiben, seltener gleichfalls wellige Verbiegungen erleiden. Ein dementsprechendes ist das Bild der obliterirten Nährschicht in der reifen Samenschale. Hier sind die einzelnen Zellen in den meisten Fällen ohne Weiteres nicht zu erkennen. Häufig erst nach Anwendung von Quellungsmitteln werden die Conturen von Zellwänden bemerkbar, und dieser Umstand hat zu den oben erwähnten Irrthümern bei der Beschreibung reifer Samenschalen geführt. Auch Harz hat sich, wie schon erwähnt, dadurch verleiten lassen, stellenweise die Nährschicht als »gequollenwandig« zu bezeichnen.

In allen, auch den sorgfältigsten und detaillirtesten Zeichnungen wurde die Nährschicht auch mehr oder weniger schematisirt. Am weitesten ist in diesem Punkte entschieden Harz gegangen, dessen Untersuchungen des gesammten landwirthschaftlichen Samenmaterials sonst mit Sorgfalt ausgeführt sind; den Vorwurf einer zu starken Schematisirung aller seiner Zeichnungen und bei diesen nicht zum Mindesten der stiefmütterlich behandelten Nährschicht kann ich dem genannten Autor jedoch nicht ersparen.

Ich habe die obliterirte Nährschicht verschiedener Samen sorgfältig mit der Camera aufgenommen und am obliterirenden Samen die Uebergangsformen durch Nachzeichnen genau studirt. Ich habe dabei gefunden,

1) Haberlandt, Physiolog. Pflanzenanatomie, Leipzig 1884, S. 270.

dass die Knickung oder Stauchung der Radialwände den Lumina eigenthümliche zugespitzte Formen verleiht. Die Formen selbst sind schwer zu beschreiben. Ihr Bild erhellt aus den Abbildungen von *Lupinus*, *Linum*, *Berberis*, *Lycopersicum*. Nur in den Fällen, wo die Parenchymzellen der Nährschicht nicht parallelepipedische Form besitzen, sondern in tangentialer Richtung zugespitzt sind (*Victoria regia*) ist die Form der Lumina im oblitterirten Zustande eine strichförmige, ohne bizarre Zuspitzungen, da eigentliche radiale Querwände hier nicht vorhanden sind (vgl. Fig. 12 u. 13). In diesem Falle treten auch wellige Verbiegungen in der oblitterirten Nährschicht, sowie stellenweise Zerreissungen auf.

Eine Resorption der Nährschicht, welche von Bechmann und Kudelka behauptet wird, erwies sich in allen Fällen als eine Täuschung. Es gibt keinen Fall, wo es mir nicht gelungen wäre, auch am vollreifen Samen die strichförmigen Lumina der oblitterirten Nährschicht zu erkennen (eventuell auf Zusatz von Aetzkali), und wenn auch ohne Weiteres die Anzahl der Schichten nicht numerisch nachweisbar war, so stimmte doch die Gesamtstärke der oblitterirten Schicht mit dem Product der durchschnittlichen Anzahl der im unreifen Zustande beobachteten Zellreihen und der doppelten Dicke der Einzelwandungen ohne wesentliche Abweichungen überein. Gleichzeitig ist dies ein Beweis, dass Quellungen der Membran ebenfalls ausgeschlossen sind.

Dass die Obliteration der Nährschicht in toto die Widerstandsfähigkeit der Samenschale rein mechanisch erhöht, liegt auf der Hand. Sie wirkt, um einen technischen Vergleich heranzuziehen, wie eine aus mehreren Lagen gepresste Pappkugel.

So wird die Nährschicht der Samenschalen auch nach Beendigung ihrer eigentlichen Funktionsdauer zum Nutzen des Samens verwerthet.

Specieller Theil.

Typus I.

Vorhandensein einer oder mehrerer Nährschichten einerseits und Hart- bzw. Schleimschichten oder einer starkwandigen Epidermis andererseits.

Aus der Familie der *Papilionaceae* wurden die Samen von zwanzig Arten untersucht und sämmtlich als diesem Typus angehörig befunden. Die beiden äusseren Schichten der Samenschale zeigen überall im Princip grosse Uebereinstimmung. Die Nährschicht ist stets die dritte Schicht und zeichnet sich durchweg durch ausserordentliche Mächtigkeit aus. Meist oblitterirt der äussere Theil derselben nicht, sondern wird starkwandig. Auch verzweigen sich die äusseren, sowie die innersten Parenchymzellen einiger Arten mehr oder weniger stark, sodass dann die

Nährschicht selbst wiederum aus drei Schichten besteht, deren mittelste am stärksten obliterirt ist und die Gefässbündel führt (Phaseolus).¹⁾

Der anatomische Bau der untersuchten Arten ist folgender:

Lupinus luteus L. (Fig. 1. 2. 3. 4.)

I. Palissadenreihe von Makrosclereiden mit knapp unter der Cuticula verlaufender Lichtlinie. Stellenweise farblos, stellenweise mit dunklem Inhalt, die Marmorirung der Samen bewirkend. Lumen in der untern Hälfte knieförmig gebogen.

II. Osteosclereiden, mässig, aber gleichartig verdickt mit ziemlich weitem Lumen und weiten Interzellularen.

III. Nährschicht²⁾ aus 18 bis 30 Zellreihen bestehend, ausser den 3 bis 6 äussersten Reihen stark collabirt. Die Zellen der Nährschicht führen während des Reifungsprocesses reichlich transitorische Säcke und transitorisches Calciumoxalat.

Lupinus albus L.

I. Palissadenzellreihe mit peripherischer Lichtlinie.

II. Osteosclereidenreihe mit weiten Interzellularen.

III. Nährschicht wie bei *L. luteus*.

Lupinus hirsutus L.

I. Aeusserst starke Palissadenzellreihe mit zwei Lichtlinien. Die einzelnen Sclereiden zu Bündeln vereinigt und eingeschrumpft. Die Epidermis zerrissen.

II. Osteosclereidenreihe.

III. Nährschicht wie bei *L. luteus*.

Die Samen nachgenannter Arten fand ich, theilweise übereinstimmend mit Harz, im Bau der beiden äusseren Testa-Schichten nur unwesentlich von *Lupinus* abweichend. Bezüglich der Nährschicht ist folgendes zu erwähnen.

Genista tinctoria L.

Nährschicht 5 bis 10 Reihen, obliterirt.

Anthyllis vulneraria L.

Nährschicht 12 bis 16 Reihen, obliterirt.

Trifolium pratense L.

Nährschicht 5 bis 8 Reihen, obliterirt.

Ornithopus sativus L.

Nährschicht 3 bis 6 Reihen, obliterirt.

1) Auf den charakteristischen Bau der Samenschale bei der Gattung *Phaseolus* wies erst Haberlandt in »Entwgesch. u. Bau d. Samensch. b. d. Gattung *Phaseolus*« hin. Von Sempolowski (s. später) wurden diese Verhältnisse übersehen.

2) Der Nährschicht bei *Lupinus luteus* thut Harz, dessen Beschreibungen sonst so genau sind, eigenthümlicherweise gar nicht Erwähnung. — Bei *Ulex Europaeus* erwähnt er sie gleichfalls nicht.

Onobrychis sativa Lam.

Nährschicht 16 bis 20 Reihen, stark oblitterirt.

Cytisus Laburnum L.

Nährschicht 12 bis 16 Reihen, zeitig oblitterirend.

Robinia Pseudacacia L.

Nährschicht ebenso.

Melilotus officinalis L.

Nährschicht 4 bis 8 Reihen, deren äusserste nicht oblitteriren.

Medicago lupulina L.

Nährschicht 3 bis 6 Reihen, oblitterirt ¹⁾.

Trigonella faenum Graecum L.

Nährschicht ebenso.

Lotus corniculatus L.

Nährschicht ebenso.

Tetragonolobus purpureus Moench.

Nährschicht 12 bis 15 Reihen, deren äusserste nicht oblitteriren.

Galega officinalis L.

Nährschicht 4 bis 8 Reihen, oblitterirt.

Astragalus glycyphyllos L.

Nährschicht ebenso.

Pisum sativum L.

Nährschicht 12 bis 20 Reihen, oblitterirt.

Vicia faba L.

Nährschicht ebenso ²⁾.

Lathyrus pratensis L.

Nährschicht ebenso.

Abweichend ist der Bau der Samenschale bei

Phaseolus multiflorus L.

In der Nährschicht finden sich mit röthlichem Inhalte ganz erfüllte Zellen während der späteren Entwicklungsstadien. Im Reifezustand ist der Inhalt noch vorhanden und dunkelbraun. Die einzelnen Schichten sind:

- I. Palissadenschicht.
- II. Osteosclereiden mit Calciumoxalatcrystallen.
- III. Sternparenchym, nicht oblitterirend, starkwandig.
- IV. Oblitterirte Nährschicht mit den Gefässbündeln.
- V. Oblitterirtes Sternparenchym, zartwandig, Zellen verfilzt.

Ebenso ist der Bau der Samenschale bei

Physostigma venenosum Balf.

1) Hier hat Sempolowski die Ueberreste des Endosperms für Theile der Samenschale gehalten.

2) Hier begingen Sempolowski und ebenso Beck den gleichen Irrthum, während schon Schleiden und später Chalon die Verhältnisse richtig beschrieben haben.

Cicer arietinum L.

Soja hispida Moench.

Aus der Familie der *Amygdalaceae* wurde nur

Prunus domestica L. (Fig. 5. 6) im reifen Zustande untersucht. Die Samenschale zeigt eine Nährschicht von etwa 12 Reihen oblitterirtem Parenchym, welches sich um die intact gebliebenen tangential oblongen Gefässbündel herumlegt. Auch die Epidermis ist oblitterirt bis auf einige papillenartig ausgestülpte verholzte Zellen derselben.

Während die herangezogenen Vertreter der übrigen Rosifloren-Familien sich dem Typus II und III anschliessen, gehört hierher noch

Cydonia vulgaris Pers. aus der Familie der *Pomaceae*. Die Samenschale besteht aus folgenden Schichten:

I. Schleimepidermis.

II. Pigmentschicht aus 4 bis 6 Reihen starkwandigen Parenchyms mit körnigem Inhalt.

III. Nährschicht, 4 bis 8 reihig, oblitterirt. Im unreifen Zustande sind alle Schichten mit feinkörniger Stärke erfüllt.

Einen weniger einfachen Bau zeigen die Samenschalen der untersuchten *Onagraceae*. Beide untersuchten Species zeigen eine mächtige Nährschicht.

Oenothera biennis L.

Die einzelnen Schichten sind folgende:

I. Epidermis grosser isodiametrischer Zellen mit nach aussen gewölbten Wandungen. Normal cuticularisirt, äussere Membran fein granulirt.

II. Isodiametrisches oder schwach gestrecktes, netzig getüpfeltes Parenchym mit bräunlichen Wandungen. Inhalt vereinzelte Crystalle oxalsauren Kalkes. Wo diese Schicht mächtiger ist und ihre Zellen radial gestellt sind, werden die kantigen Conturen der Samenschale dadurch verursacht.

III. Mässig verdickte, nach der Peripherie oft zugespitzte länglich walzige Parenchymzellen, welche dicht mit Kalkoxalatcrystallen erfüllt sind.

IV. Auf dem Querschnitt quadratische, in der Längsachse des Samens verlaufende Prosenchymzellen mit engem Lumen.

V. Gleiche, zartwandigere Schicht.

VI. Nährschicht, oblitterirt, 6 bis 8 reihig.

Epilobium angustifolium L.

Die einzelnen Schichten sind folgende:

I. Epidermis geschrumpfter, tangential gestreckter Zellen, einzelne zu stumpfen Trichomen mit engem Lumen ausgewachsen.

II. Eine Reihe grosser, zartwandiger Zellen, einzelne dicht mit Raphiden gefüllt.

III. Eine Reihe kleiner Zellen mit deutlichen Kalkoxalatcrystallen.

IV. Eine Reihe starkwandiges Prosenchym, auf dem Querschnitte fast quadratisch.

V. Nährschicht, oblitterirt, 8 bis 10 reihig.

Eine ausserordentliche Uebereinstimmung im Bau der übrigens sehr einfachen Samenschale zeigen alle untersuchten Samen der *Umbelliferae*.

Die mit der Frucht verwachsenen Samenschalen dieser Familie wurden in allen Fällen übereinstimmend aus zwei Schichten bestehend gefunden:

I. Epidermis mehr oder weniger oblitterirter parenchymatischer, tangential gestreckter Zellen mit wenig verdickter Aussenwand.

II. Nährschicht aus 2 bis 8 Reihen total oblitterirtem Parenchym mit bräunlichen Wandungen bestehend und Gefässbündel führend. In der Nähe der Raphe ist die Nährschicht stärker entwickelt und nicht oblitterirt.

Von diesem Bau wurde die Samenschale gefunden, zum grossen Theil übereinstimmend mit Harz, bei:

Anethum graveolens L.

Angelica silvestris L.

Aegopodium Podagraria L.

Aethusa Cynapium L.

Apium graveolens L.

Apium Petroselinum L.

Carum Carvi L.

Cicuta virosa L.

Cuminum Cyminum L.

Daucus Carota L.

Foeniculum capillaceum Gilib.

Heracleum Sphondylium L.

Oenanthe Phellandrium Lam.

Pastinaca sativa L.

Pimpinella magna L.

Pimpinella Saxifraga L.

Pimpinella Anisum L.

Ptychotis Adjovan DC.

Anthriscus Cerefolium Hoffm.

Anthriscus silvestris Hoffm.

Anthriscus vulgaris Pers.

Chaerophyllum aureum L.

Chaerophyllum bulbosum L.

Chaerophyllum temulum L.

Conium maculatum L.

Coriandrum sativum L.

Von der Familie der *Portulaccaceae* wurde

Portulacca oleracea L. untersucht.

Die einzelnen Schichten sind:

I. Epidermis radial gestellter Zellen mit stark verdickter Aussenmembran.

II. Nährschicht, oblitterirt, aus 3 bis 4 Reihen bestehend.

Stärke tritt während der Entwicklung im Nährgewebe in reichlicher Menge auf.

Die herangezogenen *Caryophyllaceae* zeichnen sich sämtlich durch unförmlich verdickte Epidermiszellen aus. Die Nährschicht ist von sehr verschiedener Mächtigkeit.

Stellaria nemorum L.

Die reife Samenschale besteht hier nur aus drei Schichten:

I. Epidermis sehr verschieden gestalteter und verschieden grosser, mässig verdickter, oft keulenförmig ausgebauchter Zellen. Mit welliger Cuticula versehen; stellenweise noch geschrumpftes Protoplasma vorhanden.

II. Pigmentschicht ziemlich regelmässiger, tangential gestreckter Zellen mit bräunlichem Inhalt.

III. Eine Schicht nach innen ausgebauchter länglicher, parenchymatischer Zellen ohne Inhalt. Diese Zellreihe muss als Nährschicht angesprochen werden.

Die Dicke aller Wandungen beträgt 2 bis 3 μ .

Agrostemma Githago L.

I. Epidermis stark und unförmlich verdickter, nur an der Innenmembran dünnwandiger, flaschenförmiger brauner Sclereiden mit dunklem körnigen Inhalt und warzenförmig behöckerter Cuticula.

II. Nährschicht, oblitterirt, 5 bis 8 Zellreihen.

Silene inflata Smith ebenso.

Saponaria officinal. L. ebenso, nur Epidermiszellen weniger unförmlich.

Dianthus Carthusianorum L. ebenso.

Auch im Bau der Samenschale scheint die den Caryophyllaceae nahe verwandte Familie der *Paronychieae* ziemliche Uebereinstimmung mit jener zu zeigen. So ist der Bau der Samenschale bei

Spergula arvensis L. folgender:

I. Epidermis unförmlich und stark verdickter, stellenweise zu starkwandigen Keulenhaaren ausgewachsener Zellen mit warzenförmigen Erhöhungen der Aussenmembran.

II. Nährschicht, bräunlich, oblitterirt.

III. Auf dem Querschnitt quadratische, farblose, getüpfelte Zellen mit bräunlichem Inhalt.

Aus der Familie der *Phytolaccaceae* wurde

Phytolacca decandra L. untersucht.

Die Schichten sind folgende ¹⁾:

I. Palissadenzellschicht, stark cuticularisirt, braunwandig, mit stark verdickter Aussenmembran.

II. 2 bis 6 Reihen Parenchym mit körnigem Inhalt.

III. Eine bis zwei Reihen auf dem Querschnitt kubischer Zellen.

Auftreten transitorischer Stärke wurde in den zur Verfügung stehenden Entwicklungsstadien nicht beobachtet.

Aus der Familie der *Chenopodiaceae* wurde

Beta vulgaris L. untersucht.

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Epidermis kleiner, dünnwandiger, fast isodiametrischer Zellen.

II. 4 bis 6 Reihen nach innen grösser werdender dünnwandiger Parenchymzellen. Diese Schicht ist als Nährschicht anzusehen.

III. 2 bis 4 Reihen Parenchymzellen mit verdickten, getüpfelten Wandungen.

IV. Eine starke Sclereïdenschicht mit geraden Tüpfeln und verschwindend kleinem Lumen, vereinzelt mit Crystallen oxalsauren Kalkes ausgefüllt.

Aus der Familie der *Nyctagineae* wurde die Samenschale von

Mirabilis Jalappa L. (Fig. 7) untersucht und zeigte folgenden Bau:

I. Inhaltlose, stellenweise bis zum Verschwinden des Lumens zusammengedrückte, schwach cuticularisirte Epidermiszellen.

II. Eine Reihe tangential gestreckter, auf dem Querschnitt rechteckiger oder schwach tonnenförmig ausgebauchter Zellen mit mässig verdickten Wandungen.

III. Nährschicht von 6 bis 10 Reihen inhaltfreiem Parenchym mit geschrumpften Wandungen, von gedrückter Form.

Im jugendlichen Zustande enthalten die Zellen aller Schichten im Plasma eingebettet 2 bis 6 μ grosse Stärkekörner, welche oft das halbe Zelllumen erfüllen.

Aus der Familie der *Polygoneae* gelangte zur Untersuchung:

Fragopyrum esculentum Moench.

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Eine Reihe mässig starkwandiger grosser Epidermiszellen.

II. Nährschicht, 1 bis 3reihig, obliterirt.

In jungen Stadien wurden diese Zellreihen nicht mit Stärke erfüllt angetroffen, wohl aber mit körnigem plasmatischem Inhalte.

1) Mit Harz stimme ich in der Beschreibung dieser Samenschale nicht überein.

Die Samenschale tritt hier in Mächtigkeit sowohl wie in Festigkeit zurück, weil der Same in der Fruchtschale eingeschlossen bleibt, und letztere somit den Schutz nach aussen versieht.

Die Samenschalen der untersuchten *Malvaceae* zeigen im Typus wesentliche Uebereinstimmung.

Malva borealis Wallm.

I. Epidermis kubischer bis parallelepipedischer Zellen mit nicht ausgewölbten und wenig verdickten Wänden.

II. Dünnwandige, parallelepipedische Parenchymzellen, tangential gestreckt.

III. Palissadenzellen; Lumen beiderseits zugespitzt, im äusseren Drittel liegend.

IV. Nährschicht aus etwa 6 Reihen Parenchymzellen mit gelblichem Inhalt; von innen nach aussen an Intensität der Zusammenpressung abnehmend; innerste Reihen total obliterirt.

Im jugendlichen Zustande, wo alle Elemente noch zartwandig sind, enthalten dieselben reichlich 1 bis 3 μ grosse Stärkekörner.

Gossypium herbaceum L.

I. Epidermiszellen mit bräunlichem Inhalt.

II. 6 bis 9 Reihen tafelförmiger Parenchymzellen, gleichmässig mit tiefbraunem Inhalt erfüllt.

III. 1 bis 2 Reihen kubischer bis tafelförmiger Zellen mit feinkörnigem farblosem Inhalt.

IV. Palissadenzellreihe.

V. Nährschicht, obliterirend, mehrere Reihen stark.

Althaea rosea Willd.

I. Kleinzellige Epidermis.

II. Einzellreihiges, tangential gestrecktes Parenchym.

III. Palissadenschicht mit Lichtlinie.

IV. Nährschicht, obliterirt, die äussersten Reihen noch theilweise mit bräunlichem Inhalt.

Althaea officinalis L. ebenso.

Aus der Familie der *Linaceae* gelangte zur Untersuchung:

Linum usitatissimum L. (Fig. 8. 9.)

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Epidermis eingetrockneter Schleimzellen, in Wasser aufgequollen auf dem Querschnitt quadratisch.

II. Nährschicht aus 3 bis 6 Reihen obliterirtem Parenchym; führt die Gefässbündel.

III. Sclereiden mit bräunlichen Wandungen.

IV. Eine Reihe stark tangential gestreckter Zellen.

V. Nährschicht aus 6 bis 10 Reihen obliterirtem Parenchym.

Auch die untersuchten *Euphorbiaceae* zeigten Palissaden- und Nährschicht.

Euphorbia Lathyris L.

I. Epidermis aus isodiametrischen, grossen dünnwandigen Zellen, schwach cuticularisirt.

II. 2 bis 3 Reihen tangential gestrecktes, obliterirtes Parenchym. In dieser Schicht verläuft das Gefässbündel der Raphe.

III. Einzellreihige Schicht rechteckiger, etwas tangential gestreckter stark verdickter Zellen.

IV. Palissadenschicht, gelbbraun bis schwärzlich, mit Kalkoxalateinlagerungen.

V. Nährschicht, obliterirt, zuweilen noch Kalkoxalat enthaltend.

Ricinus communis L.

I. Epidermis isodiametrischer, starkwandiger getüpfelter Zellen stellenweise mit Pigmenten.

II. 6 bis 10 Reihen Parenchym.

III. Parallelepipedische, radial gestellte Zellen.

IV. Palissadenschicht.

V. Obliterirtes Parenchym, aus 20 bis 40 Reihen bestehend, mit farblosen Wandungen.

Im jugendlichen Zustande enthalten alle Zellen der Nährschicht reichlich Stärke.

In der Familie der *Tropaeolaceae* werden zwei Nährschichten angetroffen.

Tropaeolum majus L.

Hier besteht die reife Samenschale aus folgenden Schichten:

I. Epidermis unregelmässiger Zellen.

II. Nährschicht collabirten Gewebes mit farblosen Wandungen.

III. 3 bis 4 Reihen unregelmässiger, mässig verdickter, theilweise mit mit röthlich-braunem Schleim-Inhalt erfüllter Parenchymzellen.

IV. Nährschicht, obliterirt, in engem Zusammenhang mit dem starkwandigen, getüpfelten, Eiweiss- und Stärke-erfüllten Parenchym stehend.

Im halbreifen Zustande finden sich grosse Stärkekörner, von 2,7 bis 12 μ Durchmesser im äusseren, obliterirenden, zu dieser Zeit aber noch turgescenten Gewebe. Das innere Gewebe ist obliterirt, das mittlere, nicht obliterirende, noch dünnwandig, mit körniger Substanz erfüllt, die sich mit Jod bräunt. In sehr frühem Zustande ist die innerste Schicht mit feinkörniger Stärke (höchstens 2,5 μ gross) erfüllt. Dieses Stadium liegt um ein Geringes nach dem Befruchtungsvorgange.

Aus der Familie der *Sapindaceae* gelangte zur Untersuchung:

Aesculus Hippocastanum L.

I. Epidermis, auf dem Querschnitt fast rechteckiger, radial gestreckter Zellen von brauner Farbe, mässig cuticularisirt.

II. 20 bis 80 Reihen starkwandiges Parenchym, inhaltslos, mit Inter-cellularen.

III. Nährschicht, 2 bis 8 Reihen stark, oblitterirt.

In der Familie der *Aceraceae* werden Schleimepidermen angetroffen.

Acer campestre L.

I. Epidermis tangentialer, Schleim-erfüllter ausgebauchter Zellen mit gewellten Querwänden.

II. Nährschicht aus 4 bis 6 Reihen Parenchym, oblitterirt.

Acer platanoides L.

Die Verhältnisse sind dieselben, nur ist die Nährschicht um einige Zellreihen mächtiger.

Von *Celastraceae* wurde untersucht:

Evonymus Europaeus L.

Der Same ist von einem hochgelben Arillus umgeben, dessen Zellen fettes Oel enthalten. Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Epidermis sehr grosser, tangential gestreckter, nach innen und aussen bauchig ausgewölbter Zellen.

II. Nährschicht oblitterirt, mehrere Zellreihen stark.

III. Palissadenschicht mit reich getüpfelten Wandungen.

Im halbreifen Zustande sind in der Nährschicht reichlich kleine Stärkekörner von kaum 1 μ Durchmesser enthalten.

Aus der Familie der *Violaceae* wurde untersucht:

Viola silvatica Fr.

Die Samenschale besteht aus:

I. Epidermiszellen, auf dem Querschnitt rechteckig.

II. Kalkoxalatcrystallführende Schicht.

III. Prismenschicht, Lumina beiderseits zugespitzt, Membran getüpfelt.

IV. Langgestreckte, zartwandige, beiderseits gebauchte Zellen.

V. Nährschicht aus einer Reihe isodiametrischem zartwandigem Parenchym.

Stärke ist im jugendlichen Zustande nicht vorhanden.

Von *Resedaceae* beschreibe ich die Samenschale von

Reseda odorata L.

I. Tangential gestreckte Epidermiszellen mit verdickter, gewellter Aussenwand.

II. Eine oder mehrere Reihen tangential gestreckter dünnwandiger Parenchymzellen mit körnigem Inhalt und tafelförmigen Crystallen oxalsauren Kalkes.

III. Sclereidenreihe, Zellen auf dem Querschnitt rechteckig erscheinend, getüpfelt. Diese Zellen sind gruppenweise stärker und bilden die Ursache der welligen Oberfläche des Samens.

IV. Nährschicht oblitterirt, aus zwei Reihen bestehend.

Grosse Uebereinstimmung in den einzelnen Schichten zeigen die Samenschalen der *Cruciferae*.

Alliaria hederacea Andr.

Die Samenschale des reifen Samens besteht aus folgenden Schichten:

I. Epidermis total eingeschrumpfter, pflanzenschleimfreier Zellen, welche körnige Massen (vermuthlich Magnesiumphosphat) ¹⁾ einschliessen.

II. Ein- bis zweireihige Schicht, mit weitem Lumen, dünnen, gebräunten Wandungen, mit Intercellularen, inhaltslos. Die Zellen sind in regelmässigen Abständen vorgewölbt und bilden dadurch die längsrippig anastomosirenden Oberflächenzeichnungen der Samen.

III. Nährschicht, oblitterirt.

IV. Pigmentschicht aus tangential gestreckten Zellen bestehend.

An diese schliesst sich die einzellreihige Aleuronschicht mit einem stark collabirten Reste von Endosperm an.

Im unreifen Samen enthalten die äusseren Schichten reichlich Stärkekörner von 3 bis 6 μ Grösse. Alle Zellen bleiben lange turgescent und fallen erst in der Vollreife, nach dem Verschwinden aller Stärkekörner zusammen.

Brassica nigra Koch.

I. Epidermis von Schleimzellen.

II. Grosse, mässig starkwandige, nach innen gewölbte Zellen.

III. Radial gestreckte und je nach der Lage zu den Wölbungen der äusseren Schicht verschieden lange Palissadenzellen, deren innere Wände ganz, die seitlichen bis zur Hälfte verdickt sind.

IV. Pigmentschicht einreihig, stellenweise zweireihig.

V. Nährschicht oblitterirt, braunwandig, einige Reihen umfassend.

Brassica oleracea L. (Schröder, Sempolowski).

I. Epidermis tafelförmiger Schleimzellen.

II. Nährschicht oblitterirt, mit gelblichen Wandungen.

III. Braunwandige, innen und seitlich stark verdickte, radial gestellte Palissadenzellen.

IV. Nährschicht oblitterirt 4 bis 7 Reihen stark.

V. Pigmentschicht ein- bis zweireihig.

Sinapis alba L.

Die reife Samenschale besteht aus folgenden Schichten:

I. Schleimepidermis.

II. Eine ein- bis dreireihige subepidermoïdale Nährschicht.

III. Eine nicht continuirliche Reihe grosser starkwandiger tangential gestreckter, nach innen ausgebauchter Zellen.

1) Mit conc. Schwefelsäure keine Gypsnadeln liefernd, beim Glühen eine weisse, in Salzsäure lösliche Asche hinterlassend.

IV. Sclereïdenschicht mit nur innen und seitlich verdickten Wandungen.

V. Pigmentschicht.

VI. Nährschicht oblitterirt 6 bis 8 Reihen stark.

Im halbreifen Zustande enthält die Epidermis und die darunter liegende Schicht reichlich grosse (bis $22\ \mu$) Stärkekörner. Die Prismenschicht ist frei von Stärke, die Nährschicht dicht mit feinkörniger Stärke erfüllt.

Cochlearia officinalis L.

I. Rundliche, hervorgewölbte schleimfreie Epidermiszellen, an der Aussenseite verdickt. Wand mit radiärer Streifung.

II. Einreihige oblitterirte subepidermoïdale Nährschicht.

III. Grosse kubische braunwandige Zellen.

IV. Mehrreihige oblitterirte Nährschicht mit schwarzbraunen Wandungen.

Isatis tinctoria L.

I. Epidermis zusammengedrückter Zellen mit spaltenförmigen Lumina, und mässig verdickten Wandungen, schleimfrei.

II. Eine Reihe grosser dünnwandiger Parenchymzellen.

III. Eine Reihe tangential gestreckter Zellen.

IV. Oblitterirte Nährschicht 4 bis 5 reihig.

Lepidium sativum L. (Caspari, Hofmeister).

I. Epidermis eingeschrumpfter Schleimzellen mit Verdickungsleisten.

II. Oblitterirte Nährschicht.

III. Bräunliche, fast kubische Zellen, deren innere und seitliche Wandungen stark verdickt sind.

IV. Eine Lage tangential gestreckter Parenchymzellen.

Camelina sativa Crantz.

I. Eingeschrumpfte farblose Schleimepidermis.

II. Tangential gestreckte innerseits und seitlich verdickte regelmässige Zellen in einfacher Reihe.

III. Nährschicht, oblitterirt 2 bis 4 reihig.

Einfacher gebaut ist die Samenschale in der nahe verwanten Familie der *Fumariaceae*.

Corydalis glauca Pers.

Die Samenschale besteht aus folgenden Schichten:

I. Einreihige Epidermis nach aussen stark verdickter Zellen mit engen verzweigten Tüpfeln in der Wandung.

II. Mehrreihige Nährschicht, oblitterirt.

In der unreifen Samenschale besteht die Nährschicht aus 3 bis 4 Reihen parenchymatischen Gewebes. Die Verdickung der Epidermiszellen findet sehr frühzeitig statt und dem entsprechend enthält die Nährschicht nur in sehr frühem Stadium Stärke (Körner $2-3\ \mu$).

Die untersuchten *Papaveraceae* sind im Bau der Samenschale sehr verschieden.

Chelidonium majus L.

Die Samenschale besteht aus folgenden Schichten:

- I. Epidermis, stark cuticularisirt, deren Zellen nach innen ausgebaucht und zartwandig nach aussen sehr stark verdickt sind.
- II. Vereinzelte starkwandige, isodiametrische Parenchymzellen.
- III. Einreihige Schicht dünnwandiger Parenchymzellen mit Einschlüssen tetragonaler Kalkoxalatcrystallformen.
- IV. Obliterirte Nährschicht, mehrreihig.
- V. Eine Reihe radial gestellter Palissadenzellen, deren radiale Wandungen durch Druck meist völlig verbogen sind.
- VI. Zweite obliterirte Nährschicht, deren Lumina weniger gestreckte Form besitzen, als die der äusseren.

Im halbreifen Zustande sind die Nährschichten dicht mit 1,5 bis 2 μ grossen Stärkekörnern erfüllt.

Papaver somniferum L.

- I. Epidermis grosser, auf dem Querschnitt stark tangential gestreckter Zellen mit körnigem Inhalt. Die Aussenwände sind verdickt, aber nach einwärts gebogen, so dass die gleichfalls verdickten Seitenwandungen auf der Fläche netzige Erhöhungen bilden.
- II. Prosenchymatische Elemente mit kleinem, auf dem Querschnitt quadratischem Lumen.
- III. Pigmentschicht tangential gestreckter Parenchymzellen mit farblosem oder bräunlichem Inhalt (je nach der Varietät).
- IV. Obliterirte Nährschicht 2 bis 6 Reihen stark.

Die Samenschalen der *Ranunculaceae* sind sehr verschieden gebaut. Theilweise fehlen hier Hart- und Nährschicht und die Gattungen Ranunculus und Delphinium gehören deshalb unter Typus III.

Nigella pygmaea L.

- I. Epidermis papillenartig ausgestülpter starkwandiger brauner Zellen.
- II. Nährschicht aus 3 bis 4 Reihen nur schwach obliterirtem Parenchym.
- III. Einreihige Pigmentschicht tangential gestreckter tafelförmiger Zellen.
- IV. Eine Reihe auf dem Querschnitt quadratischer, nicht starkwandiger Zellen mit geknickten Radialwänden.

In der Nährschicht ist im jugendlichen Zustande Stärke reichlich, bis zur fast völligen Verdrängung des Plasma vorhanden.

Paeonia officinalis L.

- I. Stark cuticularisirte, mit braunem Inhalt erfüllte Epidermis radial gestreckter Zellen mit dünnen, durch Einschrumpfen geknickten Wandungen.

II. Prismenschicht stark verdickter, radial gestellter Zellen mit Kalk-oxalatcrystallen.

III. Nährschicht aus netzig verdickten Parenchymzellen mit getüpfelten Wandungen.

Die Nährschicht enthält im jugendlichen Zustande reichlich Stärke.

Aus der Familie der *Magnoliaceae* wurde untersucht:

Illicium verum Hooker.

Die zerbrechliche, braunglänzende Samenschale setzt sich aus folgenden zwei Schichten zusammen:

I. Sclereidenschicht, mässig cuticularisirt.

II. Nährschicht aus mehreren Reihen obliterirtem Parenchym typischer Form.

Von *Berberideae* untersuchte ich den Bau der Samenschale von *Berberis vulgaris* L. (Fig. 10. 11).

I. Stark cuticularisirte Palissadenschicht mit weiten Lumina.

II. Eine Reihe Parenchymzellen, welche durch Verschleimung der Membrane nur ein spaltenförmiges Lumen haben.

III. Aeussere Nährschicht aus 3 bis 4 Reihen obliterirten Parenchymzellen.

IV. Einreihige Trägerzellschicht, stark verdickt mit weiten Inter-cellularen.

V. Mehrreihige obliterirte Nährschicht mit braungelben Wandungen.

VI. Mehrreihige obliterirte Nährschicht mit farblosen Wandungen.

Im halbreifen Zustande zeigen die äusseren Parthien wenig Auffallendes. Die Wandungen der Trägerzellen sind nur erst mässig verdickt und ungefärbt. Die äussere Nährschicht ist schon stark obliterirt. Die beiden inneren bestehen noch aus isodiametrischen dünnwandigen Parenchymzellen, dicht mit körnigem Inhalt erfüllt. Derselbe färbt sich mit Jod grünlich gelb, mit Eisenchlorid nicht, und desgleichen nicht mit Chlorzinkjod. Stärke wird auch in jüngsten Stadien nicht angetroffen.

Aus der Familie der *Nymphaeaceae* gehört die Gattung Nuphar dem Typus III an. Zu Typus I dagegen gehört:

Victoria regia Lindl. (Fig. 12. 13.)

Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Palissadenschicht von Sclereiden, welche durchschnittlich nur doppelt so lang als breit sind, oder diese Länge noch nicht erreichen; zuweilen tonnenförmig nach beiden Seiten ausgebaucht, mit zahlreichen, gewundenen Tüpfeln.

II. 1 bis 3 Reihen parenchymatische, tangential gestreckte Zellen, deren Wandungen relativ dünn sind und dunkel gefärbt erscheinen.

III. Mächtige oblitterirte Nährschicht mit hellen Wandungen; die Lumina verlaufen unregelmässig.

IV. Pigmentschicht, einreihig.

Aus der Familie der *Betulaceae* untersuchte ich:

Alnus glutinosa Gärtn.

I. Kleinzellige, mässig starkwandige Epidermis.

II. Braunwandige, nur mässig oblitterirte Nährschicht, an den Breitseiten ein- bis wenigreihig, an den Flügeln mächtig.

III. Mehrreihige Sclereïdenschicht.

IV. Sternparenchym mit farblosen getüpfelten Wandungen.

Aus der Familie der *Ericaceae* gelangte zur Untersuchung:

Gaultheria procumbens L.

I. Palissadenschicht starkwandiger, netzig getüpfelter, auf dem Querschnitt viereckiger, oft radial gestellter Zellen.

II. Nährschicht aus verdicktem, nicht oblitterirendem Parenchym.

Beide Schichten sind in dieser Form schon in sehr jungen Stadien ausgebildet.

Bereits vielfach untersucht ist die Familie der *Cucurbitaceae*. Ich untersuchte zwei Arten.

Cucurbita Pepo L.

Den Bau der reifen Samenschale fand ich übereinstimmend mit Harz und Fickel sowie im Allgemeinen auch mit v. Hoehnel wie folgt:

I. Epidermis von Palissadenzellen, an den Flügeln verkürzt. Zellen netzig getüpfelt (porös verdickt), auf dem Querschnitt isodiametrisch. Poren spaltenförmig. Nach Ausbildung der *o*-Zellen wird im Lumen der Palissadenzellen kleinkörnige Stärke angetroffen.

II. Dünnwandiges parenchymatisches netzig getüpfeltes Gewebe, an den Längsseiten etwa 4 bis 5 Zellreihen stark, an den Flügeln bis doppelt so mächtig.

III. Brachysclereïden, auf dem Querschnitt von *o*-förmiger Gestalt, getüpfelt, an den Rändern einreihig, an den Flügeln bis dreireihig.

IV. Netzig getüpfelte Parenchymzellen mit Interzellularräumen.

V. Oblitterirte Nährschicht typischer Form.

In einem Samen, welcher die Hälfte der Grösse des reifen Samens erreicht hat, finden sich kleine Stärkekörner von 2 bis 3 μ in der Nährschicht sowohl wie in der Palissadenschicht.

Cyclanthera explosens Schrad.

I. Epidermis mit braunem Pigment erfüllt.

II. Verzweigtes Parenchym mit stellenweise getüpfelten Wandungen, an der Breitseite etwa 3 Zellreihen, an den Flügeln bis 10 Reihen stark, die Masse des Flügels bildend, nirgends oblitterirt.

III. *o*-Zellen, schmaler als bei *Cucurbita Pepo*.

IV. Sternparenchym, an den Kanten gestreckt, wenige Zellreihen umfassend, Gefässbündel führend.

V. Obliterirte Nährschicht.

Die Nährschicht enthält im jugendlichen Zustande reichlich feinkörnige Stärke.

Aus der Familie der *Campanulaceae* untersuchte ich:

Campanula persicifolia L.

I. Stark cuticularisirte Epidermis aus Palissadenzellen mit hammerförmigem Lumen, weil die Seitenwandungen nur in der Mitte verdickt sind, und bräunlichem Inhalt.

II. Obliterirte Nährschicht.

Die Nährschicht enthält nur in sehr frühem Stadium feinkörnige Stärke.

Aus der Familie der *Caprifoliaceae* gehört *Sambucus* zu Typus II. Hierher dagegen gehört:

Symphoricarpus racemosus Pursh.

Die Samenschale geht hier direct in das Endocarp über. Die Schichten der Samenschale sind folgende:

I. Sclereiden, welche auf dem Querschnitt langgestreckt und beiderseits zugespitzt erscheinen. Auf dem Längsschnitt sind sie fast isodiametrisch.

II. Eine einreihige Schicht Sclereiden von besonderer Grösse, auf dem Querschnitt isodiametrisch.

III. Eine einzellreihige Parenchymschicht.

IV. Mehrreihige, obliterirte Nährschicht.

Die Verdickungen der Sclereidenwandungen finden sehr früh statt.

Von *Asclepiadeae* gelangten zur Untersuchung:

Vincetoxicum purpurascens Mönch.

I. Mässig starkwandige Epidermis.

II. Mehrreihige obliterirte Nährschicht.

In jungen Stadien enthält die Nährschicht reichlich Stärke.

Asclepias Syriaca L.

I. Fast isodiametrische Epidermiszellen mit verdickter Aussenwand und punktförmigen Erhöhungen auf der Mitte jeder Zelle.

II. 8 bis 16reihige Nährschicht, an den Breitseiten obliterirt, an den Flügeln turgescent geblieben.

Von *Strychnaceae* kommt in Betracht die Samenschale von:

Strychnos Nux vomica L.

Sie besteht nur aus zwei Schichten:

I. Epidermis mit charakteristischen Trichomen, an der Basis stark verdickt.

II. Nährschicht, aus 3 bis 6 Reihen obliterirtem Parenchym bestehend, am Nabel stärker entwickelt, und theilweise nicht obliterirt.

Von *Plantagineae* untersuchte ich nur:

Plantago major L.

I. Epidermis eingeschrumpfter Schleimzellen, aufgequollen quadratisch bis schwach rechteckig.

II. Obliterirte Nährschicht, 6 bis 8 Reihen stark.

III. Eine Reihe mässig verdickter, isodiametrischer oder länglich abgerundeter Parenchymzellen mit bräunlichem Inhalt.

Aus der Familie der *Labiatae* seien folgende Samenschalen beschrieben:

Salvia officinalis L.

I. Epidermis bogenförmig nach innen gewölbter Zellen, deren innere Seite völlig verdickt ist, während die äussere zart geblieben und fein cuticularisirt ist.

II. Mehrreihige obliterirte Nährschicht.

III. Parallelepipetische, ausgebauchte, starkwandige Zellen.

Scutellaria lupulina L.

weist mit wenig Veränderungen dieselben Verhältnisse auf.

Die Samenschalen der aus der Familie der *Solanaceae* untersuchten Pflanzen stimmen darin überein, dass sie sämmtlich aus zwei Schichten bestehen, deren innerste die Nährschicht ist. Die Zellen derselben sind von durchweg typischer Form und enthalten vorübergehend reichlich feinkörnige Stärke. Die Epidermiszellen zeigen grösstentheils ausserordentlich starke, unförmliche, schichtenweise Verdickungen der Innen- und Seitenwandungen, letzterer oft nur partiell, während die scharf cuticularisirte Aussenmembran unverdickt bleibt.

Lycopersicum esculentum Tournef. (Fig. 14. 15.)

I. Epidermis von Palissadenzellen, welche mit wellig gebogenen Wänden ineinander greifen. Sie sind nur an der Basis verdickt und etwa in der Hälfte ihrer Länge knieförmig nach der Spitze des Ovulum hingebogen. In den äusseren Conturen sind sie mit dem Fruchtfleisch verwachsen ¹⁾.

II. Obliterirte Nährschicht, aus 10 bis 15 Reihen bestehend.

In der Jugend enthält die Nährschicht reichlich fettes Oel und feinkörnige Stärke.

Hyoscyamus niger L.

I. Epidermis von Sclereiden mit unverdickter Aussenwand und körnigem Inhalt.

II. Nährschicht aus 3 bis 5 Reihen obliterirtem braunwandigem Parenchym.

1) Diese Epidermiszellen mit deutlicher Intercellularsubstanz sind von Lohde und Harz für Haare angesehen worden.

Capsicum longum DC.

- I. Epidermis von Sclereïden mit unverdickter Aussenwand.
- II. Nährschicht aus 6 bis 8 Reihen oblitterirtem Parenchym.

Datura Stramonium L.

- I. Epidermis von Sclereïden mit partiellen bauchigen Seitenwandverdickungen.
- II. Oblitterirte Nährschicht.

Solanum tuberosum L.

- I. Epidermis von Sclereïden, ähnlich denen von *Capsicum*.
- II. Nährschicht von 8 bis 12 Reihen an den Kanten theilweise nicht oblitterirtem Parenchym.

Die untersuchten *Convolvulaceae* zeigen Palissadenzellreihe und Nährschicht.

Convolvulus arvensis L.

- I. Epidermis aus kubischen bis säulenförmigen Palissaden-Sclereïden, mässig verdickt, gruppenweise stark verlängert und Warzen bildend. Wandungen farblos, Inhalt tiefroth- bis schwarzbraun.
- II. Einreihige Schicht, auf dem Querschnitt kubischer, in der Richtung des Samens langgestreckter Zellen.
- III. Palissadenschicht.
- IV. Nährschicht, 8 bis 12 Reihen stark, oblitterirt.

Ipomoea Sibirica H.

- I. Epidermis von Palissadenzellen.
 - II. Palissadenschicht mit Lichtlinie.
 - III. Oblitterirte Nährschicht.
- Im halbreifen Zustande strotzt die Nährschicht von Stärkekörnern, deren Grösse bis 21μ beträgt.

Die Familie der *Cuscutaceae* zeichnet sich durch die Schleimepidermis aus, sowie durch das Auftreten grosser Stärkekörner in den Epidermiszellen.

Cuscuta epithymum L.

- I. Schwach cuticularisirte rundliche Schleimepidermiszellen mit bräunlichen Wandungen.
- II. Hellbraunwandige längere und kürzere, theils kubische, theils prismatische mässig verdickte Palissadenzellen.
- III. Palissadenschicht von Makrosclereïden mit nur spaltenförmigem Lumen.
- IV. Oblitterirte Nährschicht, 2 bis 6 Zellreihen mächtig, mit blassgelblichen Wandungen.

Von Monocotylenfamilien wurden folgende untersucht: *Irideae*.

Crocus sativus All.

- I. Epidermis papillenartig ausgestülpter, mässig verdickter, bräunlicher Zellen mit körnigem Inhalt.

- II. Obliterirte Nährschicht mit bräunlichen Wandungen.
- III. Grosse, radial gestreckte, dünnwandige Parenchymzellen.
- IV. Obliterirte Nährschicht, mit hellen Wandungen.

Smilaceae.

Asparagus officinalis L.

- I. Grosszellige Epidermis, aussen und seitlich verdickt, mit braunem, körnigem Inhalt.
- II. Obliterirte Nährschicht, 8 bis 12 Reihen.

Colchicaceae.

Veratrum nigrum L.

- I. Epidermis starkwandiger, beiderseits ausgebauchter, tangential gestreckter, netzig getüpfelter Zellen.
 - II. Obliterirte Nährschicht mit braunen geschrumpften Zellwandungen.
- Im halbreifen Zustande sind beide Schichten dicht mit 2 bis 5 μ grossen, zuweilen zusammengesetzten Stärkekörnern erfüllt.

Veratrum Sabadilla L.

zeigt durchaus dieselben Verhältnisse.

Colchicum autumnale L.

weicht gleichfalls im Bau der Samenschale nicht von der eben geschilderten Form ab.

Scitamineae.

Elettaria Cardamomum White.

- I. Epidermis prosenchymatischer Schlauchzellen.
- II. Querszellenschicht.
- III. Einzellreihige, nicht obliterirte Nährschicht, ölführend.
- IV. Sclereidenschicht, deren Wandungen nach innen ausserordentlich stark und in geringem Maasse auch seitlich verdickt sind.

Gramineae.

Triticum vulgare L.

Die im reifen Zustande mit der Fruchtschale verwachsene Samenschale besteht aus zwei Schichten:

- I. Zwei Reihen obliterirtes, zartwandiges Parenchym.
- II. Eine Reihe ebenfalls stark zusammengedrückter Parenchymzellen, welche beim Erwärmen mit Wasser oder verdünnter Kalihydratlösung in radialer Richtung um das Zwölffache aufquellen und dann deutliche Schichtung der Membran zeigen. Die Lumina stossen mit ihren zugespitzten Enden dagegen in tangentialer Richtung so dicht aneinander, dass sie nur von der primären Membran getrennt erscheinen.

Im halbreifen Zustande, und theilweise schon zur Zeit der Befruchtung, enthält die zweite Schicht Stärkekörner.

Typus II.

Vorhandensein einer Nährschicht, aber keiner Hart- oder Schleimschichten.

Poteriaceae.

Poterium Sanguisorba L.

I. Epidermis dünnwandiger brauner, sehr langgestreckter Zellen mit feinkörnigem Inhalt.

II. Obliterire Nährschicht, aus 3 bis 4 Reihen bestehend, mit dem Gefässbündel der Raphe.

Sanguisorba officinalis L.

I. Schwach cuticularisirte Epidermis grosser zartwandiger, nach aussen ausgebauchter Zellen.

II. Obliterirte Nährschicht, aus 2 bis 4 Reihen bestehend.

Rosaceae.

Rosa canina L.

I. Epidermis zartwandiger unregelmässiger Zellen von sehr verschiedener Grösse.

II. Obliterirte Nährschicht.

Lauraceae.

Laurus nobilis L.

Die dünne Samenschale, welche an den Sclereidenring der Frucht angrenzt und mit dieser fast verwachsen ist, besteht nur aus dem wenig-reihigen, völlig obliterirten Parenchym, in welchem die Gefässbündel verlaufen.

Cannabineae.

Cannabis sativa L.

I. Kleinzellige Epidermis.

II. Obliterirte Nährschicht, aus 6 bis 12 Zellreihen bestehend, welche von aussen nach innen an Grösse abnehmen und Chlorophyllreste noch im reifen Zustande enthalten.

Humulus Lupulus L.

I. Epidermis tangential gestreckter Zellen.

II. Wie bei Cannabis.

Dipsaceae.

Scabiosa monspeliensis H.

I. Grosszellige dünnwandige, stark gedrückte Epidermis.

II. Obliterirte Nährschicht.

Compositae.

Achillea Millefolium L.

I. Epidermis rothbrauner, stark gedrückter Zellen.

II. Einreihige Nährschicht, obliterirt Lumina spaltenförmig.

Matricaria Chamomilla L. ebenso.

Taraxacum officinale Wigg. ebenso.

Scorzonera Hispanica L.

I. Epidermis langgestreckter Zellen.

II. 3 bis 6 Reihen gestreckter oder kurzer, netzig getüpfelter Parenchymzellen mit Interzellularen.

Helianthus annuus L.

I. Epidermis mässig verdickter, tafelförmiger, nach innen verschmälerter Zellen, Interzellularräume bildend.

II. 3 bis 5 Reihen plasmagefüllter, unregelmässiger, aber durchweg radial verkürzter Parenchymzellen.

III. 8 bis 16 reihige oblitterirte Nährschicht.

Cichorium Intybus L.

I. Epidermis farbloser, netzig verdickter Zellen.

II. 10 bis 15 Reihen oblitterirte Nährschicht.

Carthamus tinctorius L.

I. Epidermis schiefer, starkwandiger, gelblicher getüpfelter palissadenförmiger Zellen.

II. Getüpfeltes, inhaltsfreies Parenchym.

III. Mächtige oblitterirte Nährschicht.

Calendula officinalis L.

I. Epidermis zartwandiger kleiner, etwas gestreckter Zellen.

II. 2 bis 5 Reihen grosser Parenchymzellen mit Interzellularen.

III. 6 bis 10 reihige oblitterirte Nährschicht mit blassgelblichen Wandungen.

Die Entwicklungsgeschichte der Samenschale ist bei allen untersuchten Compositen dieselbe. Schon in sehr jugendlichem Zustande, wo die Zellen der zweiten Schicht noch deutliche Zellkerne zeigen, ist die Nährschicht in ihren innersten Reihen bereits gänzlich von Inhalt entleert. Stärke wird in keiner Schicht und in keinem Stadium des Reifungsprocesses angetroffen.

Caprifoliaceae.

Sambucus nigra L.

I. Epidermis tangential gestreckter Zellen, beiderseits ausgebaucht, mit zarten Wandungen und braunem Inhalt, welcher sich mit Schwefelsäure kirschroth färbt.

II. Eine bis zur Unkenntlichkeit oblitterirte Nährschicht.

Im halbreifen Zustande ist die subepidermoïdale Schicht bereits plasma-leer. Stärke tritt im Laufe der Entwicklung nicht auf.

Scrofulariaceae.

Verbascum thapsiforme Schrad.

I. Epidermis längsverlaufender Prosenchymzellen.

II. Mehrreihige oblitterirte Nährschicht.

Rhinanthus minor Ehrh.

- I. Grosse tangential gestreckte Epidermiszellen, dünnwandig, schwach ausgewölbt, mässig cuticularisirt.
- II. 2 bis 6 reihige oblitterirte Nährschicht.

Typus III.

Anstatt der Nährschicht ist ein nicht oblitterirendes Parenchym vorhanden.

*Dryadeae.**Rubus Caesius L.*

- I. Epidermis brauner zartwandiger Zellen von prismatischer Gestalt.
- II. Nicht oblitterirendes mehrreihiges Parenchym.
- III. Einreihige Schicht, auf dem Querschnitte kubischer, zartwandiger Zellen.

*Ranunculaceae.**Ranunculus arvensis L.*

- I. Dünnwandige Epidermis.
- II. Nicht oblitterirtes Parenchym.
- III. Pigmentschicht tafelförmiger Zellen mit verdickten Innenwänden und röthlichem Inhalt.

Delphinium exaltatum L. (Fig. 16).

- I. Zartwandige Epidermis.
 - II. 4 bis 7 Reihen parenchymatisches Gewebe.
 - III. Eine Reihe fast isodiametrischer, beiderseits ausgebauchter Zellen.
- Im jugendlichen Zustande sind alle Elemente mit 2 bis 6 μ grossen Stärkekörnern erfüllt.

Delphinium Staphisagria L.

- I. Epidermis grosser isodiametrischer oder radial gestreckter Zellen mit braunen, deutlich schichtenweise verdickten Wandungen und bräunlichem Inhalt.
- II. Nicht oblitterirtes Parenchym.
- III. Pigmentschicht radial gestreckter Zellen mit körnigem Inhalt und verdickter Innenwand.

Das Parenchym enthält im jugendlichen Zustande Stärke.

Nuphar luteum Smith.

- I. Zartwandige Epidermis.
 - II. 4 bis 5 Reihen nicht oblitterirendes Parenchym.
- Im jugendlichen Zustande enthält das Parenchym vorübergehend Crystalle oxalsauren Kalkes.

Cupuliferae.*Quercus Robur L.*

- I. Epidermis grosser dünnwandiger isodiametrischer Zellen.
- II. 10 bis 14 Reihen zartwandiges, nicht obliterirtes Parenchym.

Castanea vesca L.

- I. Epidermis grosser dünnwandiger isodiametrischer Zellen.
- II. 25 bis 36 Reihen nicht obliterirtes, zartwandiges Parenchym mit bräunlichem Inhalt, Intercellularräume bildend. Zellen nach innen an Grösse abnehmend.

Fagus silvatica L.

- I. Epidermis grosser, mässig dickwandiger Zellen mit braunem Inhalt.
- II. 6 bis 8 Reihen inhaltsfreier, etwas gedrückter aber nicht obliterirter Parenchymzellen mit Intercellularräumen; gefässbündelführende Schicht.
- III. Ein bis zweireihige Schicht tangential gestreckter Zellen.

Coryleae.*Corylus Avellana L.*

- I. Epidermis dünnwandiger isodiametrischer Zellen.
- II. 3 bis 5 Reihen dünnwandiges Parenchym mit Intercellularräumen.
- III. 8 bis 10 Reihen Parenchym.

Orobanchaeae.

Bei den den Orobanche-Arten besteht die Samenschale, wie schon L. Koch mitgetheilt, aus nur einer einzigen Schicht gewölbter tafelförmiger Zellen mit dünner, leicht zerreissender Aussenwand und porös verdickten, dunkelbraunen Radial- und Innenwänden.

Borragineae.*Borrago officinalis L.*

Hier vertritt nur eine einzellreihige Schicht tangential gestreckter Zellen mit mässig verdickten, stark lichtbrechenden Wandungen die Samenschale.

Palmae.*Cocos nucifera L.*

Hier steht die Oberhaut der Samenschale in unmittelbarem Zusammenhange mit dem Endocarp. Unter der Oberhaut der Samenschale befindet sich eine ca. 20 Zellreihen starke Schicht tangential gestreckter weisser, netzig getüpfelter Parenchymzellen und unter dieser eine aus etwa ebenso vielen Reihen isodiametrischer hellwandiger Parenchymzellen, welche mit röthlich braunem Inhalt erfüllt sind.

Beobachtungen über Zellhautbildung an des Zellkernes beraubten Protoplasten.

Von

Ed. Palla.

(Hierzu Tafel XIII.)

I.

Seitdem durch Hertwig für die Thiere, durch Strasburger für die Pflanzen erwiesen worden ist, welche bedeutende Rolle der Zellkern bei dem Geschlechtsacte spielt, ist von Zoologen wie von Botanikern bereits mehrfach der Versuch gemacht worden, die Frage, ob gewisse, beziehungsweise welche Functionen des Protoplasts an die Gegenwart des Zellkernes gebunden sind, zu lösen. Es sei nur auf die Arbeiten der Zoologen Balbiani, Gruber, Nussbaum, Verworn, Korschelt und Hofer verwiesen; Gruber ist zugleich der erste, der eine Nachwirkung der Zellkernthätigkeit annimmt¹⁾. Von Botanikern hat zuerst Schmitz Beobachtungen veröffentlicht, welche auch die Frage nach eventuellen Beziehungen des Zellkernes zu den Functionen der anderen Protoplastentheile berühren. Schmitz²⁾ fand, dass das Protoplasma der vielkernigen Zellen der *Siphonocladaceen* bei einer Verletzung der Zelle sich gewöhnlich zu mehreren grösseren oder kleineren Kugeln gestaltet. Diese Kugeln umgeben sich sehr rasch mit einer Membran, enthalten dann aber stets mindestens einen Zellkern. Plasmatheile, die überhaupt keinen Kern besitzen, gehen immer ohne die Bildung einer Zellhaut zu Grunde. Schmitz kommt zu dem Schlusse: »Die Eigenschaft des Plasmas der *Siphonocladaceen*-Zellen, dass auch einzelne losgetrennte Stücke desselben lebensfähig bleiben und sich zu neuen selbständigen Zellen³⁾ gestalten können, ist somit nicht dem Protoplasma als solchem eigen. Es ist vielmehr dafür, dass ein abgerissener Theil des Protoplasmas selbständig als Zelle sich gestalte und weiterlebe, durchaus erforderlich, dass dieses losgetrennte Protoplastmklümpchen einen oder mehrere Zellkerne der Mutterzelle enthalte«⁴⁾.

Sehr wichtig sind die Arbeiten von Klebs⁵⁾. Derselbe wendete bei seinen Versuchen eine Methode an, die es gestattet, einen Protoplast ohne

1) Beiträge zur Kenntniss der Physiologie und Biologie der Protozoën. Ber. d. Naturf. Ges. zu Freiburg i. B. 1. Bd. 1886. S. 46.

2) Beobachtungen über die vielkernigen Zellen der *Siphonocladaceen*. Festschrift der Naturforsch. Ges. in Halle a. S. 1879. S. 273.

3) Hiermit ist wohl, nach der ganzen Darstellung von Schmitz, hauptsächlich die Ausbildung einer Zellhaut gemeint. Ob diese Zellen weiter wachsen, findet sich nicht direct erwähnt.

4) a. a. O. S. 306.

5) Ueber den Einfluss des Kernes in der Zelle. Biolog. Centralbl. VII. Bd. 1887. S. 161. — Beiträge zur Physiologie der Pflanzenzelle. Unters. a. d. botan. Institut zu Tübingen. 1888. S. 551.

grobe mechanische Verletzung in einen kernhaltigen und einen kernlosen Theil zu trennen. Klebs cultivirte verschiedene Pflanzenzellen in 16—25 %igen Rohrzucker-Lösungen. Bei der sich einstellenden Plasmolyse geschah es dann häufig, dass in langgestreckten Zellen der Protoplast in zwei Hälften zerfiel, von denen die eine den Zellkern enthielt, die andere kernlos war. Auf diese Weise gelang es Klebs, kernlose Protoplaste von *Zygnema*, *Spirogyra* und *Oedogonium* sowie von den Blattzellen von *Funaria hygrometrica* zu erhalten. An solchen kernlosen Protoplasten fand nun Klebs vor allem, dass sie im Stande waren, sich sehr lange Zeit hindurch am Leben zu erhalten; wurden sie im Dunklen gehalten, so verschwand die in ihren Chloroplasten vorhandene Stärke, ein Beweis, dass auch in ihnen gewisse Processe des Stoffwechsels vor sich gehen müssen, vor allem Athmung. Weiter konnte die wichtige Thatsache festgestellt werden, dass bei *Spirogyra* und *Zygnema* Stärkebildung auch ohne die Gegenwart des Zellkernes stattfinden kann; denn wurden durch Aufbewahrung im Dunklen entstärkte *Spirogyren* und *Zygnemen* dem Lichte ausgesetzt, so erfüllten sich auch die Chloroplasten der kernlosen Stücke mit Stärke, und zwar viel reichlicher als jene der kernhaltigen. Dagegen konnte Klebs nie beobachten, dass kernlose Protoplaste sich mit einer Zellhaut umgeben hätten; ebensowenig konnte er ein Wachsthum derselben feststellen.

Eingehend hat sich endlich Haberlandt mit unserer Frage beschäftigt. In seiner Arbeit »Ueber die Beziehungen zwischen Function und Lage des Zellkernes bei den Pflanzen«¹⁾ wird eine grosse Anzahl von Beispielen zusammengestellt, die darthuen, dass in Zellen, welche ein lebhaftes localisirtes Längenwachsthum zeigen oder eine starke einseitige Verdickung ihrer Membran aufweisen, der Zellkern eine solche Lage einnimmt, dass er direct in der nächsten Nähe des stärksten Wachsthums oder der stärksten Zellhautbildung sich befindet oder wenigstens durch Plasmafortsätze auf dem kürzesten Wege mit jenen Stellen verbunden ist. Aus diesen Lagerungsverhältnissen schliesst Haberlandt, »dass der Kern beim Wachsthum der Zelle, speciell beim Dicken- und Flächenwachsthum der Zellhaut eine bestimmte Rolle spielt«²⁾. Haberlandt führt überdies experimentelle Versuche mit *Vaucheria* an; er zerschnitt *Vaucheria*-Fäden in 5—10 %iger Rohrzuckerlösung und fand, dass eine grosse Anzahl der bei der Operation ausgestossenen Plasmaballen am Leben blieb. Diese lebensfähigen Plasmaballen hatten alle das gemeinsame, dass sie in allen sicher untersuchten Fällen mindestens einen Zellkern besaßen, weshalb Haberlandt geneigt ist, anzunehmen, »dass die Lebensfähigkeit der ausgeworfenen Plasmatheile an das Vorhandensein

1) Jena 1887.

2) a. a. O. S. 99.

mindestens eines Zellkernes gebunden ist«¹⁾. In Bezug auf die Bildung einer Zellhaut verhielten sich die erwähnten Plasmaballen sehr verschieden, indem die einen sehr bald mit einer Membran sich umkleideten, während die anderen überhaupt keine Zellhaut bildeten. Endlich weist Haberlandt die schon aus Engelmann's²⁾ Versuchen hervorgehende Unabhängigkeit der Assimilation der Chlorophyllkörper von der Gegenwart des Zellkerns speciell für die Chloroplasten der Blattzellen von *Funaria hygrometrica* nach.

In einer anderen Arbeit³⁾ hat dann Haberlandt noch weitere Beobachtungen veröffentlicht, die für eine Abhängigkeit der Zellhautbildung vom Zellkerne sprechen. Er untersuchte die Haare mehrerer *Cucurbitaceen*, wie *Bryonia dioeca*, *Sicyos angulata* und *Momordica Elaterium*, welche die Erscheinung der »Einkapselung« zeigten, und fand, dass nur solche Plasmatheile sich einkapseln, also mit einer Membran umgeben, welche den Zellkern besitzen. Ebenso beobachtete Haberlandt an den vielkernigen Bastzellen von *Nerium Oleander*, *Vinca minor* und *Linum usitatissimum* und *narbonense*, die meist mehrere Kapseln enthielten, dass stets jede Kapsel im Besitze mindestens eines Zellkernes war; kernlose einkapselte Protoplasmatheile kamen nicht vor.

Es geben also die Arbeiten der Botaniker übereinstimmend an, dass ihres Kernes beraubte Protoplaste nicht im Stande sind, eine Zellhaut zu bilden, so dass die Membranerzeugung an die Gegenwart des Zellkernes gebunden erscheint. Wie ich bereits in einer früheren vorläufigen Mittheilung⁴⁾ in Kürze berichtet habe, ist es mir dagegen gelungen, nachzuweisen, dass Zellhautbildung auch an Protoplasten statthaben kann, welche des Kernes verlustig gegangen sind. Ich habe seither meine diesbezüglichen Beobachtungen noch fortgesetzt und gebe im folgenden die Ergebnisse meiner Versuche. Zum Schlusse werde ich dann die Frage zu erörtern haben, ob man die Zellhautbildung für einen vom Zellkerne durchaus unabhängigen Process anzusehen hat oder die hier zu besprechenden Fälle als Nachwirkungserscheinungen der Zellkernthätigkeit aufzufassen sind.

II.

1. Beobachtungen an Pollenschläuchen.

Die Pollenkörner der nachstehend besprochenen Pflanzenarten wurden in den in der zweiten Auflage von Strasburger's botanischem Practicum

1) a. a. O. S. 90.

2) Neue Methode zur Untersuchung der Sauerstoffausscheidung pflanzlicher und thierischer Organismen. Botan. Zeit. 1881. S. 441 u. f.

3) Ueber Einkapselung des Protoplasmas mit Rücksicht auf die Function des Zellkernes. A. d. Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. in Wien. Math.-naturwiss. Classe. Bd. XCVIII. Abth. I. März 1889. S. 190.

4) Ber. d. deutschen botan. Ges. VII. Jahrg. 1889. S. 330.

angegebenen Rohrzucker-Gelatine-Lösungen und zwar im hängenden Tropfen cultivirt; meist wurde jedoch der Gehalt an Gelatine erhöht, da es sich zeigte, dass in Folge dessen zwar nicht das Platzen der Pollenschläuche verhindert, wohl aber bewirkt wurde, dass die hierbei ausgestossenen Plasmatheile leichter am Leben blieben. Die Culturen wurden bei derselben Pflanzenart theils im Dunklen, theils am Lichte vorgenommen; für die zu besprechenden Vorgänge war dies von keinem wesentlichem Einflusse. Die Zellkerne wurden bei *Leucoium vernum*, *Galanthus nivalis* und *Scilla bifolia* (zum Theile) durch Methylgrün-Essigsäure, bei den übrigen Pflanzenarten durch Borax-Carmin zur Anschauung gebracht. Die Reaction auf Cellulose wurde überall mit Chlorzink-Jod durchgeführt und ergab stets ein positives Resultat.

Das Platzen der Pollenschläuche, das, wie sich zeigen wird, für die nachstehend zu schildernden Beobachtungen von der grössten Wichtigkeit war, erfolgt bei künstlichen Culturen ungemein leicht; oft genügt schon eine geringe Erschütterung des Präparates, um dasselbe herbeizuführen. Wohl stets dürfte es die Spitze des Pollenschlauches sein, an welcher das Platzen statt hat; da jedoch gerade hier die Zellhaut sehr zart ist, so gelingt es nicht, den in ihr entstandenen Riss aufzufinden. Auffallend ist es, dass der Protoplast den geplatzten Scheitel, selbst wenn der Protoplastmaverlust ein ganz unbedeutender ist, aufzugeben pflegt, indem er sich von der verletzten Stelle durch eine Cellulosekappe abschliesst und gewöhnlich auch zugleich sein Längenwachsthum überhaupt einstellt, während in günstigen Fällen, stets aber nur wo wenigstens der vegetative Kern im Schlauche zurückgeblieben ist, an irgend einer Stelle des Schlauches eine Aussackung entsteht, welche weiter wächst, den geplatzten Scheitel zur Seite schiebt und den ursprünglichen Schlauch fortsetzt. Da sich auch an diesen neu ausgetriebenen Schläuchen derselbe Vorgang wiederholen kann, so sieht man bisweilen Pollenschläuche, die sympodial bis aus vier nacheinander entstandenen Schläuchen aufgebaut sind.

Leucoium vernum.

Die leicht keimenden Pollenkörner trieben ziemlich rasch oft sehr lange Schläuche, die häufig an ihrer Spitze platzten. Traten hierbei, was nicht selten geschah, beiderlei Zellkerne aus, so ging gewöhnlich der im Schlauche verbleibende kernlose Plasmatheil zu Grunde, ohne eine Zellhaut zu bilden. In einigen Fällen konnte jedoch beobachtet werden, dass das kernlos gewordene Schlauchplasma sich mit einer Cellulosekappe gegen den verletzten Scheitel hin abschloss. Häufig geschah dies, wenn beim Platzen blos der generative Kern verloren ging, der vegetative jedoch im Schlauche verblieb ¹⁾. Manchmal kam es vor, dass an geplatzten

1) Bei *Leucoium vernum*, wie bei vielen Monokotylen überhaupt kann man beobachten, dass in den wachsenden Pollenschläuchen bald der generative, bald der

Pollenschläuchen, nach der Ausbildung der Cellulosekappe unterhalb der verletzten Spitze, ein neuer Scheitel sich bildete, der später den Schlauch fortsetzte; in solchen Fällen wurde festgestellt, dass der vegetative Kern im Schlauch zurückgeblieben war und die Bildung des neuen Scheitels gewöhnlich über demselben erfolgte. Die beim Platzen des Schlauches ausgestossenen Plasmatheile gingen stets sofort zu Grunde.

Galanthus nivalis.

Die rasch wachsenden Pollenschläuche platzten sehr häufig an ihrer Spitze, wobei gewöhnlich sowohl der generative als auch der vegetative Zellkern mit ausgestossen wurden. In den meisten Fällen erhielt sich der im Schlauche verbliebene Protoplasma-rest am Leben, auch wenn er ganz kernlos geworden war, und schloss sich gegen den verletzten Scheitel hin durch eine Cellulosekappe ab. Dann zerfiel er gewöhnlich in mehrere Theile, deren Länge häufig dem Abstände je zweier der hier, wie bekannt, typisch auftretenden Cellulosepfropfen entsprach; diese Theile kapselten sich oft sämmtlich ein, das heisst, sie umgaben sich mit einer Zellhaut, oder es umkleideten sich wenigstens die der Schlauchspitze zunächst gelegenen Theile mit einer Cellulosemembran (Fig. 1). Die ausgestossenen Plasmapartien gingen sofort zu Grunde, mochten sie den einen oder beiderlei Zellkerne enthalten oder nicht; in einem Falle jedoch wurde beobachtet, dass sich ein ausgestossener, und zwar kernloser, Protoplasma-theil lebend erhielt und mit einer Zellhaut umgab.

Scilla bifolia.

In den meisten Fällen, wenn die Pollenschläuche platzten, wobei fast regelmässig die Kerne mit austraten, zerfiel der im Pollenschlauche zurückgebliebene Protoplasma-rest in oft zahlreiche Partien, die sich zumeist sämmtlich einkapselten; so waren zwanzig und darüber grössere und kleinere Kapseln in einem Schlauche nicht gerade selten. Sehr häufig kam es vor, dass beim Platzen des Schlauches ausgestossene Plasmapartien sich lebend erhielten und mit einer Cellulosemembran umgaben (Fig. 2); bis auf einen Fall wurden dieselben alle kernlos befunden. Bei manchen solcher ausserhalb des Pollenschlauches entstandenen Kapseln konnte beobachtet werden, dass sie an einer Stelle eine mehr oder minder kugelförmige bis ellipsoidische Aussackung aufwiesen, die manchmal die Grösse der Kapsel selbst erreichte; solche Kapseln erinnerten lebhaft an sprossende Hefe. Die Aussackungen traten stets nur in der Einzahl an den Kapseln auf, auch wurde an der Aus-

vegetative Zellkern vorausgeht, eine bestimmte Regel für das Vorausschreiten des einen oder des anderen Kernes also sich nicht feststellen lässt; vergl. diesbezüglich auch Strasburger, Neue Untersuchungen über den Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen, 1884, S. 15.

sackung selbst nicht wieder eine weitere Aussackung beobachtet. Ich glaube, dass in dieser Erscheinung ein localisirtes Wachsthum der Kapseln vorliegt, wenn ich auch gestehen muss, dass ich derartige mit einer Aussackung versehene Kapseln zufälligerweise nur in solchen Präparaten zur Ansicht bekam, wo sie bereits abgestorben waren, so dass ich immerhin zugeben muss, dass solche Kapseln auch derart entstanden sein konnten, dass der ausgestossene Plasmatheil die beschriebene Gestalt bereits besass, bevor er sich mit einer Zellhaut umgab. Zweifellos aber hatte ein Wachsthum der Kapseln in jenen wenigen Fällen stattgefunden, wo die Kapseln (die sich alle als kernlos erwiesen) in einen den Durchmesser der Kapseln an Länge mehrmals übertreffenden Schlauch sich verengten, trotzdem auch diese gleichfalls erst im abgestorbenen Zustande bemerkt wurden; denn beobachtet man beim Platzen eines Pollenschlauches das austretende Plasma, so kann man wahrnehmen, dass es hierbei, vorausgesetzt natürlich, dass es lebend bleibt, das Bestreben zeigt, eine mehr minder kugelförmige Gestalt anzunehmen; dass aus dem Schlauche austretendes Plasma eine langgestreckte, einem keimenden Pollenkorne gleichende Gestalt angenommen hätte, konnte nie beobachtet werden.

Hyacinthus orientalis.

An den Pollenschläuchen dieser Pflanze wurden ganz ähnliche Erscheinungen constatirt, wie an jenen von *Scilla bifolia*. Auch hier traten beim Platzen solcher Schläuche, die bereits eine beträchtliche Länge erreicht hatten, gewöhnlich beiderlei Kerne aus und das im Schlauche zurückgebliebene Protoplasma zerfiel in oft zahlreiche Theile, die sich mit einer Cellulosehaut umgaben. Sehr häufig konnte man beobachten, dass in dem noch von der Exine umgebenen Theile der Pollenzelle sich eine, manchmal auch zwei oder drei Kapseln mit bisweilen geschichteter Membran bildeten (Fig. 3); hie und da entstand innerhalb einer solchen Kapsel in Folge einer aus unbekannten Gründen sich einstellenden Contraction des Protoplasmas nochmals eine Kapsel. Uebrigens trat auch bei älteren ausgekeimten Pollenkörnern mit nicht geplatzten Schläuchen die Bildung einer Kapsel innerhalb des von der Exine eingeschlossenen Theiles der Pollenzelle häufig genug auf. Oefters kam es an Schläuchen, die bereits eine recht ansehnliche Länge besaßen und an ihrer Spitze meist mehr oder weniger stark angeschwollen waren, vor, dass an dem Scheitel ganz kleine Plasmatheile austraten, gewissermassen durchgepresst wurden, ohne dass äusserlich eine Verletzung der Schlauchwand zu bemerken war; solche oft winzige Protoplasmapartien umkleideten sich gleichfalls mit einer Cellulosemembran. Die Erscheinungen, die früher an *Scilla bifolia* als ein Zeichen stattgefundenen Wachsthums gedeutet worden sind, kamen bei *Hyacinthus orientalis* ebenfalls vor.

Hemerocallis fulva.

Die durch ihre Grösse ausgezeichneten Pollenschläuche dieser Pflanze wurden dadurch sehr bemerkenswerth, dass sie beim Platzen in Folge ihrer Breite oft ganz ansehnliche Protoplasamassen verloren, die sich am Leben erhielten und eine Zellhaut ausbildeten. Solche Kapseln (Fig. 4) erwiesen sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle als kernlos. Sie zeichneten sich übrigens nicht bloss durch ihre Grösse, sondern auch dadurch aus, dass ihre Cellulosemembran fast stets sehr deutlich geschichtet war, manchmal auch Vorsprünge in das Kapselinnere bildete (Fig. 4, II.). Die einzelnen Stadien von dem Austreten der Plasmatheile bis zu deren Umkleidung mit einer Membran, die wie bei den übrigen angeführten Pflanzenarten gewöhnlich innerhalb 24 Stunden vor sich ging, konnten hier besonders deutlich verfolgt werden.

Gentiana excisa.

Die Pollenschläuche entwickelten sich fast stets normal fort, ohne zu platzen, und bildeten gewöhnlich, nachdem sie eine ansehnliche Länge erreicht hatten, an der Spitze oft eine sehr bedeutende kolbige Anschwellung, in welcher in den meisten Fällen der vegetative und der meist schon getheilte generative Zellkern lagen. Der Protoplast befand sich nicht in der ganzen Länge des Schlauches, sondern in der Scheithälfte desselben; die andere Hälfte stellte einen leeren Schlauch dar. Unterhalb der Anschwellung zerfiel häufig das Protoplasma in mehrere kernlose Theile, die sich einkapselten; auch das Protoplasma der Anschwellung, das, wie erwähnt, gewöhnlich die Zellkerne enthielt, umgab sich öfters mit einer Membran. Ausserhalb des Pollenschlauches zur Entwicklung gelangte Kapseln wurden nicht beobachtet.

Cytisus Weldeni.

Bei dieser Pflanze wurden zwar keine Einkapselungen innerhalb der Pollenschläuche beobachtet, dagegen bildeten aber die in Folge des Platzens, welches sich hier in ungewöhnlicher Häufigkeit einstellte, ausgetretenen Plasmamassen ungemein häufig eine Cellulosehaut. Die so entstandenen Kapseln enthielten manchmal den einen oder anderen, auch beiderlei Zellkerne, gewöhnlich jedoch waren sie kernlos. Manche der kernlosen Kapseln liefen in lange Schläuche aus, deren Scheitel eine starke Verdickung aufwies (Fig. 5). Dass hier ein Wachsthum dieser Kapseln anzunehmen ist, dürfte wohl kaum zu bezweifeln sein. Eine etwaige Verwechslung mit normalen Pollenschläuchen, die ihre Exine abgestreift haben, ist durchaus ausgeschlossen; schon die viel geringere Grösse der Kapseln sowie deren Kernlosigkeit sprechen entschieden dagegen.

Dictamnus albus.

Auch bei dieser Pflanze wurden ganz ähnliche Erscheinungen wie bei *Cytisus Weldenii* wahrgenommen. Auch hier wiesen hie und da einzelne der kernlosen Kapseln einen mehr minder langen Schlauch auf; bisweilen wurde, wie bei *Scilla bifolia*, hefeartige Sprossung beobachtet. In vereinzeltten Fällen wurden auch in den Schläuchen Kapseln (ohne Zellkern) gefunden.

Ich hatte meine Versuche mit Pollenschläuchen gerade zum Abschlusse gebracht, als die Abhandlung Tomaschek's »Ueber die Verdickungsschichten an künstlich hervorgerufenen Pollenschläuchen von *Colchicum autumnale*«¹⁾ erschien. Tomaschek beobachtete gleichfalls die Bildung von Kapseln in Pollenschläuchen von *Colchicum autumnale*; er sagt diesbezüglich auf S. 3 seines Aufsatzes: »Losgerissene Partien von Protoplasma sondern eine selbstständige Membran ab, von der sie vollständig eingeschlossen werden. Solche selbstständige, von einer besondern Membran umgebene Partien des Protoplasmas im Innern des Pollenschlauches gewinnen das Ansehen endogener Zellen.« (Vgl. hierzu Fig. 8 seiner Abhandlung.) Ueber das Verhalten der Zellkerne äussert sich Tomaschek merkwürdiger Weise gar nicht. Uebrigens hat Tomaschek schon im Jahre 1877²⁾ diese Einkapselungen beobachtet und auch die bereits 1845 von Reissek³⁾ erwähnten Erscheinungen dürften zum Theile hierher gehören.

Fassen wir die an den Pollenschläuchen gemachten Beobachtungen kurz zusammen, so ergibt sich, dass einerseits in den Pollenschläuchen befindliche losgetrennte, andererseits in Folge des Platzens der Schläuche ausgestossene Protoplastentheile sich lebend erhielten und mit einer Cellulosehülle umkleideten, auch wenn sie kernlos waren, was zumeist der Fall war. Auf das Wachsthum der kernlosen Kapseln soll hier weiterhin nicht eingegangen werden, da, wie schon

1) Botanisches Centralblatt. X. Bd. XXXIX. Nr. 27. 28. S. 1 u. f.

2) »Ueber die Entwicklung der Pollenpflänzchen des *Colchicum autumnale* L.« Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss. Math.-Naturwiss. Cl. Bd. LXXVI (1877). S. 489. — Schon in dieser Abhandlung heisst es auf S. 491: »Sobald sich im Innern des Schlauches einzelne Protoplasamassen aus dem Zusammenhange der Gesamtmasse desselben lösen, bezieht sich die Ausscheidung neuen Zellenhautstoffes nur mehr auf diese vereinzeltten Massen, wodurch diese letztere als selbstständige Zellen erscheinen. Fig. 4.« Vgl. übrigens auch noch: A. Tomaschek, Eigenthümliche Umbildungen des Pollens Bull. de la soc. imp. des naturalistes de Moscou. T. XLIV. 2. S. 1. Jahrg. 1871.

3) S. Reissek, Ueber die selbstständige Entwicklung der Pollenzelle zur keimtragenden Pflanze. Verhandl. d. kais. Leop.-Carol. Akad. d. Naturf. XIII. Bd. II. Abth. S. 467—492.

oben ausgeführt worden ist, das Wachsthum nicht direct verfolgt werden konnte, sondern auf dasselbe bloss geschlossen wurde, deshalb Einwände gegen die Deutung der angeführten Fälle auf stattgefundenes Wachsthum hin zulässig sind; ich gedenke, um diesbezüglich zu einem entscheidenden Ergebnisse zu gelangen, weitere Beobachtungen darüber anzustellen.

2. Plasmolytische Versuche.

Die folgenden Versuche wurden alle mit 10 %iger Rohrzucker-Lösung angestellt, der nach dem Vorgange von Klebs 0,01 % Congorots zugesetzt wurde, sowie 0,01 % doppelt-chromsauren Kalis, das bezüglich der Abhaltung von Pilzen und Bacterien denselben Dienst leistete, wie ihn Klebs bei der Anwendung von 0,05 % normalen chromsauren Kalis erzielte.

Elodea canadensis (Blätter).

Zu den Versuchen wurden sowohl jüngere (jedoch nicht zu junge), als auch ältere, in demselben Jahre zur Entwicklung gekommene Blätter verwendet, deren Wachsthumsfähigkeit aber allem Anscheine nach noch nicht gänzlich erloschen war. Die Blätter wurden meistens in Uhrschälchen gelegt, welche die Zuckerlösung enthielten. Die Protoplaste vieler langgestreckter Zellen zerfielen bei der Plasmolyse in zwei oder mehrere Theile (so besonders häufig die Protoplaste der zwischen den Blattzähnen gelegenen Blattrandzellen). Da die Zellen in der Regel bloss einen Zellkern enthielten, so war nach der Plasmolyse nur ein Theilprotoplast kernhaltig, alle anderen hingegen kernlos; nur selten kam es vor, dass einzelne Zellen, in Folge unterlassener oder noch nicht erfolgter Zellwandbildung, zwei Zellkerne aufwiesen, von denen nach der Plasmolyse ein jeder in je einem Theilprotoplast sich befand. Die Zellkerne waren als solche schon ohne weiteres kennbar, wurden aber stets noch durch Borax-Carmin zur Anschauung gebracht. Wie bereits Klebs beobachtet hat, so umgaben sich auch hier die plasmolysirten Protoplaste gewöhnlich mit einer Membran. In den Zellen, wo der Protoplast in zwei oder mehrere Theile zerfallen war, schieden aber nicht bloss die kernhaltigen Partien eine Hülle aus, sondern sehr häufig auch die kernlosen. Die ausgeschiedene Membran bestand in vielen Fällen aus einem ziemlich zarten, scharf sich abhebenden Häutchen (Fig. 6); öfters aber auch, namentlich in gegen die Blattbasis zu gelegenen Zellen, erschien sie ziemlich dick und viel schwächer lichtbrechend. In Zellen, in welchen zwei Theilprotoplaste enthalten waren, erschien der kernhaltige Theil häufig mit einer starken, der kernlose mit einer zarten Hülle versehen; es kamen aber auch umgekehrte Fälle vor. Die Membran trat nach Behandlung mit Eau de Javelle meist sehr scharf hervor; namentlich

konnte dies an Präparaten constatirt werden, die bereits über eine Woche lang in dem Reagens gelegen waren. Schwefelsäure liess je nach dem Concentrationsgrade die Membran mehr minder stark quellen. Die Cellulosereaction in sicherer, überzeugender Weise für die nach der Plasmolyse neugebildete Membran zu erhalten, gelang mir nicht, weder mit Chlorzinkjod noch mit Jod und Schwefelsäure. Es stellten sich diesbezüglich insoferne grosse Schwierigkeiten entgegen, als die ursprünglichen Wände der Blattzellen selbst mit den genannten Reagentien sich intensiv färbten, so dass es nicht möglich ward, sicher zu entscheiden, ob die innen gelegenen neugebildeten Membranen eine Färbung angenommen hatten oder nicht; auch die nachträglich sich einstellende allmälige Entfärbung der Präparate in Folge der Verflüchtigung des Jods führte zu keinem sicheren Ergebnisse. Dass wir es aber hier dessen ungeachtet mit wirklichen Zellhäuten zu thun haben, das beweist nach meinem Dafürhalten einerseits der Umstand, dass es stets gelang, Protoplaste, welche eine derartige Hülle bereits ausgebildet hatten, durch erneute Plasmolyse zu veranlassen, sich von dieser Hülle abzuheben, was auch stets beim Absterben der Protoplaste von selbst eintrat; andererseits das schon erwähnte Verhalten gegen Eau de Javelle und die Thatsache, dass sich neugebildete Hüllen, wenn auch schwach, mit dem in der Rohrzucker-Lösung enthaltenen Congorot färbten.

Sinapis alba (Wurzelhaare).

Die Versuche wurden an den Wurzelhaaren der Keimlinge angestellt. Zu dem Behufe wurden die im Dunklen zur Keimung gekommenen Pflanzen mit der Wurzel in einen Tropfen der Zuckerlösung auf den Objectträger gelegt, die Wurzel mit einem Deckgläschen zugedeckt und das Präparat nunmehr am Lichte belassen. Die Wurzelhaare der zu gleicher Zeit in dieselbe Zuckerlösung gestellten Wurzeln zeigten ein sehr verschiedenes Verhalten. An zahlreichen Wurzeln starben die Wurzelhaare nach der Eintragung in die Zuckerlösung fast sofort ab, an manchen wuchsen sie normal weiter fort, an anderen wieder kam es vor, dass sie an ihrem Scheitel platzten und einen Theil ihres Protoplasmas verloren; an vielen endlich trat in Folge von sich einstellender Plasmolyse eine Trennung des Protoplasts in oft zahlreiche Theile ein, von denen selbstverständlich bloss einer den Zellkern enthielt.

Bei den Wurzelhaaren, welche die Erscheinung des Platzens zeigten, wurde der in wachsenden Wurzelhaaren bekanntlich in der nächsten Nähe des Scheitels sich aufhaltende Zellkern sehr häufig mit ausgestossen; nichtsdestoweniger ergab sich nicht selten, dass der nun kernlos gewordene Protoplast des Wurzelhaares unterhalb der Wundstelle, ganz analog wie bei den Pollenschläuchen von *Leucoium vernum* und *Gallanthus nivalis* eine oft ziemlich dicke Kappe bildete, die sich bei Be-

handlung mit Chlorzinkjod intensiv violett färbte und so ihre Cellulose-natur kundgab ¹⁾).

Die Präparate, an denen in den Wurzelhaaren in Folge von Plasmolyse der Protoplast in mehrere Theile zerfallen war, verhielten sich verschieden. An vielen erhielten sich die Theilprotoplaste zwei bis drei Tage am Leben und gingen dann, ohne die Spur einer Membranbildung, zu Grunde. In einigen Präparaten wiesen jedoch zahlreiche Wurzelhaare Einkapselungen der Theile ihres zerfallenen Protoplasts auf (Fig. 7). Höchst auffallend war es, dass gerade der am Grunde der Zelle befindliche und bei hinreichender Länge des Wurzelhaares stets kernlose Theilprotoplast am häufigsten die Erscheinung der Einkapselung zeigte und eine verhältnissmässig dicke Membran ausbildete (Fig. 7, x). Die übrigen Theilprotoplaste blieben entweder uneingekapselt oder bildeten dünne, oft kaum mehr wahrnehmbare Membranen aus; nicht selten kam es vor, dass sie nur gegen die Spitze des Wurzelhaares zu eine Kappe aufwiesen, während gegen die Basis hin jedwede Bildung einer Zellhaut unterblieb (Fig. 7, III, y). Das Congorot erwies sich gerade hier von grösstem Nutzen, indem es die alte Zellhaut der Wurzelhaare ungefärbt liess, während sich die neugebildeten Membranen der Theilprotoplaste je nach ihrer Dicke mehr oder weniger intensiv färbten und sich derart sehr anschaulich dem Auge darboten. Die Anwendung von Jod und Schwefelsäure ergab bei allen Kapseln die Reaction auf Cellulose. Der Zellkern war in dem abgestorbenen Protoplasma in Folge der reichlicheren Aufspeicherung des Congorots überall ohne weiteres sichtbar; an älteren Wurzelhaaren konnte Fragmentirung desselben beobachtet werden.

Marchantia polymorpha (Rhizoide).

Thallusschnitte mit Rhizoiden wurden gleichfalls auf Objectträger in einen Tropfen Zuckerlösung gebracht, mit einem Deckgläschen zugedeckt und am Lichte gelassen. Es trat Plasmolyse ein, und die Protoplaste der Rhizoide zerfielen in zahlreiche Theile, von denen selbstverständlich wieder nur einer den Zellkern enthielt. Da der Kern, wie bei den Wurzelhaaren, unterhalb des Scheitels sich befindet, so war er nach der Plasmolyse gewöhnlich in dem, von der Spitze des Rhizoids aus gerechnet, ersten Theilprotoplast enthalten. Die Theilprotoplaste gingen in der überwiegenden Anzahl der Fälle nach zwei oder drei Tagen zu Grunde, ohne sich mit einer Zellhaut zu umkleiden. Es wurden aber in den meisten Präparaten je einige wenige Rhizoide aufgefunden, wo die Theile des

1) Wortmann (Beiträge zur Physiologie des Wachstums. Botan. Zeit. 1889. Nr. 17) hat bei seinen Versuchen mit den Wurzelhaaren von *Lepidium sativum* eine Bildung von Kappen unterhalb geplatzter Scheitel der genannten Wurzelhaare nicht beobachtet.

zerfallenen Protoplasts eine neue Membran ausgeschieden hatten (Fig. 8). Dieselbe war entweder dünn oder sie stimmte in der Dicke mit der Rhizoidenwand überein oder konnte dieselbe in dieser Hinsicht auch übertreffen. Fast alle entstandenen Kapseln waren kernlos, da die gegen die Spitze des Rhizoids zu befindlichen Theilprotoplaste, darunter auch jener, der den Zellkern enthielt, gewöhnlich abstarben, ohne sich eingekapselt zu haben, während gerade die mehr in der Mitte des Rhizoid-Schlauches gelegenen Theile vorzugsweise eine neue Zellhaut ausbildeten; so wurde an einem Präparate, wo in fünf Rhizoiden Einkapselungen sich eingestellt hatten, bloss in einem einzigen Rhizoid eine kernhaltige Kapsel aufgefunden. Auch hier bildete das Congorot zur leichteren Auffindung auch der dünnwandigsten Kapseln ausgezeichnete Dienste, indem es dieselben je nach ihrer Dicke mehr oder weniger stark färbte, während die Rhizoidenwand den Farbstoff so gut wie gar nicht aufspeicherte; andererseits brachte es in dem abgestorbenen Protoplasma den Zellkern zur deutlichen Ansicht, so dass weitere Zellkernfärbungen nach den bekannten Methoden nicht nothwendig waren. Bei successiver Behandlung mit Jod (in Jodkalium) und Schwefelsäure (2 Vol. H_2SO_4 + 1 Vol. H_2O) quollen, im Gegensatz zur Rhizoidenwand, die keine Quellung zeigte, die Kapselwände sehr bedeutend auf¹⁾ und gaben die Cellulosereaction, wobei namentlich die inneren Schichten der gequollenen Wände sich sehr intensiv blau färbten.

Die Einkapselungs-Erscheinungen wurden nur in den glattwandigen Rhizoiden beobachtet; in den »Zäpfchenrhizoiden« starben die durch Plasmolyse erzeugten Theilprotoplaste stets ohne jede Spur einer Membranbildung ab. Zu bemerken wäre noch, dass, während die Rhizoidenwände immer eine sehr deutliche Cuticula besitzen, die Kapselwände nie eine Andeutung eines solchen Häutchens aufwiesen.

Oedogonium sp.

Die Fäden der bei Ermangelung jeglicher Fortpflanzungsorgane nicht weiter bestimmbarer Alge wurden ebenfalls, wie diess für die zwei letztgenannten Pflanzen erwähnt worden ist, auf einem Objectträger unter einem Deckgläschen in der Zuckerlösung der Plasmolyse ausgesetzt. Wohl in jedem Faden gab es dann einige Zellen, wo der Protoplast in eine kernhaltige und eine kernlose Hälfte zerfiel. Vor allem ist zu bemerken, dass viele der kernlosen Protoplaste sich über einen Monat lang lebend erhielten und wohl noch weiter gelebt hätten, wenn nicht die Versuche abgebrochen worden wären; das gleiche hat bekanntlich Klebs für die kernlosen Hälften von *Zygnema*-Zellen festgestellt, welche bis 6 Wochen am Leben blieben. Während aber Klebs bei seinen Versuchen nie

1) Vgl. Klebs, Beiträge z. Physiologie S. 516.

beobachtete, dass kernlose Protoplaste der von ihm benützten *Oedogonium*-Arten eine neue Zellhaut gebildet hätten, konnte solches hier constatirt werden. Eine ziemliche Anzahl kernloser Protoplaste umkleidete sich nach drei bis vier Tagen, vielfach erst innerhalb einer Woche, mit einer Zellhaut. Die neue Membran war nicht selten nur ganz einseitig ausgebildet (Fig. 9, I); in vielen Fällen jedoch fand eine vollständige oder nahezu vollständige Einkapselung statt (Fig. 9, II). Die Membranen wiesen vielfach deutliche Schichtung auf; häufig war mehrfache Kappenbildung zu beobachten. Das Congorot wurde von den Kapselwänden sehr stark gespeichert; bei Anwendung von Jod und Schwefelsäure ergab sich die Cellulosereaction.

Bei sehr vielen der zu den Versuchen verwendeten *Oedogonium*-Fäden waren einzelne oder auch mehrere Zellen in Theilung begriffen, wie sich aus dem Vorhandensein des »Celluloserings« und zweier Zellkerne ergab.

Nachträgliche Versuche mit 20 %iger Rohrzucker-Lösung, die gleichfalls 0,01 % Congorots und 0,01 % doppelt-chromsauren Kalis enthielt, führte zu den gleichen oben angeführten Resultaten. Die 20 %ige Lösung war aber insoferne günstiger, als bei der Plasmolyse infolge der rascheren Wirkung der Zuckerlösung der Protoplast nunmehr in sehr vielen Zellen in zwei Theile zerfiel, so dass infolge dessen auch das Vorkommen kernloser Kapseln ein verhältnissmässig häufiges war.

III.

Wie aus den in II mitgetheilten Beobachtungen und Versuchen hervorgeht, findet die Bildung einer Zellhaut auch an solchen Protoplasten (beziehungsweise Theilprotoplasten) statt, die früher ihres Zellkernes verlustig gegangen sind. Es ergibt sich also, dass es nicht nothwendig ist, dass der Protoplast, wenn er eine Zellhaut ausbildet, sich während dieses Processes noch im Besitze seines Zellkernes befindet. Einen etwaigen Schluss, dass der Process der Zellhautbildung überhaupt in gar keiner näheren Beziehung zu der Zellkernthätigkeit steht, darf man aus dieser Thatsache nicht ziehen; sie spricht durchaus nicht dagegen, dass hier Nachwirkungserscheinungen einer die Zellhautbildung bedingenden Thätigkeit des Zellkernes vorliegen könnten. Hiermit soll nicht etwa gesagt werden, dass vielleicht die Zellhautbildung als solche direkt vom Zellkerne bewirkt wird; wir haben ja guten Grund anzunehmen, dass sie die specifische Eigenschaft eines bestimmten Organs ¹⁾

1) Es kann sich hierbei wohl nur um die Hautschicht und das Körnerplasma handeln; beim weiteren Eingehen auf die Sache aber stösst man bereits auf Schwierigkeiten. Zunächst ist es noch unentschieden, ob die Hautschicht als ein selbständiges

ist. Es handelt sich vielmehr darum, ob nicht irgend welche Functionen des Zellkernes so eng mit der Thätigkeit des zellhautbildenden Organs zusammenhängen, dass die Function der Zellhautbildung stets nur auf eine solche vorausgehende Function des Zellkernes hin erfolgt. Wäre diess der Fall, so müsste, wenn das zellhautbildende Organ auch nach der Entfernung des Zellkernes aus dem Protoplast weiter seine Thätigkeit fortsetzt, die ganze Erscheinung für eine Nachwirkung der früheren Zellkernthätigkeit erklärt werden. Ob nun wirklich eine derartige enge Beziehung zwischen der Zellkernthätigkeit und der Zellhautbildung besteht,

Organ aufzufassen ist, das sich nie Neubildet, sondern stets nur durch Theilung fortpflanzt. Pfeffer (Ueber Aufnahme von Anilinfarben in lebende Zellen. Unters. a. d. bot. Inst. zu Tübingen, II. Bd. 1886, S. 319 u. f.) und Klebs (Beiträge, S. 510) bestreiten im Allgemeinen die Selbständigkeit der Hautschicht und behaupten, dass aus einem beliebigen Theile des Körnerplasmas durch Neudifferenzirung sich eine Hautschicht herausbilden könne. Dagegen hat Vries, der zuerst die Ansicht begründete, dass die Hautschicht ein selbständiges Organ darstelle, mehrere gewichtige Gründe für seine Annahme in's Treffen geführt (Plasmolytische Studien über die Wand der Vacuolen. Jahrb. f. wiss. Botanik. XVI. 1885. S. 493 u. f. — Intracellulare Pangenesis. 1889. S. 159 u. f.). Aber abgesehen von der Frage nach der Selbstständigkeit der Hautschicht, ergiebt sich bezüglich der näheren Bezeichnung des zellhautbildenden Organs selbst überdiess noch die weitere Schwierigkeit, ob dasselbe in der Hautschicht oder im Körnerplasma zu suchen ist. Klebs (Beiträge, S. 498) betont mit Recht die Möglichkeit, dass die Bildung der Zellhaut im peripheren Theile des Körnerplasmas vor sich gehen könnte, wonach erst die Ausscheidung derselben durch die Hautschicht hindurch nach aussen erfolgen würde, wie ja gerade auf diese Weise die Bildung der zellhautartigen Hülle der Euglenen erfolgt; es wäre dann die periphere Schicht des Körnerplasmas das Organ der Zellhautbildung, während die Hautschicht vor allem den osmotischen Verkehr zwischen der Aussenwelt und dem Protoplast zu vermitteln hätte. Andererseits spricht wiederum vieles dafür, dass in der Hautschicht selbst die Bildung der Zellwand erfolgt. (Es sei hierbei bemerkt, dass Vries darauf aufmerksam zu machen sucht, dass sich die Beobachtungen von Strasburger, Haberlandt und Klebs, denen zufolge beim Zerschneiden von *Vaucheria*-Schläuchen ein Theil der herausgetretenen Protoplasmaaballen sich mit einer neuen Cellulosemembran umkleidet, ein anderer Theil hingegen selbst wenn im Besitze eines Zellkernes, ohne die Bildung einer Zellhaut zu Grunde geht, vielleicht dahin erklären lassen dürften, dass im ersteren Falle die herausgetretenen Plasmaballen von der ursprünglichen Hautschicht eingeschlossen waren, im letzteren nicht. Dasselbe könnte man für das verschiedene Verhalten der infolge des Platzens der Pollenschläuche ausgestossenen Protoplasmatheile geltend machen. Leider fehlt uns zur Entscheidung dieser Frage noch jegliches Mittel, die Hautschicht zu jeder Zeit leicht zur Anschauung zu bringen). Auf welche Weise die Zellhautbildung vor sich geht, lässt sich aber bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse darüber gleichfalls noch nicht mit Sicherheit entscheiden. Lässt sich nun auch nicht läugnen, dass die Vries'sche Hypothese, sowohl was den Ort der Zellhautbildung als auch die Selbständigkeit der Hautschicht anbelangt, sehr vieles für sich hat, so steht die Sache doch noch nicht ganz geklärt da, und müssen uns erst weitere Untersuchungen zu einem endgiltigen Ergebnisse führen.

darüber ein bestimmtes Urtheil abzugeben, sind wir derzeit noch nicht berechtigt, da wir über die physiologischen Functionen des Zellkernes noch durchaus im Unklaren und nur soviel anzunehmen gezwungen sind, dass der Zellkern das übrige Protoplasma irgendwie beeinflussen muss ¹⁾; deshalb müssen wir uns bezüglich der Einkapselungen kernlosen Protoplasmas mit dem oben aufgestellten allgemeinen Satze begnügen. Wenn ich dessenungeachtet hier die Meinung ausspreche, dass wir es in den in II beschriebenen Fällen wahrscheinlich doch mit Nachwirkungserscheinungen der Thätigkeit des früher vorhandenen Zellkernes zu thun haben, so geschieht dies aus, wie ich glaube, wohl berechtigten Gründen.

Ich bemerke zunächst, dass ein guter Theil meiner oben angeführten Beobachtungen an Pollenschläuchen gemacht worden ist, also an Organen, die sich durch ihr ungemein rasches Wachsthum auszeichnen, mit dem selbstverständlich die Ausbildung einer Zellhaut Hand in Hand geht. Weiter wurde ein Theil der plasmolytischen Versuche an Wurzelhaaren und Rhizoiden angestellt, denen bekanntlich nicht minder schnelles Wachsthum zukommt. Ich weise endlich darauf hin, dass bei vielen *Oedogonium*-Fäden Theilung der Zellen zu beobachten war und dass die zur Plasmolyse verwendeten Blätter von *Elodea canadensis* noch im, wenn auch oft nur schwachen, Wachstume begriffen waren. Es zeigt sich also vor allem, dass die kernlosen Protoplaste, an denen die Neubildung einer Membran constatirt werden konnte, solchen kernhaltigen Zellen entstammten, welche meist im Wachstume begriffen waren, jedenfalls aber noch ihre Zellhaut verdickten. Daraufhin dürfte sich der Gegensatz zwischen den Versuchen von Klebs und meinen eigenen Beobachtungen zurückführen lassen. Klebs stellte, soviel aus seinen Darstellungen zu entnehmen ist, seine experimentellen Untersuchungen hauptsächlich im Spätherbste und im Winter an, also zu einer Zeit, wo sich zweifelsohne die zu den Experimenten verwendeten Pflanzen in einem Ruhezustande befanden; nach der Plasmolyse umgaben sich nur kernhaltige Theilprotoplaste mit einer Zellhaut, weil offenbar eben nur diese durch den Zellkern, der jedenfalls durch die plötzlich geänderten Lebensbedingungen zur Thätigkeit veranlasst wurde, zur Zellhautbildung angeregt werden konnten. Von *Oedogonium* scheint Klebs gleichfalls nur solche Fäden benützt zu haben, an deren Zellen in dem Augenblicke, wo sie der Plasmolyse ausgesetzt wurden, weder Wachsthum noch Membranverdickung statthatte. Es würden also unter Berücksichtigung der verschiedenen Umstände, unter denen von Klebs und mir experimentirt wurde, Klebs' Versuchsergebnisse einerseits, meine eigenen Beobachtungen andererseits

1) Die Nothwendigkeit der Annahme dieses Satzes ergibt sich aus der in jüngster Zeit veröffentlichten Mittheilung von Boveri (Ein geschlechtlich erzeugter Organismus ohne mütterliche Eigenschaften. Sitzungsberichte der Gesellschaft für Morphologie und Physiologie in München. V. 1889. S. 73).

entschieden dafür sprechen, dass die Zellhautbildung zu irgend einer Art der Zellkernthätigkeit in enger Beziehung steht und demnach die Einkapselungen kernlos gewordener Protoplaste oder Protoplastentheile Nachwirkungserscheinungen dieser Zellkernthätigkeit sind.

Hierzu kommt noch ein weiterer Umstand, auf den Gewicht gelegt werden muss. Es ist bekannt, dass in den Pollenschläuchen der vegetative Kern immer mehr an Substanz abnimmt, als der Pollenschlauch länger wird, bis er sich schliesslich in vielen Fällen nicht mehr nachweisen lässt¹⁾. Nicht minder auffallend ist es, dass er sich, trotzdem er mit der Befruchtung nichts zu thun hat, dennoch fast regelmässig in der Pollenschlauchspitze aufhält, also in der Nähe jenes Ortes, wo das Längenwachsthum des Pollenschlauches vor sich geht. Aehnlichem Verhalten wie bei den Pollenschläuchen begegnen wir auch bei den Wurzelhaaren und Rhizoiden²⁾; auch bei diesen hält sich der Zellkern unterhalb der fortwachsenden Spitze auf und geht mit der Grössenzunahme dieser Organe oft weitgehende Fragmentationen ein. Beide Thatsachen aber, die Lagerungsverhältnisse sowohl als die Structurveränderungen des Zellkernes, dürften hier gleichfalls wohl am besten durch die Annahme zu erklären sein, dass zwischen der Zellkernthätigkeit einerseits und dem Wachsthum und der Zellhautbildung andererseits irgend ein Zusammenhang besteht.

Es muss auch darauf hingewiesen werden, dass in solchen Pflanzenzellen, in denen von selbst ein Zerfall des Protoplasts in zwei oder mehrere Theile eintritt, es stets nur der den Zellkern enthaltende Theil war, an dem die Ausbildung einer Membran festgestellt werden konnte³⁾. Es ist nun nicht ausgeschlossen, dass hier gelegentlich Einkapselungen auch kernloser Theile aufgefunden werden. Zweifellos tritt aber in den meisten Fällen eine Einkapselung nur der kernhaltigen Plasmapartieen ein. Gerade mit Rücksicht auf die entgegengesetzten Resultate der experimentellen Versuche verdienen die hierher gehörigen Beispiele jedenfalls eine nochmalige eingehende Untersuchung; namentlich wäre es von Wichtigkeit, die ganze Erscheinung, wo möglich an lebendem Materiale, Schritt für Schritt zu verfolgen.

Man könnte vielleicht gegen die Annahme der Zellhautbildung kernlos gewordener Protoplaste als einer Nachwirkungserscheinung die Einwendung machen, dass bei *Elodea canadensis* und *Oedogonium* die Zellhautbildung erst nach mehreren Tagen sich einstellte, während man doch, wenn sie eine Nachwirkung der Zellkernthätigkeit wäre, erwarten möchte,

1) E. Strasburger, Neue Untersuchungen über den Befruchtungsvorgang bei den Phanerogamen. Jena 1884. S. 19.

2) G. Haberlandt, Ueber die Beziehungen zwischen Function und Lage des Zellkernes. S. 59.

3) G. Haberlandt, Ueber Einkapselung des Protoplasmas.

dass sie möglichst bald in Erscheinung treten werde. Dagegen kann man aber immer annehmen, dass durch die Plasmolyse das zellhautbildende Organ zunächst derart beeinflusst wird, dass es vorerst nicht im Stande ist, seine zellhautbildende Function fortzusetzen; erst nach einiger Zeit, wenn sich der Protoplast an die neuen Lebensbedingungen gewöhnt hat, wird das Organ befähigt, seine Thätigkeit wieder aufzunehmen. Schwieriger wäre es freilich, sich vorzustellen, wie es kommt, dass die nachwirkende Zellkernthätigkeit sich noch nach dem Ablaufe einer so langen Zeit geltend machen könne. Auf Erklärungsversuche zur Beantwortung dieser Frage kann hier aber schon aus dem Grunde nicht eingegangen werden, weil zuerst die verschiedenen Möglichkeiten der Einwirkung des Zellkernes auf das übrige Protoplasma näher erörtert werden müssten, was zu weit führen würde. Es ist jedoch klar, dass auch dieser schwierige Punkt gegen die Annahme einer Nachwirkung der Zellkernthätigkeit nicht geltend gemacht werden kann.

Es soll hiermit übrigens nicht behauptet werden, dass die hier vorgebrachten Umstände, welche dafür sprechen, dass die Ausbildung einer Membran seitens ihres Kernes beraubter Protoplaste als eine Nachwirkungserscheinung der Thätigkeit des früher vorhandenen Zellkernes aufzufassen ist, die Annahme einer solchen Nachwirkung als über jeden Zweifel erhaben hinstellen. Eine sichere Entscheidung der Sache müssen uns erst fernere Untersuchungen bringen, denen namentlich obliegen wird, festzustellen, ob kernlos gewordene Protoplaste immer nur dann im Stande sind, eine Zellhaut zu bilden, wenn an ihnen in dem Augenblicke, wo sie des Zellkernes verlustig wurden, eine Ausbildung der Zellhaut vor sich ging.

Graz, 15. April 1890.

Botanisches Institut der Universität.

Tafelerklärung.

Sämmtliche Figuren sind nach todtten Objecten mit der Camera gezeichnet; das Protoplasma erscheint deshalb (mit theilweiser Ausnahme von Fig. 2 und 3) in Folge eingetretener Contraction von der neugebildeten Membran abgehoben.

Fig. 1. *Galanthus nivalis*. Der Pollenschlauch ist an der Spitze geplatzt; sowohl der generative (*g*) wie der vegetative (*v*) Zellkern sind ausgestossen worden. Das im Schlauche zurückgebliebene Protoplasma hat sich zunächst gegen die verletzte Spitze zu durch eine Cellulosekappe (*k*) abgeschlossen und ist dann in mehrere Theile zerfallen, von denen sich die zwei vorderen eingekapselt haben. Vgr. 550.

- Fig. 2. *Scilla bifolia*. Der Pollenschlauch ist zuerst an der Spitze und dann seitlich, an dem sich neubildenden zweiten Scheitel, geplatzt. Der generative (*g*) Kern ist ausgestossen worden; der vegetative konnte nicht nachgewiesen werden. Das im Schlauche zurückgebliebene Protoplasma hat gegen die verletzte Spitze hin eine Cellulosemembran (*k*) ausgebildet. Die meisten der ausgeworfenen Plasmatheile haben sich mit einer Zellhaut umgeben (bei der Kapsel α sowie bei der überwiegenden Anzahl der kleinen Kapseln hat sich das Protoplasma beim Absterben von der Zellwand abgehoben). *e* (violett) Exine. Vgr. 550.
- Fig. 3. *Hyacinthus orientalis*. I. Innerhalb des Pollenkornes ist eine kernlose Kapsel entstanden; eine andere hat sich im Schlauche ausgebildet. II. Kernlose Kapsel innerhalb des Pollenkornes. *e* (gelb) Exine. Vgr. 550.
- Fig. 4. *Hemerocallis fulva*. I und II. Zwei ausserhalb des Pollenschlauches entstandene kernlose Kapseln. Vgr. 350.
- Fig. 5. *Cytisus Weldenii*. Ausserhalb des Pollenschlauches entstandene kernlose Kapsel, bei der zweifelsohne ein Wachsthum stattgefunden hat. Vgr. 550.


Die folgenden Figuren beziehen sich auf Zellen, die der Plasmolyse ausgesetzt worden waren; der Zellkern ist überall carminroth gehalten.

- Fig. 6. *Elodea canadensis*. Blattrandzelle; sowohl der kernhaltige als auch der kernlose Theilprotoplast haben sich eingekapselt. Vgr. 550.
- Fig. 7. *Sinapis alba*. Wurzelhaare. I. Der über der Basis des Wurzelhaares befindliche kernlose Theilprotoplast hat sich eingekapselt (x); der Zellkern ist in zwei Theile zerfallen. II. Zwei dünnwandige Kapseln in der Spitze des Wurzelhaares, unterhalb dieser eine längere, deren Membran gegen den Zellkern hin immer undeutlicher wird, bis sie gänzlich verschwindet; am Grunde des Wurzelhaares eine verhältnissmässig dickwandige Kapsel (x). III. An der Spitze ist eine dünne Kappe (*y*), im unteren Theile eine dicke kernlose Kapsel (x) ausgebildet; der Kern ist im Zerfall begriffen. Vgr. 350.
- Fig. 8. *Marchantia polymorpha*. I. und II. Rhizoide mit kernlosen Kapseln; in der Richtung gegen *a* hin die Spitze, gegen *b* hin die Basis der Rhizoide. Rhizoid I enthielt ausser den vier gezeichneten Kapseln noch weitere drei. Vgr. 350.
- Fig. 9. *Oedogonium* sp. I und II. An beiden Zellen ist der Protoplast infolge von Plasmolyse in eine kernhaltige und eine kernlose Hälfte zerfallen, die beide eine Cellulosemembran ausgebildet haben; bei II sind an den Kapselenden mehrere Kappen hinter einander abgesetzt. Vgr. 350.

Frucht in Frucht von *Carica Papaya*.

Von
Fritz Müller.

Vor Kurzem brachte mir einer meiner Enkel die hier abgebildete längsdurchschnittene Frucht eines Melonenbaumes (*Carica Papaya*). Die Frucht umschliesst eine zweite, die fast ebensolang ist wie sie selbst und,



um in ihrer Höhle Platz zu finden, oben sich umgebogen hat. Die äussere Frucht ist von mittlerer Grösse, das Fruchtfleisch nach Dicke, Farbe und Geschmack von gewöhnlicher Beschaffenheit. Samen fehlen vollständig, während unentwickelte Samenanlagen in reichlicher Zahl vorhanden sind. Der Samenmangel erklärt sich daraus, dass (wenigstens an der mir vorliegenden Hälfte) äusserlich jede Spur von Griffel und Narbe fehlt. Dagegen findet sich im Innern der Fruchthöhle eine von deren Scheitel abwärts gerichtete, in gewöhnlicher Weise gelappte Narbe.

Die innere Frucht nimmt den ganzen Boden der Höhle der äusseren ein und behält bis oben nahezu gleiche Dicke. Sie ist

glatt, weiss, ihr Fleisch hart, geschmacklos und ganz ohne Milchsaft, der sonst in unreifen Früchten besonders reichlich vorhanden zu sein pflegt. Sie besteht aus fünf Fruchtblättern; eines derselben ist nur etwa 2, ein anderes etwa 3 cm lang; sie enden (wie die Abbildung rechts unten zeigt) mit einem rundlichen schwach vorspringenden Wulst, an welchem ein dunklerer Punkt die verkümmerte Narbe andeutet. Die drei übrigen Fruchtblätter reichen bis zum Ende der Frucht, wo sie in wohlentwickelte, gelappte und zum Theil wunderbarlich verkrümmte Narben übergehen. Es bleibt hier zwischen ihnen ein ziemlich breiter Spalt, durch den man in die mit zahlreichen Samenanlagen bedeckte Fruchthöhle hineinsieht. Diese Höhle verengt sich rasch nach unten, hat 3 cm über dem Boden nur noch etwa 3 mm, und 25 mm über dem Boden wenig über 1 mm Durchmesser; sie endet, halbkugelig abgerundet, etwa 2 cm über dem Boden der äusseren Frucht. Der unterste Theil der Frucht ist dicht. Samenanlagen finden sich in der ganzen Länge der Fruchthöhle.

Unter der inneren Frucht, zwischen dieser und den Boden der äusseren eingeklemmt, stehen fünf farblose, dünnhäutige spitze Blättchen, deren Länge von 5—8, deren Breite von 2—3 mm schwankt; sie wechseln ab mit den Fruchtblättern der inneren Frucht.

Die beiden in der eben besprochenen Frucht vereinigten Bildungsabweichungen, den in die Fruchthöhle ragenden Griffel und die zweite innere Frucht, habe ich getrennt bei zwei anderen Pflanzen wiederholt gesehen, letztere bei *Passiflora*, erstere bei *Alpinia*.

Durch unseren verstorbenen deutschen Consul Victor Gärtner erhielt ich mehrere Früchte von *Passiflora alata*, die eine vollständige, regelrecht entwickelte, aber natürlich unentfaltete und etwas verknitterte Blume umschlossen. Die Früchte besaßen reichliche gute Samen; eine aus diesen gezogene Pflanze meines Gartens hat bis jetzt nur gewöhnliche Früchte getragen.

An einer *Alpinia*, mit deren abweichend gebildeten Blumen ich mich seit einigen Jahren beschäftigt habe ¹⁾, waren im letzten Sommer Zwischenformen zwischen drei- und zweizähligen Blumen ungewöhnlich zahlreich und unter diesen nicht selten solche, in deren Fruchtknoten eine der drei Scheidewände fehlte, so dass dieser zwei ungleich grosse Fächer zeigte. In etwa einem Dutzend solcher Fruchtknoten und zwar stets in dem grösseren Fache traf ich einen an die Fäden der *Olyra*-Halme erinnernden weissen, drehrunden, regellos gebogenen Faden, der bisweilen das Fach so vollständig füllte, dass kaum Raum blieb für einige Samenanlagen. Er entspringt vom oberen Ende des Faches und endet frei in eine kleine flache, am Rande bewimperte Scheibe. Das erinnerte an die ganz ähnliche Bewimperung des Narbenrandes und nähere Untersuchung ergab, dass der Faden auch sonst in seinem Baue mit dem Griffel übereinstimmt und nichts Anderes ist, als das dem einen Fruchtblatt zugehörige Drittel des Griffels. Dies wurde dadurch bestätigt, dass wo der Faden im Fruchtknoten sich fand, der Griffel nicht drehrund, sondern von einer Längsrinne durchzogen war, die der im Fruchtknoten versteckte Faden hätte bedecken sollen. Nachdem ich dies erkannt, konnte ich schon vor Eröffnung des Fruchtknotens aus der An- oder Abwesenheit einer solchen Rinne entnehmen, ob in demselben der gewundene Faden zu finden sei oder nicht.

Die Abbildung, in $\frac{4}{9}$ der natürlichen Grösse, nach einem Lichtbild, das ich der Gefälligkeit meines Freundes B. Scheidemantel verdanke.

Blumenau, Santa Catharina, Brazil, 13. Mai 1890.

1) Vgl. Ber. der D. Bot. Ges. VI. S. 95.

Lichenes Africae tropico-orientalis

auctore

Dr. J. Müller.

Die nachfolgende Aufzählung der Flechten aus dem ostäquatorialen Africa umfasst folgende Sammlungen:

1. Die vom österreichischen Schiffslieutenant Ritter L. v. Höhnel im Gebiete Leikipia, am Kenia, und am africanischen Montblanc Kilima Ndjaro gesammelten Lichenen, von der Reise stammend, die Ritter v. Höhnel und Graf Teleki vereint ausgeführt haben.
2. Materialien aus den zwischen Victoria Njansa und der Sansibarküste gelegenen Gebieten, gesammelt von den Engländern Rev. J. Hannington, H. H. Johnston, Esq., und Mr. Last und mitgetheilt vom Kew Herbarium.
3. Flechten vom Kilima Ndjaro und aus der zwischen diesem Gebirgsstock und Sansibar liegenden Gegend Usambara, gesammelt von dem deutschen Afrikareisenden Dr. H. Meyer, und mitgetheilt von Herrn Garteninspector B. Stein in Breslau.

Von diesen diversen Materialien sind diejenigen von Dr. Meyer bereits von Herrn Stein bearbeitet worden, und das Resultat wurde 1888 in der Januar-Sitzung der schlesischen Gesellschaft für vaterl. Cultur vorgelegt und erschien dann in dem darauf folgenden Jahresbericht dieser Gesellschaft. Ein 1. Abschnitt umfasst die Flechten vom Kilima Ndjaro mit 26 Nummern; ein 2. diejenigen von Usambara mit 23 Nummern, und ausserdem folgt dort noch ein 3. Abschnitt über Congo-Flechten, die von Herrn Leden bei Vivi, im unteren Congogebiete, gesammelt wurden und die alle am Schlusse dieser Abhandlung als Appendix Berücksichtigung gefunden haben.

Leider ist der Versuch von Herrn Stein, diese exotischen Flechten wissenschaftlich zu verwerthen, sehr unglücklich ausgefallen, denn viel Neues wurde verkannt, und viel Bekanntes wurde als neu aufgefasst. Allein es ist hier zu bemerken, dass ein so schwieriges Thema nur von solchen Forschern gelöst werden kann, welche hierfür mit allen nöthigen Hilfsmitteln ausgerüstet sind, die über grosse exotische Typensammlungen und über eine quasi vollständige lichenologische Bibliothek verfügen können. Dazu ist bei den Meyerschen Flechten für Stein noch der doppelt erschwerende Umstand eingetreten, dass sehr viele Arten nur steril und fast allgemein in nur sehr kleinen Exemplaren mitgebracht worden sind, ein Umstand in welchem nur vollendet in alle exotischen Lichenen Eingeweihte sich richtig und sicher durchzuarbeiten vermögen. Zum Glück für die Lichenographie ist es mir aber möglich gewesen, durch die von Herrn Stein mitgetheilten od. auch nur für die Revision geliehenen Exemplare, alle als neu aufgestellten Flechten zu beurtheilen und in der folgenden Aufzählung richtig zu stellen.

Bei dieser Gelegenheit möchte ich für Anfänger in der exotischen Lichenologie noch hinzusetzen, dass es ja nicht thunlich ist, etwa im Hinblick auf die sehr grosse Anzahl neuer Flechten, die ich in den letzten Jahren publizirt habe, zu wähnen, dass in nicht explorirten Gebieten fast Alles neu sein müsse, denn es wurden von mir auch viele Tausende von Exemplaren studirt die nichts Neues boten und die aus denselben Quellen

flossen wie das Neue. Und ebenso erinnere ich daran, dass der Lichenograph für jedes tropische und subtropische Gebiet in erster Linie immer mit der tropischen Gesamttlichenenmasse, und nicht bloss mit dem Inhalt von Localflora desselben Gebietes oder naher Gebiete zu thun hat, denn eine sehr grosse Anzahl von Flechten macht in den Tropen den Kehr um die Erde; und dass in zweiter Linie immer und immer wieder auch die europäischen Flechten genau berücksichtigt werden müssen, weil nun immer mehr und mehr bloss europäisch geglaubte Flechten auch in der breiten Tropenregion constatirt werden.

Collemaceae Müll. Arg. Lich. Genève p. 18.

1. **Leptogium tremelloides** f. **isidiosa** Müll. Arg. L. B. n. 374; *L. tremelloides* Stein Flecht. v. Usambara n. 22; corticola in territorio Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 20).

2. **Synechoblastus Robillardii** Müll. Arg. L. B. n. 48; *Synechoblastus nigrescens* Stein Flecht. von Usambara n. 23 (non Trev.). — Sporae angustae dactylinae, curvulae, utrumque apicem versus leviter incrassatae, obtusae, vulgo 4-loculares. Habitu re vera ad *S. nigrescentem* Trev. hanc accedit, sed sporae biclavatae optime differunt. — Corticola ad Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 21).

Cladonieae Müll. Arg. Lich. Genève p. 22.

3. **Cladonia peltata** Spreng. Syst. 4. p. 271; in monte Kilima Ndjaro, alt. 3000 met.: Dr. Hans Meyer (specim. Steinian.).

4. **Cladonia crispata** Flot. v. **subsimplex** Müll. Arg.; podetia circ. 1—2 cm longa, $\frac{1}{8}$ — $1\frac{1}{4}$ mm lata, cartilagineo-corticata et laevia, haud squamulosa, apice simpliciter in scyphum (perforatum) parvum patentem margine denticulatum abeuntia v. e scyphi margine semel prolifera. — Habitu formam exiguum simplicem *Cl. degenerantis* Flk. refert, sed scyphi non clausi sunt. — Terricola in monte Kilima Ndjaro, alt. 3000 met., cum sequente: Ritter v. Höhnelt n. 207 pr. min. p.

5. **Cladonia Floerkeana** Fries Lich. Europ. p. 238; *Cladonia isidioclada* Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 5 (non Montgn.); ad truncos montis Kilima Ndjaro, alt. 3—4000 met., sine apotheciis: Dr. Hans Meyer (Stein n. 10), mixta cum var. sequente.

— — v. **intermedia** Hepp Flecht. Europ. n. 291, f. **melanocarpa** Müll. Arg.; *Cladonia isidioclada* Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 5, pr. p., apothecia nigrata, lamina sporigera autem sub microscopio apice intense rubra est. Reliqua bene cum citata var. conveniunt. Podetia fere omnia pulverulenta, nonnulla autem intermixta omnino v. pro parte cartilagineo-corticata sunt.

6. **Stereocaulon ramulosum** v. **farinaceum** Th. M. Fries Stereocaul. p. 25; *St. Meyeri* Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 7. — Ad saxa vulcanica in monte Kilima Ndjaro, alt. 3—5000 met.: Dr. Hans Meyer (specim. Stein.).

— — v. **acuminatum** Müll. Arg., robustum, superne saepius in ramulos simplices suberectos albescenti-farinosos abiens et ibidem patenter ramulosum; phyllocladia superiora sensim sensimque breviora, in apice ramulorum deficientia. — Haec forma quodam modo jamaicense *St. cornutum* Müll. Arg. refert, ubi autem phyllocladia omnino alia; apothecium unicum tantum vidi, junius, cum iis *St. ramulosi* Ach. conveniens, et planta dein

haud affinis evadit *St. Salazano* Nyl. Etiam cephalodia conveniunt. — In monte Kilima Ndjaro, alt. 3000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 208.

— — v. **macrocarpum** Babingt. in Hook. Flora of New Zealand p. 30; *St. Meyeri* v. *Bornmülleri* Stein Flecht. v. Kilim. n. 7; character a cl. Stein enunciatus is est omnino quo var. *macrocarpum* distinguitur, sed plantam ipse non vidi. — In monte Kilima Ndjaro, alt. 4000 met.: Dr. Hans Meyer.

7. **Stereocaulon confluens** Müll. Arg. L. B. n. 806; *St. vesuvianum* v. *Kilimandscharoense* Stein Flecht. v. Kilim. n. 6; ad saxa vulcanica montis Kilima Ndjaro, alt. circ. 4000 met.: Dr. Hans Meyer (vidi ab auct. miss.), et similiter in vulcanicis Gédé insulae Javae, alt. 2500 met.: Prof. Solms.

— — v. **fuscescens** Müll. Arg., totum obscurius et praesertim pagina superior squamularum cinereo-fuscescens; granula et squamulae densiora. — In monte Kilima Ndjaro, alt. circ. 3—4000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 204.

, **Usneae** Th. M. Fries Gen. Heterol. p. 47.

8. **Usnea barbata** v. **aspera** (Eschw.) Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 2; *U. barbata* v. *florida* Stein Flecht. v. Usambara n. 4. — Est robustior et validius papillosa quam v. *florida* Fr. — Ad Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 4); ad Pangami prope mare zanzibaricum: Ritter v. Höhnelt n. 222.

— — v. **strigosa** Krphl. Lich. exot. p. 312; *U. strigosa* Ach., Stein Flecht. v. Kilim. n. 3 et Usambara n. 5; in silva Rabai Taro et in Usambara: Dr. H. Meyer (n. v.), et ad podem montis Merau: Ritter v. Höhnelt n. 203 pr. p.

— — v. **cornuta** Flot. in Linnaea v. 17. p. 16; *U. cornuta* Körb., Stein Flecht. v. Kilim. n. 4; saxicola ad terminum arborum: Dr. Hans Meyer. — Forma haec est latissime in aliis terris distributa.

— — v. **densirostra** Müll. Arg. L. B. n. 234; *U. densirostra* Tayl. (fide specim. orig.); *U. cornuta* v. *Meyeri* Stein Flecht. v. Kilim. n. 4; saxicola in pascuis montis Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (specim. Stein.). — Bene cum speciminibus austro-americanis quadrat, et etiam in Madagascaria et Zambesia ad Dzomba alt. 2000 met. (Dr. Kirk), et ad Natal (Baines) et in Java occurrit.

9. **Usnea articulata** Hoffm. D. Fl. 135; in territorio Leikipia: Ritter v. Höhnelt n. 180, in monte Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer, (*U. barbata* v. *articulata* f. *gracilis* Stein Flecht. v. Kilim. n. 2, quae simpliciter eadem, sed junior aut forte summitates Lichenis referens).

— — f. **erubescens**; *Usnea barbata* v. *articulata* f. *erubescens* Stein Flecht. v. Kilim. n. 2; in Kilima Ndjaro, alt. 3000 met.: Dr. H. Meyer (n. v.), et in Java et Nova Caledonia.

— — f. **erecta**; *Usnea barbata* v. *erecta* Stein Flecht. v. Kilim. n. 2; ad terminum arborum in monte Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (ipse non vidi).

10. **Usnea dasypogoides** Nyl. in Trim. Journ. of Bot. v. 14. p. 263, var. **exasperata** Müll. Arg.; tenella, rami primarii 1½—4 dm longi, basi fere 1 mm crassi, longo tractu tenues et laeves (straminei ut tota planta), copiose ramilligeri, ramilli varie flaccido-curvati, subhorizontales, tenelli, plus minusve dense tuberculis soresiosis vulgo acute prominulis exasperati; apothecia parva. — Ramulicola in monte Kilima Ndjaro, ad 3000 met.: Dr. Hans Meyer (Stein n. 1).

11. *Usnea trichodea* Ach. Meth. p. 312, secund. Stein Flecht. von Usambara n. 2; in territorio Usambara: Dr. H. Meyer.

12. *Usnea longissima* Ach. Univ. p. 626; Stein Flecht. v. Usamb. n. 1; in regione Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 14).

— — v. *Ebersteinii* Stein Flecht. v. Kilim. n. 1; intense straminea et brevius ramilligera, sed ramilli in specim. misso pro maxima parte (non tota) e mutilatione tantum abbreviati sunt; in silva Rabai Taro: Dr. H. Meyer (Comm. cl. Stein).

13. *Usnea angulata* Ach. Syn. p. 307; in regione Leikipia: Ritter v. Höhnelt n. 189 (specimina velusta, robustiora et ramillis orbata occurrunt, quae faciem offerunt prima fronte valde alienam); in Kilima Ndjaro: H. Johnston Esq.

— — f. *ferruginea* Krph. Lich. Argent. n. 14; *Usnea angulata* Stein Flecht. v. Usambara n. 3; in territorio Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 13).

— — v. *flaccida* Müll. Arg.; rami primarii parte inferiore tantum acute v. etiam obtuse angulosi v. subteretes v. inferne superficie impresso-inaequales, caeterum cum ramillis copiosis undique teretes et laeves aut sublaeves, valde flaccidi; corticola ad pedem Aberdarekaka in territorio Leikipia: Ritter v. Höhnelt n. 176.

Ramalinae Th. M. Fries Gen. Heterol. p. 50.

14. *Ramalina Hoehneliana* Müll. Arg.; thallus sesquipedalis et longior, pendulus, flaccidus, longissime subdichotome divisus; laciniae membranaceo-compressae, planae, 4—1 mm latae, longo tractu aequilatae, hinc inde paullo spiraliter tortae aut non tortae, erga lucem visae pelluentes et crebre et continue longitrorsum multicostulatae, costulae extus tenuiter prominulae, in latioribus circ. 20; apothecia marginalia et sparsa, 1½—2½ mm lata, subpodicellata, e concavo mox plana et convexa, extus et in margine laevia; discus subcinereo-pruinosis; sporae 8-nae, 13—17 μ longae, 5—7 μ latae, ambitu satis ludentes, rectae et subrectae et incurvae. — Species insignis, juxta *R. capensem*, sc. *R. usneoidem* v. *capensem* Nyl. Recogn. Ramal. p. 25 (ambitu et brevitate sporarum a *R. usneoides* Fr. diversam) locanda est, a qua differt laciniiis latioribus, tenuioribus, aliter costatis et sporis robustis. Habitu caeterum quasi formam longissimam simulat *R. flaccidissimae* Urv., sed hujus laciniae non parallele costulatae, nec hinc inde spiraliter tortae sunt. — Ad arbores territorii Leikipia, alt. 15—2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 179.

15. *Ramalina complanata* Ach. Univ. p. 599 var. *denticulata* Müll. Arg.; *R. denticulata* Nyl. Ram. p. 28; *R. rigida* v. *africana* Stein Flecht. v. Usambara n. 8 pr. p.; corticola in territorio Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 9, 10).

— — v. *canaliculata*; *Ramalina denticulata* v. *canaliculata* Nyl. Ram. p. 28; *R. rigida* v. *africana* Stein l. c. pr. p.; cum var. praecedente: Dr. Hans Meyer (Stein n. 11).

— — v. *fallax*; *R. denticulata* v. *fallax* Müll. Arg. L. B. n. 928; *R. rigida* v. *africana* Stein l. c. pr. p.; similis *R. dendriscoidi* Nyl. («*R. dendroides* Müll. Arg.» a cl. Stein citata non existit, et spermogonia »pallida subpodicellata margaritacea Steinii nil sunt nisi asperitates sorediosae huius speciei). — In territorio Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 8). — In tota specie (inclusa *R. denticulata* Nyl.) habitus, magnitudo et ambitus sporarum valde ludunt et hae insuper rectae, subrectae et curvatae commixtim occurrunt.

16. **Ramalina calicaris** v. **subpapillosa** Nyl. *Recogn. Ramal.* p. 34 (sub var. *subampliata*); corticola in regione Leikipia, alt. 1500—2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 179 pr. p.

17. **Ramalina polymorpha** Ach. *Univ.* p. 600; Nyl. *Recogn. Ramal.* p. 50; *R. Meyeri* Stein *Flecht. v. Kilim.* n. 8; ad saxa vulcanica montis Kilima Ndjaro, alt. 4200 met.: Dr. Hans Meyer (comm. cl. Stein).

18. **Ramalina Eckloni** v. **membranacea** Müll. *Arg. L. B.* n. 818; *R. laevigata* Stein *Flecht. v. Usambara* n. 7 (non El. Fries); in territorio Usambara: Dr. H. Meyer (vidi fragm. Steinian.).

19. **Ramalina pusiola** Müll. *Arg.*; *R. pusilla* v. *Meyeri* Stein *Flecht. v. Usambara* n. 6; ramuli 3—4 cm longi, crassi, compresso-teretes, hinc inde (parce) rotundato-perforati et jam sicci erga lucem pellucidi, laeves, apice truncati v. in apothecia abeuntia; apothecia 3—5 mm lata, apici ramulorum immersa, extus laevia, margine rosello cincta; discus albido-pruinosis; sporae 8-nae, 10—13 μ longae, 4—6 μ latae, rectae aut leviter curvulae. — Cum *R. pusilla* Le Prev. convenit receptaculo extus laevi et sporis rectis, cum *R. abyssinica* Nyl. autem thallo laevi nec rugoso et dein ab his proximis simul in eo distat quod rami erga lucem inspecti pellucidi et obsolete reticulatim venulosi. — Ramulicola in territorio Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 12).

Parmeliaceae Müll. *Arg. Lich. Paraguay.* p. 3.

20. **Peltigera rufescens** Hoffm. v. **spuria** Körb *Syst.* p. 59; ad terram in monte Kilima Ndjaro, circ. alt. 3000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 171, et Dr. H. Meyer (si *P. spuria* Stein l. c. n. 20 eadem).

21. **Sticta pulmonacea** Ach. *Univ.* p. 449; frequens in silvis montis Kilima Ndjaro, alt. circ. 3000-metrali: Ritter v. Höhnelt n. 125, 205, et in territorio Leikipia ad pedem montis Aberdarekaka: Ritter v. Höhnelt n. 176 pr. p.

22. **Theloschistes flavicans** Norm. *Conat. praemiss.* p. 17; *Tornabenia flavicans* v. *acromela* Stein *Flecht. v. Usambara* n. 9 (non auct.); in Usambara: Dr. Hans Meyer (Stein n. 16).

— — f. **cinerascens**; *Tornabenia flavicans* v. *acromela* f. *cinerascens* Stein *Flecht. v. Usambara* n. 9; tota decolorando-cinerascens (apices ramulorum haud nigrati); in Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 15).

— — v. **melanotrichus** Müll. *Arg. Revis. Lich. Mey.* n. 5; in monte Kilima Ndjaro, alt. circ. 1500 met.: Johnston, Esq.; et in silva Rabai Taro (fide Steinii *Flecht. v. Kilim.* n. 10, sed specim. non vidi).

23. **Theloschistes parietinus** Norm. *Conat. praem.* p. 17; ad ramulos loco Settimahaup, alt. 2000 met., cum europaeo perfecte congruens: Ritter v. Höhnelt n. 178 pr. p.

— — f. **albicans** Müll. *Arg.*, est forma normalis speciei, thallo orbiculari, depresso, centro late albescente aut demum fere usque ad marginem flavo-aurantiacum v. omnino usque ad marginem decolorato-albido: In Argentina et Uruguay frequens: Schnider, Spegazzini n. 3, Ricer n. 4, 6 et dein in Africa australi: Mac Owen.

24. **Parmelia latissima** Fée. *Ess. Suppl.* p. 139; *P. Hildebrandtii* Stein *Flecht. v. Usamb.* n. 11 (non Krph.); ad terminum arborum in monte Kilima Ndjaro, alt. 3—4000 met. (fide Steinii), et in Usambara: Dr. H. Meyer (Stein commun.).

25. **Parmelia crinita** Nyl. *Syn.* p. 380 (non Ach.); ramulicola prope Pangam versus oram maritimam zanzibarianam: Ritter v. Höhnelt n. 230.

26. *Parmelia urceolata* f. *sorediifera* Müll. Arg. L. B. n. 183; Africa tropico-orientalis: Rev. J. Hannington.

— — v. *nuda* Müll. Arg. L. B. n. 183; *P. Hildebrandtii* Krph. Neue Beitr. n. 15 (non Stein Flecht. v. Usambara n. 11); in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

27. *Parmelia Hanningtoniana* Müll. Arg.; thallus supra glaucescenti-albidus, opacus, minutissime puncticulato-marmoratus, laevis v. obsolete rugulosus, subtus intense stramineo-flavicans, medio demum fusco-pallidus, modice nigro- v. nigrescenti-rhizinosus, strato grosse lacero-granuloso scaberrimo irregulari concolore tectus, intus albus, ad margines longe nigro-ciliatus; apothecia submarginalia, 5—10 mm lata, crasso-podicellata, valde concava; receptaculum extus undique tuberculis grossis breviter lobiformibus, cylindricis et compressis et cristato-laceris valde inaequalibus crebre obsitum et iis incrassatum; discus badio-fuscus; sporae 8-nae, late ellipsoideae, 16—18 μ longae et 10—12 μ latae, haud pachydermeae. — Species insignis, habitu supra fere *P. urceolatam* Eschw. referens, subtus autem potius *Cetrariam* simulans. Thallus haud adpressus est, intus laxe stuppeus. Spermogonia secus margines loborum et in ipsis tuberculis et in margine receptaculi copiosa, nigra, obsolete prominula, spermatiis circ. 6—7 μ longis, cylindricis. — In Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington;

28. *Parmelia abessinica* Krph. Neuer Beitr. z. Afrik. Flecht. p. 140. *P. perforata* v. *ciliata* Stein Flecht. v. Usambara n. 10 hic pertinere videtur, sed sterilis tantum lecta fuit: in Usambara: Dr. H. Meyer (comm. cl. Stein).

29. *Parmelia Schweinfurthii* Müll. Arg. Diagn. Lich. Socotr. p. 3?; in monte Kilima Ndjaro: Ritter v. Höhnelt n. 200, sterilis lecta, haud omnino certa, magis platyloba et leviter fuscidula, forte sp. n.

30. *Parmelia praetervisa* Müll. Arg. L. B. n. 191; *P. revoluta* v. *ambigua* Stein Flecht. v. Usambara n. 13; in territorio Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 2). — Thallus (subtus glaber v. subglaber) paullo validius isidiosus, caeterum bene conveniens, sterilis tantum lectus.

31. *Parmelia perlata* Ach. Meth. p. 216; ramulicola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

32. *Parmelia proboscidea* Tayl. in Mack. Flor. Hib. 2. 143; in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

33. *Parmelia perforata* Ach. Meth. p. 217; ad Settimahaup, alt. 2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 178 pr. p. (ster.); in silvis Rabai Taro: Dr. H. Meyer (fid. Steinii).

— — v. *ulophylla* Mey. et Flot. in Act. Acad. Leopold. 1843 p. 218; cum planta normali speciei ad Settimahaup alt. 2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 178 pr. p. (ster.), et in Kilima Ndjaro: Rev. J. Hannington.

34. *Parmelia tiliacea* Ach. Meth. p. 215; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

— — v. *scortea* Nyl. Scand. p. 99; *P. tiliacea* v. *eximia* Stein Flecht. v. Usambara n. 12; a planta vulgatissima europaea nullomodo differt (Schaer. Lich. Helvet. n. 359 accurate congruit); in territorio Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 1, c. apoth. valde juven.).

35. *Parmelia coronata* Fée Ess. p. 123. t. 31. fig. 2; Müll. Arg. L. B. n. 1150; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

36. *Parmelia Borreri* v. *ulophylla* (Ach.) Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. p. 313; ad Settimahaup, alt. 2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 178 pr. p.

37. *Parmelia saxatilis* Ach. Meth. p. 204; Stein Flecht. v. Kilim. n. 14; truncicola ad terminum arborum montis Kilima Ndjaro, alt. 4500 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

38. *Parmelia caperata* Ach. Meth. p. 217; Stein Flecht. v. Kilim. n. 17; in Kilima Ndjaro, alt. 3000 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

— — v. *caperatula* Nyl. Syn. p. 377; corticola, in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

39. *Parmelia conspersa* Ach. v. *laxa* Müll. Arg. L. B. n. 575; in Kilima Ndjaro, ad limites nivales, alt. circ. 4200 met.: H. H. Johnston, Esq., n. 21 (ster.).

40. *Parmelia molliuscula* Ach. Univ. p. 492; Stein Flecht. v. Kilim. n. 13 (inclusa f. *stenophylla* eiusd., in iisdem specim. transitus aut simul ambae formae in eodem thallo observand.); ad terram et saxa supra terminum arborum montis Kilima Ndjaro, alt. 3000—4500 met.: Dr. H. Meyer (specim. Stein.).

41. *Parmelia sinuosa* Ach. Syn. p. 207; Stein Flecht. v. Kilim. n. 15; in silvis Rabai Taro, alt. 2800 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

42. *Parmelia physodes* Ach. Meth. p. 250; Stein Flecht. v. Kilim. n. 16; supra speciem arboream *Ericae* in monte Kilima Ndjaro, alt. 4000 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

43. *Physcia leucomelas* Mich. Flor. Bor. Amer. 2. p. 326; ad Settima-haup, alt. 2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 178 pr. p.

— — v. *angustifolia* Nyl. Syn. p. 415 (excl. syn. Mey. et Flot.); in territorio Leikipia: Ritter v. Höhnelt n. 6; in monte Kilima Ndjaro ad terminum arborum: Dr. H. Meyer (Stein n. 9); in Usambara: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

— — v. *subcomosa* Nyl. Syn. p. 415; *Physcia comosa* Stein Flecht. v. Usambara n. 6 (non Nyl.); in Usambara meridionali: Dr. H. Meyer (Stein n. 3).

44. *Physcia speciosa* v. *hypoleuca* Nyl. Syn. p. 417; *Physcia hypoleuca* Nyl., Stein Flecht. Usambara n. 16; ad Tumakanya: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

— — v. *cinerascens*; *Physcia speciosa* f. *cinerascens* Nyl. Syn. p. 417; a reliquis varietatibus recedit rhizinis inter normalem et v. *hypoleucam* bene intermediis, sc. ex albo nigricantibus, albo-brunneis v. albo-fuscis et plus minusve thalli laciniis magis adpressis. — Talis occurrit in Abyssinia (a Schimperio pluries lecta, Quartin Dillon et Petit); in Khasia Indiae orientalis, et ibidem in Naja Hills: Griffith; in Himalaya; et demum in Argentina (Lorentz).

— — f. *pulvinigera* Müll. Arg.; soredia pulviniformia gerens ut *Ph. speciosa* f. *sorediosa*; ad pedem Merou Africae aequatorial-orientalis: Ritter v. Höhnelt n. 203; in Naja Hills Indiae orientalis: Griffith.

— — f. *coralligera*, est forma isidiosa varietatis *cinerascens*, quacum caeterum habitu adpresso et colore partium bene congruit. — In monte Kilima Ndjaro, alt. 1500—1800 met.: H. H. Johnston, Esq.

— — f. *brachyloba*; thalli lacinae in centro late in lobulos numerosos turgidos et imbricatos subinde conglomeratos abeuntes. — Directe e var. *cinerascens* normali orta, adsunt enim transitus, at prima fronte insigniter recedens. — Haec forte eadem est ac *Physcia firmula* Nyl. Syn. p. 418, haud sufficienter stabilita. — In Naja Hills et in Khasia Hills Indiae orientalis: Griffith et alii, cum praecedentibus, et dein in Patagonia andina: Claraz.

— — f. *dispansa*; *Physcia dispansa* Nyl. Syn. p. 418; in ambitu thalli hinc inde optime in formam genuinam *Physciae speciosae* v. *cinerascens* transit. — In Naja Hills Indiae orientalis, cum praecedentibus: Griffith.

45. *Physcia picta* Nyl. Syn. p. 430; ramulicola in regione Leikipia, alt. 1500—2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 179 pr. p. (ster.); in monte Kilima Ndjaro alt. 3000 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii), in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

— — v. *coccinea* Müll. Arg. L. B. n. 937; *Crocynia Leopoldi* Stein Congoflecht. n. 12, nec non *Crocynia ? haematina* Stein Flechten v. Kilim. n. 19; ramulicola ad oram maritimam prope Pangami: Ritter v. Höhnelt n. 230 pr. p.; ad Tchamtéi: Hildebrandt; in Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (specim. Stein.), prope Lydenburg in Transwaalia: Wilms n. 3; et dein in Africa occidentali prope Vivi in territorio Congoensi inferiore (specim. Steinian.). — *Crocynia* Mass. est diversissimum genus.

— — v. *sorediata* Müll. Arg. Lich. Afr. occid. n. 12; in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

Pyxineae Müll. Arg. Lich. Paraguay. p. 6.

46. *Pyxine Cocoës* Nyl. Lich. exot. Bourb. p. 255; Africa tropico-orientalis: Rev. J. Hannington.

— — v. *chrysantha* Müll. Arg., thallus sorediis tenellis aurantiaco-aureis adpersus, intus aurantiacus. — Corticola in Africa aequatoriali-orientali: Rev. J. Hannington.

Gyrophoreae — *Gyrophorei* Nyl. Syn. 2. p. 3.

47. *Gyrophora umbilicarioides* Stein Flecht. v. Kilim. n. 21; est bona species; saxicola in monte Kilima Ndjaro, alt. 4000 met.: Dr. H. Meyer (vidi specim. orig.).

Placodieae Müll. Arg. Lich. Genève p. 37.

48. *Amphiloma elegans* Körb. Syst. p. 110; *Gasparrinia elegans* Stein Flecht. v. Kilim. n. 22; ad saxa vulcanica montis Kilima Ndjaro, alt. 6100 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

49. *Candelaria subsimilis*; *Lecanora epixantha* Nyl. Lich. Ehrenb. p. 62; *Gyalolechia epixantha* Stein Flecht. v. Kilim. n. 23; muscos in-crustans in monte Kilima Ndjaro, alt. 5000 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii).

Lecanoreae Müll. Arg. Lich. Socotr. p. 359.

50. *Lecanora atra* Ach. Univ. p. 344; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

51. *Lecanora subfusca* v. *allophana* Ach. Univ. p. 395; *L. subfusca* v. *vulgaris* Schaer., Stein Flecht. v. Kilim. n. 24; ad truncos ad terminum arborum in monte Kilima Ndjaro, alt. 3000—4000 met.: Dr. H. Meyer (fide Steinii); in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

— — v. *coilocarpa* Ach. Univ. p. 393; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

— — v. *glabrata* Ach. Univ. p. 393; corticola cum var. praecedente: Rev. J. Hannington.

— — v. *cinereo-carnea* Tuck. in C. Wright. (Eschw.); *L. subfusca* Stein Flecht. v. Usambara n. 17; in Usambara, ramulicola, cum *Graphide*

Lincola Ach.: Dr. H. Meyer (Stein n. 22 pr. p.); in Africa tropico-orientali litorali: Rev. J. Hannington. — In regionibus calidioribus vulgatissima est.

52. **Lecanora pleospora** Müll. Arg.; thallus subflavescenti-cinereus, tenuis, minute granulari-rugulosus, margine subarachnoideo-effusus; apothecia dense conferta et mutua pressione angulosa, $\frac{2}{3}$ — $\frac{3}{4}$ mm lata et minora, margine tenui subintegro paullo v. demum vix prominente cincta, discus carneo-pallidus et nudus v. junior subcinereus; lamina hyalina; sporae in ascis obovoideo-cylindricis 16-nae, ellipsoideae, 8—11 μ longae, 6—8 μ latae. — Est simillima *L. subfuscae* v. *cinereo-carneae* Tuck., sed thallus nonnihil flavicans et asci 16-spori. — Ramulicola in territorio Leikipia, i. e. inter lacum Njansa et montem Kenia, alt. 1500—2000 met.: Ritter v. Höhnelt n. 179 pr. p.

53. **Lecanora caesio-rubella** Ach. Univ. p. 366; corticola, in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

54. **Lecanora hypocrocina** Nyl. in Flora 1876, p. 509; ramulicola prope Pangami ad oram zanzibaricam: Ritter v. Höhnelt n. 222 pr. min. p., cum planta cubensi (Ch. Wright ser. II. n. 48 bene quadrans), et corticola in Africa tropico-orientali, hypothecio minus intense croceorubente, caeterum omnibus congruentibus: Rev. J. Hannington.

55. **Lecanora flavido-nigrans** Müll. Arg.; thallus e virente albido-flavus, tenuis, crebre rugulosus v. confluenti-granulosus, mox superficie pulverulentus; apothecia 1—1 $\frac{1}{3}$ mm lata, sessilia, margine thallino tumido undulato paullo involuto, sed leviter tantum prominente, obsolete pulverulento cincta; discus e plano modice convexus, subniger, pruina livido-cinerea obtectus; epithecium subolivaceum; lamina hyalina; hypothecium inferne praesertim e flavescence rufo-aurantiacum, sub lente plus minusve carneum v. rufescens; asci 8-spori; sporae 17—20 μ longae, 5—6 μ latae, cylindrico-ellipsoideae, saepius 3 $\frac{1}{2}$ —4-plo longiores quam latae. — Prope *L. sibiricam* Müll. Arg. L. B. n. 1368 locanda est. — Extus fere *L. hypocrocinam* Nyl refert, sed thallus distincte flavidus, discus aliter coloratus et ambitus sporarum bene alius. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

56. **Lecanora** (s. **Pseudomaronea**) **fuscula** Müll. Arg.; thallus cinereo-fuscescens, crebre et grossiuscule granularis, granula contigua, gibboso-irregularia, initiis apotheciorum saepius fusco-impressa, caeterum laevigata, firma; apothecia evoluta 1—1 $\frac{2}{3}$ mm lata, sessilia, crassiuscula, plana, margine integro crassiusculo leviter prominente cum thallo concolore cincta, et intra marginem linea nigro-fusca zeorina vulgo leviter distincta praedita; discus obscure fuscus, nudus, lamina hinc inde secedente pallidior et rubescens; epithecium olivaceo-fuscidulum; lamina hyalina; hypothecium subhyalinum, stratum subjacens irregulariter rubescens; asci elongato-obovoidei, myriospori; sporae 6—8 μ longae, 2—3 μ latae, ambitu satis ludentes, vulgo cylindrico-ellipsoideae. — Juxta transvaalensem *L. crassilabram* Müll. Arg. L. B. n. 1371 inserenda est. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

— — v. **pruinosa** Müll. Arg.; apothecia pro parte distincte majora, margo demum undulatus (sed integer) et discus nigro-fuscus, intense caesio-pruinosis, stratum sub hypothecio situm intensius carneo-rubens. — Prima fronte ad *L. crassilabram* Müll. Arg. referenda apparet, sed apothecia minus adpressa, crassiora et margo leviter incurvo-prominens. — Sporae cum iis plantae normalis speciei bene congruunt. — Corticola, in Africa sublitorali tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

57. *Lecania* (s. *Haematomma*) *punicea* Müll. Arg. L. B. n. 130; Africa tropico-orientalis: Rev. J. Hannington.

58. *Callopusia aurantiacum* v. *salicinum* Mass. Synops. Blasten. p. 11; corticolum in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

59. *Urceolaria scruposa* v. *cinereo-caesia* Müll. Arg. Lich. Montevid. n. 35; *Urceolaria Steifensandii* Stein Flecht. v. Kilim. n. 25; sporae normales (nondum vetustae et corrugatae) circ. $28\ \mu$ longae et $13\ \mu$ latae sunt, in ascis 8-nae; ad terram turfosa montis Kilima Njaro, alt. 4000 met.: Dr. H. Meyer (Stein n. 16).

60. *Pertusaria subvaginata* Nyl. in Flora 1866, p. 290; corticola, in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

61. *Pertusaria melaleuca* Duby Bot. gall. p. 673; Müll. Arg. L. B. n. 729; corticola, in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

62. *Pertusaria xanthothelia* Müll. Arg.; thallus flavens, tenuis, primum sublaevis, dein grossiuscule et crebre plicato-granularis; verrucae $\frac{4}{5}$ —1 mm latae, copiosae, concolores, sessiles, basi constrictae, paullo irregulariter gibboso-globosae, vertice plus minusve truncatae v. ibidem depressae, ostiolis 1—3 prominenter hemisphaericis et concolori-flavis ornatae, caeterum superficie laeves, 1—3-carpicae; sporae in ascis 8-nae, 55—80 μ longae, 23—27 μ latae, ambitu satis ludentes, intus haud costulatae. — Juxta *P. Wulfenii* DC. locanda est, cujus ostiola omnino alia. Habitu et ostiolis flavis prominentibus ad *P. meridionalem* Müll. Arg. etiam accedit, sed tota intensius flava, verrucae basi constrictae, et ostiola cum verrucis concolora sunt. — Corticola, in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

63. *Pertusaria subareolata* Müll. Arg.; thallus albidus v. paullo virescenti-albidus, tenuis, crebre contiguo-areolatus, areolae irregulares, planae, corticato-firmae; verrucae $\frac{3}{4}$ —1 mm latae, nano-hemisphaericae, ambitu obsolete gibboso-irregulares et superficie obsolete subareolato-inaequales, quasi ex areolis thallinis imperfecte unitis formatae, cum thallo concolores, oligocarpicae; ostiola indistincta; sporae 4-nae (et subinde 6—8-nae in iisdem verrucis), circ. 52 μ longae, 27 μ latae aut angustiores, laeves. — Prima fronte deminutam *P. leioplacam* Schaer. simulat, sed thallo et superficie verrucarum differt, at in hujus vicinitate locanda est. — Corticola, in Africa tropica orientali: Rev. J. Hannington.

Lecideaceae Müll. Arg. Enum. Lich. Genève p. 50.

64. *Lecidea* (sect. *Biatora*) *russula* Ach. Univ. p. 197; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

65. *Lecidea* (s. *Biatora*) *carneo-rufa* Müll. Arg.; thallus cinereus, tenuis, furfurellus, demum subrimulosus; apothecia $\frac{1}{3}$ — $\frac{2}{3}$ mm lata, sessilia, crassiuscula, rufescenti-carnea, subpellucida, novella medio impressa, mox immarginata, plana et nuda; lamina undique hyalina; paraphyses facile segregandae; sporae 8-nae, 13—14 μ longae, 6—7 $\frac{1}{2}$ μ latae. — Thallus ut in *L. griseo-pallente* Nyl.; apothecia potius ut in *L. mutabili* Fée, sed minus translucida et magis obscure carnea. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

66. *Lecidea* (s. *Biatora*) *Piperis* Spreng. Act. Holm. 1820, p. 467; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

67. *Patellaria* (s. *Bombyliospora*) *Meyeri* Müll. Arg.; *Bombyliospora Meyeri* Stein Flecht. v. Usambara n. 19. — Proxima est *Pat. conjunctae* (Nyl.) Müll. Arg. ex insula Bourbon, sed thalli papillulae longe tenuiores,

circ. $\frac{1}{12}$ mm tantum latae, creberrimae; epithecium brunneo-fuscum; hypothecium subhyalinum, strato inferiore magis obscuratum; sporae solitariae, evolutae 80—100 μ longae, 23—30 μ latae, 6—8-loculares, utrinque late rotundato-obtusae. — Corticola in territorio Hundu: Dr. H. Meyer (Stein n. 14).

68. **Patellaria** (s. **Bacidia**) **endoleucoides** Müll. Arg. L. B. n. 988; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

69. **Buellia parasema** β **vulgata** Th. M. Fries Scand. p. 590; ramulicola ad Pangani prope mare zanzibaricum: Ritter v. Höhnelt n. 230 pr. p.; in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

70. **Buellia cinereo-cincta** Müll. Arg.; thallus cinereus, tenuis, tenuissime et obsolete rugulosus et subrimulosus; apothecia $\frac{1}{2}$ mm lata et minora, adpressa, plana, tenuissime cinereo-marginata, margo integer, demum cinerascens v. livido-niger et evanescens; discus planus, niger et nudus; epithecium et hypothecium crassum nigro-fusca; sporae 8-nae, circ. 13 μ longae et 7 μ latae, ellipsoideae, 2-loculares. — *B. parasema* v. *vulgata* Th. Fr. quae similis, differt margine apotheciorum nigro et crassiore. Characteres interiores utriusque caeterum bene conveniunt. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

Coenogonieae Müll. Arg. Lich. Paraguay. p. 18.

71. **Coenogonium implexum** Nyl. in Ann. Sc. nat. ser. 4 vol. 16 p. 92; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

Graphideae Müll. Arg. Graphid. Fécan. p. 4 et 13.

72. **Graphis Lineola** Ach. Univ. p. 264 (excl. syn.); Stein Flecht. v. Usambara n. 20; ramulicola in Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 22 pr. p.); in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

73. **Phaeographis** (s. **Schizographis**) **Palmarum** Müll. Arg.; thallus pibus v. albidus, tenuissimus, laevis, instratus; lirellae 3—5 mm longae, circ. $\frac{1}{6}$ mm latae, longe lineares, simplices, subrectae et modice curvatae, ad extremitates obtusae, utroque latere altiuscule thallino-duplicatae, caeterum nudae et atrae, majore parte emersae; labia conniventi-clausa, laevia et hinc inde irregulariter 1-sulcata; perithecium basi crasso-completum et lateraliter basi anguloso-productum, undique nigrum; sporae 8-nae, fuscidulae, 38—46 μ longae, 9—11 μ latae, valide fusiformes, utrinque obtusae, 8—12-loculares. — Prope jamaicensem *Ph. sulcatam* Müll. Arg. L. B. n. 1046 locanda est. — Ad lignum sicco-putrescens Palmarum, prope Usagara: Last.

74. **Helminthocarpon Meyeri** Müll. Arg.; *Phlyctis Meyeri* Stein Flecht. v. Usamb. p. 18; simile *H. Le Prevostii* Fée, at differt perithecio lirellarum laterali albo, haud nigro-fusco; lirellae elato-emersae, basi in sectione paullo constrictae, extus laeves, late hiantes, oblongatae, curvulae; discus crasse albo-pulverulentus; paraphyses firmae, capillares, crebre intricatim ramosae et connexae; sporae crebre parenchymaticae. — Ramulicola ad Tumakanya in Usambara: Dr. H. Meyer (vidi specim. Steinian.).

75. **Phaeographina caesio-pruinosa** Müll. Arg. Graphid. Fécan. p. 49; ramulicola in monte Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (vidi fragmentul. unic. in hb. Steinii). — Est species latissime dispersa, in America calidiore vulgarissima.

76. *Opegrapha Bonplandi* v. *abbreviata* (Fée) Müll. Arg. Graphid. Féean. p. 17; Stein Flecht. v. Usambara n. 21; corticola in Usambara: Dr. H. Meyer (Stein n. 17).

77. *Opegrapha* (s. *Lecanactis*) *Quassiae* v. *nuda* Müll. Arg. Revis. Lich. Féean. p. 5; corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

78. *Arthothelium aurantiacum* Müll. Arg.; thallus intense aurantiacus aut flavescenti-aurantiacus, margine linea nigrescente cinctus, tenuissimus, leprosulus v. sublaevis; apothecia nigra, parvula, tenuiter astroideo-ramosa, nigra, obsolete thallino-vestita; sporae in ascis obovoideis apice pachydermeis 8-nae, hyalinae, 25—28 μ longae et 9—11 μ latae, oblongo-obovoideae, rectae et curvulae, transversim 8—10-loculares, loculi in axi 3—5-locellati. — Thallus fere ut in *Callopismate aurantiaco* Mass., apothecia autem ut in *Arthonia astroidea* Ach., sed longe gracilius et longius astroideo-ramosa. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

79. *Chiodecton minutulum* Müll. Arg.; thallus albido-glaucus, tenuissimus, laevis, continuus v. demum parce rimulosus, ambitu haud byssinus; verrucae albissimae, fere 1 mm latae, orbiculares et oblongae et tum rectae aut varie curvulae v. etiam parce confluentes, nano-convexae, basi applanatae, laevigatae, minutissime et sat copiose ostiolatae; apothecia dense sparsa, orbicularia v. hinc inde oblongata; $\frac{1}{20}$ — $\frac{1}{10}$ mm longa, non prominula, nuda, intus infra laminam profunde atra, subdiscreta; sporae 26—30 μ longae, 3 μ latae, tenuiter fusiformes, subrectae, 4-loculares. — Juxta *Ch. effusum* Fée et *Ch. Meratii* Fée inserandum est, quibus longe tenuius est. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

80. *Glyphis favulosa* v. *intermedia* Müll. Arg. Graph. Féean. p. 61; ramulicola in monte Kilima Ndjaro: Dr. H. Meyer (vidi fragm. in hb. Steinii).

Pyrenuleae Müll. Arg. Pyrenoc. cubens. p. 375.

81. *Melanotheca cruenta* Müll. Arg. Pyrenoc. cubens. p. 379; *Pyrenula Gravenreuthii* Stein Flecht. v. Kilima Ndjaro n. 26; ad ramulos minores silvae Rabai Ndara: Dr. H. Meyer (vidi specim. Steinii). Apothecia in specim. viso fere omnia simplicia, qualia etiam hinc inde in speciminibus americanis occurrunt. Sporae bene evolutae 30 μ longae et 15 μ latae sunt.

82. *Arthopyrenia* (s. *Mesopyrenia*) *planipes* Müll. Arg.; thallus glauco-albus, tenuissimus, maculiformis, ambitu effusus; apothecia hemisphaerica, ex oblecto demum nuda et nigra, umbilicato-ostiolata, $\frac{5}{10}$ — $\frac{6}{10}$ mm lata, basi insuper in annulum planum vulgo velatum dilatata; perithecium basi deficiens; paraphyses capillares, firmae, sparsim connexae; asci obovoideo-cylindrici, 2-seriatim 8-spori; sporae 25—33 μ longae, 11—12 μ latae, obovoideae, medio subconstrictae, utrinque rotundato-obtusae, 2-loculares. — Apothecia juniora fere illa *A. planorbiculatae* Müll. Arg. referunt, sed oblecta et sporae multo majores sunt. Ab *A. indusiata* Müll. Arg. recedit structura apotheciorum. Optime, ut videtur, juxta *A. terminatam*, sc. *Verrucariam terminatam* Nyl. Lich. Andam. p. 21 locanda est, quae thallo et paraphysibus differt. — Corticola in Africa tropico-orientali: Rev. J. Hannington.

Appendix.

Als Appendix folge hier noch die Revision der Congo-Flechten, welche von Herrn Stein als neu beschrieben wurden. Stein's Aufzählung (p. 7—9) enthält 22 Nummern, von welchen 14 als nicht neu, 8 aber als neu figuriren. Die ersteren sind meist gewöhnliche Arten, die recht gut im untern Congo-Gebiet vorkommen können und die somit, richtig oder unrichtig bestimmt, für die Lichenographie und Lichenologie ohne Belang sind, und von diesen sah ich nur 4; dagegen konnte ich durch die bereitwillige Mittheilung des Herrn Stein sämtliche 8 neue Flechten der Kontrolle unterwerfen und bin dadurch zu folgendem Gesamtergebnisse gekommen.

Usnea strigosa f. **Ledienii** Stein Congo-Flechten n. 1, est **Usnea barbata** v. **aspera** (Eschw.) Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 2.

Tornabenia flavicans v. **acromela** Stein l. c. n. 5, est **Theloschistes flavicans** v. **intermedius** Müll. Arg. Revis. Lich. Mey. n. 5.

Parmelia perforata Stein l. c. n. 6, est **Parmelia argentina** Krph. Lich. Argent. n. 32.

— — v. **ciliata** Stein l. c., est **Parmelia proboscidea** Tayl.

Parmelia, haud enumerata nisi forte sub **P. revoluta** l. c. n. 7, est **Parmelia tiliacea** Ach. v. **hypoleuca** Müll. Arg.; similis **P. tiliaceae** v. **minori** Müll. Arg. L. B. n. 46, anguste laciniata, centro rugulosa, lacinae apice applanata, tota subtus pallida. — Corticola prope Vivi: Ledien (Stein n. 42).

Parmelia congensis Stein l. c. n. 8, est **Parmelia adpressa** v. **stenophylloides** Müll. Arg. Lich. Paraguay. n. 32.

Pyxine Cocoësi v. **Congensis** Stein l. c. n. 11, est **Pyxine Cocoësi** Fr. normalis.

Crocynia Leopoldi Stein l. c. n. 12, est **Physcia picta** v. **coccinea** Müll. Arg. L. B. n. 937 (vid. supra n. 45).

Dimelaena Stanleyi Stein l. c. n. 13 nec thallum placodiale nec apothecia lecanorina offert **Dimelanae**, sed species est **Buelliae** et fere cum **B. subalbula** (Nyl.) Müll. Arg. Lich. aegypt. n. 49 convenit, attamen diversa est thallo tenuiore, pallide ochraceo-argillaceo et apotheciis minoribus. — Thallus e continuo rimoso-diffractus; sporae 10—13 μ longae, 5—6½ μ latae; epithecium nigro-fuscum; hypothecium pallido-fuscum v. rufescenti-obscuratum. Sit ergo **Buellia Stanleyi** Müll. Arg.

Rinodina exigua v. **Congensis** Stein l. c. n. 14, est **Rinodina metabolica** Anzi Cat. p. 53.

Rinodina sophodes v. **Ledienii** Stein l. c. n. 15, est **Rinodina Hüfferiana** Müll. Arg. Lich. Beitr. n. 132.

Myxodictyon icmadophiloides Stein l. c. n. 19, sit **Helminthocarpon Congoense** Müll. Arg.; thallus albido-glaucus, tenuis, minute rugulosus, firmus; gonidia chroolepoidea, catenarum articuli valde inaequales, 3—8 μ crassi; lirellae evolutae 2/3—4/5 mm latae, 1—2 mm longae, ellipsoideae et varie oblongatae, simplices v. subastroideo-pauciramulosae, late apertae, planae; labia thallino-corticata, paullo involuta, tenuiuscula et crispula; discus planus, medio depressus, albo-pulverulentus; perithecium basi completum, coerulescenti- v. olivaceo-nigricans; lamina hyalina; asci 1-spori; sporae c. 120 μ longae et 30 μ latae, hyalinae, crebre parenchymatice loculosae, locelli subcubici in series 20—25 transversales dispositi, in quaque serie (in axi) 4—6, haud raro iterum semel v. cruciatim bis divisi.

— Nomen specificum »icmadophiloides« verae naturae, habitui et structurae hujus Lichenis contrarium est et recusari debuit. Paraphyses valde tenellae, clathratim connexae. Habitu accedit ad *H. Le Prevostii* Fée et *H. platyleuco* Müll. Arg., ubi thallus lacteus et sporae aut perithecium alia. — Ramulicola ad Congo di Lemba (Stein n. 47).

Phaeographis tortuosa Stein l. c. n. 22, non Müll. Arg., sit **Phaeographis** (sect. **Hemithecium**) **paragraptia** Müll. Arg.; thallus albus, tenuissimus, laevis; lirellae simplices, subrectae et varie leviter curvulae, lineares, utrinque obtusae, nigrae et nudaе, e thallo emersae, $\frac{1}{2}$ —2 mm longae, $\frac{1}{5}$ — $\frac{1}{4}$ mm latae; labia sicca modice conniventia, madefacta patentia, nunquam clausa, subtenuia et integra; discus planus, nudus; perithecium basi deficiens, nigrum; hypothecium superne hyalinum, inferne rufo-fuscescens; asci clavato-cylindrici, 8-spori; sporae 23—26 μ longae, $6\frac{1}{2}$ — $7\frac{1}{2}$ μ latae, obovoideo-cylindricae, fuscidulae, 6—8 loculares. — Accedit ad *Ph. inustam* (Ach.) Müll. Arg. L. B. n. 459, at differt lirellis emersis, minus late apertis, prima fronte haud male *Graphidem scriptam* Ach. referentibus. — Ramulicola ad Congo di Lemba in regione Congoensi: Fr. Ledien (Stein n. 44). — Eodem loco dein etiam parcissime lecta est madagascariensis *Phaeographis* (sect. *Phaeodiscus*) *glauca* Müll. Arg. L. B. n. 973. (Stein n. 45).

Trypethelium mastoideum Stein l. c. n. 22, est **Trypethelium tropicum** Müller Arg. *Pyrenoc. Cubens.* p. 393.

Aspicilia citata sed non determinata l. c. p. 9, est **Urceolaria actinostoma** Schaer. *Enum.* p. 87.

Psorothecium Schadenbergianum Stein l. c. p. 9, e Philippinis adjunctum, est **Patellaria atro-rubicans** Müll. Arg. L. B. n. 443.

Litteratur.

Die Bewegungen des Protoplasma von *Caulerpa prolifera* von D. J. M. Janse. Mit 3 Tafeln. Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik herausgegeben von N. Pringsheim. Bd. 21. Heft 2. Berlin 1889.

Die vorliegende, 119 Seiten umfassende Abhandlung bietet neben einer sehr ausführlichen Beschreibung der Plasmabewegungen in »Rhizomen«, »Wurzeln« und »Blättern« der *Caulerpa* noch eine Reihe von Beobachtungen an dieser Alge, welche die Entstehung und die Funktion der viel besprochenen Zellstoffbalken betreffen.

Die Protoplasmaströmungen sind in neuerer Zeit wieder mehr in den Vordergrund getreten durch die Deutung, die ihnen de Vries als Transportvermittler gegeben und durch Versuche einer physikalischen Erklärung, wie sie z. B. von Berthold und Quincke gemacht worden sind. Ohne Zweifel sind physikalisch-chemische Prozesse die unmittelbar treibenden Momente bei dieser Bewegung; dem aufmerksamen Beobachter der so mannichfaltig in die Erscheinung tretenden Bewegung des lebenden Plasma's wird es aber nicht entgehen, dass diese sehr anerkennenswerthen Versuche keineswegs eine befriedigende Erklärung abgeben können, sondern dass da noch bestimmende Faktoren mit im Spiele sind, welche man als »physiologische« bezeichnen muss, die mit anderen Worten von Eigenheiten und

Reizbarkeiten des lebendigen Plasma's abhängen, welche einer Kausal-Auffassung noch ganz unzugänglich sind. Dies an einem prägnanten Beispiele zu zeigen, wäre eine dankbare und gerade jetzt recht dienliche Aufgabe gewesen. Leider nimmt die vorliegende Arbeit auf diese interessanten Fragen gar keinen Bezug. Sie ist lediglich in der Absicht unternommen wieder neue Beweise für den Satz von de Vries beizubringen, »dass der Transport der organischen Baustoffe in den Pflanzen vorwiegend durch die Rotation und die Cirkulation des Protoplasma vermittelt wird«. Neuere Untersuchungen haben nun gezeigt, dass die Voraussetzung dieser Behauptung, nämlich die allgemeine Verbreitung der Plasmaströmungen in lebenden unverletzten Pflanzen keineswegs eine zutreffende ist, und wirkliche fassbare Beweise für diese Deutung der Plasmaströme liefert auch die vorliegende Arbeit nicht. Wohl ist in einfacher schöner Weise gezeigt worden — was auch übrigens der blosse flüchtige Blick auf eine *Caulerpa* lehrt — dass die Hauptstrombahnen nach und von den jungen wachsenden Theilen ausgehen, dass Wunden, welche diese Bahnen unterbrechen, nach einiger Zeit in bestimmter Weise umgangen werden und die Plasmaströme auf Umwegen ihre Bestimmungsorte erreichen; zur Beweisführung der aufgestellten Behauptung hätte aber der hier gewiss mit am leichtesten ausführbare Beweis erbracht werden müssen, dass die zu den wachsenden Theilen hinführenden Ströme mit Stoffen beladen sind, welche den von dort zurückkehrenden Strömen fehlen. Zu einem solchen Nachweis ist nicht einmal der Versuch unternommen und wer da behaupten will, dass die Plasmaströme aus irgend welchen anderen Gründen den ganzen Körper dieser Siphonée durchziehen, kann, aus dem Mitgetheilten gerade so viel oder so wenig Beweise für seine Ansicht entnehmen, wie für die vom Verf. behauptete.

Die sehr fleissigen eingehenden Einzelbeobachtungen sind sehr ausführlich beschrieben und bieten für die äusserliche Kenntniss der Plasmapbewegungen manch interessantes Detail. So sind auch die Erscheinungen unmittelbar nach der Verwundung und später eingehend beobachtet und ausführlich beschrieben. Die Erklärung dieser Erscheinungen dürfte nach Ansicht des Ref. aber besonders da nicht ganz zutreffend sein, wo es sich um das Auftreten der hellen chlorophyllkornfreien Zonen handelt. Verf. erwähnt z. B. gar nicht einer eigenartigen weisslichen Substanz, die sich ausser dem eigentlichen Plasma in dem Lumen der *Caulerpa* vorfindet und durch Erstarrung zu einem festen elastischen Pfropf bei Berührung mit Meerwasser die Wundverschlüsse, nach Beobachtungen des Ref., vornimmt, während sich das Plasma von der Wunde zurückzieht¹⁾.

Merkwürdig ist, nach der Ueberzeugung des Verf., die Entstehung der Cellulosebalken, welche das Innere der Alge durchsetzen. Dieselben sollen nämlich frei und beweglich im Innern von Plasmaströmungen angelegt werden, und erst später, bei ihrem Längerwerden an die peripheren Wände oder an andere »Balken« angekittet werden. Die Hautschicht, die nach Vorgang de Vries als selbständiges plasmatisches

1) Ueber den inneren Aufbau der *Caulerpa*, bei welchem die oben erwähnte Substanz eine Hauptrolle spielt, wird Ref. demnächst berichten. Die eiweissartige, sich mit Kernfärbemitteln stark und vornehmlich färbende Materie bildet geradezu die Füllmasse, in der mannichfache Vakuolengänge hinziehen und innerhalb dieser Nakuolengänge verlaufen die eigentlichen Plasmaströme. Diese Verhältnisse sind freilich nur an äusserst sorgfältig hergestellten Celluloid-Schnitten zu sehen. An Alkoholmaterial schrumpft der komplizierte Bau zu unverständlichen Trümmern zusammen, aber auch da bleibt die besagte Materie deutlich gesondert vom Plasma zu erkennen.

»Organ« aufgefasset wird, soll sich aus principiellen Gründen (beobachtet ist das nicht) vorher in die Stränge von aussen einstülpen. Wenn man bedenkt, dass trotz sehr fleissigen ausdauernden Suchens seitens des Verf. nur ganz vereinzelt einmal ein freier Balken beobachtet ist, so drängt sich dem Leser eher die Ueberzeugung auf, dass dies irgendwie losgerissene Balken waren, die zur Beobachtung gelangten, als dass alle Balken auf diese Weise entstehen sollten. In der That ist für die Behauptung des Verf. ausser den seltenen Ausnahms-Fällen, in denen freie Balken einmal beobachtet wurden, kein Argument für eine so eigenthümliche Entstehungsweise beigebracht. Das ist festgestellt, dass die Balken im Innern von Plasmasträngen entstehen, wie es frühere Forscher schon vermuthet und angenommen haben, ob aber dieselben darin mit freien Enden entstehen oder gleich festsitzend, das ist nach den Ausführungen dieser Arbeit noch zum Mindesten sehr zweifelhaft und unwahrscheinlich. Es ist wohl kaum anzunehmen, dass der spätere Verlauf eines Balkens von seinem zufälligen Anwachsen abhängig gemacht wird.

Ueber die Bedeutung der Zellstoffbalken oder -»Fasern«, wie sie rücksichtlich ihrer Dimensionen wohl besser bezeichnet würden, hat sich Verf. auch eine eigene Meinung gebildet. Dieselben sollen verhindern, dass die Blätter durch den Turgor aus ihrer flachen Gestalt zu dicken blasigen Schläuchen angetrieben werden. Die senkrecht von Blattfläche zu Blattfläche verlaufenden Fasern erhalten durch ihre Zugfestigkeit die nützlichere flache Gestalt. Bewiesen wird diese Vermuthung auch unzweideutig durch das Experiment, indem eine lokale Verletzung der Balken die Blattfläche lokal blasenförmig auftreibt. Wäre das Vorkommen der Balken auf die flachen Blätter allein beschränkt, so würde man sich dieser Ansicht des Verf. einwurfslos wohl anschliessen müssen. Gerade die Hauptmassen der Fasern liegen aber zum Theil in komplizirtem Verlauf im runden derbhäutigen Rhizom und ebenso in den cylindrischen Wurzelschläuchen. Annehmen zu wollen, dass diese vielleicht durch den Turgor ohne Balken gesprengt würden, während doch viel dünnwandige Zellen ohne Balken erhalten bleiben, wird wohl niemandem einfallen. Die Balken werden hier daher eine andre Funktion haben. In einem ausführlicheren Aufsatz¹⁾ hat Ref. diese Bedeutung näher beleuchtet und kam zu dem Resultat, dass die Zellstofffasern vermöge ihrer besseren Permeabilität für Salze und Gase, als sie dem Protoplasma zukommt, Zuleitungsbahnen dieser Lebensfaktoren für die inneren Plasmaportionen im Caulerpaleib darstellen. Die Versuche, welche den Ref. zu dieser Auffassung führten, waren mit einer Tötung des Plasmakörpers verknüpft, auf welchen Umstand besonders als eventuell das Resultat beeinflussend aufmerksam gemacht wurde. Der Verf. vorliegender Arbeit irrt sich aber, wenn er glaubt, ich selbst legte deshalb diesen Versuchen keinen Werth bei. Dass die Balken in den Blättern nebenbei auch eine mechanische Funktion erfüllen, das soll dem Verf. durchaus nicht bestritten werden, aber dass die Funktion der Balken im Uebrigen der raschere Austausch zwischen dem Innern der Pflanze und dem Wasser ist, das spricht, trotz oberflächlicher Verwerfung meiner Resultate, der Verf. an anderer Stelle (pag. 263), wo (auf pag. 270) von der Nothwendigkeit gesprochen wird, dass die Balken auch von der Hautschicht überzogen sein müssten, selbst folgendermassen aus: »Denn weil die aus Cellulose bestehenden Theile sehr viel mehr permeabel sind, wie die Hautschicht so würde an den Balken, falls diese nicht von Hautschicht umkleidet waren, das Körnerplasma in fast direktem Verkehr mit dem mangelnden Medium treten ...«

1) Ueber die Funktion der Zellstofffasern von *Caulerpa prolifera*. Arbeiten a. d. bot. Institut zu Würzburg. Bd. III. 1888.


Wer *Caulerpa* nicht aus eigener Anschauung gut kennt, wird sich, unter Vorbehalt dieser wenigen hier kritisirten Punkte, bei deren Auffassung sich Verf. wohl zuviel von vorgefassten Meinungen leiten liess, aus diesen sehr fleissigen Beobachtungen und eingehenden Schilderungen ihrer Verhältnisse ein genau detaillirtes Bild von den Bewegungserscheinungen und andern Vorgängen in dieser interessanten Pflanze machen können. Was genaue, selbst mühevollen Beobachtungen und eingehende Schilderung des Gesehenen betrifft, so verdient diese Arbeit alle Anerkennung der Fachgenossen.









F. Noll.


Glaser, Taschenwörterbuch für Botaniker und alle Freunde der Botanik, enthaltend die botanische Nomenklatur, Terminologie und Litteratur nebst einem alphabetischen Verzeichnisse aller wichtigen Zier-, Treibhaus- und Kulturpflanzen, sowie derjenigen der heimischen Flora. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Leipzig, T. O. Weigel's Nachfolger. 1890.

Dem Titel nach wäre das vorliegende Werkchen in der That ein recht nützliches Unternehmen, weniger für »Botaniker« als für Gärtner und Dilettanten, und da eine zweite »verbesserte und vermehrte« Auflage erschienen ist, so könnte man darin auch ein äusseres Zeichen des Erfolges sehen. Betrachtet man aber diese »Auflage« genauer, so sieht man, dass dieselbe einfach ein Abdruck der ersten ist (S. 1—485) und dass die »Verbesserung und Vermehrung« nur darin besteht, dass ein »erweiternder und berichtender Anhang« von S. 486—516 beigegeben ist. Leider hat der Verfasser ohne hinreichende Sachkenntniss, Verständniss und Sorgfalt alles Mögliche zusammengestellt. Mit Erstaunen liest man, dass »adulterinus« unächt »auch: verschwägert« bedeute, apokarp »sondersamig (nämlich Carpell)«, dorsiventralis »rückenbauchig« (»dorsum und venter, — ris Bauch — beides verkehrt«), dass *Batis* zu den Taxaceen oder Ephedreen gehöre, *Blasia* auf deutsch »kleines Aftermoos« heisse u. a. Ebenso wenig befriedigend sind die Litteraturangaben. So soll der Systematiker Engelmann (dessen Cakteenarbeiten nicht erwähnt werden) auch »zur Biologie der Schizomyceten« geschrieben haben, Russow, Janczewski und Wilhelm sind als Autoren von »Beitr. zur Kenntniss des Siebröhrenapparates. Lpz. 1880« aufgeführt, Schimper jun. ist dem Verf. derselbe wie Schimper sen.; dass Schleiden, de Bary, Röper nicht mehr unter den Lebenden weilen, erfährt man nicht. Doch diese Proben mögen genügen, um die Haltung dieses »erweiterten und berichteten« Buches zu kennzeichnen; am ehesten mag noch das Namenverzeichniss von Pflanzen zu brauchen sein. Auch dies leidet freilich an Auslassungen (z. B. fehlen *Anhalonium*, *Leuchtenbergia*) und Unrichtigkeiten (*Carludovica* soll z. B. eine Palme sein).

K. G.







Ueber die Vermehrung von *Hydrodictyon utriculatum*.

Ein Beitrag zur Physiologie der Fortpflanzung

von

Georg Klebs.

Einleitung.

Die Untersuchung, deren Resultate in dieser Abhandlung dargestellt werden, nahm ihren Ausgangspunkt von der Frage, in welchem Grade äussere Bedingungen die Fortpflanzung beeinflussen. Dieses Problem, für Zoologie und Botanik von allergrösstem Interesse, ist oft in Angriff genommen worden, aber, da es sich hierbei um die verwickeltsten Lebensprocesse der Organismen handelt, mit wenig Erfolg, sodass bis auf den heutigen Tag nicht viele unzweifelhaft sichere Thatsachen zu Tage gefördert sind. So erklärt es sich, dass auch heute noch die Ansicht vielfach vertreten wird, nach welcher die Fortpflanzung als die höchste und eigenartigste Funktion, nur in der inneren Natur des Organismus ihre Ursachen findet, und die Aussenwelt zwar fördernd oder hindernd, aber nicht bestimmend einwirken kann. Die Versuche Weismanns¹⁾ bei Daphniden, Heyers²⁾ bei höhern Pflanzen haben dieser Ansicht neue Stützen gegeben. Andererseits sind in neuerer Zeit lebhaftere Bestrebungen aufgetreten, engere Beziehungen der Fortpflanzung mit der Aussenwelt aufzudecken, und besonders hat Herbert Spencer³⁾ in geistvoller Weise den Zusammenhang der Ernährung mit der Fortpflanzung nach mancherlei Richtungen hin erörtert. Ein reiches Thatsachenmaterial, welches dieselbe Frage behandelt, findet sich in dem dankenswerthen Werke von Düsing⁴⁾, welcher bestrebt ist, die zerstreuten Beobachtungen durch eine einheitliche Hypothese zu verbinden. Düsing nimmt an, dass die Organismen die Eigenschaft erworben haben, immer gerade diejenige Vermehrungsform, sei sie geschlechtlich oder ungeschlechtlich, oder diejenige Geschlechtsform, sei sie männlich oder weiblich, zu erzeugen, welche bei bestimmten äussern Verhältnissen die vortheilhafteste ist. Diese nützliche Eigenschaft, je nach

1) Weismann, Beiträge zur Kenntniss der Daphnoiden. Zeitschr. für wiss. Zoologie. XXX u. XXXIII.

2) Heyer, Untersuchungen über das Verhältniss des Geschlechtes bei einhäusigen und zweihäusigen Pflanzen. Halle 1883.

3) Herbert Spencer, Die Principien der Biologie übersetzt von Vetter. Bd. I und II.

4) Düsing, Die Regulierung der Geschlechtsverhältnisse bei der Vermehrung von Menschen, Thieren und Pflanzen. Jenaische Zeitschrift für Naturwiss. XVII. 1884.

Umständen das Geschlecht zu regulieren, ist nach Düsing durch natürliche Zuchtwahl erlangt worden. Abgesehen davon, dass eine eingehende Kritik sowohl der Thatsachen selbst, als der theoretischen Ausnützung derselben, die Anschauungen Düsings sehr erschüttert, hat der vorliegenden Untersuchung der Grundgedanke Düsings fernelegen. Vielmehr ruht das Hauptgewicht derselben in dem Nachweis, dass bestimmte äussere Einflüsse nothwendig bestimmte physiologische Reactionen des Organismus hervorrufen, welche in der Form der Fortpflanzung sichtbar werden.

Von vornherein erschien es verlockend, die Süsswasseralgen zu Versuchen über dieses Problem zu verwenden, da mir aus früheren Erfahrungen bekannt war, dass diese Organismen sich zu physiologischen Untersuchungen in hohem Grade eignen. Um so aussichtsreicher schienen diese Versuche, als bei solchen niedrigen Formen am ehesten daran zu denken war, dass die Fortpflanzungserscheinungen durch äussere Bedingungen wesentlich beeinflusst würden. Der Erfolg hat den Erwartungen entsprochen. Allerdings ist zunächst nur eine einzige Alge, das Wassernetz, zur Untersuchung herangezogen worden, da es vor allem darauf ankam, bei einer einzigen Form, aber bei dieser mit möglichst grosser Sicherheit und zwingender Kraft des Beweises, festzustellen, bis zu welchem Grade und in welcher Weise eine Abhängigkeit der Fortpflanzung von der Aussenwelt existirt.

Einige Resultate meiner Untersuchung, welche im Sommer 1888 begonnen und bis zum Sommer 1890 fortgesetzt wurde, sind im biologischen Centralblatt 1889 mitgetheilt worden; die folgende Abhandlung bringt den eingehenden Bericht meiner Beobachtungen.

Abschnitt I.

Allgemeine Vorbemerkungen.

1. Entwicklungsgang des Wassernetzes.

Das Wassernetz tritt bekanntlich in Form langer schlauchförmiger, geschlossener Netze auf, deren cylindrische Zellen zu drei oder vier an den Ecken zusammenstossen und fünf- oder sechseckige leere Maschen bilden. Die Fortpflanzung dieser Alge ist durch die Forschungen von Al. Braun¹⁾, Cohn²⁾, Pringsheim³⁾ sehr gut bekannt. Jede Zelle ist in gleichem Maasse fähig sich fortzupflanzen, und zwar kann die Vermehrung eine ungeschlechtliche oder geschlechtliche sein. Bei der ersten Form der Fortpflanzung zerfällt die Zelle in eine grosse Anzahl von Zoosporen

1) Al. Braun, Ueber die Erscheinungen der Verjüngung. Freiburg 1849–50.

2) Cohn, Untersuchungen über die Entwicklungsgeschichte der microsc. Algen und Pilze. Nova Acta Leop. Carol. XXIV.

3) Pringsheim, Ueber die Dauerschwärmer des Wassernetzes. Monatsber. der Berl. Akadem. Decbr. 1860.

(7000—20000 nach Braun), welche innerhalb der aufquellenden Mutterzellhaut kurze Zeit sich hin- und herbewegen, bis sie sich zu einem neuen Netz direct zusammenlegen und mit Zellhaut umgeben. Nach Auflösung der alten Zellhaut wird das junge Netz frei und wächst schnell in 3—4 Wochen bis zu dem Grade heran, dass es von neuem dieselbe Art der Fortpflanzung eingehen kann.

Bei der geschlechtlichen Fortpflanzung zerfällt die Zelle in eine sehr grosse Anzahl kleinerer Schwärmer (30000—100000 nach Braun), welche mit dem Ausdruck von Strasburger als Gameten bezeichnet werden mögen. Diese Gameten brechen durch ein Loch der Zellwand hervor, schwärmen umher und copuliren mit einander, welche Erscheinung zuerst von Suppanetz beobachtet wurde¹⁾. Das Product der Verschmelzung, die Zygote, entwickelt sich zu einer kleinen Zelle, welche nach einiger Zeit der Ruhe stark heranwächst und in vier grössere Schwärmsporen zerfällt. Dieselben, zur Ruhe gekommen, bilden sich zu polyederartigen Zellen aus, welche nach einigem Wachsthum auf ungeschlechtlichem Wege junge, meist noch sehr einfach gebaute Netze erzeugen. Die Entwicklung der Zygote ist durch Pringsheim zuerst vollständig klar gelegt worden.

Hydrodictyon gilt als ein typisches Beispiel des Generationswechsels, und ist bei den vielfachen Erörterungen darüber von Forschern wie Sachs²⁾, Pringsheim³⁾, Nägeli⁴⁾ u. a. häufig berücksichtigt worden. Nach ihrer Darstellung entsteht aus den Zygoten die erste ungeschlechtliche Generation, auf welche zahlreiche Wiederholungsgenerationen (Nägeli) folgen, bis eine einzige Geschlechtsgeneration den Abschluss macht, indem sie Zygoten bildet. Indessen wird nicht näher angegeben, ob dieser Cyclus der Zellgenerationen — von Nägeli als ontogenetische Periode bezeichnet — nur einmal oder mehrere male im Laufe eines Jahres durchlaufen wird, ob, um mit Weismann zu reden, Hydrodictyon wie eine mono- oder polycyclische Species sich verhält. Schon Pringsheim hat darauf hingewiesen, dass die Zahl der ungeschlechtlichen Generationen beim Wassernetz wie bei andern Algen eine unbestimmte ist, was wohl nichts anderes heisst, als dass äussere Verhältnisse dafür massgebend sind, während nach Weismann bei Daphniden die Zahl der Jungferngenerationen eine für jede Art bestimmte, unabänderliche Grösse darstellt.

Die Hauptfrage, von welcher ich in meiner Untersuchung ausgieng, war, ob dieser Generationswechsel thatsächlich vorkommt, und ein in der innern Natur der Alge begründeter, durch Vererbung fixirter Vorgang ist,

1) Rostafinski, Quelques mots sur l'Haematococcus lacustris. Mem. de la Soc. nat. des Sc. natur. Cherbourg XIX. 1875. S. 152.

2) Sachs, Lehrbuch der Botanik. 4. Auflage.

3) Pringsheim, Ueber Sprossung der Moosfrüchte und den Generationswechsel der Thallophyten. Jahrb. für wiss. Botanik. XI. 1878.

4) Naegeli, Theorie der Abstammungslehre. 1884. Cap. VIII.

oder ob die äussern Umstände für das Eintreten der beiden Fortpflanzungsweisen von Bedeutung sind, und der etwa vorhandene Generationswechsel nur durch zufällige äussere Bedingungen bestimmt wird. In der That hat auch bereits Vines¹⁾ in einem kleinen Aufsatz lebhaft bestritten, dass überhaupt ein Generationswechsel bei Thallophyten abgesehen von Coleochaete und Chara existirt; er behauptet, dass die Vermehrungsweise von äussern Bedingungen abhängt. Gelegentliche Beobachtungen an Hydrodictyon führten mich auf eine ähnliche Vermuthung, und dieselbe wurde noch gestützt durch eine kurze Angabe von Al. Braun²⁾, dass das Verhältniss von Zoosporen und Gametenbildung zum Theil von äussern Umständen abzuhängen scheine. Das wichtige Resultat, dass das Verhältniss geradezu durch die Aussenwelt bedingt wird, ist in meiner vorläufigen Mittheilung bereits angegeben.

2. Cultur des Wassernetzes.

In der freien Natur lebt das Wassernetz in Teichen und Sümpfen, bisweilen auch in langsam fließenden Gräben und tritt gewöhnlich in grosser Ueppigkeit auf. Der eine Weg der Untersuchung, ob seine Fortpflanzung von äussern Bedingungen abhängt, würde darin bestehen, die Alge an ihrem natürlichen Standort während des ganzen Jahres zu beobachten und die Vermehrungsweise zu den verschiedenen Zeiten festzustellen. Die Resultate meiner darauf bezüglichen Beobachtungen sollen erst später erwähnt werden. Von vornherein erschien es mir viel bedeutungsvoller, mit Hülfe des Experimentes die Frage zu entscheiden; denn nur in einem genau bekannten Experiment ist es möglich, einigermaßen die Bedeutung einer bestimmten äussern Bedingung zu beurtheilen, wenn auch selbst dann Schwierigkeiten des Verständnisses entstehen, weil die zarten Zellen für einen so geringen Wechsel der äussern Bedingungen empfindlich sein können, dass wir es nicht bemerken. Es ist eine oft gemachte Erfahrung, dass schon bei diesen niedern Organismen anscheinend Individualitäten entwickelt sind, da dieselben Algen unter gleichen Umständen sich verschieden verhalten. Meine zahlreichen Versuche mit dem Wassernetz haben oft diese Erfahrung bestätigt. Doch scheint es mir, als wenn man sich darin täuscht, diese Verschiedenheit des Verhaltens ausschliesslich auf die Verschiedenheit der Individuen zurückzuführen. Sehr wahrscheinlich sind die Umstände eben nur anscheinend gleich, aber nicht wirklich; sie sind es vielleicht nicht in ein und demselben Versuche für alle Zellen desselben Netzes. Als zweites wichtiges Moment kommt hinzu, dass vor dem Versuch schon die Netze unter verschiedenen Einflüssen

1) Sidney Vines, On alternation of generations in the Thallophytes. Journal of Botany. 1879.

2) Al. Braun, Verjüngung S. 238. Anmerkung 2.

gelebt haben, und in Folge dessen verschiedene Neigungen angenommen haben, welche nachher in dem Versuch die Verschiedenheit des Verhaltens bedingen. Diese Nachwirkung der vorhergehenden Lebensumstände, die Beeinflussung des Versuchsergebnisses durch dieselbe ist von wesentlichster Bedeutung für die richtige Beurtheilung vieler Versuche.

Für die erwähnten Verhältnisse bietet das Wassernetz ein relativ günstiges Versuchsobject dar, insofern man, wenigstens soweit es möglich ist, gleichartiges Material zur Verfügung hat, da die zahlreichen Zellen eines Netzes als Schwesterzellen unter gleichen Bedingungen aufgewachsen sind. Um den noch vorhandenen Ungleichheiten möglichst zu begegnen, gilt es viele gleichartige Versuche anzustellen; andererseits kommt es darauf an, die Alge unter möglichst verschiedenen Verhältnissen leben zu lassen, um ein Urtheil über den Einfluss derselben zu gewinnen. Der grösste Theil meiner Versuche wurde mit selbst gezüchtetem Material angestellt, welches im Sommer und Herbst 1888 aus dem Neudorfer See bei Basel geholt wurde. Die jungen Netze wurden in sehr verschieden grossen Gefässen cultivirt, auf deren Grunde eine Schicht von Lehm und Sand sich befand. Diese Gefässe wurden theils im Zimmer, theils im Freien bald kälter, bald wärmer, bald lichter, bald schattiger aufgestellt. Am besten gelang die Cultur in grossen Zinkkästen, welche während des Sommers in einem Gewächshaus standen. Besondere Vorschriften für die Cultur sind kaum anzuführen. Die Hauptsache ist, dass man beständig aufpasst, für neues Wasser, neuen Grund von Zeit zu Zeit sorgt, die directe Sonne je nach der Grösse der Wassermasse je nach der Jahreszeit einwirken lässt. Es ist selbstverständlich, dass die Culturen im Frühjahr und Sommer am üppigsten gedeihen, wenn es auch gelingt, den ganzen Winter hindurch die Alge zu erhalten. Für die Zimmercultur sind die Monate October bis Januar die schlimmsten; zu dieser Zeit vermehren sich die Parasiten und Feinde der Algen, seien es Flagellaten oder Pilze, wie besonders *Chytridium hydrodictyi* A. Br. in verheerendster Weise, und vernichten die wenig widerstandsfähigen Algen. Doch kann man dieselben retten und bewahren durch Cultur in Salzlösungen, in welchen die Parasiten nur geringe Macht haben.

Neben dem Material aus Neudorf wurden auch frische Netze aus den Teichen der Umgebung von Freiburg untersucht. Ich verdanke dieselben der grossen Liebenswürdigkeit des Herrn Prof. Klein, welcher mich mehrere male mit neuem Material versorgt hat.

Für die im Folgenden beschriebenen vielfältigen Versuche, bei welchen die Netze in verschiedenartigen Nährlösungen cultivirt wurden, ist meistens filtrirtes Regenwasser als Lösungsmittel benutzt worden.

Abschnitt II.

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung.

1. Ueber die Methode, Zoosporenbildung hervorzurufen.

Die Bedingungen der Zoosporenbildung, seien es innere oder äussere, sind bisher sehr wenig erforscht worden. Doch ist es eine jedem Alologen bekannte Thatsache ¹⁾, dass man bei Algen wie *Ulothrix*, *Oedogonium*, *Vaucheria*, die Bildung der Zoosporen hervorrufen kann, wenn man aus dem Freien geholte Exemplare in frisches Wasser bringt. Walz ²⁾ zeigte, dass für diese Wirkung des Wassers der in ihm gelöste Sauerstoff allein in Betracht kommt. Ferner wies Cornu ³⁾ darauf hin, dass auch die Temperaturverhältnisse bei der Geburt der Schwärmsporen eine Rolle spielen, da *Oedogonium* aus einem kalten in ein warmes Zimmer gebracht, Zoosporen bildet. Famintzin ⁴⁾ konnte bei *Protococcus*arten durch Salzlösung von 3% die Zoosporenbildung aufheben, sie durch Verdünnung mit Wasser wieder hervorrufen; es gelang ihm überhaupt, durch Veränderung des Mediums diese Algen zu verschiedenen Entwicklungsformen zu bringen.

Die ungeschlechtliche Fortpflanzung ist also bei gewissen Organismen von äussern Verhältnissen abhängig, und es fragt sich nun, wie *Hydrodictyon* sich in dieser Beziehung verhält. Wichtiger ist noch die Frage, welche in den erwähnten Arbeiten nicht in Betracht gezogen worden ist, in wie weit die bezeichneten äussern Bedingungen wirklich die Zoosporenbildung ursächlich bedingen, oder nur die blosser Veranlassung zur Bildung werden, nachdem dieselbe in Folge des Reifezustandes der Zelle im Wesentlichen vorbereitet ist. Ich habe versucht, bei *Hydrodictyon* auch dieser Frage näher zu treten.

Meine Versuche haben gezeigt, dass *Hydrodictyon* zu jeder beliebigen Zeit des Jahres Zoosporen zu bilden im Stande ist, dass es dieselben bilden muss, sobald bestimmte äussere Bedingungen auf die Zelle einwirken. Die Methode besteht einfach darin, die Netze in einer Nährlösung von 0,5—1% einige Zeit zu cultiviren und darauf in frisches Wasser zu bringen. Die angewandte Nährlösung entspricht in ihrer Zusammensetzung derjenigen von Knop. Die Mischung der Salze besteht aus 1 Th. salpetersaurem Kali, 1 Th. schwefelsaurer Magnesia, 1 Th. phosphorsaurem

1) Vgl. Strasburger, Wirkung des Lichtes und der Wärme auf Schwärmsporen. *Jenaische Zeitschrift für Naturw.* XII. S. 564.

2) Walz, Beitrag zur Kenntniss der Zoosporenbildung der Algen. *Botan. Zeitung* 1868. No. 31.

3) Cornu, *Comptes rendus* 1877. T. LXXXV. S. 860.

4) Famintzin, Die anorganischen Salze als Hilfsmittel zum Studium der Entwicklung niederer chlorophyllhaltiger Organismen. *Mélanges biolog. Acad. Imp. de St. Pétersbourg*. T. VIII. 1871.

Kali und 4 Th. salpetersaurem Kalk. In der Lösung gewinnen nach wenigen Tagen die Zellen ein lichtgrünes Aussehen, indem die Reservestärke¹⁾, welche in grosser Menge im Chlorophyllkörper sich eingelagert hat, verschwindet, und das reine Grün desselben mit den Amylonkernen hervortritt. Im Sommer genügt ein Aufenthalt von 2—3 Tagen, um in den Zellen die Neigung zur Zoosporenbildung zu erregen, nach 24 Stunden kann schon ein Theil der Zellen Zoosporen bilden. Bei ungünstiger Witterung, z. B. im Winter, muss die Alge dagegen länger in der Nährlösung verweilen, und es bedarf eines längeren Zeitraums, bis die meisten Zellen zur Fortpflanzung übergehen.

Der Versuch gelingt nicht nur mit frisch aus dem Freien stammenden Netzen, welche an und für sich häufig in den ersten Tagen im Wasser Zoosporen bilden; er gelingt bei Netzen, die auf alle mögliche Weise cultivirt worden sind, bei Netzen, die in Folge der Zimmercultur in einen vollkommen indifferenten Zustand gerathen sind, so dass kein anderes Mittel sie mehr zur Fortpflanzung veranlassen kann. Solche Netze, schmutzig gelb bis röthlich gefärbt, sterben schliesslich im Wasser ab, und in Fällen, wo die Netze dem Tode sich schon nähern, gelingt sogar der Versuch noch bei einem Theil der Zellen.

Im Allgemeinen darf man sagen, dass der Versuch, die Zoosporenbildung hervorzurufen, mit einer bei Organismen seltenen Sicherheit und Exaktheit verläuft, dass die Nährlösung allen Netzen, mögen sie herkommen, wo sie wollen, die lebhafteste Neigung zur Zoosporenbildung verleiht. Es war vorauszusetzen, dass die Concentration der Nährlösung bedeutungsvoll ist, dass eine obere und untere Grenze für ihre Wirkung existirt. Die erstere wird dadurch bedingt, dass die Zellen bei hoher Concentration leicht absterben; halten sie dieselbe aus, so gelingt noch der Versuch, nur dass der Aufenthalt im Wasser bis zur Zoosporenbildung gewöhnlich verlängert wird. Das Wassernetz erträgt relativ hohe Concentrationen, sodass es noch in einer 4% Lösung bei allmählicher Angewöhnung lebendig bleibt. In Wasser langsam übergeführt, bilden die Zellen Zoosporen.

Wird auf der andern Seite die Concentration der Nährlösung unter 0,5% verringert, so hängt die Wirkung sehr von dem Lebenszustand der Zellen ab, da bei gut cultivirten schon eine Lösung von 0,1% die Zoosporenbildung anregen kann, bei schlecht cultivirten dagegen nicht. In allen Fällen ist das Resultat nicht mehr so sicher, da bei schwächerer Concentration die Nachwirkungen der vorhergehenden Culturweise sich leichter bemerklich machen.

Die chemische Zusammensetzung der Nährlösung braucht nicht nothwendig der angegebenen Mischung zu entsprechen; der Versuch gelingt

1) Ich unterscheide Pyrenoidstärke und Reservestärke; erstere findet sich in den Amylonkernen, letztere im übrigen Theile des Chlorophyllkörpers.

selbst mit einzelnen Salzen, wenn auch lange nicht so allgemein und so sicher zu jeder Zeit. So kann das salpetersaure Kali in Lösung von 0,5 bis 1% die Zoosporenbildung anregen, ebenso der salpetersaure Kalk, das phosphorsaure Kali. Dagegen misslingen die Versuche mit schwefelsaurer Magnesia und zwar weil schon eine 0,5% Lösung die Zellen sehr rasch tötet. Andere Salze wie Chlornatrium, Chlorammonium, kohlensaures Natron wirken schlecht oder gar nicht, sodass doch thatsächlich nur die für die Ernährung wichtigen Salze, mit einander vereinigt, das beste Resultat in allen Fällen liefern. Weil nun die Nährsalze in Concentrationen von 0,1—4% wesentlich dieselbe Wirkung ausüben, ergibt sich schon daraus mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass die Salze hauptsächlich durch ihren Einfluss auf die Ernährung wirksam sind, während ihre physikalischen Eigenschaften, besonders ihre Wasser entziehende Kraft erst in zweiter Linie in Betracht kommen.

In der Nährlösung halten sich die Netze viele Wochen, ja Monate hindurch in gleichem Zustande, und bewahren ihre Fähigkeit, Zoosporen zu bilden. Dieselben konnten hervorgerufen werden bei Culturen noch nach einem halben Jahre. Allerdings bemerkt man bei so langer Dauer des Versuches, dass die Zellen nicht mehr so gleichmässig und schnell die Zoosporen erzeugen. Meistens entwickeln sich auch, wenn die Cultur sich selbst überlassen wird, andere Algen in üppigster Weise und überwuchern die Zellen des Wassernetzes.

2. Der Einfluss von Wärme und Licht auf die Zoosporenbildung.

Die Herbeiführung der Zoosporenbildung mit Hülfe der Nährlösung gelingt nur dann sicher, wenn noch andere äussere Einflüsse, vor allem Licht und Wärme mitwirken. Die Wärme hat für den Process dieselbe Bedeutung wie für alle Lebensvorgänge, und seine Abhängigkeit von dem Wärmegrad der Umgebung ist ebenso auffällig wie bei dem Wachsthum. Das Temperaturminimum liegt übrigens relativ sehr hoch im Vergleich mit andern Algen. Denn während *Ulothrix*¹⁾ z. B. in einem Wasser von 0° Zoosporen bilden kann, vermag *Hydrodictyon* es nicht unter 8° C. Die Culturen der aus Nährlösung in Wasser gebrachten Netze können unverändert Wochen lang in einem Zimmer am Fenster stehen, wo die Temperatur cc. 8—10° beträgt; sowie sie in ein warmes Zimmer gebracht werden (16—20°), entstehen in ihnen gleich Zoosporen. In diesem Falle bildet die Temperaturerhöhung der Umgebung die Veranlassung für die eigentliche Bildung der Zoosporen.

Der gesammte Verlauf des Processes, die Einwirkung der Nährlösung, des Wassers u. s. w. geht bei hoher Durchschnittstemperatur viel lebhafter

1) Dodel-Port, Jahrb. für wiss. Botanik. X. 1876. S. 484.

vor sich, so z. B. im Thermostaten bei 28° mit gleichzeitiger Beleuchtung. Das Temperatur-optimum und Maximum ist indessen nicht näher bestimmt worden.

Auffallender ist die Wirkung des Lichtes auf die Zoosporenbildung. Bisher gilt allgemein, dass dieselbe vom Licht mehr oder weniger unabhängig ist, in gewissen Fällen sogar von der Dunkelheit begünstigt wird ¹⁾. Ich habe früher nachgewiesen ²⁾, dass sie z. B. bei *Oedogonium* nach mehrtägigem Aufenthalt im Dunkeln in Zuckerlösung stattfindet. Bei dem Wassernetz dagegen hindert meistens schon ein zweitägiger Aufenthalt im Dunkeln die Zoosporenbildung; es geht sogar soweit, dass die Alge, welche im Sommer aus 0,5 Nährlösung in Wasser gebracht und gleich dunkel gestellt wird, nach den ersten 24 Stunden keine jungen Netze erzeugt, während in der beleuchteten Cultur nach derselben Zeit eine grosse Menge von solchen sich entwickelt haben.

Es fragt sich, ob das Licht sowohl für den Aufenthalt der Zellen in der Nährlösung als auch im Wasser gleich bedeutungsvoll ist. Am besten gelingt der Versuch, wenn das Licht in beiden Stadien auf die Culturen einwirkt; indessen scheint es, dass besonders für den Aufenthalt im Wasser das Licht erforderlich ist, denn der Versuch gelingt noch — allerdings nicht so sicher —, wenn man die Netze in der Nährlösung im Dunkeln cultivirt und die Wassercultur beleuchtet. Hat die letztere im Licht gestanden und mit der Zoosporenbildung begonnen, so kann dieser Process auch ein wenig im Dunkeln weitergehen, besonders wenn man das Wasser durch eine 1% Lösung von Maltose ersetzt.

Alle Versuche weisen daher auf die grosse Abhängigkeit der Zoosporenbildung vom Lichte hin. Um so überraschender war daher die Beobachtung einer unter besondern Umständen erzogenen Cultur, bei welcher sich selbst nach achttägigem Aufenthalt im Dunkeln Zoosporen entwickeln liessen. Doch auch in diesem Ausnahmefall begünstigte stets das Licht die Bildung der Zoosporen. In jedem Falle erfordert diese Abhängigkeit eine Erklärung, besonders weil sie auch für die ungeschlechtliche Fortpflanzung gegenüber der geschlechtlichen charakteristisch ist.

Die Bedeutsamkeit des Lichtes für die Zoosporenbildung erinnert lebhaft an die gleiche Erscheinung, welche für die Bildung der Zellhaut und für das Wachsthum von *Zygnema* von mir nachgewiesen wurde ³⁾. Auch hier für *Hydrodictyon* kommt ein Mangel an Nährstoffen in den Dunkelculturen nicht in Betracht. Es ist sogar sehr merkwürdig, wie äusserst langsam die Zellen im Dunkeln ihre organische Substanz verbrauchen. Ich kenne bisher keine Alge, welche so lange im Dunkeln in reinem

1) Vergl. z. B. Rostafinski und Woronin, Ueber *Botrydium granulatum* Bot. Ztg. 1877. S. 667.

2) Klebs, Untersuchungen aus dem Tübinger Institut. Bd. II. S. 547.

3) Klebs l. c.

Wasser zu leben vermag; standen mir doch stets Dunkelculturen von 3—4 Monaten zur Verfügung, und ich habe lebende Zellen beobachtet, welche ein halbes Jahr lang im Dunkeln gelebt haben.

Das Licht muss im Verlauf der Zoosporenbildung an irgend einer Stelle eingreifen, und zwar zu der Zeit, in welcher die nicht sichtbaren Vorbereitungen in den Zellen vor sich gehen. Die Annahme, dass es sich um thermische Wirkungen des Lichts handelt, ist ausgeschlossen, da eine directe Bestrahlung durch die Sonne nicht nothwendig ist, es auch nie gelang, das Licht bloß durch Wärme zu ersetzen. Augenscheinlich löst das Licht chemische Processe aus, und zwar um so lebhafter, je intensiver es wirkt. Jene erwähnten Ausnahmefälle lassen sich dann erklären durch die Annahme, dass diese vom Licht erregten Processe schon früher stattgefunden und die Produkte sich erhalten haben, sodass die Zoosporenbildung im Dunkeln weiter fortgehen kann.

Die wichtige Frage, in welcher Weise das Licht bei der Zoosporenbildung wirksam ist, lässt sich nicht sicher beantworten; kennen wir doch seine Rolle so wenig bei viel bekannteren Erscheinungen des Pflanzenlebens. Man könnte daran denken, dass das Licht chemische Processe *sui generis*, Synthesen besonderer Stoffe, Eiweisssubstanzen etc. einleitet, welche für die Zoosporenbildung nothwendig sind. Bisher haben sich derartige Lichtwirkungen nicht nachweisen lassen; dagegen weiss man, dass das Licht bei der Zersetzung der Kohlensäure betheiligt ist, und ferner hat Pringsheim¹⁾ die wichtige Thatsache entdeckt, dass das intensive Licht die Oxydation in der Zelle befördert. An und für sich sollte man entscheiden können, ob die Zoosporenbildung in irgend welcher Weise mit der Assimilation zusammenhängt, dadurch dass man dieselbe ausschliesst. In der That gelingt es nicht unter diesen Umständen, die Zoosporenbildung zu beobachten, was aber nichts beweist, da gerade die Versuchsbedingungen die Verhinderung bewirken können. Bei der von mir²⁾ für *Zygnema* angewandten Methode, die Algen in concentrirter Magnesiumoxyd-Lösung zu cultiviren — wobei in den ersten Tagen keine Assimilation nachweisbar ist — blieben die Zellen mit lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung unverändert, während sie in etwas verdünnten Lösungen Zoosporen erzeugten. Es liess sich nicht entscheiden, ob die Zoosporenbildung durch den Mangel der Assimilation oder durch Nebenwirkung des Magnesiumoxyds verhindert wurde.

Nimmt man den Zusammenhang mit der Assimilation an, so könnte derselbe nach verschiedenen Richtungen sich geltend machen. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften des Zellsaftes könnten in Folge der Assimilation eine günstige Beschaffenheit annehmen, oder es könnte

1) Pringsheim, Ueber Lichtwirkung und Chlorophyllfunction. Jahrb. für wiss. Bot. XII. 1879—81. S. 341; ferner ebenda Bd. XIII. 1882. S. 395.

2) Klebs l. c. S. 543.

der entstehende Sauerstoff die Hauptrolle spielen. Der Sauerstoff ist unzweifelhaft eine nothwendige Bedingung für die Zoosporenbildung, welche letztere in einem ausgekochten Wasser, in einem luftdicht verschlossenen Gefäss unterbleibt. Andererseits aber lässt sich nicht nachweisen, dass der Mangel an Sauerstoff im Dunkeln in Betracht kommt, und es zeigte sich sogar, dass eine lebhafte Zufuhr von frischer Luft mit Hülfe eines Aspirators das Licht nicht ersetzen kann. Aber vielleicht entsteht im Licht durch den Assimilationsprocess activirter Sauerstoff, welcher die Zoosporenbildung begünstigt, eine Annahme, welche Walz¹⁾ gemacht hat. Wir wissen aber durch die Untersuchungen Pfeffers²⁾, dass die Entstehung von activirtem Sauerstoff in der Pflanze nicht nachweisbar ist, dass der erzeugte Sauerstoff beim Übergang in den Zellsaft und nach aussen nicht activirt ist. Allerdings lässt Pfeffer die Möglichkeit offen, dass der Sauerstoff bei seiner Entstehung im Chlorophyllkorn activirt werden könnte. Ebensowenig nachweisbar erscheint es, dass das intensive Licht, nach der Ansicht von Pringsheim³⁾, besondere Oxydationsvorgänge hervorruft, welche bei der Zoosporenbildung betheiligt sind.

So lässt sich nach keiner Seite hin entscheiden, warum das Licht die Zoosporenbildung befördert, und man wird sich mit dem allgemeinen Ausspruch begnügen müssen, dass dasselbe besondere chemische Processe, seien es Reductions- oder Oxydationsprocesse anregt, welche für die Zoosporenbildung wichtig sind.

3. Ueber den Einfluss des Wassers auf die Zoosporenbildung und über den Zellsaftdruck.

Die in der 0,5—1% Nährlösung cultivirten Zellen des Wassernetzes bilden in der Lösung trotz ihrer lebhaften Neigung keine Zoosporen, sondern erst, nachdem sie in reines Wasser gebracht worden sind. Das ist indess nicht ausnahmslos, da man nicht selten, namentlich in der ersten Zeit, einzelne Zellen beobachten kann, welche in der Nährlösung selbst noch von 1% Zoosporen erzeugen. Im Sommer 1890 bemerkte ich sogar bei einer in vollster Vegetation begriffenen Cultur, dass dieselbe nach kurzem Aufenthalt (2—3 Tage) in 0,5 Nährlösung ungemein lebhaft Zoosporen bildete, obwohl unter diesen Umständen eine regelmässige Netzhildung nicht erfolgen kann. In diesem Falle verhinderte erst eine 1% Lösung die Bildung. Jedenfalls erfordert die Regel, dass die Nährlösung Zoosporen erregend, aber nicht erzeugend wirkt, eine Erklärung. Zunächst würde man wieder auf den Gedanken kommen, dass das Wasser durch

1) Walz, Bot. Ztg. 1868. No. 31.

2) Pfeffer, Beiträge zur Kenntniss der Oxydationsvorgänge in lebenden Zellen. 1889. S. 478—80.

3) Pringsheim l. c.

seinen Sauerstoffgehalt die Veranlassung zur eigentlichen Bildung spiele, wie es nach Walz bei andern Algen stattfindet. Frisches sauerstoffhaltiges Wasser wirkt auch bei Hydrodictyon anregend auf die Zoosporenbildung ein; es kann sehr wohl den Reiz abgeben für Auslösung dieses Processes, wenn derselbe vorbereitet ist, und ist in dieser Beziehung für die Zoosporenbildung wichtiger als für die Gametenbildung. Indessen kommt dieses Moment nicht allein, wahrscheinlich auch nicht in erster Linie in Betracht, da in der Nährlösung namentlich in der ersten Zeit lebhaft Assimilation herrscht, überhaupt Sauerstoff in genügendem Masse vorhanden ist.

Das Wasser wird vielmehr dadurch vor allem als auslösender Reiz wirken, dass es aus der Umgebung der Zellen die Salze fortschafft, welche neben ihrer Zoosporen erregenden Wirkung durch andere Eigenschaften hemmend wirken. Es folgt das ohne Weiteres aus der Thatsache, dass in verdünnteren Nährlösungen z. B. von 0,08—0,1% sehr häufig die Zoosporenbildung bei zahlreichen Zellen direct eintritt, ohne Mitwirkung des frischen Wassers. Die Salzlösung könnte von einer gewissen Concentration ab hinderlich sein, indem ihre wasserentziehende Eigenschaft die in ihr lebenden Zellen beeinflusst. Indessen kann dieser Einfluss nur ein geringer sein; und dass er nicht in erster Linie in Betracht kommt, beweist die Thatsache, dass Hydrodictyon aus 0,5% Nährlösung in eine 10% Rohrzuckerlösung übergeführt, sehr lebhaft Zoosporen bildet, obwohl die letztere Lösung sehr viel stärker Wasser entziehend wirkt, als die erstere. Dagegen wird bei höherer Concentration von 1% ab die Wasser anziehende Kraft der Nährlösung bei der Hemmung wesentlich mitwirken.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass schon aus einer 0,5—1% Lösung die Salze in zu grosser Menge in den Zellsaft treten und dann neben ihren fördernden Einflüssen zugleich eine Hemmung bewirken. Bringt man die Algen aus der Nährlösung in frisches Wasser, so geht der hemmende Ueberschuss der Salze wieder heraus, und die Zoosporenbildung kann erfolgen. Für die Entziehung des Ueberschusses ist nicht reines Wasser nothwendig, sondern andere selbst stärker concentrirte Lösungen wie die des Rohrzuckers von 10% wirken in derselben Richtung, indem sie die Exosmose der Salze veranlassen.

Bei dieser Ansicht wird vorausgesetzt, dass Eintritt und Austritt der Nährsalze bei den Zellen stattfindet. Nicht zweifelhaft ist es, dass die Nährsalze in die Zelle eintreten, was aus ihrer raschen Wirkung auf schlecht cultivirte Zellen in deutlichster Weise hervorgeht. Bei warmem sonnigem Wetter wird die aufgehäuften Reserve-Stärke in solchen Zellen schon nach 24 Stunden verarbeitet, und dieser Process ist durchaus an das Vorhandensein der Nährsalze gebunden. Die Wirkung der Nährsalze für die Zoosporenbildung beweist nicht minder ihr Eintreten in die Zelle. Ueberhaupt steht jetzt von vornherein dieser Ansicht nichts mehr im

Wege, nachdem von Pfeffer¹⁾, Wieler²⁾, mir selbst³⁾, Janse⁴⁾ und De Vries⁵⁾ nachgewiesen worden ist, dass die verschiedenartigsten anorganischen wie organischen Substanzen in die Zelle eintreten können. Bezüglich des Austrittes von Stoffen aus der Zelle sind noch wenige Beobachtungen bisher gemacht worden. Es handelt sich hier nicht um die bekannte Erscheinung, dass lebende Zellen im Allgemeinen die in ihnen enthaltenen Stoffe nur in geringem Masse exosmiren lassen. Die Frage ist vielmehr, ob die Zellen, welche in Folge der Cultur Salze aufgenommen haben, einen Theil derselben wieder abgeben, wenn sie aus der Lösung in Wasser kommen. Versuche darüber rühren von Janse⁶⁾ her, welcher zu dem Schlusse kommt, dass die Extrameabilität des Protoplasten nicht existirt und dass es sich wahrscheinlich um eine fundamentale Eigenschaft derselben handle. Das wäre nun sehr merkwürdig und eines sehr entscheidenden Beweises bedürftig, den Janse mit seinen wenigen und mehrdeutigen Versuchen nicht geliefert hat, worauf neuerdings Pfeffer⁷⁾ mit Nachdruck hingewiesen hat. Pfeffer⁸⁾ hat auch schon früher beobachtet, dass das in die lebenden Zellen eintretende Methylenblau nach einiger Zeit wieder herausgeht, und dass diese Exosmose mit Hülfe verdünnter Säuren sehr rasch vor sich gehen kann. Ueberhaupt muss bei dem Stoffwechsel der Zellen, Ein- und Austritt von Substanzen nothwendiger Weise erfolgen. Für jenen Fall, wo ein Uebertritt von Stoffen aus dem umgebenden Medium in die Zellen bemerkbar ist, gilt mindestens die grosse Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Austritt stattfindet, wenn die osmotischen Verhältnisse des Mediums plötzlich verändert werden. Es ist nicht nothwendig, ja unwahrscheinlich, dass die austretenden Stoffe den eintretenden quantitativ gleich bleiben, da ein Theil der letzteren in den Stoffwechsel hineingezogen werden kann.

Meiner eigentlichen Aufgabe liegt eine eingehendere Behandlung der hier in Frage kommenden Probleme zu fern, und die hier zu berücksichtigenden Momente sind in dem neuesten Werk von Pfeffer in so allseitiger und kritischer Weise dargestellt worden, dass ich darauf verweise. Anfangs hoffte ich, dass vielleicht eine Erkenntniss der diosmotischen Ver-

1) Pfeffer, Ueber Aufnahme von Anilinfarben in lebende Zellen. Untersuchungen aus dem Tübinger Institut Bd. II.

2) Wieler, Bericht der bot. Gesellsch. 1887. Bd. V. S. 375.

3) Klebs, Untersuchungen aus dem Tübinger Institut. Bd. II. S. 540.

4) Janse, Die Permeabilität des Protoplasmas. 1888.

5) de Vries, Ueber den isotonischen Coefficient des Glycerins. Bot. Ztg. 1888. No. 15; id. ebenda 1889. No. 19—20.

6) Janse l. c. S. 60—70.

7) Pfeffer, Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Vacuolen nebst Bemerkungen über den Aggregatzustand des Protoplasmas und über osmotische Vorgänge. Leipzig 1890. S. 142—143.

8) Pfeffer, Untersuchungen aus dem Tübinger Institut. Bd. II. S. 286 u. w.

hältnisse in den Zellen engere Beziehungen zur Fortpflanzung entdecken liessen. Ich habe in Folge dessen eine ganze Reihe Versuche über den osmotischen Druck des Zellsaftes bei Hydrodictyon angestellt, was hier an dieser Stelle nur eine kurze Erwähnung finden möge. Die Versuche sind negativ ausgefallen, insofern die gewünschten Beziehungen bisher nicht erkannt wurden; nach anderer Seite haben sie doch vielleicht ein gewisses Interesse, weil sie einen Punkt in der Lehre des Zellsaftdruckes berühren, welcher noch wenig behandelt ist, nämlich die Abhängigkeit desselben von äussern Verhältnissen.

Der Zellsaftdruck oder die Turgorkraft der Zelle beruht bekanntlich auf der Wasser anziehenden Eigenschaft der gelösten Salze. Mit dem Wachsthum der Zelle ändert sich die Turgorkraft, indem sie von der Entstehung an allmählich zunimmt bis zu einer gewissen Stärke, welche bis zum Ende des Lebens nach den bisherigen Beobachtungen beibehalten wird ¹⁾. Diese Veränderung des Zellsaftdruckes, welche man in eine causale Beziehung zu den in der Zelle sich abspielenden Wachsthumsvorgängen setzt, wird auf in der Zelle selbst liegende Gründe zurückgeführt. Andererseits ist durch die Untersuchungen Pfeffers ²⁾ bekannt, dass in Folge eines äusseren Anlasses plötzliche Aenderungen der Turgorkraft bei jenen Pflanzen eintreten, welche für Druck, Stoss u. s. w. empfindlich sind, wie Mimosa, Cynareen. Hierbei handelt es sich augenscheinlich um eigenartig ausgebildete Erscheinungen; es drängt sich aber die allgemeine Frage auf, ob nicht auf alle lebende Pflanzenzellen die äusseren Verhältnisse auch in Beziehung auf den Zellsaftdruck von massgebendem Einflusse sind. Die neueren Beobachtungen zeigen, wie durch Einwirkung des Salzgehaltes des Mediums der Zellsaftdruck erhöht werden kann ³⁾. Meine Erfahrungen an den Zellen des Wassernetzes weisen aber noch weiter darauf hin, dass alle möglichen äussern Einflüsse bedeutungsvoll werden können, weil der Zellsaftdruck in engstem Zusammenhange mit der Ernährung der Zellen steht.

Eine Vorstellung von der Grösse des Zellsaftdruckes gewinnt man, wie Nägeli ⁴⁾ und besonders De Vries ⁵⁾ erwiesen haben, mit Hülfe der

1) de Vries, Untersuchungen über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung. Halle 1877; vgl. ferner die neue Arbeit Wortmanns, Beiträge zur Physiologie des Wachstums. Bot. Ztg. 1889.

2) Pfeffer, Physiologische Untersuchungen 1873. S. 96. id. Zur Kenntniss der Plasmahaut etc. 1890. S. 187 (des Sep.).

3) Vergl. auch die Arbeit von Fr. Eschenhagen, Ueber den Einfluss von Lösungen verschiedener Concentration auf das Wachsthum von Schimmelpilzen. Stolp 1889.

4) Nägeli, Pflanzenphysiologische Untersuchungen I. 1885. Primordialschlauch.

5) Vergl. besonders unter dessen Arbeiten: de Vries, Untersuchungen über die mechanischen Ursachen der Zellstreckung. Halle 1877. S. 33; id. Eine Methode zur Analyse der Turgorkraft. Pringsheim's Jahrb. für wiss. Botanik. 1884. XIV.

plasmolytischen Methode, indem die Concentration einer Salzlösung, z. B. von Salpeter, bestimmt wird, welche eben merkliche Plasmolyse hervorruft. Diese Lösung besitzt ungefähr die gleiche osmotische Kraft wie der Zellsaft. Anfangs wurde auch versucht, den Salpeter zu benutzen; es wurde indessen aufgegeben, weil die Resultate zu unsicher waren. Salpeter dringt in relativ kurzer Zeit in die Zellen ein, und bewirkt vor allem eine Schädigung der Zellen, sodass dieselben, obwohl noch lebendig, sehr unregelmässig plasmolysiren. Besser gelangen die Versuche bei Anwendung der Knop'schen Nährlösung, welche auch um so lieber benutzt wurde, als die Algen längere Zeit bei relativ hohen Concentrationen lebend blieben. Die interessante Frage nach der Wirkung der einzelnen Bestandtheile blieb vorläufig unberücksichtigt.

Die Versuche, den Zellsaftdruck mit Hülfe der Nährlösung zu bestimmen, zeigten bald in welchem hohem Grade derselbe variirt und wie die Art und Weise der Cultur dabei eine bestimmende Rolle ausübt. Die Grenzen, innerhalb welcher die Turgorkraft schwankt, bewegen sich in Gewichtsprozenten der isotonischen Nährsalzlösung ausgedrückt, zwischen 1,8 und 4%, sind also weit auseinander liegend. Die Minimalwerthe gelten für Zellen, welche lange Zeit im Dunkeln gelebt haben; die Maximalwerthe für Zellen, welche in kleinen Gefässen sehr sonnig cultivirt worden waren. Versucht man nun zu entscheiden, in welchem Grade durch die plasmolytische Methode ein Eintritt der Nährsalze sich nachweisen lässt, so ist der Erfolg durchaus verschieden, je nach dem Ernährungszustand der für den Versuch benutzten Netze. In Netzen, welche durch Zimmercultur mit Nahrungsstoffen überladen sind, steigt die Turgorkraft der Zelle, da auch im Zellsaft eine Ansammlung von Stoffen erfolgt. Wenn man solche Netze, deren plasmolytischer Grenzwert durch 3% Nährlösung bestimmt ist, in eine 0,5—1% Nährlösung cultivirt, bemerkt man die auf den ersten Blick höchst überraschende Erscheinung, dass der Zellsaftdruck beträchtlich sinkt, trotzdem es zweifellos ist, dass Salze in den Zellsaft eintreten; der Grenzwert beträgt dann 2,6% Nährsalzlösung. Die eindringenden Nährsalze bewirken, wie schon das ganze Aussehen der Zellen beweist, wesentliche chemische Veränderungen im Protoplasma und höchst wahrscheinlich auch im Zellsaft, in Folge dessen Verbindungen von geringerer osmotischer Kraft entstehen. Anders verhalten sich die Zellen, welche in lebhaftem Wachsthum begriffen sind, und an und für sich einen geringeren Zellsaftdruck besitzen. Bei ihnen zeigt sich durch Cultur in 0,5 bis 1% Nährlösung in der ersten Zeit anscheinend keine Veränderung, oder eine geringe Erhöhung des Zellsaftdruckes, welche allmählig sich steigert, je länger der Versuch dauert. Doch habe ich in langer Cultur, selbst in 2—3% Nährlösung, nur selten Werthe erhalten, welche das Maximum des Druckes überschritten, das bei Netzen aus lange stehenden Wasserculturen beobachtet wurde. Wie leicht ersichtlich, lässt sich wegen der

entgegengesetzten Wirkungen der Nährlösung, ihren Turgor herabsetzenden und ihren Turgor erhöhenden Eigenschaften kein sicherer Schluss über die Menge der eintretenden Nährsalze ziehen. Bei der Entscheidung der anderen Frage, ob die Nährsalze aus den Zellen heraustreten, bieten sich ähnliche Schwierigkeiten dar. Allerdings lässt sich feststellen, dass bei Netzen, welche in der Nährlösung ihren Zellsaftdruck herabgesetzt haben, derselbe noch etwas sinkt, wenn man sie in Wasser überführt, dass ebenso bei Netzen, welche in 2—3% Nährlösung cultivirt wurden, nach dem Uebergang in Wasser geringere Turgorkraft zeigten, doch sind die Unterschiede nicht immer sehr prägnant, so dass kein zu grosses Gewicht darauf gelegt werden kann. Man könnte selbst die Ansicht aufstellen, dass trotz einer deutlichen Herabsetzung des Turgors im Wasser kein Heraustreten der Salze stattgefunden hat, sondern dass durch die Veränderung des Mediums innere Veränderungen des Stoffwechsels der Zelle veranlasst sind, welche dazu geführt haben. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass bei jenen Zellen mit hohem Zellsaftdruck derselbe durch einfache Cultur in frischem Wasser bei sonst günstigen äusseren Bedingungen verringert wird.

Neben dem Einfluss des Mediums spielt jedenfalls auch das Licht eine gewisse Rolle bei den Veränderungen des Zellsaftdruckes, vor allem weil die Ernährungsprocesse von ihm abhängen. Jene chemischen Umsetzungen, welche durch die Nährsalze eingeleitet werden, geschehen wesentlich nur im Licht, so dass z. B. die Auflösung der Reservestoffe durch das Licht sehr befördert wird. Dabei muss natürlich auch eine gewisse Höhe der Temperatur mitwirken. Ausserdem scheint nun aber noch die Temperatur eine ganz besondere Wirkung auszuüben. Denn in Nährsalzlösung von 2%, welche 24 Stunden hindurch bei 28° gehalten wurde, sank der Zellsaftdruck z. B. von 4 auf 3,6 Nährlösung, was nicht durch erhöhte Athmung zu erklären ist, weil durch dieselbe nur sehr langsam die Zellsaftbestandtheile vermindert werden. Stellte man die Nährlösung wieder ans Licht bei gewöhnlicher Temperatur, so stieg der Zellsaftdruck wieder.

Wenn auf der einen Seite die wichtige Thatsache sich aus der Beobachtung ergibt, dass der Zellsaftdruck in hohem Grade von der Aussenwelt abhängig erscheint, so folgt andererseits nichts sicheres daraus, was die Frage über den Ein- und Austritt von Salzen erhellen würde. Die von mir ausgesprochene Ansicht von der Wirkung des Wassers bei der Zoosporenbildung kann zwar als berechtigt, aber nicht als bewiesen gelten. Als andere Möglichkeit wäre die oben berührte Annahme zu erwägen, dass ohne Austritt von Salzen nach Ersetzung der Nährlösung durch Wasser, chemische Veränderungen der Zellsaftsubstanzen veranlasst würden, welche die Zoosporenbildung möglich machen.

Wie es sich auch damit verhalte, so ist hervorzuheben, dass die hemmende Wirkung der Nährsalze nur in den allerersten Vorbereitungsstadien der Zoosporenbildung von Bedeutung ist. Sind diese Stadien durchlaufen, so hält die Nährsalzlösung die weitere Bildung nicht mehr auf. Wenn *Hydrodictyon* aus 0,5 Nährlösung ein bis zwei Tage im Wasser und bei Licht cultivirt und dann wieder in 0,5 Nährlösung gebracht wird, so geht die Zoosporenbildung mehrere Tage in derselben ruhig weiter; selbst in 1%, bisweilen in 2% gelingt es noch, diese Bildung zu beobachten, während bei höherer Concentration die hemmenden Wirkungen, die Wasser entziehenden Eigenschaften des Mediums, zu stark werden.

4. Der Einfluss organischer Substanzen auf die Zoosporenbildung.

Die Thatsache wurde schon hervorgehoben, dass die Zoosporenbildung in einer 10% Rohrzuckerlösung sich ereignen kann. Da indessen bei dieser Concentration stets eine Anzahl Zellen zu Grunde gehen, so ist es besser, nur eine Lösung von 5% zu benutzen. Die Versuche, die Zellen des Wassernetzes nach der Cultur in 0,5 Nährlösung durch 5% Zucker zur Zoosporenbildung zu nöthigen, gelingen mit derselben Sicherheit wie im Wasser. Ob die Zuckerlösung einen specifisch fördernden Einfluss auf die Zoosporenbildung ausübt, lässt sich schwer entscheiden. Man kann nur sagen, dass bei Netzen mit lebhafter Neigung in Zuckerlösung die Zoosporenbildung auch dann noch sehr allgemein vor sich geht, wenn die Lichtverhältnisse nicht mehr so günstig sind, wie sie die Wasserculturen verlangen.

Dagegen gibt es gewisse organische Substanzen, welche in auffälligerer Weise die Zoosporenbildung begünstigen. Hierzu gehört vor allem die Maltose, von der ein krystallinisches Präparat von Grübler zu Versuchen benutzt wurde. Bringt man frische oder gut cultivirte Netze in 1—2% Maltose, so tritt schon nach 2 Tagen Zoosporenbildung ein und zwar in einem Grade, wie es selbst bei den früheren Versuchen mit Nährlösung und Wasser nicht zu beobachten ist. Man kann mit Hülfe der Maltose in kürzester Zeit eine enorme Menge junger Netze bilden lassen, und zur Weitercultur benutzen. Wenn aus irgend welchen Gründen die Zoosporenbildung nicht in den ersten Tagen vor sich gehen kann, so erfolgt sie später unregelmässig oder gar nicht, weil die Maltoselösungen rasch sich verändern, Bakterien, Pilze, Flagellaten sich lebhaft in ihr entwickeln. Dasselbe findet statt bei höheren Concentrationen; die schädigenden Einflüsse werden zu stark, so dass z. B. bei einer 4—5% Lösung keine jungen Netze mehr entstehen, während in einer 3% Lösung solche sich noch bilden können. Aehnlich wie Maltose verhält sich eine Lösung von 1 bis 2% Dulcit, wenn auch das Resultat nicht immer so sicher ist.

Die Wirkung der Maltoselösung unterscheidet sich von derjenigen der Nährlösung dadurch, dass erstere nicht bloss die Zoosporenbildung anregt, sondern dieselbe direct veranlasst. Auf der andern Seite aber kann die Maltose die Nährlösung nicht ersetzen, weil sie nicht in so allgemeiner und sicherer Weise wirksam ist. Eine gewisse Neigung zur Zoosporenbildung muss schon in den Zellen vorhanden sein, damit die Maltose ihre Wirkung ausüben kann. Sie ist nicht im Stande, indifferente Netze zur Zoosporenbildung zu bringen, und unter Umständen kann auch Gametenbildung in ihr eintreten. Für die Reaction in Maltose spielen die äussern Bedingungen, Licht und Wärme, dieselbe Rolle, wie bei der Nährlösung. Im Dunkeln bilden sich in der Maltoselösung gewöhnlich keine Zoosporen, doch ist bemerkenswerth, dass es geschehen kann, wenn Netze mit lebhafter Neigung zum Versuch benutzt werden, besonders wenn die Zellen, aus der Nährlösung in Wasser gebracht, einige Zeit beleuchtet worden waren.

Es ist jedenfalls interessant, dass eine organische Substanz so fördernd auf die Zoosporenbildung wirkt, wenn auch vielleicht geringe Mengen Aschenbestandtheile des Maltosepräparates dabei mitspielen. Mir erscheint es nicht zweifelhaft, dass die Maltose in die Zellen eindringt, in welchen sie eine deutliche Wirkung ausübt. Dieselbe macht sich besonders bemerkbar, wenn man die Zellen in der Maltoselösung ins Dunkle stellt. Nach 1—2 Tagen ist fast alle Stärke verschwunden, die Reserve- wie die Pyrenoid-Stärke, während sonst dieselbe erst nach 3—4 Wochen aufgebraucht ist. Im Zusammenhange damit steht die Beobachtung, dass im Protoplasma zahllose kleine ölartige Tröpfchen auftreten, was sonst bei *Hydrodictyon* nicht bemerkt wurde. Ein näheres Verständniss dieser Thatsachen ist bisher nicht erzielt worden, aber sie weisen unstreitig auf den Eintritt der Maltose in die Zellen hin, abgesehen von der Wirkung auf die Zoosporenbildung.

5. Die allgemeinen Bedingungen der Zoosporenbildung.

Die Kenntniss von den Bedingungen der Zoosporenbildung beschränkte sich bisher, wie früher (S. 356) angedeutet wurde, auf einige gelegentliche Beobachtungen und die nicht für alle Fälle gültige Ansicht von Walz, nach welcher der Sauerstoffgehalt des Wassers die Algen zur Zoosporenbildung veranlasst. Hier bei *Hydrodictyon* gelingt es, wie die vorhergehenden Abschnitte darlegen, ein wenig tiefer einzudringen und wenigstens aufzudecken, dass eine ganze Reihe der verschiedenen äusseren Bedingungen zusammenwirken müssen, damit die ungeschlechtliche Fortpflanzung stattfinden kann. Die Kenntniss dieser Bedingungen gestattet, die Alge zu jeder Zeit zu dieser Fortpflanzung zu zwingen, und dies Experiment gelingt bei Berücksichtigung aller Bedingungen mit der Sicherheit einer chemischen Reaction oder eines physikalischen Versuches.

Bei jedem noch so einfachen Versuch mit Körpern der anorganischen Welt ist die nothwendige Voraussetzung für das Gelingen, dass der betreffende Körper die Eigenschaft besitzen muss, welche durch den Versuch zur äussern Erscheinung gebracht werden soll. Die Fähigkeit z. B. in einer bestimmten Form zu crystallisiren, ist eine unveränderliche Eigenschaft eines Salzes, sie beruht auf der unerklärlichen molecularen Structur desselben; die äusseren Bedingungen dienen nur dazu, diese Fähigkeit zur Thatsache zu machen. Ebenso ist die Fähigkeit in der charakteristischen Weise Zoosporen zu bilden, eine unveränderliche unerklärliche Eigenschaft der Hydrodictyon-Zelle. Die äusseren Bedingungen sind es, die sie zur Entfaltung bringen. Die Hypothese des Transformismus erfüllt ein philosophisches Postulat, hat aber, soweit allen bisherigen Beobachtungen ein Gewicht beigelegt werden darf, keine Bedeutung für das physiologische Experiment, ebenso wenig wie das periodische System der Elemente, welches zu der Annahme eines genetischen Zusammenhanges derselben führt, die Thatsache umstösst, dass die Elemente Eigenschaften besitzen, welche für unsere heutigen Methoden unveränderlich sind.

Die unveränderlichen Eigenschaften der Hydrodictyon-Zelle werden als die vererblichen bezeichnet, da sie jedem aus der Zelle stammenden Keim mitgegeben werden. Die vielfältigen Erörterungen in der neueren Zeit, welche durch zahlreiche Gelehrte, wie Darwin, Spencer, Sachs, Naegeli, Weismann, de Vries u. a. über das Problem der Vererbung angestellt worden sind, haben zu der Annahme geführt, die eigentlich jetzt als selbstverständlich erscheint, dass die vererblichen Eigenschaften der Zelle auf materieller Grundlage ruhen, dass sie bedingt sind durch bestimmten chemisch physikalischen Bau der Materie, welcher gegenüber der molecularen Organisation eines Elementes oder seiner Verbindungen ausserordentlich viel complicirter vorgestellt werden muss. Da bei der heutigen Sachlage es nicht möglich erscheint, die vererblichen Eigenschaften auf bestimmte chemische Verbindungen zurückzuführen, wird man zu der Annahme von höheren morphologischen Einheiten gedrängt, welche selbst wieder einen complicirten molecularen Bau besitzen müssen. Darwin ¹⁾ hat diese Einheiten als Keimchen, Spencer ²⁾ als physiologische Einheiten, Naegeli ³⁾ als Stücke seines zusammenhängenden Idioplasma aufgefasst. Die Schwierigkeiten, welche darin liegen, dass eine Menge verschiedenartiger erblicher Eigenschaften in einer Zelle vorhanden sind, werden nach meiner Ansicht am glücklichsten von De Vries ⁴⁾ vermieden, welcher die alte Darwin'sche Idee der Pangenesis aufgegriffen und umgestaltet hat.

1) Darwin, Das Variiren der Thiere und Pflanzen im Zustande der Domestication Bd. II. 1873. Cap. 27.

2) Herbert Spencer, Principien der Biologie. Bd. I. S. 198.

3) Naegeli, Theorie der Abstammungslehre. 1884.

4) de Vries. Intracellulare Pangenesis. 1889.

Jede einzelne erbliche Eigenschaft denkt man sich durch einen besonderen stofflichen Träger vertreten; und wenn auch Schwierigkeiten genug sich aufthürmen bei dem Versuch, aus dem Zusammenwirken dieser einzelnen Einheiten, den Pangen, den Gesamtorganismus der Zelle zu erklären; so gibt doch diese Annahme ein klares anschauliches Bild, mit welchem man weiter rechnen kann. Die materiellen Träger für die Processe der Ernährung, Theilung, des Wachstums, der Fortpflanzung müssen für jeden derselben verschieden sein; sonst könnten dieselben äusseren Bedingungen nicht jeden in besonderer Weise beeinflussen.

Für die weitere Betrachtung genügt die Annahme, dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung, wie sie in latentem Zustande in jeder Zoospore des Wassernetzes enthalten sein muss, bedingt ist durch einen bestimmten materiellen Träger, welcher hier mit dem einfachen Ausdruck Anlage bezeichnet werden soll, um möglichst wenig damit präjudiciren zu wollen. Erst in einem späteren Kapitel will ich auf die Frage eingehen, ob die Anlage eine eigene innere Entwicklung hat, welche gleichen Schritt hält mit dem Wachsthum der Zelle, oder ob sie von vornherein entfaltungs-fähig, nur mittelbar an die Ausbildung der ganzen Zelle gebunden ist. Vorausnehmen will ich die Thatsache, dass bei relativ noch jungen und unausgewachsenen Zellen die Zoosporenbildung sich zur Entfaltung bringen lässt. Hier beschränken wir uns auf die Annahme, dass in ungefähr ausgewachsenen Zellen die Anlage in irgend welcher Form vorhanden ist. Die äusseren Bedingungen sind es dann, welche diese Anlage aus ihrem latenten Zustande erwecken, sie zur Entwicklung anregen, wobei die sich entfaltende Anlage die ganze übrige Zelle in Mitleidenschaft zieht und alle weiteren physiologischen Prozesse der Ernährung, des Wachstums zurückdrängt.

Die Beobachtungen zeigen, dass für die vollständige Entfaltung der Anlage der Zoosporenbildung folgende äussere Bedingungen mitwirken müssen: Wärme, Sauerstoff, organische Nahrung, Nährsalze, Licht, Wasser. Nur wenn alle diese Momente zusammenwirken, geht der Prozess ungestört vor sich. Indessen sind diese Momente überhaupt allgemeine Lebensbedingungen, und es fragt sich, welche von ihnen als die specielleren Ursachen für die Zoosporenbildung hervortreten. Die Versuche beweisen, dass vor allem ein gewisser Gehalt an Nährsalzen den Zellen eine äusserst lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung verleiht, d. h. dass durch dieselben eine Reihe Processe ausgelöst werden, welche nothwendig zur Zoosporenbildung führen, wenn sonst alle Bedingungen vorhanden sind. Warum die Nährsalze so wirken, welche ersten chemischen Processe durch sie eingeleitet werden, darüber lässt sich nichts aussagen. Ihr Eintritt in die Zelle veranlasst mannichfache Umänderungen, die lebhafte Wirkung auf die Stärkeauflösung, ihr Einfluss auf die Zusammensetzung des Zellsaftes sind deutliche Zeichen ihrer Thätigkeit, welche höchst wahrscheinlich noch

nach andern Richtungen, nur für uns unsichtbar, eingreift. So werden die Salze mittelbar oder unmittelbar auf die Anlage der Zoosporenbildung einwirken. Von den andern Bedingungen ist zunächst das Licht als eine spezifische Ursache zu bezeichnen, da es für andere Algen bedeutungslos ist, ja selbst für die geschlechtlichen Schwärmer des Wassernetzes. Höchst wahrscheinlich tritt das Licht in engere Verbindung mit den Nährsalzen, es vermittelt zweifellos den eigenartigen Einfluss derselben auf die Stärkeauflösung, den Zellstoffdruck, und könnte auch bei den andern Einflüssen derselben mithelfen. Die andern Bedingungen werden wir wahrscheinlich nicht als solche nächste Ursachen der Zoosporenbildung ansehen dürfen, sondern mehr nur als allgemeine Bedingungen jedes Lebensprocesses überhaupt. Ausgeschlossen ist nicht, dass unter Umständen eine dieser Nebenursachen den ersten Anlass gibt, wie es der Fall zu sein scheint für bestimmte organische Nährstoffe, z. B. Maltose. Indessen wurde schon aufmerksam gemacht, dass diese Substanzen nur dann speciell den Process ins Werk setzen oder beschleunigen, wenn die ersten Schritte bereits gemacht sind, welche die Lebensbewegung der Zelle leise in die Richtung der Zoosporenbildung gelenkt haben.

Sind durch die Nährsalze und das Licht die vorbereitenden Prozesse eingeleitet, so läuft die Kette der sich daran anschliessenden Veränderungen bis zur Bildung der Zoosporen ab. Ob ein besonderer Anlass oder Reiz, welcher noch irgendwo an einer Stelle eingreifen müsste, nothwendig erscheint, lässt sich schwer verneinen oder bejahen. Meistens wird es der Fall sein, dass eine kleine äussere Veränderung den letzten Anstoss gibt schon deshalb, weil, wie wir später sehen werden, die Fortpflanzung in Beziehung zum Wachsthum steht, so dass eine Aenderung in den äusseren Bedingungen, welche das letztere behindert, zu der Veranlassung werden kann, erstere herbeizuführen. Die Zoosporenbildung kann selbst nur erfolgen, wenn ausser Nährsalzen und Licht die andern allgemeinen Lebensbedingungen mit thätig sind, und zwar mit einer gewissen Kraft und Stärke, welche nicht zu gering, bisweilen auch nicht zu beträchtlich sein darf. Denn erreicht nur eine von diesen Bedingungen, während alle andern in günstigem Grade entwickelt sind, nicht die gehörige Stärke, so bleibt der vorbereitete und angefangene Process stillstehen. Beliebig lange Zeit kann dieser Stillstand währen, bis zu dem Augenblick, wo durch Verstärkung der betreffenden Bedingung das hemmende Rad beseitigt ist, so dass der Process bis zu seinem Ende fortrollen kann. Die zugeführte Bedingung erscheint unter diesen Umständen als ein Reiz ¹⁾, welcher die Zoosporenbildung auslöst, wenn man darunter jeden Anlass bezeichnet, welcher einen vorbereiteten verwickelten Lebensprocess in Bewegung setzt, ganz wie der Anstoss des Pendels das Ablaufen der aufgezogenen Uhr

1) Vergl. Pfeffer, Pflanzen-Physiologie S. 3–4.

oder wie der Funke die Explosion der Pulvermasse bewirkt. So können niedrigere Temperatur, Mangel an Sauerstoff, Dunkelheit, Mangel an Nahrung als Hemmungen, höhere Temperatur, Sauerstoff-Zufuhr, Beleuchtung, Nahrungszufuhr als auslösende Reize wirken.

In allen diesen Fällen wird das Medium, in welchem die Alge lebt, nicht wesentlich verändert; neue Hemmungen, neue Reize können veranlasst werden, indem man die Verhältnisse des Mediums verändert. Die einfachste Form einer solchen Hemmung besteht darin, die Alge auf einer feuchten Fläche, sei es Torf, Lehm u. dgl. in einer feuchten Atmosphäre leben zu lassen. Unter diesen Bedingungen kann die Zoosporenbildung nicht erfolgen, was insofern bemerkenswerth ist, als diese Abhängigkeit des Processes vom flüssigen Medium bei der Gametenbildung nicht vorhanden ist. Monate lang kann die Alge, trotz lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung, in feuchter Luft vegetiren; sowie sie in Wasser gebracht wird, tritt der Process ein. Wir haben ferner kennen gelernt, dass die Nährsalze im Ueberschuss hemmend wirken, so dass die Entfernung derselben durch Wasser oder Zucker zum auslösenden Reize wird. Auch andere Substanzen können, dem Wasser beigefügt, die Zoosporenbildung aufhalten. So habe ich z. B. 5 Wochen lang *Hydrodictyon* aus 0,5% Nährlösung in einer anfänglich ganz concentrirten Magnesiumoxyd-Lösung cultivirt, in welcher keine Veränderung erfolgte. Als ein Stück des Netzes in Wasser übergeführt wurde, war sehr bald die Bildung junger Netze zu beobachten.

Als wichtigsten Punkt in der bisherigen Darlegung möchte ich hervorheben, dass von jenen äusseren Bedingungen, welche bei der Zoosporenbildung eingreifen, nicht alle dieselbe Bedeutung haben. Allerdings steht nichts im Wege, die Wirkung der Nährsalze und des Lichtes ebenfalls als eine Reizerscheinung aufzufassen, wie diejenige der andern Bedingungen, da die eigentliche Wirkung aller nicht näher erkannt ist. Man gewinnt aber durch diese Bezeichnung eigentlich keine besondere Aufklärung, ja es liegt die Gefahr nahe, den Begriff des Reizes zu verflüchtigen, und vor allem durch denselben Erscheinungen zu umfassen, deren Verschiedenartigkeit hervorzuheben gerade sehr wichtig ist. Denn die Nährsalze können als Reiz wirken, indem sie das Hemmniss beseitigen, welches durch die zu starke Ansammlung von Nahrungssubstanz in der Zelle entstanden ist. Sie können ferner als Reiz wirken, indem sie bei der Erzeugung der nothwendigen Nahrungsmittel eine Rolle spielen. Aber das erklärt noch nicht, wie sie den Zellen eine besonders lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung verleihen; es ist dies wieder eine ganz andere Reizwirkung als in den beiden ersten Fällen, wenn man bei dem Worte bleiben will. Wir müssen annehmen, dass die Nährsalze die vorausgesetzte Anlage wirklich bis zu einem gewissen Grade der Entwicklung bringen. Diese Wirkung ist doch wohl nicht direct gleichzusetzen der Rolle eines Fermentes oder jedes beliebigen

auslösenden Reizes, um so weniger als eine deutliche Quantität der Nährsalze in Betracht kommt. Denn bei dem kleinen Volumen der Hydrodictyon-Zelle ist die Menge der Salze in einer 0,2% Lösung, in welcher die Zoosporenbildung angeregt und vollzogen wird, relativ gross, und dabei genügt dieselbe noch nicht für alle Fälle. Wesentlich das Gleiche ist von dem Lichte zu sagen, wenn man auch nicht im Stande ist, in Maass und Zahl die nothwendige Lichtquantität anzugeben. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, dass ebenso wie bei dem Assimilationsprocess auch hier eine gewisse Lichtenergie verbraucht wird.

So können wir bei dem ganzen Process der Zoosporenbildung unterscheiden, die vererbte innere Anlage, welche im latenten Zustande vorhanden ist; die nächsten Ursachen, welche die erste Entfaltung derselben bedingen Nährsalze und Licht, die Nebenursachen oder allgemeinen Lebensbedingungen, wie Nahrung, Wärme, Sauerstoff, Wasser, welche, wenn sie nicht in richtiger Menge vorhanden sind, den Process zum Stillstand bringen und welche dann, neu zugeführt, als Reize wirken, die den vorbereiteten Process zu Ende führen.

Abschnitt III.

Die geschlechtliche Fortpflanzung.

1. Methode, die Gametenbildung hervorzurufen.

Die geschlechtliche Fortpflanzung erscheint als die eigenartigste und höchste Leistung des Organismus und bildet im Allgemeinen den Abschluss des Lebensganges des Individuums. Selbst wenn sie in so einfacher Form auftritt, wie bei Hydrodictyon, wird das Räthselhafte des ganzen Vorgangs nicht begreiflicher, sondern nur schärfer bestimmt. Zwei kleine Zellen, welche eben durch Theilung aus derselben Mutterzelle gebildet worden sind, verschmelzen gleich wieder, und das Product erlangt dadurch die Fähigkeit, einen neuen eigenthümlichen Entwicklungsgang einzuschlagen, während die Zellen, die nicht copuliren, zu Grunde gehen. Es war zu erwarten, dass dieser Vorgang der geschlechtlichen Fortpflanzung nicht in so relativ einfacher Abhängigkeit von der Aussenwelt stehe, wie derjenige der ungeschlechtlichen. In der That hat es lange gedauert, und zahllose oft vergebliche Versuche waren nothwendig, um die Bedingungen insoweit zu erkennen, dass mit Hülfe derselben zu jeder Zeit die Zellen zur geschlechtlichen Fortpflanzung gezwungen werden konnten; aber der hohe Grad der Sicherheit, wie bei der ungeschlechtlichen Fortpflanzung, liess sich bisher nicht erreichen, da es immer ab und zu vorkommt, dass einzelne Versuche versagen. Dessen ungeachtet ist das Beweismaterial vollständig genügend, um die Ansicht zu widerlegen, nach welcher das Wassernetz besondere sexuelle Generationen besitzt, welche den Abschluss des Lebenscyclus der Alge bilden, wie etwa die Blüthe resp. Frucht den

Abschluss einer einjährigen Pflanze. Zu allen Zeiten, an allen Netzen, welche ungefähr ausgewachsen sind, können die Gameten entstehen. Entscheidend sind nicht innere Gründe der Entwicklung, sondern äussere Einflüsse. So findet sich in dieser Beziehung die weitgehendste Aehnlichkeit zwischen Zoosporen- und Gametenbildung, welche sich andererseits dadurch unterscheiden, dass für jede Form der Fortpflanzung eine besondere Combination äusserer Einflüsse characteristisch ist.

Im Allgemeinen erhält man im Sommer leicht und sicher Gameten, wenn man die Zellen des Wassernetzes in einer Zuckerlösung am Fenster cultivirt. In der ersten Zeit benutzte ich eine Lösung von 10% Rohrzucker, später meistens eine solche von 5%, da die letztere dieselben Dienste thut und weniger schädigt als erstere. Die Wirkung der Zuckerlösung ist eine sehr überraschende, denn nach 6—8 Tagen, manchmal schon früher, manchmal auch später, tritt die Gametenbildung in einem Grade auf, wie man es in der freien Natur kaum je beobachten kann. Fast sämtliche Zellen eines Netzes, je nach der Grösse des benutzten Stückes zu Hunderten an der Zahl, bilden Gameten, wobei die einzelnen Zellen sich leicht von einander loslösen, sodass das Netz vollständig zerfällt. Es dauert oft mehrere Tage, bis schliesslich der grösste Theil der Zellen sich geschlechtlich fortgepflanzt hat; während dieser Zeit kann man beständig eben heraustretende, bewegliche und copulirende Gameten beobachten, sodass das Wassernetz ein ausgezeichnetes Demonstrationsobject darstellt. Die Concentration der Zuckerlösung hat innerhalb gewisser Grenzen keine sehr grosse Bedeutung für den Process, selbst eine Lösung von 1—2% kann noch in ähnlichem, wenn auch schwächerem Grade wirken, wie eine 12%, und sogar in 16% beobachtete ich Bildung von Gameten, welche aber dann nicht mehr die Fähigkeit hatten, herauszutreten und zu schwärmen. Die Wassernetze zeigen sich sehr verschieden gegenüber stärkerer Concentration der Zuckerlösung, was schon daraus hervorgeht, dass manche Netze in 16% Zucker ruhig leben, während andere schon von 8% stark geschädigt werden; es kommt dabei ganz auf die vorhergehende Culturweise der Netze an.

Zur Veranschaulichung will ich aus den zahlreichen Versuchen während 2 Jahren eine Reihe herausgreifen und in nebenstehender Tabelle anführen. Zu den Versuchen wurden Netze benutzt, die im Februar 1889 entstanden waren und Ende April im Garten in einem grossen Culturefasse herangewachsen waren.

Aus dieser Tabelle ersieht man, dass die Zuckerlösung, ebenso auch Glycerin die Gametenbildung in hohem Grade begünstigt, indem sie dieselbe bei Netzen hervorruft, welche an und für sich im Wasser (s. No. 11) Zoosporen bildeten, oder wie es bei vielen Zellen der Fall war, unverändert blieben. Diese Wirkung des Rohrzuckers bestätigte sich in Hunderten von Versuchen, welche im Laufe der Jahre 1888—89—90 angestellt wurden.

Tabelle I.

Nummer	Datum	Medium	%	Resultat nach 5—8 Tagen.
1	6. Mai	Rohrzucker	6	sehr viele Gameten.
2	—	—	7	sehr viele Gameten.
3	—	—	8	viele Gameten, eine Anzahl Zellen todt.
4	—	—	9	viele Gameten, eine Anzahl Zellen todt.
5	—	—	10	viele Gameten, viele Zellen todt.
6	—	Glycerin	1	viele Gameten.
7	—	—	2	viele Gameten.
8	—	—	3	viele Gameten, viele Zellen todt.
9	—	—	4	viele Gameten, viele Zellen todt.
10	—	—	5	alle Zellen todt.
11	8. Mai	Wasser		mässig viele Zoosporen.
12	9. Mai	Rohrzucker	2	sehr viele Gameten.
13	—	—	4	sehr viele Gameten.
14	12. Mai	—	5	sehr viele Gameten.
15	8. Mai	Nährlösung	0,5	nichts.
16	12. Mai	Nr. 15 Wasser		sehr viele Zoosporen.
17	—	Nr. 15 Rohrzucker	5	sehr viele Zoosporen.
18	14. Mai	Rohrzucker	1	sehr viele Gameten.
19	—	—	0,5	viele Gameten.
20	—	—	10	viele Gameten.

Indessen hatten nicht alle Versuche das gleiche Resultat, und ich erkannte bald, dass die Wirkung des Rohrzuckers für die Gametenbildung nicht einfach der Wirkung der Nährlösung für die Zoosporenbildung gleich zu setzen war. Das Wassernetz erwies sich hinsichtlich seiner geschlechtlichen Fortpflanzung oft so launenhaft, dass es kaum möglich schien, dieselbe auf eine gesetzmässige Wirkung der Aussenwelt zurückzuführen. Wenn in der Zuckerlösung die Netze nicht Gameten bildeten, so konnten sie entweder Zoosporen bilden oder unverändert bleiben. Letzteres ist bei ausgewachsenen Zellen gewöhnlich ein Zeichen eines krankhaften Zustandes, in welchen die Netze durch längere Zimmercultur stets hineingerathen. Selbst frische gesunde Netze können in der Zuckerlösung indifferent bleiben, wenn die sonstigen Bedingungen ungünstig sind;

bisweilen wurde auch beobachtet, dass durch chemische Veränderungen der Lösung, alkoholische oder saure Gährungen, die Netze geschädigt wurden. Aus dem indifferenten Zustande kann der Rohrzucker die Zellen nicht befreien, sondern ausschliesslich frische Nährsalze enthaltendes Wasser. Schon früher (S. 362) wurde hingewiesen, dass gerade Netze aus solchen Nährsalzculturen in der Zuckerlösung Zoosporen bilden. Die kleine Tabelle zeigt auch, dass aus derselben Cultur in Zucker Gameten bildende Netze durch einen 4tägigen Aufenthalt in 0,5 Nährlösung genöthigt wurden, in der gleich concentrirten Zuckerlösung Zoosporen zu erzeugen. (Vergl. Tabelle I, Versuch 12—14, 15 und 17).

Ohne Zweifel kann die Zuckerlösung nur dann die Gametenbildung in so hohem Masse begünstigen, wenn die Zellen der Netze schon vorher eine gewisse Neigung zur geschlechtlichen Fortpflanzung besitzen. Für das Gelingen der Versuche ist daher in erster Linie erforderlich, die Bedingungen zu erkennen, durch welche die Netze die geschlechtliche Neigung erwerben. Die Beobachtungen der Culturen im Zimmer und Garten im Laufe des Sommers machten es wahrscheinlich, dass gerade durch diese Culturweise die Neigung zur Gametenbildung gesteigert werde, weil Hydrodictyon gewöhnlich in der freien Natur mehr zur Zoosporenbildung hinneigt. Stets liessen sich auch frisch geholte Wassernetze durch die Zimmercultur zur Gametenbildung im Wasser führen. Am besten und sichersten gelingt es, wenn man die Veränderungen, welche in den äussern Lebensumständen der Alge durch die Zimmercultur hervorgerufen werden, gleich in starkem Grade eintreten lässt, indem man die Netze in flachen Glasschaalen mit relativ wenig Wasser an ein sonniges Fenster stellt. Der wesentliche Grund jener Veränderung liegt darin, dass die Alge in einer sehr geringen, nicht gewechselten Wassermenge lebt, während in freier Natur selbst in kleinen Tümpeln eine im Verhältniss zur Alge grosse Wassermenge ihr zur Verfügung steht, welches durch Ab- und Zufluss meist frisch gehalten wird. Vor allem bedingt das frische Wasser neue Zufuhr von Nährsalzen und Sauerstoff und es wäre auch denkbar, dass eine Ansammlung schädlicher Stoffwechselproducte verhindert würde, welche aus der Zelle in die nächste Umgebung herübertreten. Bei den Culturen mit wenig Wasser kommt dann noch hinzu, dass bei directer Bestrahlung durch die Sonne sehr leicht die Temperatur eine schädliche Höhe erreichen kann. Die Culturen im Garten liessen stets sehr deutlich erkennen, wie die jungen Netze um so lebhafter und längere Zeit wuchsen, je grösser die angewandten Gefässe waren. In den kleinen Schaalen machte sich stets ein Stillstand des Wachstums bemerklich, welches von allen Lebensäusserungen der Alge, am empfindlichsten gegenüber kleinen Aenderungen äusserer Bedingungen sich verhält. Mit dem Aufhören des Wachstums u. damit des wesentlichsten Momentes, welches Verbrauch von Nahrung erfordert, ist eine starke Ansammlung organischer Nahrung

verbunden, da die Assimilation ungestört weiter geht. Diese Aufspeicherung von Reservestoffen, hauptsächlich Stärke, führt allmählich zur Verkümmern der Alge, welche schliesslich am Uebermass erzeugter Nahrung und der dadurch herbeigeführten Lähmung aller Lebensprocesse zu Grunde geht. Wenn man mit Hülfe der Nährlösung die Anhäufung der Reservestoffe verhindert (S. 357), so können die Zellen Monate lang in frischem grünem Zustande in ganz kleinen Culturen gezogen werden. Selbst im Dunkeln halten sich die Netze frisch, sogar länger lebendig, da ebenfalls die Ansammlung nicht zu Stande kommt.

Sicher wird in der ersten Zeit solcher Zimmercultur in den Netzen die Neigung zur Gametenbildung vermehrt resp. gesteigert, sodass regelmässig die Netze Gameten bilden, nachdem sie Anfangs Zoosporen erzeugt haben. In den flachen Glasschaalen mit wenig Wasser genügen bei son-nigem Wetter oft wenige Tage, um die Neigung zur geschlechtlichen Fortpflanzung hervortreten zu lassen. Während in diesen Culturen immer nur eine beschränkte Anzahl Zellen Gameten bilden, entstehen in Netzen, welche in Zuckerlösung gebracht werden, in fast allen Zellen die Gameten. Die Zuckerlösung bewirkt aber auch dasselbe Resultat bei Netzen, an welchen Gametenbildung nicht bemerkt wurde, solange sie im Wasser waren. Lange noch, nachdem in den Culturen die etwa begonnene Gametenbildung aufgehört hat, kann dieselbe im Zucker noch hervorgerufen werden.

Es fragt sich jetzt, welcher von den oben bezeichneten Einflüssen der Zimmercultur auf das Verhalten des Wassernetzes hauptsächlich massgebend ist für die Erregung der geschlechtlichen Neigung. Der Stillstand des Wachstums kann es an und für sich nicht sein, da derselbe in gleicher Weise vor der Zoosporenbildung eintritt. Der Mangel an Nährsalzen, welcher aber nur bis zu einem gewissen Grade sich einstellen darf, ist jedenfalls insofern bedeutungsvoll, als er die Neigung zur Zoosporenbildung unterdrückt. Man wird zu der Vorstellung genöthigt, dass geradezu diese Unterdrückung nothwendig ist für das Zustandekommen der Gametenbildung. Ferner spielt aber eine sehr wichtige Rolle die Ansammlung der organischen Nahrungssubstanz; durch sie werden Zustände in den Zellen geschaffen, welche die Gametenbildung einleiten. Je nach den sonstigen äusseren Bedingungen, je nachdem die schädlichen Einflüsse der Zimmercultur sich schneller oder langsamer bemerklich machen, kann die Gametenbildung in schwächerem oder stärkerem Grade stattfinden.

Der Rohrzucker, von dem wir annehmen müssen, dass er in die Zellen eintritt, wirkt in derselben Richtung wie die Zimmercultur, ihren Einfluss erheblich verstärkend und gleichzeitig auf alle Zellen übertragend, sodass die von mir beobachtete allgemeine Gametenbildung zu Stande kommt. Durch die Cultur in Zuckerlösung werden zugleich die Netze ihrer alten Umgebung entrückt; sie erhalten frisches Wasser, Spuren

von Nährsalzen, sowohl aus dem Zucker als aus dem Wasser, sodass die allgemeinen Bedingungen günstiger liegen, als in der Wassercultur, wenn sie auch für die Zoosporenbildung nicht günstig genug sind. Wie wir gesehen haben bei dem Hydrodictyon der Tabelle ist der Rohrzucker allein im Stande, die Netze zur Gametenbildung zu bringen, selbst wenn dieselben eine geringe Neigung zur Zoosporenbildung besitzen. In diesem Falle tritt noch deutlicher hervor, wie die Ansammlung organischer Substanz eine sehr wichtige Ursache der Gametenbildung ist. Die wichtige Frage, wie dagegen Netze mit sehr lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung doch noch zur geschlechtlichen Fortpflanzung zu veranlassen sind, wird später eingehend behandelt.

Da Rohrzuckerlösung eine solche Gameten erregende Wirkung ausübt, lag es nahe, zu untersuchen, ob andere organische Substanzen in ähnlicher Weise wirken. Meine Versuche sind aber in dieser Beziehung zu wenig ausgedehnt, als dass ich ein endgültiges Urtheil abgeben könnte. Ich will daher nur kurz meine Erfahrungen angeben, aus welchen sich ergibt, dass nur solche Substanzen den Rohrzucker bis zu einem gewissen Grade vertreten können, von welchen eine ähnliche physiologische Rolle vermuthet werden kann. Organische Substanzen wie weinsaures Ammoniak, Harnstoff, Asparagin, Glycocoll, Amydalin zeigten sich indifferent oder schädlich. Am meisten wurde Asparagin geprüft, wegen seiner Bedeutung im Stoffwechsel. Indessen sah ich nur einmal eine Entwicklung von Zoosporen, während Gameten bisher nicht bemerkt wurden. Vorzugsweise wurden die Kohlehydrate berücksichtigt und daneben die mehratomigen Alcohole Mannit, Dulcit, Erythrit und Glycerin. Letzteres kann, wie die Tabelle gezeigt hat, die Gametenbildung befördern, ebenso wie Rohrzucker. Doch geschieht es sehr viel häufiger, dass die Netze in Glycerin sich indifferent verhalten aus nicht näher untersuchten Gründen. Von den Kohlehydraten würde am ehesten von der Glycose zu erwarten sein, dass sie Gametenbildung begünstige. Indessen entsprach der Erfolg nicht den Erwartungen, wohl hauptsächlich aus dem Grunde, weil die Netze in der rasch sich verändernden Traubenzuckerlösung zu leicht kränkeln, oder durch die in ihr sich entwickelnden Organismen gestört werden, so dass sie indifferent werden. In Milchzucker (2—5%), in Mannit, Erythrit wurde ab und zu lebhafte Gametenbildung beobachtet, in Dextrin, Lävulose, Galactose, Sorbin, Quercit dagegen nicht, doch fehlt die eingehende Untersuchung, in welchem Grade die anscheinend der Gametenbildung günstigen Stoffe wirklich dabei wirksam sind und ob bei den ungünstigen Stoffen die negativen Resultate sich immer zeigen. Jedenfalls gehen Netze mit lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung in Glycerin, Traubenzucker, Milchzucker, Mannit zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung über. Am genauesten wurde von den Kohlehydraten neben Rohrzucker nur noch Maltose untersucht, von welcher schon berichtet wurde, dass sie die Netze zur

lebhaftesten Zoosporenbildung anregt; andererseits kann in ihr auch Gametenbildung eintreten, worauf aber erst später einzugehen ist.

2. Der Einfluss von Wärme und Licht auf Gametenbildung.

Einige der wichtigeren Ursachen der Gametenbildung sind oben hervorgehoben worden (S. 377). Indessen spielen wie bei der Zoosporenbildung noch andere äussere Bedingungen dabei mit, vor allem ist es selbstverständlich, dass Wärme nothwendig ist, und zwar sehen wir, dass auch für die geschlechtliche Fortpflanzung die Temperatur über 10° betragen muss, dass bei $10\text{--}12^{\circ}$ die Gametenbildung äusserst langsam vor sich geht und schliesslich viele Zellen indifferent werden. Je höher die Temperatur steigt, um so lebhafter bilden die Zellen Gameten; ja höhere Temperatur erscheint viel bedeutungsvoller für diesen Process als für die Zoosporenbildung. Denn nicht allein bewirkt höhere gleichmässige Temperatur ($26\text{--}30^{\circ}$), wie sie in einem Thermostaten erhalten wurde, den schnelleren Verlauf des eigentlichen Processes, sondern sie vermittelt augenscheinlich auch eine schnellere Wirkung der Zuckerlösung. Leider liess sich bisher nicht nachweisen, dass eine grössere Menge Zucker bei höherer Temperatur in die Zellen eintritt als bei niederer, was wahrscheinlich die schnellere Bildung der Gameten veranlasst.

Als zweites höchst bedeutungsvolles Moment haben wir bei der Zoosporenbildung das Licht kennen gelernt; es ist von grossem Interesse, seine Wirkung auf die Gametenbildung zu verfolgen. In dieser Beziehung offenbart sich ein merkwürdiger Unterschied der beiden Fortpflanzungsformen, insofern die Gametenbildung in hohem Grade unabhängig vom Licht erscheint. Frische Netze in $5\text{--}10\%$ Rohrzucker, im Dunkeln cultivirt, liessen nach $8\text{--}10$ Tagen ungezählte Mengen von Gameten aus ihren Zellen heraustreten; ein Unterschied gegenüber den Lichtculturen konnte nicht bemerkt werden.

Einige Versuche will ich in Tabelle II (s. folgende Seite) anführen. Sie wurden im Sommer 1889 angestellt.

Aus dieser Tabelle geht hervor, dass *Hydrodictyon*, welches 14 Tage bis 4 Wochen im Dunkeln sich aufgehalten hat, lebhaft Gameten zu bilden vermag, vorausgesetzt, dass Rohrzucker vorhanden ist. Denn ohne Zucker in gewöhnlichem Wasser lässt sich nach achttägiger Dunkelheit die geschlechtliche Fortpflanzung nicht mehr beobachten, und es sind nicht häufige Fälle, dass nach einem Aufenthalt von $4\text{--}5$ Tagen im Dunkeln im Wasser noch lebhafte Gametenbildung eintritt. Diese Erscheinung ist verständlich, weil eine Anhäufung von organischer Substanz nicht zu Stande kommt, da im Dunkeln sogleich ein Verbrauch derselben stattfindet. So ist auch der Einfluss der Zuckerlösung nur durch die Annahme erklärlich, dass Zucker in die Zellen eintritt und für die Gametenbildung

Tabelle II.

Nummer	Frühere Cultur	Beginn des Versuchs	% Rohr- zucker	Ende des Versuchs	Resultat
1	seit 24/VII dunkel	1/VIII	10	10/VIII	sehr viele Gameten.
2	hell	4/VIII	10	29/VIII	sehr viele Gameten.
3	seit 9/IX dunkel	21/IX	10	29/IX	sehr viele Gameten.
4	seit 9/IX dunkel	5/X	10		nichts.
5	seit 11/IX dunkel	25/X	10	19/XI	vereinzelte Gameten.
6	hell	25/X	10	1/XI	sehr viele Gameten.
7	seit 25/IX dunkel	25/X	10	31/X	sehr viele Gameten.
8	seit 25/IX dunkel	31/X	10	2/XII	mässig viele Gameten.
9	hell	4/XI	10	9/XI	viele Gameten.
10	seit 25/IX dunkel	31/X	5		nichts.
11	hell	9/XI	10	17/XI	viele Gameten.

benützt wird. Die Concentration der Zuckerlösung spielt insofern eine gewisse Rolle dabei, als vielleicht der Eintritt von Zucker dabei verstärkt wird; doch auch in einer Lösung von 2—5% wurde die Gametenbildung im Dunkeln beobachtet. Noch auffallender ist die Thatsache, dass selbst nach einem 10monatlichen Aufenthalt im Dunkeln Zellen des Hydrodictyon nicht bloss frisch grün waren, sondern auch bewegliche Gameten erzeugt hatten. Diese Zellen, seit 11. Oct. 1888 in einer verdünnten Citronensäure (0,03) dunkel cultivirt, wurden den 3. Jan. 1889 in 2% Glycerin gebracht; die Cultur blieb unverändert im Dunkelschrank stehen und wurde nur ab und zu untersucht. Am 20. Juli 1889 sah ich in Zellen von nur 0,1 bis 0,2 mm Länge bewegliche Gameten und ruhende kleine Zellen, höchst wahrscheinlich Zygoten. Die letzten lebendigen grünen Zellen dieser Cultur sah ich am 3. November 1889, so dass die Zellen über ein Jahr im Dunkeln gelebt hatten. Eine zweite Cultur in 2% Glycerin, welche am 21. November 1888 ins Dunkle gestellt wurde, zeigte noch lebende Zellen am 12. December 1889.

Es kann nicht zweifelhaft sein, dass an und für sich die Gametenbildung ganz unabhängig vom Licht vor sich gehen kann. Auf der andern Seite muss aber die Thatsache hervorgehoben werden, dass die Dunkelculturen lange nicht mit derjenigen Sicherheit gelingen wie die Lichtculturen. Es herrscht augenscheinlich dabei eine Launenhaftigkeit im Verhalten, welche nicht recht zu erklären ist. Die einen Versuche haben, wie die Tabelle zeigt, das beste Resultat, andere nicht oder nur in geringerem Grade. Wahrscheinlich treten Nebenwirkungen dabei ins Spiel,

welche durch den Mangel des Lichtes hervorgerufen werden. Schliesslich wäre das keine wunderbare Erscheinung, da das ganze Leben einer Wassernetzzelle beständig dem Wechsel von Tag und Nacht unterworfen ist, so dass alle Functionen in irgend welcher Weise bald mehr, bald weniger vom Lichte abhängig sind. Ein Theil der Lichtwirkungen beruht auf der durch directe Bestrahlung erzeugten Wärme, welche sich durch höhere gleichmässige Temperatur im Thermostaten ersetzen lässt. Es wurde oben schon die Thatsache berührt, dass bei Anwendung höherer Temperatur (26—28°) die Gametenbildung sicherer zu erreichen ist. Die photochemischen Wirkungen des Lichtes lassen sich nicht ersetzen, weil sie unbekannter Natur sind. Vorläufig muss man sich mit dem Resultate begnügen, dass die Gametenbildung ein vom Licht nicht direct bedingter Process ist, wenn derselbe auch bei normal beleuchteten Culturen mit grösserer Sicherheit als bei lange im Dunkeln gehaltenen verläuft.

Eine andere Frage ist, ob die Dunkelheit in der ersten Zeit die Gametenbildung begünstigt. Wenn im Sommer in einem Culturegefäss lebhaft Neigung zur Gametenbildung erregt war, ohne dass sie zum Ausbruch kam, so genügte ein Aufenthalt im Dunkeln während mehrerer Tage, um die Entwicklung der Gameten in hohem Grade herbeizuführen, selbst in Lösungen von 0,1—0,5% Salpeter. Netze aus derselben Cultur bildeten in Maltose und Dulcitol Zoosporen, im Falle sie beleuchtet wurden. Vielleicht am richtigsten drückt man den Sachverhalt dahin aus, dass die Dunkelheit die Zoosporenbildung verhindert und dadurch den schon eingeleiteten Processen freie Bahn schafft, welche zur Gametenbildung führen. Wenn dieselbe aber nicht in den ersten Tagen eintritt, so erfolgt sie im Wasser überhaupt nicht mehr, so lange Dunkelheit herrscht. Der blosser Aufenthalt im Dunkeln genügt nicht, dem Wassernetz eine bestimmte Neigung zur Gametenbildung zu verleihen. Zahlreiche Versuche sind von mir angestellt worden, um zu entscheiden, ob das Leben im Dunkeln — zunächst Wasserculturen vorausgesetzt — für die Art der später im Licht eintretenden Fortpflanzung von Bedeutung ist. Ein klares Resultat hat sich bisher nicht ergeben. Nur habe ich im Allgemeinen folgenden Eindruck gewonnen: Netze mit schwächerer oder stärkerer Neigung zur Zoosporenbildung, bewahren dieselbe, mögen sie so lange im Dunkeln sich aufhalten, wie es überhaupt ohne Schädigung möglich ist. Ebenso kann es bei Netzen geschehen, welche Neigung zur Gametenbildung besessen haben. Da aber nach längerer Dunkelheit keine Nahrungsstoffe genügend vorhanden sind, kann in den ersten Tagen weder das eine noch das andere entstehen, und es hängt jetzt sehr gerade von den äussern Bedingungen dieser ersten Tage ab, welche Art der Fortpflanzung veranlasst wird.

Abschnitt IV.

Das Verhältniss der ungeschlechtlichen und geschlechtlichen Fortpflanzung.

1. Aufgabe der Untersuchung.

Die in den beiden letzten Abschnitten dargelegten Beobachtungen beweisen, dass Zoosporen- und Gametenbildung nicht nothwendig aufeinanderfolgende, durch besondere Generationen vertretene Stufen des Entwicklungsganges vorstellen, sondern Fortpflanzungsformen sind, welche zu beliebiger Zeit an beliebigen Netzen auftreten können, wofür äussere Bedingungen massgebend sind. Es hat sich ferner die wichtige Thatsache herausgestellt, dass die beiden Formen nicht bloss ihrer Anlage nach verschieden sind, sondern dass für das Eintreten jeder von beiden specifische, von einander verschiedene äussere Bedingungen nothwendig sind. Diese Thatsachen hängen aufs innigste mit der Frage zusammen, worin die Unterschiede zwischen ungeschlechtlicher und geschlechtlicher Fortpflanzung eigentlich liegen.

Da es sich hier um ein Problem von allgemeinsten Bedeutung handelt, ist es die Aufgabe, die Abhängigkeit beider Fortpflanzungsformen von der Aussenwelt noch sicherer zu beweisen, noch eingehender zu erforschen, als es durch die vorhergehenden Untersuchungen geschehen ist. Man musste sich sagen, dass, wenn wirklich äussere Verhältnisse die eine oder andere Art der Vermehrung herbeiführen, es gelingen müsse, an ein und demselben Netz gleichzeitig die eine und die andere Fortpflanzung als nothwendige Folge äusserer Einflüsse zur Erscheinung zu bringen. Die Zellen eines Netzes sind Schwesterzellen, sie sind, so weit es überhaupt möglich ist, unter denselben Bedingungen aufgewachsen, sie zeigen thatsächlich dasselbe Verhalten, wenn das ganze Netz in der früher geschilderten Weise entweder zur Zoosporen- oder zur Gametenbildung veranlasst wird. Wenn man nun noch einen innern unbekannten Faktor annehmen wollte, welcher den Vermehrungsprocessen zu Grunde liegt, so müsste derselbe doch wenigstens in denselben Zellen eines Netzes der gleiche sein. Er müsste sie stets nach derselben Richtung hintreiben. Gelingt es dagegen ausschliesslich mit Hülfe der äussern Bedingungen bei jedem Netz, woher es auch komme, die eine Hälfte zur Zoosporen-, die andere zur Gametenbildung zu bringen, so beweist das nicht nur, dass äussere Verhältnisse überhaupt dabei mitwirken, sondern dass sie allein darüber entscheiden. Daher war es ein sehr wichtiger Theil meiner Untersuchung, den Nachweis eines solchen Verhaltens der Netze zu führen. Im Laufe der Untersuchung verschob sich die Fragestellung nach einer andern Richtung. Wie aus den früheren Abschnitten ersichtlich ist, gelingt es auf dem Wege der Cultur, den Netzen eine besonders lebhafte Neigung zu einer Fortpflanzungsweise, sei es die geschlechtliche, sei es die ungeschlechtliche

zu induciren, und so gleichsam eine Art von innerer Ursache zu erzeugen. Denn würde man nicht die allmähliche Entstehung der Neigung in Folge der äussern Einflüsse kennen, sondern nur die Thatsache derselben, so würde sie für ein Zeichen eines in der innern Natur der Zelle begründeten Faktors gelten. Netze können nach der Cultur in 0,5 Nährlösung während mehrerer Monate die Neigung zur Zoosporenbildung in gleichsam ruhendem Zustande bewahren; ein kleiner Reiz genügt, die Spannung in die Reaction umzusetzen. Ebenso gelingt es in Netzen die Neigung zur Gametenbildung in hohem Grade zu steigern. Nun kam es darauf an, ein Netz mit einer solchen hochgradigen Neigung zu der einen Fortpflanzungsweise, dennoch durch äussere Bedingungen, mit vollkommener Sicherheit zu der andern entgegengesetzten Fortpflanzung zu bringen. Erst wenn die Versuche nach den beiden möglichen Richtungen vollständig gelingen, ist die Anschauung bewiesen, dass allein äussere Bedingungen das Verhältniss der beiden Fortpflanzungsformen regeln.

2. Die Umwandlung Gameten bildender Netze in Zoosporen bildende.

Netze, welche in Folge der früher erwähnten Culturweise oder während des Lebens in der freien Natur eine lebhafte Neigung zur Gametenbildung erlangt haben, lassen sich leicht und sicher zur Zoosporenbildung bringen, indem man sie bei hellem Licht in 0,5 Nährlösung cultivirt. Wenn bei den Netzen schon eine Anzahl Zellen Gameten erzeugt haben, so kann in den ersten Tagen dieser Process bei manchen Zellen weitergehen, während mit jedem Tage, bei einer immer grösser werdenden Anzahl, die Neigung zur Zoosporenbildung überhand nimmt. Während noch einzelne Zellen in der Nährlösung Gameten erzeugen, bilden andere desselben Netzes, in Wasser übergeführt, Zoosporen. Schliesslich hört bei allen die geschlechtliche Fortpflanzung auf, und die Neigung zur ungeschlechtlichen ist allen Zellen inducirt.

Bei stärkerer Concentration der angewandten Nährlösung gelingt der Umkehrungsversuch leichter und schneller. Bei Netzstücken, deren Zellen theilweise lebhafte Gameten bildeten, genügte schon ein Aufenthalt von 2 Tagen in 1% Nährlösung bei Licht und Wärme, um nach Einführung in Wasser Netzbildung hervorzurufen. Ganz ebenso gelingt der Versuch mit Netzen, welche in einer Rohrzuckerlösung von 5—10% in intensiver Gametenbildung begriffen sind. Sowie ein Theil der noch unveränderten Zellen eines solchen Netzes direct aus dem Rohrzucker in 0,5 Nährlösung gebracht wird, hört die Gametenbildung sofort auf, und in wenigen Tagen sind die betreffenden Zellen im Stande Zoosporen zu bilden, während in der Zuckercultur die Gametenbildung weitergeht. Die Umwandlung gelingt auch häufig dadurch, dass man die Zellen aus der Rohrzuckerlösung in gewöhnliches Wasser überführt. Durch die plötzliche Aenderung des

Mediums wird die Gametenbildung aufgehalten, und bei sonst günstigen Bedingungen kann die Anlage der Zoosporenbildung den Vorsprung erhalten und siegen. Manchmal, wenn Gametenbildung in einer Wassercultur sich gezeigt hat, kann einfach Wechseln des Wassers und helle Beleuchtung an demselben Netz die Zoosporenbildung hervorrufen. Doch am sichersten bleibt immer die Anwendung der Nährsalzlösung.

Es ist unnöthig, einzelne Versuche anzuführen, weil alle ganz übereinstimmende Resultate geliefert haben. Unzweifelhaft können durch äussere Bedingungen die Processe, welche die Gametenbildung einleiten, und die Neigung zu derselben verursachen, rückgängig gemacht, oder unterdrückt und jene Processe angeregt werden, welche die Zoosporenbildung bedingen.

3. Die Umwandlung Zoosporen bildender Netze in Gameten bildende.

Obwohl kein Grund einzusehen war, warum die Umwandlung ungeschlechtlich sich fortpflanzender Netze in geschlechtliche nicht eben so leicht vor sich gehen sollte, wie der umgekehrte Process, so traten doch bei der Untersuchung auffallende Schwierigkeiten hervor, in Folge dessen es sehr langer und sehr zahlreicher Versuche bedurfte, um einigermaßen zum Ziele zu gelangen.

Allerdings die einfache Thatsache, dass die Netze, deren Zellen theilweise Zoosporen bilden, infolge der äussern Bedingungen Gameten bilden können, war leicht nachweisbar. Wir haben kennen gelernt, dass Netze, welche im Lauf des Sommers aus der freien Natur frisch geholt werden, gewöhnlich in den ersten Tagen sich ungeschlechtlich fortpflanzen; allmählich ändert sich in denselben Netzen durch Einwirkung der Zimmercultur diese Neigung nach der geschlechtlichen Seite. Aber auch die Netze, welche durch die Cultur in Nährlösung eine besonders lebhaft Neigung zur Zoosporenbildung erworben haben, können unter Umständen Gameten bilden. So ist es eine gar nicht seltene Erscheinung, dass solche Netze, in Wasser übergeführt, zuerst Zoosporen erzeugen, bei längerer Dauer des Versuches, ungünstigen Lichtverhältnissen, später Gameten bilden. Vor allem wurde es beobachtet bei Anwendung von Zuckerlösungen; ich will nur anführen, dass bei 40 derartigen Versuchen im Jahre 1888 20 ausschliesslich Zoosporen, 16 zuerst Zoosporen, dann Gameten bildeten, während 4 Dunkelversuche kein Resultat lieferten. Ein längerer Aufenthalt in der Zuckerlösung wirkt also dahin, in den Netzen die Neigung zur Zoosporenbildung zu unterdrücken und der zur Gametenbildung zum Siege zu verhelfen. Auch noch auf eine andere Weise gelingt es den Nachweis zu führen, dass ein und dasselbe Netz mit Hülfe äusserer Bedingungen gleichzeitig in seinen verschiedenen Theilen auf beide Arten sich vermehren kann, wie folgende Tabelle zeigt, welche

Versuche vom Sommer 1889 angibt. Dieselben sind derart angestellt, dass ein Netz getheilt wurde und die eine Hälfte A beleuchtet, die andere B verdunkelt wurde bei Anwendung des gleichen Nährmediums.

Tabelle III.

Nr.	Beginn des Versuchs	Medium	‰	Ende des Versuchs A	Hälfte A beleuchtet	Ende des Versuchs B	Hälfte B verdunkelt
1	25/V	Maltose	2	1/VI	Zoosporen	6/VI	Gameten
2	31/V	Dulcit	2	3/VI	Zoosporen	3/VI	Gameten
3	3/VI	Maltose	0,5	5/VI	Gameten.	7/VI	Gameten
4	3/VI	Dulcit	0,5	5/VI	Zoosporen	5/VI	Gameten
5 ¹⁾	4/VI	Maltose	1	7/VI	Zoosporen	—	nichts
6	5/VI	Maltose	0,5	7/VI	Zoosporen	7/VI	Gameten
7	7/VI	Dulcit u. Salpeter	0,5 0,5	10/VI	Zoosporen	10/VI	Gameten
8	8/VI	Wasser		11/VI	Zoosporen	12/VI	Gameten
9	8/VI	Maltose	2	11/VI	Zoosporen		nichts
10	8/VI	Rohrzuck.	5	11/VI	Zoosporen	11/VI	Gameten
11	8/VI	Dulcit	1	10/VI	Zoosporen	10/VI	Gameten
12	9/VI	Maltose	1	13/VI	Zoosporen	15/VI	Gameten
13 ²⁾	20/VI	Dulcit	2	23/VI	Zoosporen	23/VI	Gameten
14	17/IX	Maltose	1	29/IX	Zoosporen	20/IX	Gameten
15	17/IX	Dulcit	1	29/IX	Zoosporen, dann Gameten	29/IX	Gameten

Bei der Durchsicht springt die Thatsache in die Augen, wie oft eine verhältnissmässig sehr kleine Veränderung in den äussern Bedingungen genügt, zu entscheiden, welche Fortpflanzungsweise die Zellen eines Netzes annehmen, sodass einer innern Ursache keine Bedeutung dabei zukommt. Natürlich haben nicht alle Versuche, welche in gleicher Weise angestellt werden, dasselbe Resultat, und es muss überhaupt bemerkt werden, dass die Gametenbildung in den Dunkelversuchen häufig nur theilweise eintritt. Denn diese auffallende und interessante Erscheinung, durch Licht und Dunkelheit über die geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung zu entscheiden, ist nur bei solchen Netzen möglich, welche keine ausgesprochene Neigung zu der einen oder andern Form haben. In diesem Falle lässt sich die Sache noch weiter treiben, indem es gelingt, dieselben Hälften der Netze, welche im Dunkeln in Dulcit und Maltose Gameten gebildet haben, durch Beleuchtung zur Zoosporenbildung zu bringen.

1) Diese Cultur seit 14/III dunkel.

2) Diese Cultur seit 17/VI in 0,5 ‰ Nährlösung.

Die Schwierigkeiten traten erst auffallend hervor, als versucht wurde, Netze mit sehr lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung zur Gametenbildung zu nöthigen mit derselben Sicherheit, wie der umgekehrte Versuch gelang (siehe S. 383). Es mag mir gestattet sein, etwas ausführlicher auf die Versuche einzugehen, weil sowohl die positiven als auch die negativen Resultate bedeutungsvoll sind, wenn man das Verhältniss der beiden Fortpflanzungsformen näher erkennen will.

Die Beobachtung, dass ungeschlechtlich gestimmte Netze bei längerem Verweilen in der Zuckerlösung ab und zu Gameten bilden, war die Veranlassung zu verschiedenen Versuchsreihen. Die Tendenz zur Gametenbildung konnte dadurch angeregt werden, dass allmählich eine grössere Menge Zucker in die Zellen übertrat, oder dass die im Ueberschuss vorhandenen Nährsalze zum Austritt genöthigt wurden; beide Momente konnten auch nebeneinander wirksam sein. Zunächst wurde versucht, den Aufenthalt der Netze in der Zuckerlösung zu verlängern, indem die Culturen entweder im Dunkeln oder bei niedriger Temperatur gehalten wurden. Für den letzteren Versuch benutzte ich ein nach Norden gelegenes Zimmer, welches nie geheizt wurde und daher den ganzen Winter hindurch eine Temperatur unter 8° hatte.

Meine Versuche zeigen nun, dass trotz langem Aufenthalt im Dunkeln oder Kalten bei Gegenwart von Zucker die ungeschlechtliche Neigung sich in stärkerem oder geringerem Grade erhielt, so dass im Licht oder bei höherer Temperatur die Zoosporenbildung gleich wieder eintrat.

Ein zweiter Weg eine Ansammlung organischer Substanz in den Zellen herbeizuführen, besteht darin, die Netze statt in Wasser auf einer feuchten Unterlage, sei es Torf, Lehm oder Filtrirpapier zu cultiviren und recht sonnig zu stellen. In diesen Versuchen wurde dafür gesorgt, dass der Lehm stets feucht war und die Torfstücke u. s. w. mit ihrem unteren Theil im Wasser standen. Unter diesen Umständen kann eine Zoosporenbildung nicht oder nur sehr spärlich erfolgen, die Zellen assimiliren weiter und speichern grosse Massen Stärke in sich auf. Die Versuche schienen um so mehr Aussicht auf Erfolg zu haben, als vielfach Netze in dieser Weise cultivirt, lebhafteste Gametenbildung zeigten. Jedoch trat der erwartete Erfolg nicht ein, die Neigung zur Zoosporenbildung schien unverändert, ja vielleicht erhielt sie sich bei keiner andern Versuchsreihe in so hohem Grade, da bei Wasserzufuhr stets in kurzer Zeit sämtliche Zellen Zoosporen bildeten. Einige Beispiele will ich in folgender Tabelle anführen.

Tabelle IV.

Feuchte Unterlage.	In Wasser.	Datum des Resultats.
I. Sand seit 24/III 89	{ 1) 23/IV 2) 28/V	24/IV Zoosporen 30/V Zoosporen
II. Torf seit 1/III	25/III	27/III Zoosporen
III. Filtrirpapier seit 11/X 89	{ 1) 1/XI 2) 8/I 90 3) 1/II 90	2/XI Zoosporen 10/I Zoosporen 3/II Zoosporen

Die Tabelle zeigt, dass selbst nach mehr als 3½ Monaten die Neigung zur Zoosporenbildung noch vollständig sich erhalten hatte. Auch bei Versuchen, bei welchen das Filtrirpapier mit Maltose-, Dulcit- oder Rohrzuckerlösung getränkt war, liess sich kein Erfolg nachweisen, während bei beliebigen Netzen unter diesen Umständen vielfach Gametenbildung eintreten kann, wenn keine lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung vorhanden ist. Die Thatsache ist insofern bemerkenswerth, als sich dabei eine Verschiedenheit im Verhalten der Zoosporen- und Gametenbildung herausstellt; es ist wahrscheinlich, dass Netze, bei denen die Neigung zur Zoosporenbildung nicht sehr gefestigt ist, durch allmähliches Eintrocknen des Standortes zur Gametenbildung geführt werden.

Neben der Anhäufung organischer Substanz kommt noch ein zweiter wichtiger Punkt in Betracht, das Verhalten der Nährsalze. Sie sind es gerade, welche die lebhafte ungeschlechtliche Neigung bedingen; will man dieselbe unterdrücken, so musste dafür gesorgt werden, dass die Nährsalze entfernt werden. Natürlich durfte das nur bis zu einem gewissen Grade erfolgen, da auch für die Gametenbildung geringe Mengen von Nährsalzen nothwendig sind. Die Schwierigkeit liegt darin, dass kein Mittel bekannt ist, welches direct die Exosmose der Nährsalze bewirkt. Indessen war wenigstens zu versuchen, ob nicht durch einen längeren Aufenthalt in höherer Temperatur der Austritt der Nährsalze gesteigert würde. Doch hatten die Versuche keinen durchschlagenden Erfolg, da nur hier und dort, aber nicht regelmässig, die Zoosporenbildung unterdrückt und die Gametenbildung hervorgerufen werden konnte. Jetzt blieb noch ein Mittel zu versuchen übrig, zu welchem ich von Zeit zu Zeit immer wieder gegriffen habe und welches dem Gedanken entsprang, durch besondere chemische Substanzen eine Exosmose der Zellsaftstoffe zu veranlassen. Vor allem lag es nahe in dieser Beziehung an Körper sauren Characters zu denken¹⁾. Leider aber zeigte sich doch, dass sichere Resultate nicht erreicht werden konnten. Die vielen Versuche mit verdünnter Aepfel-

1) Vergl. Pfeffer, Arbeiten des botanischen Instituts Tübingen. II. S. 288—291; hier wird gezeigt, wie durch Citronensäure Exosmose der in die Zellen eingedrungenen Anilinfarbstoffe veranlasst wird.

Citronen-, Essig-, Phosphorsäure, mit saurem und gewöhnlich weinsaurem Kali, mit Eisenweinstein, weinsaurem Ammoniak führten zu keinem Resultat. Höchstens liess sich feststellen, dass die Gametenbildung ungestört in verdünnten organischen Säuren vor sich gehen kann, während Netze mit ungeschlechtlicher Neigung keine Zoosporen bilden, bis die Säure durch Wasser ersetzt ist, im Falle die Netze nicht zu sehr geschädigt worden waren. In alkalischen Lösungen, z. B. von Magnesiumoxyd, bleibt die Neigung zur Zoosporenbildung unverändert; sie kann vor sich gehen, wenn die Lösung schwächer, aber immerhin noch alkalisch reagirt.

So war die Frage trotz aller Bemühung ungelöst, so dass ich in meiner ersten vorläufigen Mittheilung ausdrücklich auf diese Lücke aufmerksam machen musste. Erst im Winter 89—90 gelang es mir dieselbe bis zu einem gewissen Grade auszufüllen, indem ich die verschiedenen äussern Einflüsse in mannigfachen Combinationen auf die Netze einwirken liess. Mich leitete dabei folgender Gedankengang. Wenn ein einzelner Factor, wie niedere Temperatur, Lichtmangel, welcher an und für sich die gesammten Lebensvorgänge ungünstig beeinflusst, längere Zeit auf die Cultur einwirkt, so wird die Folge davon sein, dass abgesehen von der nothwendigen Athmung alle andern Processe so gut wie stillstehen, infolge dessen keine wesentliche Veränderungen in den Zellen eintreten können. Die Neigung zur Zoosporenbildung erhält sich desshalb unverändert, und die für die Gametenbildung nothwendigen Processe können nicht Platz greifen. Auch für die letzteren wirkt ein gewisser Grad der Beleuchtung günstig, und ebenso ist eine gewisse Menge Wärme für die einleitenden Processe nothwendig. Daher muss man versuchen, die ungeschlechtlich gestimmten Netze dem Licht auszusetzen, aber einem solchen, welches zu schwach ist, lebhaftere Zoosporenbildung zu erwecken, und ebenso erscheint es nothwendig, eine Temperatur anzuwenden, welche noch hoch genug ist, um die Lebensprocesse der Zelle fortgehen zu lassen, aber so niedrig, dass die Zoosporenbildung nicht recht zum Ausbruch kommen kann. Diese Ueberlegungen führten zu einer grossen Anzahl Versuche, welche in überraschender Weise und mit solcher Sicherheit gelangen, dass ich in einem kleinen Nachtrag ¹⁾ zu meiner ersten Mittheilung das Problem als vollständig gelöst bezeichnete. Zu den Versuchen wurden Netze benutzt, welche in Nährlösung von 0,5—1% seit Ende October oder Anfang November cultivirt worden waren, und welche wie immer in solchen Fällen lebhafteste Neigung zur Zoosporenbildung besaßen. Die Netze wurden entweder in Wasser oder direct in eine 5% Rohrzuckerlösung gebracht und an einem Nordfenster cultivirt, an welchem während der Wintermonate ein relativ schwaches diffuses Licht am Tage herrschte und zugleich eine Temperatur von 10—12°. Nach 10—20 Tagen kamen die Culturen in

1) Klebs, Biologisches Centralblatt IX. 1890. No. 24.

den Thermostaten, dessen Temperatur auf circa 28° gehalten wurde. Meist schon nach 1–2 Tagen trat vollständigste Gametenbildung ein. Wenn dies nicht der Fall war, wurden die Culturen von Neuem an das Nordfenster gestellt und dann später der Wirkung des Thermostaten ausgesetzt. Statt ausführlicher Beschreibung der Combinationen wird es zweckmässig sein, eine Anzahl Versuche tabellarisch aufzuführen. Dieselben beziehen sich alle auf ein und dieselbe Hauptcultur, in welcher einige wenige aber sehr grosse Netze sich befanden, welche dann auf die verschiedenen Versuche vertheilt wurden. Die römischen Zahlen geben die einzelnen Versuche resp. Versuchsreihen an mit einer bestimmten Menge Hydrodictyon aus dieser Hauptcultur. Entweder wurde das Material direct derselben entnommen oder einer secundären Cultur, in welcher die Netze aus der Nährlösung in Wasser gebracht worden waren. Es findet sich bei dem betreffenden Versuch in der zweiten Rubrik die Angabe der Nummer, aus welcher das Material stammt; so ist z. B. das Material des Versuches No. I zu mannigfachen andern Versuchen verwendet worden. Die Temperatur im Thermostaten wie am Nordfenster ist ziemlich constant gewesen; sehr wechselnd war sie in dem Falle, dass directe Sonne auf die Culturen einwirkte, infolge dessen die Grenzen ungefähr angegeben sind. Bei der Angabe der Lichtstärke heisst »mässig hell« stets diffuses Licht ohne directe Sonne, »hell« dagegen zeitweilige Sonnenbeleuchtung.

Tabelle V.

Hydrodictyon seit 2/XI in 0,5 Nährlösung.

No.	Datum und Medium.	Licht.	Temperatur.	Resultat.
I	Seit 8/XII Wasser	mässig hell	10°	wenige Netze
II	No. I 12/XII 5‰ Rohrzucker	dunkel	28°	mässig viel Netze
	Dann 20/XII » »	mässig hell	10°	nichts
	» 28/XII » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
III	No. I 10/XII » »	dunkel	28°	nichts
	Dann 20/XII » »	mässig hell	10°	nichts
	» 28/XII » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
IV	No. I 10/XII » »	mässig hell	10°	einzelne Netze
	Dann 20/XII » »	dunkel	28°	einzelne Netze, sehr viele Gameten
V	No. I 23/XII » »	mässig hell	28°	einzelne Netze, sehr viele Gameten
VI	No. I 23/XII » »	mässig hell	10°	einzelne Netze

Tabelle V. (Fortsetzung).

No.	Datum und Medium.	Licht.	Temperatur.	Resultat.
VI	Dann 3/I 5‰ Rohrucker	dunkel	28°	sehr viele Gameten
VII	No. I 5/I Wasser	hell	10—20°	sehr viele Netze
VIII	No. I 3/I 1‰ Dulcit	hell	10—20°	sehr viele Netze
IX	7/XII 5‰ Rohrucker	mässig hell	10°	nichts
	Dann 11/XII 5‰ Rohrucker	dunkel	28°	wenige Netze, wenige Gameten
	» 20/XII » »	mässig hell	10°	nichts
	» 4/I » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
X	7/XII 5‰ Rohrucker	mässig hell	10°	wenige Netze
	Dann 20/XII 5‰ Rohrucker	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XI	25/XI Wasser	dunkel	28°	nichts
	Dann 6/XII 5‰ Rohrucker	dunkel	28°	nichts
	» 20/XII » »	mässig hell	10°	nichts
	» 6/I » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XII	23/XII » »	mässig hell	28°	einige Netze, sehr viele Gameten
XIII	23/XII » »	mässig hell	10°	nichts
	Dann 3/I » »	dunkel	28°	nichts
	» 10/I » »	mässig hell	10°	nichts
	» 30/I » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XIV	23/XII Wasser	mässig hell	28°	einige Netze
	Dann 2/I Wasser	hell	10—20°	sehr viele Gameten
XV	23/XII Wasser	mässig hell	10°	nichts
	Dann 3/I Wasser	dunkel	28°	nichts
	» 8/I »	mässig hell	10°	nichts
	» 21/I »	dunkel	28°	viele Gameten
XVI	6/I Wasser	mässig hell	10°	nichts
	Dann 23/I Wasser	dunkel	28°	nichts
	» 30/I »	mässig hell	10°	nichts
	» 7/II »	dunkel	28°	nichts
	» 18/II »	hell	10—20°	eine Anzahl Netze
	» 26/II »	dunkel	28°	sehr viele Gameten

Tabelle V. (Fortsetzung).

No.	Datum und Medium.	Licht.	Temperatur.	Resultat.
XVII	6/I 5% Rohrucker	hell	10–20°	eine Anzahl Netze
	Dann 16/I 5% Rohrucker	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XVIII	6/I 5% Rohrucker	mässig hell	10°	wenige Netze
	Dann 16/I 5% Rohrucker	dunkel	28°	nichts
	Dann 24/I 5% Rohrucker	mässig hell	10°	wenige Gameten
XIX	25/XI Wasser	dunkel	10°	nichts
	Dann 24/I 5% Rohrucker	hell	10–20°	eine Anzahl Netze
	» 2/II » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XX	13/I Wasser	dunkel	28°	nichts
	Dann 26/I Wasser	hell	10–20°	eine Anzahl Netze
	» 5/II »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XXII	No. XX 1/II Wasser	mässig hell	10°	nichts
	Dann 4/II 5% Rohrucker	mässig hell	10°	nichts
	» 16/II » »	dunkel	28°	sehr viele Gameten
XXII	12/II Wasser.	hell	10–20°	viele Netze

Ganz entsprechende Resultate haben noch andere Versuchsreihen gezeigt, welche deshalb nicht weiter angeführt werden sollen.

Die nähere Durchsicht der angeführten Tabelle beweist, dass das Hydrodictyon in 0,5 Nährlösung vom 8. Dec. 89 bis 12. Febr. 90 seine lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung bewahrt hatte und sich ungeschlechtlich vermehrte, sobald es in Wasser gebracht wurde, und Sonnenlicht einige Zeit einwirkte (vergl. Versuch I. VII. VIII. XXII). Wenn also während der ganzen Zwischenzeit die Netze derselben Cultur zu der denkbar vollständigsten Gametenbildung gebracht werden konnten, so musste stets vorher die lebhafte Neigung zur Zoosporenbildung unterdrückt werden. Das erstrebte Ziel war thatsächlich in diesen Fällen erreicht. Eine der Hauptursachen bei dieser Unterdrückung spielte das Licht in Combination mit relativ niedriger Temperatur; beide Factoren liessen die Zoosporenbildung nicht oder nur in geringem Masse erfolgen. Jetzt konnten die zur Gametenbildung führenden Ursachen den Vorrang gewinnen und schliesslich siegen. Sehr bezeichnend, übrigens mit allem was sonst beobachtet wurde, übereinstimmend, ist die Thatsache, dass diese Unterdrückung der ungeschlechtlichen Neigung nur eine zeitweilige war, d. h. nur so lange gelang, als das Licht sich in bescheidenen Grenzen

hielt. Der Vergleich der Versuche I und VII, welche mit demselben Material und auch mit demselben nicht gewechselten Wasser angestellt wurden, lässt aufs Klarste hervortreten, wie noch nach 4 Wochen der Cultur bei geringem Licht und niedriger Temperatur die ungeschlechtliche Neigung sich unverändert erhielt und sofort wieder zum Ausbruch kam, als directe Sonne d. h. helles Licht und höhere Temperatur einwirkte. Neben der geringeren Wärme und Licht-Intensität, welche durch Zurückdrängung der ungeschlechtlichen Neigung die Gametenbildung beförderte, wurde dieselbe weiterhin durch Dunkelheit und hohe Temperatur in hohem Masse gesteigert. Beide Factoren dienten wesentlich dazu möglichst schnell und möglichst vollständig in einer Cultur die Gametenbildung hervorzurufen. Dieselbe konnte auch eintreten in Versuchen, bei welchen das Innere des Thermostaten bei 28° erleuchtet wurde und andererseits konnte auch eine Temperatur von 20° in der Dunkelheit für viele Zellen genügen. Im Allgemeinen gelangen die Versuche, bei welchen Zuckerlösung benutzt wurde, sicherer, als bei Anwendung von Wasser aus dem leicht verständlichen Grunde, weil die Zuckerlösung an und für sich die Gametenbildung begünstigt. In Wasserculturen gelang bisweilen eine ganze Anzahl Versuche noch in ganz anderer Weise als in der Tabelle angegeben ist. Wenn man nämlich die Netze in der Nährlösung im Dunkeln cultivirt, so wirkt dieselbe in jedem Falle nicht so günstig für die Zoosporenbildung wie im Licht (vergl. S. 359). Nach dem Versetzen in Wasser bei fortwährender Dunkelheit kann die ungeschlechtliche Neigung nicht in so hohem Grade erregt werden. Solche Culturen in den Wintermonaten einem mässig hellen Licht ausgesetzt, bilden ausserordentlich leicht Gameten. Der Versuch gelingt im Sommer in den seltensten Fällen, weil bei der starken Lichtintensität die Zoosporenbildung zu schnell eintritt.

Die im Vorhergehenden besprochenen Versuche beweisen unzweifelhaft, dass Netze mit lebhafter Neigung zur Zoosporenbildung durch äussere Bedingungen zur geschlechtlichen Fortpflanzung genöthigt werden können, und sie vervollständigen den schon früher ausgesprochenen Satz, dass die Aussenwelt die Fortpflanzung regulirt. In meinem kleinen Nachtrag glaubte ich mich in Folge dessen zu dem Ausspruch berechtigt, dass jedes Netz bald zu der einen, bald zu der andern Fortpflanzungsart, je nach den äussern Bedingungen gezwungen werden kann. Indessen haben weitere Untersuchungen mich genöthigt, den Satz etwas einzuschränken, sie haben zugleich eine für die ganze Frage wichtige Erscheinung kennen gelehrt.

Unter meinen Culturen im Grossen fand sich eine einzige vor, bei welcher in allen Netzen die Neigung zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung in solchem Grade entwickelt war, dass alle Mittel Gameten hervorzurufen, fehl schlugen. Die Cultur bestand in jungen Netzen, welche im Sommer

1889 erzeugt und während der grossen Ferien in einem Gefäss im Garten unbeachtet stehen geblieben waren. Anfang October wurden die Netze in einem grossen Holzbehälter draussen cultivirt bis Anfangs December, zu welcher Zeit sie in einem kleineren Gefäss im Warmhaus weiter gezogen wurden. Die Netze waren wenig gewachsen, gelb gefärbt und dicht mit Stärke erfüllt. Noch bis Ende October liessen sich beide Arten der Fortpflanzung hervorrufen, wenn auch wegen des schlechten Zustandes, nur bei einem Theile der Zellen. In 5—10% Rohrzucker traten im Thermostaten bei einer Anzahl Zellen Gameten auf; im Allgemeinen aber schien die ungeschlechtliche Fortpflanzung leichter einzutreten, und nach Weihnachten gelang es kaum mehr Gameten zu sehen. Die Netze dieser Cultur wurden nun in 0,5% Nährlösung gebracht und gewannen dadurch normales Aussehen. Zugleich steigerte sich die Neigung zur Zoosporenbildung und wurde zu einer anscheinend von der Aussenwelt unabhängigen Eigenschaft. In den Monaten Januar bis April 1890 habe ich in der Ueberzeugung, dass der Versuch Gameten hervorzurufen, gelingen müsse, das denkbar möglichste versucht und die aller mannigfachsten Combinationen äusserer Factoren angewandt; ich könnte viele Seiten anfüllen mit der Besprechung solcher Versuche, aber alle fielen in derselben Weise aus, d. h. überall traten Zoosporen auf, wenn die Bedingungen überhaupt die Fortpflanzung gestatteten. Immerhin ist es denkbar, dass es noch eine unbekannte Versuchsanstellung gegeben hätte, durch welche die Gametenbildung veranlasst worden wäre. Indessen halte ich es deshalb für unwahrscheinlich, weil alle Versuche in durchaus gleicher Weise reagierten, weil während der ganzen Zeit unter den vielen Hunderten von Zellen nicht eine einzige Zelle mit Gameten beobachtet wurde. Im Zusammenhange mit dieser auffallenden Befestigung der ungeschlechtlichen Neigung steht die Thatsache, dass bei dieser Cultur die Zoosporenbildung in hohem Grade unabhängig vom Licht geworden war (S. 359). Bei Anwendung des Thermostaten gelang es wiederholt junge Netze zu erzeugen, nachdem die Cultur 8—14 Tage im Dunkeln gestanden hatte.

Nach der Feststellung der Thatsache, dass durch die Art und Weise der Cultur Netze die nicht mehr veränderliche Eigenschaft erwerben, Zoosporen zu bilden, war die wichtigste Frage wie die Nachkommen solcher Netze sich verhalten. Im April 1890 wurden frische junge Netze derselben Cultur weiter cultivirt; sie wuchsen schnell zu lebhaft grünen Netzen heran. Schon nach 3 Wochen zeigten sie lebhaft Neigung zur Zoosporenbildung und behielten dieselbe auch bis Mitte Juni bei, wo die Cultur durch die Versuche aufgebraucht war. Doch gelang es schliesslich, wenn auch schwer, mit Hülfe von Zuckerlösung und Dunkelheit einige Zellen zur Gametenbildung zu bringen. Sehr viel leichter ging es bei der zweiten Generation, es scheint daher als wenn die stark befestigte Neigung zur Zoosporenbildung nur bis zu einem gewissen Grade auf die Nachkommen übertragen werde.

Es bedarf keiner ausführlichen Darlegung, dass die hervorgehobenen Thatsachen nichts dafür beweisen, dass es wirklich ungeschlechtliche Generationen bei Hydrodictyon gibt, denn anfänglich liessen in der Cultur wie immer beide Fortpflanzungsweisen sich hervorrufen. Erst allmählich durch die Art der Cultur erhielt die eine Form, die ungeschlechtliche, das Uebergewicht, bis schliesslich, besonders durch die Einwirkung der Nährlösung, dieselbe den hohen Grad der Festigkeit erlangte, so dass die Netze specifisch ungeschlechtlich wurden. Am besten erklärt sich wohl diese merkwürdige Erscheinung durch die Annahme, dass in Folge der Culturbedingungen schon weitergehende, wenn auch noch nicht sichtbare Processe der Zoosporenbildung in den Zellen eingetreten waren, so dass dieselben nur aufgehalten aber nicht mehr unterdrückt werden konnten. Die interessante Frage ob es möglich ist, eine ungeschlechtliche Race zu erziehen, konnte bisher nicht experimentell geprüft werden.

4. Die Unterschiede der geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Fortpflanzung.

Die Untersuchungen, welche die auffallende Abhängigkeit der Fortpflanzungserscheinungen von der Aussenwelt klar bewiesen haben, werfen zugleich einiges Licht auf die Frage von allgemeiner Bedeutung nach den Unterschieden der geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Vermehrung. Die Frage kann verschieden gestellt werden. Zunächst würde es sich darum handeln, festzustellen, welche bestimmte physiologische Ursachen für das Eintreten jeder der beiden Vermehrungsarten charakteristisch sind. Man kann aber weiter gehen und das Problem erforschen, wie phylogenetisch die Entstehung beider Erscheinungen vorzustellen ist, und worin die Bedeutung jeder der beiden Fortpflanzungsweisen liegt.

Bei der Besprechung der allgemeinen Bedingungen der Zoosporenbildung wies ich bereits darauf hin, dass bei der physiologischen Erklärung derselben die vererbte Anlage von den äusseren Ursachen zu unterscheiden ist. Das für die Zoosporenbildung Gültige bezieht sich auch auf die Gametenbildung. Wir werden am einfachsten annehmen, dass in den Zellen des Wassernetzes eine besondere Anlage der Gametenbildung sich findet, welche durch ein materielles System von bestimmter molecularer Organisation gebildet wird. Diese Anlage, auf welcher der charakteristische Verlauf der Gametenbildung beruht, muss bei jeder Theilung der Wassernetzzelle vermehrt und jeder Zoospore zugetheilt werden, in welcher daher die Anlagen beider Fortpflanzungsweisen nebeneinander vorkommen. Wenn man von phylogenetischen Speculationen vorläufig ganz absieht, entspricht den Thatsachen am besten die Annahme, dass beide Anlagen verschiedenartig ausgebildet sind. Wie man sich diese Verschiedenartigkeit der Anlagen selbst nun auch vorzustellen habe, es bleibt die sichere Thatsache von wesentlicher Bedeutung,

dass die äusseren Bedingungen für die geschlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflanzung verschiedenartig sind.

Allerdings lassen sich nicht, wie ich selbst anfangs hoffte, für jede Fortpflanzung spezifische Unterschiede erkennen. Vielmehr sind es dieselben äusseren Kräfte, welche die Entfaltung beider bedingen; es kommt auf die verschiedene Combination derselben an, es hat der verschiedene Intensitätsgrad ihrer Wirkung eine grosse Wichtigkeit. So kann intensives Licht sowohl die Zoosporen- wie Gametenbildung befördern, je nachdem sich andere Bedingungen damit vergesellschaften. Andererseits kann schwaches und starkes Licht verschiedene Wirkungen ausüben. Eine bestimmte Combination äusserer Kräfte längere Zeit auf Zellen einwirken zu lassen, ist kaum in der Wirklichkeit durchzuführen, weil im Laufe schon eines Tages, noch mehr einer oder mehrerer Wochen Licht, Temperatur, Beschaffenheit des Mediums sich verändern. Jede Combination, welche eine gewisse Zeit eingewirkt hat, hinterlässt Veränderungen des Zellinhaltes, welche die Wirkung der nächstfolgenden Combination beeinflussen. In diesem bunten Wechsel der Einwirkungen äusserer Kräfte, ihrer mannigfaltigen Combinationen verhalten sich die beiden Anlagen der Fortpflanzung wie zwei Gegner, von welchen jeder den andern vollständig unterdrücken muss, um zu seinem Ziele, seiner Entwicklung, zu gelangen. Jeder von ihnen sucht die sich ihm darbietenden äusseren Umstände zu benutzen, bald mit Hülfe dieses bald jenes Momentes einen Vortheil zu erringen. Hat die eine Anlage einen Vorsprung gemacht, so kann derselbe wieder rückgängig gemacht werden, und die andere kann mit Hülfe günstiger Combinationen den Sieg erreichen. Ich will jetzt versuchen die verschiedenen Combinationen äusserer Bedingungen kurz zu charakterisiren, welche in dem Kampf der beiden Anlagen von entscheidender Bedeutung sind. Man muss dabei die beiden Fälle unterscheiden, dass die Anlagen in der Zelle ungefähr sich das Gleichgewicht halten und dass eine derselben entwickelter ist wie die andere, oder, wie ich mich vorhin häufig ausdrückte, in den Zellen eine entschiedene Neigung zu einer der beiden Fortpflanzungsformen herrscht.

I. Beide Anlagen halten sich ungefähr das Gleichgewicht.

A. Die Zoosporenbildung wird angeregt und hervorgerufen durch:

a) Frisches Wasser, während einiger Zeit helles Licht, am besten zeitweilig directe Sonne, bei einer Temperatur, welche zwischen 12 und 28° C. schwanken darf.

b) Frisches Wasser, diffuse Beleuchtung bei durchschnittlich etwas höherer Temperatur 20—28°.

c) Maltose und Dulcitolösung von 0,5—2 %, Beleuchtung und Temperatur entweder wie bei a oder b.

d) Nährsalzlösung von 0,05—0,4 %, Beleuchtung und Temperatur wie bei a.

B. Die Gametenbildung wird angeregt und hervorgerufen durch:

α) Cultur in wenig nicht gewechseltem Wasser, in heller Beleuchtung bei einer Temperatur von 16—28°.

β) Cultur ohne Wasser in feuchter Atmosphäre, sonst wie bei α .

γ) Zuckerlösung 5—12 %, diffuse oder sonnige Beleuchtung bei einer Temperatur von 12—28°.

δ) Zuckerlösung, Maltose, Dulcit in der Dunkelheit bei 15—28°.

Keineswegs darf vorausgesetzt werden, dass der Erfolg in den angeführten Fällen immer den Erwartungen entspricht. Gerade wenn beide Anlagen ziemlich gleichwerthig sind, so genügen kleine Unterschiede in den äusseren Verhältnissen, um den Sieg der einen oder andern Anlage herbeizuführen, so dass in einem Versuch Gametenbildung auftritt, wenn man Zoosporenbildung zu beobachten hoffte. Der Fall wird eigentlich nicht häufig sein, dass beide Anlagen ganz gleich sind, da die vorhergehenden Lebensumstände stets Wirkungen ausgeübt haben, welche eine gewisse Neigung zu einer der Fortpflanzungsweisen erweckt haben. Im Allgemeinen haben die aus dem Freien geholten Netze eine Neigung zur Zoosporenbildung, in Folge dessen schon frisches Wasser und helles Licht genügt, sie zur Entfaltung zu bringen. Andererseits wissen wir, dass bei der Zimmercultur leicht die Neigung zur Gametenbildung erregt wird, daher rührt es, dass bei vielen solcher Versuche zuerst Zoosporen-, dann Gametenbildung auftritt. Ferner spielt die schon erwähnte Erscheinung mit, dass eine bestimmte Combination äusserer Umstände sich schwer lange festhalten lässt, da durch den Wechsel des Klimas tägliche Veränderungen eintreten, welche das Resultat beeinflussen. Ganz besonders gilt dies für das Licht. In den Versuchen, in welchen Zoosporenbildung eintreten soll, wird durch eine Reihe trüber Tage dieselbe behindert und demgemäss kann die Anlage der Gametenbildung den Vorrang gewinnen. Bei dem für das Resultat so wichtigen Wechsel von Licht und Temperatur erschöpfen die aufgezählten Combinationen nicht die Mannigfaltigkeit der vorkommenden Fälle.

II. Entschiedene Neigung zur Gametenbildung.

Dieselbe kann sich bei Netzen vorfinden, welche aus der freien Natur stammen oder sie ist erlangt worden durch die I α bis δ erwähnten Culturmethoden.

Zoosporenbildung wird hervorgerufen:

a) durch Cultur in frischem Wasser bei heller Beleuchtung und einer Temperatur von 16—28°.

b) durch Cultur in 0,5—2 % Nährsalzlösung und Ueberführung in Wasser, sonst wie a.

Die erste Methode kann man mit Erfolg gebrauchen, wenn die Gametenbildung durch Cultur in Zuckerlösung angeregt ist. In jenen Fällen,

in welchen die Neigung in Wasserculturen erstarkt ist, genügt einfaches Wechseln des Wassers nicht immer, die zweite Methode hat für diese wie überhaupt alle Fälle sicheren Erfolg.

III. Entschiedene Neigung zur Zoosporenbildung.

Dieselbe wird hervorgerufen durch die Culturmethoden Ia—c, vor allem aber in hohem Grade durch die Methode IIb.

Gametenbildung wird hervorgerufen:

a) durch Wasser, lange Einwirkung niederer Temperatur $8-12^{\circ}$ bei mässig hellem Licht (Ausschluss directer Sonne), dann Anwendung höherer Temperatur $26-30^{\circ}$ und Dunkelheit.

b) durch Zuckerlösung von $5-10\%$, sonst wie a oder zuerst in Dunkelheit bei 28° , dann mässig hellem Licht und wieder höhere Temperatur.

c) durch Cultur in $0,5\%$ Nährlösung im Dunkeln, Ueberführung in Wasser im Dunkeln, später bei mässig hellem Licht und einer Temperatur von $12-20^{\circ}$.

Auf die sonstigen kleineren Unterschiede in den Versuchen, welche zu demselben Resultat geführt haben, soll hier nicht näher eingegangen werden. Nur möchte ich bemerken, dass in den Sommermonaten die Versuche nicht recht gelingen, weil es schwer zu erreichen ist, während längerer Zeit niedere Temperatur und mässiges Licht gleichzeitig einwirken zu lassen. Namentlich gilt das für die Methode IIIc.

Als weiterer Fall müsste jene merkwürdige Erscheinung erwähnt werden, dass unter besonderen Culturbedingungen die ungeschlechtliche Neigung sich so befestigen kann, dass sie nicht zu unterdrücken ist, in Folge dessen die Gametenbildung unmöglich wird. Der andere denkbare Fall, dass die Neigung zur Gametenbildung in gleichem Grade sich festsetzt, wurde bisher nicht beobachtet, und er ist sehr wenig wahrscheinlich, da bei dem Wassernetz die geschlechtliche Neigung sich stets mit solcher Sicherheit zurückdrängen lässt.

Aus der gegebenen Darstellung ist ersichtlich, dass man nicht in einer kurzen Formel den Unterschied der beiden Fortpflanzungsformen auszudrücken im Stande ist. Wenn man das typische Verhalten des Wassernetzes im Laufe der Sommermonate im Auge behält, so kann man den Unterschied etwa in folgender Weise formuliren: die ungeschlechtliche Fortpflanzung tritt ein, wenn die Netze bei genügend hoher Temperatur, hellem sonnigem Wetter, bei Vorhandensein eines frischen nährsalzhaltigen Wassers in lebhaftem Stoffwechsel begriffen sind, bei welchem Ernährung und Verbrauch sich ungefähr die Wagschale halten. Ein besonderer Reichthum des Wassers an anorganischen Nährsalzen verleiht den Netzen eine besonders lebhafte Neigung zu dieser Fortpflanzungsart.

Die geschlechtliche Fortpflanzung tritt dagegen ein, wenn bei den Netzen durch irgend ein äusseres Moment, sei es niedere Temperatur, zeitweilig geringes Licht oder Dunkelheit, nicht gewechseltes Wasser oder Mangel an Wasser, die Zoosporenbildung verhindert wird und zugleich eine lebhafte Ansammlung organischer Substanz stattfindet. Besonders wirken in dieser Richtung fördernd organische Nährlösungen, vor allem Zucker.

Vergleicht man die Bedingungen beider Fortpflanzungsarten unter einander, so könnte man eine Bestätigung des Satzes von Herbert Spencer¹⁾ herauslesen, nach welchem die ungeschlechtliche Fortpflanzung, die Agamogenesis, bei Ueberfluss, die geschlechtliche oder Gamogenesis bei Mangel auftritt. Düsing²⁾ hat sich Spencer angeschlossen und das Material, welches dafür spricht, zusammengestellt. Dieser Ansicht kommt eine gewisse Berechtigung zu, insofern auch hier bei Hydrodictyon die Agamogenesis an sehr günstige Ernährungsbedingungen gebunden ist, während es für die Gamogenesis charakteristisch ist, dass irgend eine der Bedingungen sich ungünstiger gestaltet. Andererseits sind diese Ausdrücke Ueberfluss und Mangel, Gunst und Ungunst zu unbestimmt, zu wenig bezeichnend; sie sind nicht im Stande die vorhandenen physiologischen Unterschiede hervorzuheben. Wenn man diese Ausdrücke in ihrem eigentlichen Sinne fasst, so erscheinen sie noch weniger passend, weil Ueberfluss an Nahrung geradezu für die Gametenbildung förderlich ist, und die Zoosporenbildung auch selbst bei relativ ungünstigen Lebensverhältnissen erfolgt, wenn nur die Neigung dafür durch vorhergehende Einflüsse geweckt ist.

In seiner eigentlichen Richtigkeit erscheint der Satz Spencer's, wenn man die physiologischen Ursachen der Fortpflanzungsarten unberücksichtigt lässt und sich nur fragt, welche biologische Bedeutung haben beide für das Leben der Alge. Unzweifelhaft weisen die Beobachtungen bei Hydrodictyon wie bei vielen anderen niederen Organismen darauf hin, dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung vor allem der Vermehrung, die geschlechtliche der Erhaltung dient. Je günstiger die allgemeinen Lebensbedingungen sind, je üppiger Wachsthum und Ernährung stattgefunden haben, um so lebhafter erfolgt die Vermehrung auf ungeschlechtlichem Wege. Tritt eine Störung ein, gestalten sich in irgend welcher Beziehung die Lebensverhältnisse ungünstiger, so schützt sich die Pflanze vor dem Untergang durch die Bildung widerstandsfähiger Ruhezellen auf geschlechtlichem Wege. Sie sind bei vielen Algen die Organe, mit Hülfe deren die Pflanze auch ihren Standort verlassen und neue Gebiete aufzusuchen im Stande ist.

1) Herbert Spencer, Principien der Biologie Bd. I. S. 243 u. w.

2) Düsing, Die Geschlechtsregulirung etc. S. 233.

Der Werth einer solchen biologischen Deutung der Fortpflanzung liegt hauptsächlich darin, eine Vorstellung von der phylogenetischen Entstehung derselben zu geben. Es erscheint ausgeschlossen, die physiologischen Ursachen zu erkennen, welche zur Differenzirung der beiden Fortpflanzungsarten geführt haben, weil, wie schon früher betont wurde, beide in ihrem Wesen als unveränderliche Eigenschaften der Zelle uns gegenübertreten. Doch dem Drange der Erkenntniss Folge leistend werden wir annehmen müssen, dass die Agamogenese die ursprünglichere Form der Fortpflanzung ist, aus welcher erst später sich die Gamogenese entwickelt hat. Der Wechsel des Klimas, der Eintritt ungünstiger äusserer Umstände wurde zur Ursache der Bildung der ersten Ruhezellen, anfänglich durch Umwandlung einfacher vegetativer Zellen, bis dass an den verschiedenen Theilen des Systems die Verschmelzungen zweier Zellen, damit die Sexualität an die Stelle trat und von nun an immer bedeutungsvoller für das ganze Leben der Organismen wurde. Wohl kann man sich auch hier die Vorstellung erlauben, dass durch die Vereinigung zweier Zellen eine besonders starke Ernährung ¹⁾ der Ruhezellen erreicht wurde oder, wie Weismann ²⁾ sich ausdrückt, eine besondere Stärkung der Kräfte des Organismus in Bezug auf die Vermehrung. Aber damit wird natürlich das Geheimniss, welches über der ersten Entstehung der geschlechtlichen Fortpflanzung schwebt, nicht erhellt. Es liegt mir fern, auf die Hypothesen, welche sich mit diesen Problemen beschäftigen, einzugehen. Aus meinen Untersuchungen am Wassernetz ergibt sich nur die interessante Thatsache, dass die ungeschlechtliche Fortpflanzung viel leichter und sicherer eintritt, und dass eine bestehende Neigung dafür viel schwieriger zu unterdrücken ist als es bei der geschlechtlichen der Fall ist. Die erstere erscheint als die ursprünglichere einfachere und mehr gefestigte Form, die letztere als die jüngere, abgeleitete, complicirtere und daher schwerer sich befestigende Form. Möglicherweise ist das Verhältniss der beiden Fortpflanzungsweisen schon bei anderen Algen verändert.

5. Der Einfluss des Alters auf die Fortpflanzung.

In allen bis jetzt angeführten Beobachtungen und daran anschliessenden Betrachtungen handelte es sich stets um Netze, welche in ihrer Entwicklung so weit vorgeschritten waren, dass sie sich fortpflanzen konnten. Es ist eine sehr allgemeine Erscheinung bei Pflanzen und Thieren, dass die Fortpflanzungsfähigkeit erst mit einem gewissen Alter beginnt, gewöhnlich dann, wenn die betreffenden Organismen ihr Wachsthum beendet haben. Die Frage stellt sich ein, in welchem Grade bei Hydrodictyon die Fortpflanzung in beiderlei Formen von der Entwicklung der ganzen Zelle abhängig ist.

1) Rolph, Biologische Probleme. Leipzig 1882.

2) Weismann, Die Bedeutung der sexuellen Fortpflanzung Jena 1886 S. 52.

Allerdings erhebt sich gleich die grosse Schwierigkeit, den Moment zu bestimmen, wann unter normalen Verhältnissen die Zellen ausgewachsen sind, ja es ist einfach unmöglich, weil das wichtigste Merkmal, das Aufhören des Wachstums, nicht brauchbar ist. Denn man weiss sehr selten bei einer Zelle, ob der Stillstand im Wachstum auf inneren Gesetzen der Entwicklung oder nur auf zufälligen äusseren Bedingungen beruht. Die charakteristische Wachstumsweise der Zellen findet ihre Ursache in einer vererbten Anlage, deren Entfaltung in stärkster Abhängigkeit von der Aussenwelt steht. Wärme, Licht, Beschaffenheit des Mediums etc. müssen in geeigneter Weise neben und mit einander einwirken, um normales Wachstum zu veranlassen. Schon kleine Abweichungen und Veränderungen führen den Stillstand herbei, es wurde schon früher (S. 376) hingewiesen, wie gerade das Wachstum, unter welchem hier immer nur Vergrösserung der Zelle, sei es der Länge, Dicke oder Breite nach verstanden wird, eine so grosse Empfindlichkeit gegenüber dem Wechsel äusserer Einflüsse zeigt. Von dem Aufhören dieses Processes werden die anderen Functionen der Zelle direct nicht betroffen, die Zelle selbst erhält sich sehr lange Zeit lebendig, wie es besonders die Dunkelculturen beweisen, in welchen die Netze über ein halbes Jahr lang frisch sich erhielten, obwohl sofort nach Entziehung des Lichtes Ernährung und Wachstum aufhörten. Monatelang können die Zellen in der 0,5-Nährlösung im vollen Licht stehen und sich frisch erhalten, obwohl in derselben kein Wachstum zu beobachten ist. Sehr nahe liegt hier die Frage, ob nicht gerade die Verhinderung des Wachstums zu einer Beförderung der Fortpflanzung wird. In der That erscheinen Wachstum und Fortpflanzung bis zu einem gewissen Grade als antagonistische Processe, welcher Gegensatz allerdings erst zu der Zeit deutlich wird, in welcher beide normaler Weise auf einander folgen. So lange lebhaftes Wachstum herrscht, sind die erworbenen Nahrungsstoffe absorbirt, können die Fortpflanzungsanlagen sich nicht entwickeln. Sie können es erst dann, wenn äussere Bedingungen ihnen zu Hülfe kommen, welche das Wachstum zum Stillstand bringen. Dabei ist nicht zu vergessen, dass eine untere Grenze des Alters existiren wird, unter welcher allein Wachstum herrscht, und eine obere, von welcher ab die Fortpflanzung an und für sich im Vorrang ist, während zwischen diesen Grenzen beide Functionen mit einander kämpfen, da sie sich bei den Zellen des Wassernetzes gegenseitig ausschliessen. Hier bei Hydrodictyon liegen augenscheinlich diese Grenzen ziemlich weit auseinander, und in Folge dessen tritt die Correlation von Wachstum und Fortpflanzung sehr deutlich hervor.

Der beste Weg, von dem Verhältniss der beiden Functionen ein klares Bild zu gewinnen, besteht darin, eine Cultur ganz junger Netze von Zeit zu Zeit zu prüfen und den Zeitpunkt zu bestimmen, wann die Fortpflanzung überhaupt möglich ist. Dabei berücksichtige ich zunächst nur

die Zoosporenbildung, weil sie jedenfalls in directerer Beziehung zum Wachsthum steht als die Gametenbildung und vor allem leicht und sicher hervorzurufen ist. Bei einer solchen Cultur beobachtete ich, dass etwa 3 Wochen alte Netze zur Zoosporenbildung genöthigt werden konnten. Die Zellen hatten eine Länge von 0,8—1 mm. In der freien Natur wird bei der rascheren Entwicklung eine kürzere Zeit nothwendig sein. Bei sehr günstigen äusseren Bedingungen erlangen die Zellen des Wassernetzes eine Maximalgrösse von 8—10 mm. Während der ganzen Zeit, in welcher die Zellen von 0,8 bis auf 8, also das Zehnfache ihrer Länge heranwachsen können, hängt es von äusseren Bedingungen ab, ob Wachsthum oder Fortpflanzung herrscht. So lange alle Lebensverhältnisse in günstigster Combination auf die Zelle einwirken, erfolgt ununterbrochen Wachsthum. Erst wenn durch irgend eine kleine Veränderung dieser Combination, z. B. zeitweilig zu niedere Temperatur in der Nacht oder zu hohe am Tage, eine Störung hervorgerufen wird, welche das Wachsthum behindert, kann die Anlage zur Zoosporenbildung freie Bahn für ihre Entfaltung gewinnen; die Zelle wächst nicht mehr, sie bildet Zoosporen, vorausgesetzt —, dass die Bedingungen sich in den für die Bildung nothwendigen Grenzen halten. In dem Maasse, als die Zelle sich ihrem Grössenmaximum nähert, von welchem ab überhaupt Fortpflanzung eintritt, brauchen diese Veränderungen der äusseren Bedingungen immer kleiner zu werden, um den Sieg der Fortpflanzung herbeizuführen. Bei der oben erwähnten Cultur gelang es nach 3 Wochen nur mit Hülfe einer 0,5-Nährlösung die Zoosporenbildung hervorzurufen, nach 4 Wochen, wo die Zellen beträchtlich gewachsen waren, genügte ein Wechsel des Wassers, um dasselbe zu erreichen.

Wie verhält es sich jetzt mit der geschlechtlichen Fortpflanzung? Die früher besprochenen Beobachtungen haben gezeigt, dass dieselbe erfolgt, wenn die Anlage zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung zurückgedrängt ist. Erstere steht zur letzteren in einem ähnlichen Verhältniss wie diese zum Wachsthum. Bei guten Culturen, bei frischem Material aus dem Freien, welches ja fast nie aus ausgewachsenen Zellen besteht, muss daher nach Unterdrückung des Wachsthums eine Neigung zur Zoosporenbildung zunächst hervortreten, bis nach Unterdrückung derselben die Neigung zur Gametenbildung sich durchbricht. Natürlich kommt es auch vielfach vor, dass junge Netze plötzlich in solche Bedingungen versetzt werden, dass sofort die Neigung zur Gametenbildung erweckt wird. Man würde vermuthen, dass vielleicht bei höherem Alter, bei der Annäherung an das Grössenmaximum aus inneren Gründen die Anlage zur geschlechtlichen Fortpflanzung in den Vordergrund tritt gegenüber der ungeschlechtlichen. Doch lassen die Beobachtungen bisher nichts davon bemerken; ich beobachtete sogar, dass die grössten Zellen von 8—10 mm im Herbst 1889, aus dem Freien geholt, sehr entschieden un-

geschlechtlich gestimmt waren, wenn auch die Erregung der geschlechtlichen Neigung schliesslich gelang.

So lange lebhaft wachsende Culturen zur Verfügung stehen, befindet sich die Grösse der Zellen in einem proportionalen Verhältniss zum Alter. Da aber das Wachsthum so leicht für lange Zeit stillstehen kann, ist man meistens nicht im Stande aus der Grösse auf das Alter schliessen zu dürfen. Der grösste Theil der Versuche ist mit einem Material angestellt worden, dessen Alter nicht zu bestimmen war, sondern bei welchem sich sicher nur die allerverschiedensten Grössen nachweisen liessen. Es bietet daher ein gewisses Interesse, zu untersuchen, in wie weit die Fortpflanzung von der Grösse der Zellen abhängt. In noch viel stärkerem Grade, als vorhin festgestellt wurde, gelang der Nachweis, dass selbst sehr wenig ausgewachsene Zellen fähig sind, sich fortzupflanzen. So wurde Gametenbildung bei Netzen beobachtet, deren Zellen eine Länge von 0,09—0,11 oder von 0,15—0,22, von 0,22—0,25, von 0,24—0,32, von 0,32—0,48 u. s. w. besaßen, und wenn man damit die ausgewachsenen Zellen von 8—10 mm vergleicht, so ergibt sich innerhalb sehr weiter Grenzen eine Unabhängigkeit der Fortpflanzung von der Grösse der Zellen. Aehnlich, wenn auch nicht so auffallend, verhält es sich mit der Zoosporenbildung, welche noch bei Netzen beobachtet wurde, deren Zellen eine Länge von 0,24—0,48 oder 0,32—0,48 u. s. w. besaßen.

Die auffallende Thatsache, dass so wenig ausgewachsene Zellen die Fähigkeit besitzen, sich fortzupflanzen, erklärt sich zum Theil aus der Annahme, dass auch ohne Wachsthum mit dem Alter Veränderungen in den Zellen vor sich gehen, welche die Entfaltung der Fortpflanzungsanlagen möglich machen. In jenen von Anfang an verfolgten Culturen liess sich in den ersten Wochen weder Zoosporen- noch Gametenbildung erreichen bei Zellen, welche unter 0,5 mm lang waren, während solche Zellen leicht dazu gebracht werden konnten, nachdem sie mehrere Monate bei unveränderter Grösse älter geworden waren. Wir können also sagen, dass bei 1—20 Tage alten Zellen von einer Länge unter 0,5 mm überhaupt bisher keine Fortpflanzung beobachtet wurde, dass mit steigendem Alter auch kleinere Zellen und zwar bis zu solchen von 0,1 mm die Fähigkeit erlangen, sich fortzupflanzen, dass dagegen die Zellen unter 0,1 mm gewöhnlich trotz noch so hohen Alters steril bleiben. Zellen von 0,5—10 mm gleichgültig welchen Alters, wachsen oder pflanzen sich fort je nach den äusseren Bedingungen.

Die Anlagen der beiden Fortpflanzungsformen sind daher nicht gleich zur vollständigen Entwicklung zu bringen in dem Zustande, in welchem sie sich in der Zoospore befinden, sie erlangen erst die Fähigkeit von einem gewissen Entwicklungszustande der aus den Zoosporen entstehenden Zelle. Die eine Möglichkeit wäre, dass die Anlagen zwar an und für sich von Anfang an entfaltungsfähig sind, aber die ganze Zelle erst dann in

Mitleidenschaft ziehen können, wenn die anderen Bestandtheile und Organe derselben, das Protoplasma, die Zellkerne, der Zellsaft sich etwas entwickelt haben. Auf der anderen Seite liegt die Annahme nahe, dass die Anlage selbst eine innere Entwicklung durchmachen müsse: z. B. eine gewisse Grösse erlangen oder sich vermehren müsse, bis die Aussenwelt entscheidet, ob überhaupt und welche von den Anlagen sich entfalten kann. Wahrscheinlich werden beide Momente, innere Entwicklung der Anlage und Entwicklung der übrigen Zellbestandtheile erforderlich sein, so dass erst von einer gewissen Grösse der Zelle resp. von einem gewissen Alter derselben an die Fortpflanzung erfolgen kann. Dabei bleibt die interessante Thatsache bestehen, dass in so auffallendem Grade Fortpflanzung und Wachsthum von einander unabhängige Processe vorstellen. Weil aber zugleich beide mit derselben Function der Ernährung im engsten Zusammenhange stehen, so existirt die früher hervorgehobene Beziehung, dass der Stillstand des Wachsthums in Folge äusserer Bedingungen den Eintritt der Fortpflanzung nach sich zieht, vorausgesetzt, dass die Bedingungen derselben sonst günstig sind.

6. Das Verhalten des Wassernetzes in der freien Natur.

In der bisherigen Untersuchung war versucht worden auf dem Wege des Experimentes über die Abhängigkeit der Fortpflanzung von der Aussenwelt Aufschluss zu gewinnen. Die andere Methode, welche von den meisten ähnliche Fragen behandelnden Arbeiten befolgt wird, geht darauf aus, das Verhalten des Organismus in der freien Natur während des ganzen Jahres zu beobachten. Auf diesem Wege müsste sich schliesslich entscheiden lassen, ob ein regelmässiger Generationswechsel existirt oder ob die Fortpflanzungsformen in mannigfaltigstem Wechsel anscheinend in Abhängigkeit von der Aussenwelt auftreten.

Leicht lässt sich auch feststellen, dass bei Hydrodictyon in der freien Natur eine vollständige Regellosigkeit in der Fortpflanzungsweise herrscht, welche um so auffallender erscheint, wenn man mehrere Jahre hintereinander die Beobachtungen macht, und welche sich mit der Auffassung des Generationswechsels kaum vereinigen lässt. In allen Jahreszeiten, mit Ausnahme der eigentlichen Wintermonate, während welcher kein Standort mit Hydrodictyon mir zur Verfügung stand, kommen nebeneinander, oder bald die eine bald die andere Form vorherrschender, beide Fortpflanzungsarten vor. Schon Alexander Braun¹⁾ bemerkte es, in Folge dessen er den Gedanken aussprach, dass äussere Verhältnisse massgebend einwirken müssen. So wie ich aber die nothwendigen Beziehungen zu erforschen suchte, welche zwischen der Beschaffenheit eines bestimmten Standortes und der an ihm auftretenden Fortpflanzungsweise existiren,

(1 A. l. Braun, Verjüngung etc. S. 238. Anmerkung 2.

legten sich so grosse Schwierigkeiten in den Weg, dass es im besten Falle nur möglich erschien, allgemeine und wenig präzise Vorstellungen dieser Beziehungen zu gewinnen. Diese Erkenntniss der Mängel der Methode führte auf die Nothwendigkeit des Experimentes.

Die Hauptschwierigkeit liegt in der Beurtheilung der physiologischen Verhältnisse eines Standorts, besonders wenn es sich um Zellenpflanzen des Wassers handelt wie bei Hydrodictyon. Bei einem Standort, wie z. B. dem grossen Teich bei Neudorf in der Nähe von Basel, wirken Verhältnisse zusammen, welche quantitativ und qualitativ sehr schwer ihrer Bedeutung nach abgeschätzt werden können, zumal die Zellen für Unterschiede empfindlich sind, welche sich der directen Beobachtung entziehen. Die Beschaffenheit des Bodens, des Wassers, die Temperaturen bei Tag und Nacht, die Beleuchtung, die Wirkung anderer Gewächse, die Concurrenz mit anderen Netzen bei sehr dichtem Wuchs, alles vereinigt sich in mannigfaltigen, dabei von Tag zu Tag wechselnden Combinationen. Man macht sich die grosse Schwierigkeit besonders klar, wenn man an demselben Standort zu gleicher Zeit Netze mit geschlechtlicher, andere mit ungeschlechtlicher Fortpflanzung findet oder Netze, welche beides gleichzeitig zeigen. Wie soll man herausfinden, auf welche physiologischen Bedingungen diese Verschiedenheit zurückzuführen ist? Man kann sich ungefähre Vorstellungen bilden, welche in den meisten Fällen falsch sein werden.

Dazu kommt die schon mehrfach erwähnte Erscheinung der Nachwirkungen, in Folge deren die an einem Standort beobachtete Fortpflanzung in keiner Beziehung zu stehen braucht zu den gerade waltenden Verhältnissen, vielmehr das Resultat früherer, nicht mehr vorhandener Bedingungen sein kann. Schliesslich ist noch zu berücksichtigen bei Algen wie Hydrodictyon, dass die Feststellung der an einem Standort herrschenden Fortpflanzung mit kritischer Vorsicht erfolgen muss. In den meisten Fällen findet die Untersuchung des Materiales zu Hause statt, vielleicht erst mehrere Tage nachdem die Algen in anderem Wasser unter ganz anderen Licht- und Temperaturbedingungen im Zimmer gelebt haben. Dadurch können aber die Neigungen oder die Fortpflanzungsweisen direct andere werden als an dem Standort selbst.

Da stets die Beobachtungen in der freien Natur für die vorliegenden Fragen sehr wichtig sind, ist es um so nothwendiger, die bezeichneten Schwierigkeiten im Auge zu behalten und nicht die dadurch bedingten Schranken zu übersehen, welche sich der Erkenntniss der physiologischen Ursachen der Fortpflanzung gegenüberstellen. Selbst bei Experimenten, bei welchen die Wirkung einer einzelnen äusseren Bedingung für sich in Betracht gezogen und ihrem Werth nach beurtheilt werden kann, ist der richtige Einblick oft schwer zu erhalten. Es wäre ein Irrthum, zu glauben, mit Hilfe von Experimenten gleich vollen Aufschluss zu gewinnen. Die grosse Unkenntniss

der verwickelten Lebensprocesse, welche mit und nebeneinander in einer Zelle vor sich gehen, führt es mit sich, dass die Wirkung der einzelnen Bedingung, welche doch meistens auf alle Lebensprocesse Einfluss ausübt, nur in Rücksicht auf die Fortpflanzung oft schwer genau abzuschätzen ist. Die bisherigen Experimente entsprechen auch noch nicht allen Anforderungen exacter Versuche wie in der Chemie und Physik, da gewisse Bedingungen besonders die sehr wichtige des Lichtes nicht in genau bekanntem und bei den Versuchen sich gleich bleibendem Maasse angewendet wurden. Man müsste wohl zu künstlichen Lichtquellen greifen, um constante bekannte Lichtmengen für die Versuche zur Verfügung zu haben. Ebenso lässt sich bisher der Eintritt der Nährsalze in die Zelle, welcher doch vor allem wichtig erscheint, nicht genau bestimmen. So erklärt es sich, dass man bei den vielen Versuchen im Laufe mehrerer Jahre doch auf Resultate stösst, welche nicht mit der Erwartung übereinstimmen, was sich allerdings wesentlich nur auf die geschlechtliche Fortpflanzung bezieht.

Wenn nun auch die Experimente in ihren Resultaten einer stetigen scharfen Kritik wegen der noch bestehenden Fehlerquellen zu unterziehen sind, so geben sie uns doch, wie ich glaube gezeigt zu haben, sichere Andeutungen über die Wirkung der Aussenwelt auf die Zelle. Von dem gewonnenen Standpunkt aus kann man jetzt eher daran gehen, die Standortverhältnisse in der freien Natur zu beurtheilen und sie andererseits zur Bestätigung oder Erweiterung der Anschauungen zu benutzen. Am richtigsten wird die Erklärung ausfallen, wenn an einem freien Standort ein auffallender Wechsel in der Fortpflanzung erfolgt, wenn nach langer ungeschlechtlicher Vermehrung Gametenbildung auftritt in einem Grade, der völliges Verschwinden der Algen nach sich zieht, wie es z. B. der Fall war im Juli 1889 im Teich von Neudorf. Hier hing die Erscheinung wahrscheinlich damit zusammen, dass das Wasser des Teiches, welcher an der einen Stelle vollgepfropft mit Netzen war, gerade dort zurückging, so dass die Unmasse Netze in relativ wenig Wasser einer glühenden Julihitze während des Tages ausgesetzt waren. Ganz andere Ursachen wirken vielleicht dahin, dass im Herbst häufig die Gametenbildung sehr reichlich auftritt. Die kühlen Nächte behindern die Zoosporenbildung, ebenso die vielen trüben Tage, welche andererseits ausreichend Licht geben, so dass die Bildung von Nahrungsstoffen vor sich gehen, und die Gametenbildung um sich greifen kann. In der freien Natur handelt es sich jedenfalls in der Mehrzahl der Fälle um Netze, bei welchen die beiden Anlagen der Fortpflanzung ungefähr sich das Gleichgewicht halten, in Folge dessen alles in Betracht kommt, was ich früher ausführlich über diesen Punkt behandelt habe (S. 395). Dabei kann es sehr wohl sich ereignen, dass unter besonderen Umständen, bei bestimmten Standorten lebhaftere Neigungen zu der einen Fortpflanzungsform sich bemerkbar

machen, wie es der Fall sein muss bei jenen Netzen, welche nach Klein¹⁾ in der Nähe von Freiburg bis in den Winter hinein sich durch Zoosporenbildung erhielten. Hier könnte in der That eine reichliche Zufuhr von Nährsalzen die wesentliche Rolle gespielt haben. So wird man sich meistens eine Vorstellung bilden können über den Zusammenhang von Standort und Fortpflanzung, ohne dabei zu vergessen, dass die Gefahr sehr nahe liegt, in Irrthümer zu verfallen.

7. Der Generationswechsel bei Hydrodictyon und anderen Algen.

In meiner vorläufigen Mittheilung habe ich die Resultate meiner Arbeit in folgender Weise bezeichnet. Das wichtigste Ergebniss meiner Untersuchung besteht darin, dass das Wassernetz keinen bestimmten, auf inneren Gründen beruhenden Wechsel von geschlechtlichen und ungeschlechtlichen Generationen zeigt, dass überhaupt keine besonderen Generationen, sei es der einen oder der anderen Fortpflanzungsform existiren; vielmehr besitzt jede Zelle des Netzes die Anlagen für beide Formen, und über das jedesmalige Eintreten derselben entscheiden die äusseren Bedingungen. Ich fügte noch bei, dass man in gewisser Weise die Zellen mit jenen enantiotropen Substanzen wie Schwefel, Salpeter etc. vergleichen könne, welche in zweierlei Formen vorkommen und welche die eine oder die andere annehmen je nach den äusseren Bedingungen. Mit diesem Vergleiche sollte nur soviel gesagt werden, dass in beiden Fällen die Fähigkeit, in verschiedenen Formen aufzutreten, in der specifischen unerklärlichen Natur, sei es der Zelle oder der Substanz des Schwefels etc. begründet ist, dass aber die Entscheidung darüber, welche Form angenommen wird, von der Aussenwelt abhängt.

Die seit jener Mittheilung neu beobachteten Thatsachen haben diese Sätze nur noch bestätigt, und es existirt eine nothwendige Aufeinanderfolge von ungeschlechtlichen und geschlechtlichen Generationen bei dem Wassernetz jedenfalls nicht. Die Frage des Generationswechsels ist aber damit noch nicht gelöst, weil ein sehr wichtiger Punkt, die Entwicklung der Zygoten, bisher nicht berücksichtigt worden ist. Wir wissen durch Pringsheim's²⁾ treffliche Untersuchung, dass die Zygoten bei der Keimung grosse ungeschlechtliche Schwärmer bilden, dass die daraus entstehenden Polyeder auf ungeschlechtlichem Wege die ersten jungen Netze erzeugen. Liegt hier ein nothwendiger Entwicklungsgang vor, so müsste man von einem wahren Generationswechsel sprechen. Die Frage lässt sich theoretisch nicht entscheiden, sondern einzig auf dem Wege des Experimentes. Man

1) L. Klein, Vergleichende Untersuchungen über Morphologie und Biologie der Fortpflanzung bei der Gattung Volvox; Berichte der Naturf. Gesellsch. Freiburg V 1, 1890, S. 81.

2) Pringsheim, Monatsberichte der Kgl. Akad. d. Wissensch. Berlin 1861.

müsste versuchen sowohl die Polyeder wie auch schon die Zygoten direct zur Erzeugung von Gameten zu nöthigen; es könnte auch bei ersteren gelingen ¹⁾, bei letzteren nicht. Meine eigenen Versuche sind negativ ausgefallen, doch kann ich kein Gewicht darauf legen, weil sie zu wenig zahlreich und mannigfaltig waren. Nur eine Beobachtung machte ich dabei, welche der Erwähnung werth ist. Wie Pringsheim nachgewiesen hat, und ich bestätigt gefunden habe, bleiben die Zygoten eine ganze Zeit hindurch ruhend, bis sie keimen. Diese Ruhezeit ist aber keine nothwendige, da es gelingt, die Zygoten gleich nach ihrer Bildung zum Wachsthum zu bringen, indem man sie in 0,5-Nährsalzlösung bei vollem Licht cultivirt. Sie wachsen allmählich heran und bilden nach einigen Wochen Zoosporen, sowie sie in frisches Wasser übergeführt werden. Die gewonnenen Polyeder erzeugten bisher nur ungeschlechtliche Zoosporen.

Es bleibt also die Möglichkeit bestehen, dass Hydrodictyon einen Generationswechsel in dem Sinne besitzt, dass aus den auf geschlechtlichem Wege erzeugten Zygoten immer zuerst aus inneren Ursachen 1 oder 2 ungeschlechtliche Generationen entstehen. Von diesen ab entscheiden dann die äusseren Bedingungen, welche Art der Fortpflanzung stattfindet.

Die bei Hydrodictyon sich darbietenden Probleme des Generationswechsels drängen sich auch bei allen anderen Algen auf; ein weites Gebiet neuer Untersuchungen eröffnet sich, da die bisher herrschenden Auffassungen mehr auf gelegentliche Beobachtungen als auf planvoll durchgeführte Versuche sich gründen. Bereits Vines ²⁾ hat den Generationswechsel für alle Thallophyten geleugnet mit Ausnahme der Coleochaete und Characeen, obwohl auch für diese bisher der Nachweis nicht geliefert ist. Denn bei Coleochaete wäre es möglich, dass die Zellscheibe, welche aus der Oospore sich entwickelt, unter geeigneten Bedingungen direct zu einer geschlechtlichen Pflanze wird, und die Characeen haben überhaupt keinen Generationswechsel, weil der wesentliche Charakter, die Selbstständigkeit der ungeschlechtlichen Generation, die aus der Eispore entwickelt wird, nicht vorhanden ist.

Wenn man von der Entwicklung der Geschlechtsproducte absieht und sich zunächst darauf beschränkt, das Verhältniss von ungeschlechtlicher und geschlechtlicher Fortpflanzung bei den Algen zu erkennen, so tritt schon jetzt aus den Beobachtungen Anderer und von mir aufs Deutlichste hervor, dass die Aussenwelt dieses Verhältniss in sehr hohem Grade beeinflusst. Ein sehr anschauliches Beispiel dafür liefert uns *Botrydium granulatum*, dessen Lebensgang in so ausgezeichneter Weise durch

1) Pringsheim l. c. S. 10 erwähnt, dass er in dem Polyeder zweierlei Schwärmsporen, grössere und kleinere, beobachtet habe; doch treten beide Formen zu jungen Netzen zusammen.

2) S. Vines, On alternation of generations in the Thallophytes. Journal of Botany 1879.

Rostafinski¹⁾ und Woronin bekannt geworden ist. Je nach den äusseren Bedingungen erzeugen die vegetativen Pflanzen Zoosporen oder vegetative Ruhezustände in verschiedenen Formen; durch Einwirkung der Insolation, der Trockenheit lassen sich Sporen hervorrufen, welche Gameten bilden. Botrydium wäre jedenfalls einer besonderen Untersuchung werth, um die physiologischen Bedingungen der Fortpflanzung zu erkennen. Wenn auch selten so deutlich, zeigt sich immerhin bei anderen Algen die gleiche Erscheinung der Abhängigkeit von der Aussenwelt. Strasburger²⁾ äusserte sich auf Grund seiner reichen Erfahrungen, dass die Algen unter den günstigsten Verhältnissen sich gewöhnlich nur auf ungeschlechtlichem Wege vermehren, meist aber reichlich Geschlechtsorgane erzeugen, sobald ihnen der Tod zu drohen beginnt. Besonders abhängig von äusseren Bedingungen erscheint die ungeschlechtliche Fortpflanzung; es ist bekannt, wie leicht viele Algen wie Ulothrix, Oedogonium, Conferva etc. zur Zoosporenbildung zu bringen sind. Es scheint als wenn bei diesen Algen unter normalen Verhältnissen die Anlage zur Zoosporenbildung in der Zelle schon meist entfaltet ist, so dass ein leichter Anstoss, eine Veränderung des Mediums genügt, um die Entwicklung der Schwärmer hervorzurufen. Die Ansicht von Walz, dass der Sauerstoff des Wassers einen solchen Reiz abgibt, ist für viele Fälle richtig aber nicht allgemein gültig. Vaucheria geminata, welche gern in rasch fliessendem Wasser vorkommt, bildet Zoosporen, wenn man sie in stehendes Wasser überführt, obwohl ihr in letzterem weniger Sauerstoff zur Verfügung steht als in ersterem. So werden die verschiedensten Momente die Veranlassung zur ungeschlechtlichen Fortpflanzung werden können, und sie werden auch nicht immer so einfach herauszufinden sein, so z. B. bei Algen wie den Cladophora-Arten, bei welchen die Zoosporenbildung anscheinend so unregelmässig und launenhaft auftritt.

Verwickelter und zweifelhafter liegt die Frage bezüglich der Abhängigkeit der geschlechtlichen Fortpflanzung von der Aussenwelt bei vielen Algen, sei es isogame oder oogame Befruchtung. Hierbei können die gelegentlichen Angaben über das Erscheinen der Geschlechtsorgane wenig entscheiden, und richtig ausgeführte Versuche fehlen. Doch weist wenigstens jetzt schon eine Reihe Erfahrungen darauf hin, dass äussere Bedingungen eine massgebende Rolle dabei spielen, so z. B. gerade die Angaben von Rostafinski und Woronin, nach welchen die Geschlechts-sporen bei Botrydium durch allmähliches Eintrocknen bei hellem Licht hervorgerufen werden. Eigene Beobachtungen und Versuche sind von mir bei Chlamydomonas und Vaucheria angestellt worden. Seit vielen Jahren wende ich eine einfache Methode an, um bei Chlamydomonas pulvisculus mit Sicherheit Gameten zu erlangen. Die Zoosporen werden auf Torf aus-

1) Rostafinski und Woronin, Ueber Botrydium granulatum. Leipzig 1877.

2) Strasburger in Pringsheims Jahrbücher, VII. 1869—70. S. 420.

gesät, welcher mit einer sehr verdünnten Nährsalzlösung getränkt worden ist. Allmählich bilden sich grosse pallmellenähnliche Gallertmassen durch lebhaft vegetative Theilung. Wenn man solche Torfstücke in Wasser bringt, so werden schon nach 24 Stunden unzählige Gametenschaaren entwickelt. Ebenso gelingt es zu verschiedenen Zeiten des Jahres die Geschlechtsorgane der *Vaucheria geminata* zu erhalten. An solchen Standorten, wo lebhaft fliessendes Wasser vorhanden ist, scheint die Alge selten zu fructificiren. Bringt man aber sterile Rasen der Alge in Culturgefässe und stellt sie im Zimmer hell, so entwickeln sich in einigen Wochen stets die Geschlechtsorgane in grösster Anzahl. Diese Beobachtungen sind natürlich zu vereinzelt und lassen verschiedene Deutungen zu; doch genügen sie, um die Wahrscheinlichkeit zu stützen, dass äussere Bedingungen das Auftreten der Geschlechtsorgane reguliren.

In neuester Zeit hat auch Klein¹⁾ in einer interessanten Arbeit über *Volvox* den grossen Einfluss der Aussenwelt auf die Fortflanzung hervorgehoben und die Idee eines regelmässigen Generationswechsels aufgegeben, welche er noch in der vorletzten Abhandlung zu retten gesucht hatte²⁾. Klein stützt seine Ansicht ausschliesslich auf das Verhalten von *Volvox* in der freien Natur, in welcher statt einer regelmässigen Aufeinanderfolge ungeschlechtlicher und geschlechtlicher Colonieen eine bunte Mannigfaltigkeit und vollständige Regellosigkeit derselben zu beobachten ist. Zwischen den Extremen, rein ungeschlechtlichen, rein weiblichen, rein männlichen Colonieen gibt es eine grosse Menge Mittelformen, verschiedene Combinationen, von welchen Klein nicht weniger als 20 aufzählt. Diese Combinationen finden sich an den verschiedensten Standorten in sehr verschiedenen Mengeverhältnissen; die sexuellen Colonieen können den Höhepunkt ihrer Entwicklung zu den verschiedensten Zeiten des Jahres erreichen, und an benachbarten Standorten können alle möglichen Formen dieser Colonieen gleichzeitig entwickelt sein. Klein glaubt nun, auf sein reiches Beobachtungsmaterial gestützt, dass die ganze chaotische Mannigfaltigkeit in der Zusammensetzung von *Volvox aureus* der Hauptsache nach, der Eintritt oder das Ausbleiben der sexuellen Fortpflanzung ausschliesslich durch äussere Ursachen bedingt ist. In welcher Weise allerdings die Aussenwelt eingreift, wie es zu erklären ist, dass zu derselben Zeit an demselben Standort die verschiedenen Combinationen vorkommen, ist bisher vollkommen räthselhaft. Die Versuche Klein's sind negativ ausgefallen; seine Ideen werden sich kaum beweisen lassen und erhellen das Dunkel nicht.

Gerade die verwickelten Erscheinungen bei *Volvox* mahnen zur Vorsicht, diesen Gedanken über die Abhängigkeit der Fortpflanzung von äusseren Ursachen nicht gleich zu schnell auf alle Fälle zu übertragen und

1) L. Klein, Vergleichende Untersuchungen über Morphologie und Biologie der Fortpflanzung bei der Gattung *Volvox*; Ber. der Naturf. Gesellsch. Freiburg V, 1.

2) L. Klein, Morphologische und biologische Studien über die Gattung *Volvox*; Pringsheims Jahrb. f. wissenschaftl. Bot. XX, 1889.

zu übertreiben. Denn innere Ursachen, mögen sie auch noch so räthselhaft für uns erscheinen, spielen jedenfalls eine wichtige Rolle; umfassen sie doch den ganzen verwickelten Complex von Stoffen und Kräften, welchen wir uns in der vererbten Anlage vorstellen müssen. Wahrscheinlich muss diese Anlage selbst wieder eine gewisse innere Entwicklung durchmachen, und es ist wohl möglich, dass bei manchen Algen auch die Zeit ihrer Fructification erblich fixirt ist wie bei höheren Pflanzen. Dabei bleibt auch die Frage noch offen, ob nicht die Producte der geschlechtlichen Fortpflanzung aus inneren Gründen zuerst ungeschlechtlich sich fortpflanzen müssen, bevor sie wieder zur Sexualität schreiten können. Nur ein Fall ist mir bisher bei Algen bekannt, wo die äusseren Bedingungen darüber entscheiden, in welcher Weise die sexuell erzeugten Keime sich entwickeln. Es ist dies die merkwürdige Alge *Phyllobium dimorphum*, welche in Blättern von *Lysimachia* lebt. Wie ich früher¹⁾ nachgewiesen habe, entstehen durch Copulation zweier geschlechtlich differenzirter Gameten Zygoten, welche sich in für sie günstigen Verhältnissen zu geschlechtlichen Sporen entwickeln, dagegen bei ungünstigen Bedingungen zu ungeschlechtlich sich fortpflanzenden Zellen heranwachsen. Hier ist augenscheinlich das Verhältniss der beiden Fortpflanzungsformen ein ganz abweichendes gegenüber *Hydrodictyon*. Schon mehrfach behauptet ist das vollständige Fehlen eines nothwendigen Generationswechsels bei den Pilzen, bei welchen überhaupt die Fortpflanzungserscheinungen in sehr auffallendem Grade von äusseren Ursachen, besonders von der Ernährung abhängen. Bei *Mucorineen*, deren Entwicklungsgang so häufig mit demjenigen der Algen verglichen worden ist, wird nicht bloss das Auftreten von Gonidien und Zygosporien-Fructification durch die Aussenwelt regulirt, sondern es gelang *Brefeld*²⁾ auch die Zygosporien von *Mucor dichotomus* direct wieder zur Bildung von Zygosporien zu bringen, während gewöhnlich bei der Keimung zuerst ungeschlechtliche Fortpflanzung erfolgt. Allerdings sind auch bei den Pilzen die Verhältnisse durchaus noch nicht so aufgeklärt; hat doch selbst *Brefeld*³⁾, welcher über ein so reiches Beobachtungsmaterial verfügt, später seine Ansicht zurückgenommen und die Meinung ausgesprochen, dass die äusseren Umstände von keiner wesentlichen Bedeutung für das Auftreten der geschlechtlichen Fortpflanzung seien.

Der rasche Ueberblick, welchen ich im Anschluss an meine Arbeit über *Hydrodictyon* gegeben habe, soll nur zeigen, welch' eine Fülle von neuen Untersuchungen sich aufdrängt, um die Frage zu entscheiden, welchen Einfluss die Aussenwelt auf die Fortpflanzungserscheinungen ausübt; meine eigene Untersuchung möge nur dazu anregen und den Weg anbahnen, mit Hülfe des Experimentes dem wichtigen Problem näher zu treten.

1) Klebs, Beiträge zur Kenntniss niederer Algenformen. Bot. Zeitg. 1881.

2) Brefeld, Botanische Zeitung 1875, S. 847—48.

3) Brefeld, Schimmelpilze; IV, 1881, S. 74—75.

Arbeiten aus dem botanischen Institut zu Marburg.

VIII. C. Giesenhagen: Die Hymenophyllaceen.

(Hierzu Tafel XIV—XVII).

I. Einleitung.

Wie aus den Notizen der Sammler und aus gelegentlichen Bemerkungen in der Litteratur hervorgeht, leben die *Hymenophyllaceen* unter ganz eigenartigen Verhältnissen, sie haben in den feuchten, schattigen Wäldern der Tropen und der subtropischen Länder ihre eigentliche Heimat. Ihr Standort befindet sich meistens hoch über dem Erdboden auf den Stämmen und Aesten der Waldbäume oder auf überhängendem Gestein in feuchten Gebirgsschluchten. Es ist klar, dass diese Farne durch gewisse Eigenthümlichkeiten in ihrem Aufbau befähigt sein müssen, eine so extreme Lebensweise, wie sie ihnen durch die äusseren Umstände geboten ist, zu ertragen. Wir wollen nun versuchen, im Folgenden die Morphologie und Anatomie dieser interessanten Farnfamilie in ihren Beziehungen zu den äusseren Lebensbedingungen zu schildern.

Es werden sich im Laufe der Untersuchung auch einige Resultate ergeben, welche für die Systematik der *Hymenophyllaceen* zu verwerthen sind. Auf dem letzteren Gebiete herrscht heute eine ausserordentliche Verwirrung, da fast jeder Autor, welcher eine Untersuchung der *Hymenophyllaceen* unternahm, eine neue Anordnung und die Neuauftellung von Gruppen und Gattungen für gut befunden und die vorhandenen Artbegriffe nach seinem Ermessen abgewandelt hat. Aus diesem Grunde wäre eine eingehende Neubearbeitung der Systematik dieser Familie von einem einheitlichen Gesichtspunkte aus ein für die Wissenschaft sehr erwünschtes Unternehmen. Zum grossen Theil scheint mir an der herrschenden Verwirrung in der Artumgrenzung der Umstand schuld zu sein, dass die Bearbeiter bei der Aufstellung von Arten und bei der Vereinigung derselben zu grösseren Abtheilungen auf die eigenartige Biologie der *Hymenophyllaceen* nicht die nöthige Rücksicht nahmen. Die *Hymenophyllaceen* gehören zum Theil zu denjenigen Gewächsen, welche sich gegenüber den Einflüssen der äusseren Umstände ein ziemlich grosses Mass von Bildsamkeit bewahrt haben, welche also mit Leichtigkeit inconstante Standortvarietäten bilden. Dem Systematiker werden, wenn er nicht Gelegenheit nimmt diesen Umstand eingehender zu prüfen, leicht zwei Exemplare derselben Species, welche durch verschiedene äussere Umstände beeinflusst different ausgebildet sind, als besonderen Arten zugehörig erscheinen, zumal da für die Untersuchung in vielen Fällen nur mangelhaftes Herbarmaterial vorhanden ist. Eine Neubearbeitung der Systematik der Hymenophyllaceen würde also bei der Fixirung der Speciebegriffes auf die Beein-

flussung der Formen durch die äusseren Umstände ihre Aufmerksamkeit zu lenken haben. Auch hinsichtlich der Lösung dieser Aufgabe kann die vorliegende Arbeit, welche einige Beziehungen zwischen dem Bau und der Lebensweise der *Hymenophyllaceen* klar zu legen sucht, für die Systematik nutzbringend sein. Es sollen ausserdem, wenn sich dazu Gelegenheit bietet, Andeutungen über etwa gefundene Incongruenzen und Unrichtigkeiten gegeben werden. Für eine eingehende Bearbeitung der Systematik hielt ich das mir zugängliche Material nicht für genügend.

Ausser dem Herbarium der Universität Marburg standen mir zur Verfügung die *Hymenophyllaceen* der Universitätsherbarien von Göttingen, Leipzig und München, das Herbarium Grisebachianum und das Privatherbar des Herrn Professor Goebel. Von dem Berliner Herbarium, dessen *Hymenophyllaceen* für einen andern Bearbeiter reservirt werden, waren mir einige Doubletten überlassen worden. Von Herrn Alfred Viereck, zur Zeit in Blumenau in Brasilien, wurden mir einige interessante brasilianische Formen zur Bearbeitung übersandt. Ich nehme die Gelegenheit, sämmtlichen Herren Professoren und Direktoren, durch deren Güte mir die Benutzung des genannten Materials für meine Arbeit gestattet war, sowie dem Herrn Viereck für seine Sendung, auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank auszudrücken. Dem Herrn Professor Goebel bin ich noch zu ganz besonderem Danke verpflichtet für die Ueberlassung werthvollen Alkoholmaterials und für das Interesse, dass er in jeder Weise meinen Arbeiten zuzuwenden die Güte hatte.

Es ist wohl selbstverständlich, dass ich bei der folgenden Darstellung der Wachstums- und Gestaltungsverhältnisse bei den *Hymenophyllaceen* das in der Litteratur gegebene Thatachenmaterial eingehend berücksichtigt und, soweit es mir geboten erschien, im Zusammenhang wieder gegeben habe. Natürlich ist das nicht ohne Prüfung der betreffenden Angaben älterer Autoren geschehen, sofern es das Material gestattete. Um nicht durch allzuhäufige Hinweise auf die Litteratur die Darstellung ungeniessbar zu machen, füge ich hier eine kurze Uebersicht über die wichtigeren einschläglichen Arbeiten ein.

Die *Hymenophyllaceen* sind schon mehrfach zum Gegenstande zusammenhängender Untersuchungen gemacht worden. Die älteren Autoren Swartz¹⁾, Hooker²⁾, Presl³⁾, Van den Bosch⁴⁾ und andere be-

1) Synopsis filicum. Kiliae 1806.

2) Species filicum. Vol. I.

Hooker et Greville, Icones filicum. Garden Ferns, Exotic flora, Icones plantarum Vol. X, XVII, Second Century of Ferns etc.

3) Hymenophyllaceae. Prag 1843.

4) Inleiding tot de Kennis der Hymenophyllaceae und Eerste Beidräge tot de Kennis der Hymenophyllaceae. Verslagen en Mededeel. d. K. Acad. Amsterdam 1861. Deel XI.

Hymenophyllaceae Javanicae. Natuurk. Verh. der K. Akad. Deel IX.

mühten sich entsprechend der vorwiegenden Richtung in der wissenschaftlichen Botanik ihrer Zeit die zahlreichen Formen dieser Farnfamilie zu beschreiben und in systematische Ordnung zu bringen; von kleineren Arbeiten, welche gleichfalls eine rein systematische oder pflanzengeographische Richtung verfolgen, will ich hier als für meine Arbeit bedeutungsvoll nur die folgenden nennen: Kunze, *Analecta pteridographica* ¹⁾; Derselbe, über *Hooker species filicum* ²⁾; K. Müller, über einige bisher verwechselte Arten der Farrngruppe der *Hymenophyllaceae* ³⁾; Karsten, *Flora Columbiae* ⁴⁾; Sturm, über einige neue *Hymenophylleen*arten aus der Verwandtschaft des *Hymenophyllum sericeum* Sw. ⁵⁾; Baker, *Dekription of six new Species of simplefronded Hymenophyllaceae* ⁶⁾; Luerßen, *Peridologische Notizen* ⁷⁾. Ferner nenne ich hier noch Taschner, *de duabus Trichomanum speciebus* ⁸⁾. Eine eingehende Untersuchung der *Hymenophyllaceen* hinsichtlich ihres Baues und ihrer Entwicklung hat zuerst Mettenius ⁹⁾ unternommen. Er begnügt sich damit, einfach die vorgefundenen morphologischen, anatomischen und entwicklungsgeschichtlichen Thatsachen zu constatiren; ausser gelegentlichen Hinweisen auf ein ähnliches oder abweichendes Verhalten in andern Farnfamilien finden wir in seiner Arbeit nur wenige Versuche, aus den beobachteten Verhältnissen allgemeine Schlüsse für das Verständniss der untersuchten Pflanzengruppe abzuleiten. Prantl ¹⁰⁾, der jüngste Monograph der *Hymenophyllaceen*, hat nun die von Mettenius gefundenen Thatsachen und die Resultate seiner eigenen Untersuchungen für die Systematik und Abstammungslehre zu verwerthen gesucht. Er glaubt zeigen zu können, dass sich in den *Hymenophyllaceen* die Ausgangspunkte für die allen übrigen Ordnungen der Farne und vielleicht noch den Cycadeen zukommenden Charaktere erkennen lassen, und glaubt Anhaltspunkte zu finden, welche den Gang der morphologischen Differenzirung von der Mooskapsel zum einfachsten Typus der Gefässkryptogamen mit einiger Wahrscheinlichkeit anzudeuten gestatten. Prantl hat sich bei seinen Untersuchungen und Deductionen vorwiegend auf die vegetative Generation der *Hymenophyllaceen* beschränkt und auch dort nur einzelne Punkte, vornehmlich den Aufbau und die

1) Leipzig 1837.

2) Bot. Zeitg. 1847. p. 183.

3) Bot. Zeitg. 1854. p. 713.

4) Tom. 2. p. 107 flgd.

5) Bot. Zeitg. 1859. p. 297.

6) Linn. Soc. Journ. bot. Vol. IX.

7) Bot. Centralbl. IX. p. 438 und XI. p. 26.

Flora 1876. Nr. 15.

8) Jena 1843.

9) Ueber die Hymenophyllaceae. Abhandl. d. math.-phys. Classe der Kgl. Sächs. Gesellsch. der Wiss. Bd. VII.

10) Morphologie der Gefässkryptogamen. Heft I. Leipzig 1875.

Entwicklung des Blattes eingehender betrachtet. Mögen auch diese Untersuchungen hinreichen, um dazuthun, dass in den *Hymenophyllaceen* die Hauptcharaktere der übrigen Farngruppen ebenfalls vorhanden sind, so sind sie doch keineswegs genügend, um die Phylogenesis des *Hymenophyllaceentypus* in irgend einer Weise verständlich zu machen. Die Darstellung, welche Prantl von dem Entwicklungsgange von der Moosbüchse zur einfachsten Farnpflanze giebt, hat einen durchaus hypothetischen Charakter. Es ist nicht zu leugnen, dass wir in der Moosbüchse und in der vegetativen Farnpflanze homologe Gebilde vor uns haben; ob aber wirklich die erstere eine Station in dem Entwicklungsgange der letzteren darstellt, darüber wissen wir bis jetzt, auch nach Prantls Untersuchungen, nichts. Es können ebensogut Moosbüchse und Farnpflanze die Endpunkte zweier Entwicklungsreihen sein, welche von einer uns unbekannten längst verschwundenen Urform ihren gemeinsamen Ursprung genommen haben.

Um die verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den Muscineen und Filicineen klarzulegen, ist es erfolgreicher gewesen, die geschlechtliche Generation der *Hymenophyllaceen* zum Gegenstande der Untersuchung zu machen, wie es Goebel in seinen Beiträgen zur Keimungsgeschichte einiger Farne¹⁾ gethan hat. Er macht in der citirten Arbeit vor allen Dingen auf die Uebereinstimmung der Prothallien mit den Moosprotonemen aufmerksam und zeigt, wie in sehr einfacher Weise aus dem Aufbau dieser Gebilde der phylogenetische Zusammenhang zwischen denselben zwangslos abgeleitet werden kann.

Studien über das *Hymenophyllaceenprothallium* finden wir ausserdem noch in den schon erwähnten Arbeiten von Taschner und Mettenius und ferner bei Janczewski und Rostafinski²⁾ und bei Bower³⁾, welch letzterer auch die Erscheinungen der Aposporie und Apogamie bei *Trichomanes* beschreibt.

Damit dürfte die Aufzählung der wesentlichsten Arbeiten über die *Hymenophyllaceen* abzuschliessen sein. Was sonst noch an Litteratur benutzt worden ist, soll gelegentlich im Text angegeben werden.

Bevor wir nun an die Behandlung des Stoffes herantreten, mögen hier noch einige Betrachtungen Platz finden, welche die Art der für die vorliegende Arbeit bedeutungsvollen Fragestellung charakterisiren und rechtfertigen sollen. Wir haben die Absicht, die Morphologie und Anatomie der *Hymenophyllaceen* in ihrer Beziehung zu den für diese Gewächse gegebenen Lebensbedingungen zu betrachten; wir wollen den Zusammenhang ins Auge fassen, welcher zwischen der eigenartigen Aus-

1) Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg VII. p. 74.

2) Note sur le Prothalle de l'*Hymenophyllum Tunbridgense*. Mem. de la soc. nat. de Cherbourg. 1875.

3) On some Normal and Abnormal Developments of the Oophyte in *Trichomanes*.

bildung der *Hymenophyllaceen* und den ihre Lebensweise bedingenden äusseren Verhältnissen besteht. Dass ein solcher Zusammenhang existirt, bedarf keines Beweises, es fragt sich nur, welcher Art derselbe ist.

Albrecht von Haller hat die Ansicht ausgesprochen, dass die Natur aller Orten gerade diejenigen Gewächse hervorbringt, welche den vorhandenen örtlichen Verhältnissen angemessen sind. Er wollte damit die geographische Verbreitung der Pflanzen, das oft durch weite Strecken getrennte Vorkommen gleicher Pflanzenarten erklären. Wenn nun auch dieser Satz in dem Sinne, wie Haller ihn auffasste, für uns unannehmbar ist, so können wir doch in demselben ein Körnchen Wahrheit finden, einen Gedanken, der freilich in etwas veränderter Fassung auch von Darwin ausgesprochen worden ist, wenn er sagt, dass die den Verhältnissen nicht oder schlecht angepassten Wesen im Kampf ums Dasein von den günstiger organisirten verdrängt werden. Dabei fällt nun freilich der Natur, das heisst hier der Gesammtheit der äusseren Umstände, eine ganz andere Rolle zu. Sah Haller sie als die Erzeugerin oder Erzieherin zweckmässiger Formen an, so erblickt Darwin in ihr die Vernichterin alles Unzweckmässigen. Der Erfolg ist derselbe, das Vorhandene ist den Umständen angemessen gebildet. Darwin nahm an, dass Pflanzen und Thiere die Fähigkeit besitzen, nach jeder beliebigen Richtung hin zu variiren. Die Fixirung der durch die Variation erlangten neuen Eigenschaften aber steht unter dem Einfluss der durch die äusseren Verhältnisse ausgeübten Selection. Alles den Umständen angemessene erhält sich und bildet sich weiter, alles nicht passende geht zu Grunde. Nägeli ¹⁾ hat indes gezeigt, dass die thatsächlichen Verhältnisse durch die Ansicht Darwins keine genügende Erklärung finden. Vielmehr lässt sich aus den Thatsachen schliessen, dass das Variiren der Pflanzen aus innern Ursachen und nicht allseitig, sondern in bestimmten Richtungen erfolgt. Dieser Gedanke, den auch Goebel in der Einleitung zu seinen pflanzenbiologischen Schilderungen ausspricht, birgt eine Gefahr für die naturphilosophische Betrachtung in sich, und in der That wird er von Lason ²⁾ benutzt, um daraus ein Argument gegen die Berechtigung der auf dem Boden der Entwicklungsgeschichte stehenden Weltanschauung abzuleiten. Die Gewächse sind ohne Ausnahme ihren Lebensbedingungen entsprechend gebaut, sind in gewissem Grade den äusseren Verhältnissen angepasst. Da die jetzt existirenden zweckmässigen Formen durch Variiren in bestimmten Richtungen aus anders gebauten entstanden sind, so ist der Gedanke Nägelis in dem Sinne missverstanden worden, als ob die bestimmten Richtungen, in denen das Variiren der Gewächse aus innern

1) Ueber den Einfluss der äussern Verhältnisse auf die Varietätenbildung im Pflanzenreiche. Bot. Mittheilg. II. p. 103.

Theorie der Abstammungslehre 1884.

2) In seinen Vorlesungen über die Grundprobleme der Philosophie.

Ursachen erfolgt, auf die höhere Zweckmässigkeit hinzielen, als ob die Variation aus inneren Ursachen bestimmte Bahnen einschlägt, welche zu einer vollkommeneren Ausbildung führen müssen. Damit wäre dann die Zweckmässigkeitsidee, wie sie die Naturwissenschaften bis in unser Jahrhundert hinein beherrschte, wieder in ihre vollen Rechte eingesetzt. Das hat indes nicht entfernt in der Absicht Nägelis gelegen. Es kann nicht oft genug wiederholt werden, dass die Richtungen der Variation, von denen Nägeli spricht, anzusehen sind als die Wirkung einer Summe von inneren Ursachen, deren Zusammenhang mit den äusseren Umständen wir durchaus nicht kennen. Die Beziehung zwischen den durch Variation erworbenen Eigenschaften und den äussern Umständen wird vielleicht überhaupt erst durch die Einwirkung der letzteren hergestellt, sei es durch ausgeübte Selection im Laufe der Generationen, sei es durch direkte Beeinflussung. Dass die existirenden Pflanzenformen zweckmässig gebaut sind, beruht einfach darauf, dass unzweckmässig gebaute nicht existenzfähig sind. Dass aber die von der Variation eingeschlagenen Richtungen nicht immer zu zweckmässigen Formen geführt haben, beweist der Umstand, dass ausserordentlich viele Pflanzenformen vollständig zu Grunde gegangen sind.

Kehren wir nach diesen allgemeinen Betrachtungen zu unserer speciellen Aufgabe zurück. Die *Hymenophyllaceen* sind den eigenthümlichen Lebensbedingungen, unter denen sie wachen, angepasst; sie würden sonst nicht existiren können. Wir werden bei der Betrachtung der einzelnen Anpassungserscheinungen, die wir als erbliche Eigenschaften der Formen erkennen, nicht fragen, zu welchem Zweck ist diese oder jene Einrichtung an den Pflanzen vorhanden? — Das Wort Zweck involvirt für mich immer den Begriff des Bewussten, Gewollten; — sondern wir werden vielmehr fragen, wie functionirt die Einrichtung unter den vorliegenden äusseren Bedingungen, welche Folge hat das Vorhandensein derselben für das Leben und Gedeihen der vorliegenden Species? Natürlich können wir auch den umgekehrten Weg einschlagen. Wir kennen die vitalsten Bedürfnisse der Pflanzen, Licht, Luft, Nahrung und Sicherheit gegen äussere Angriffe. Wir kennen ferner die Verhältnisse, unter welchen diese Lebensbedingungen am Standort der *Hymenophyllaceen* dargeboten sind. Welches sind nun die Einrichtungen im Bau der Pflanzen, die es ihnen ermöglichen, an dem Standorte zu leben trotz des von dem gewöhnlichen abweichenden Verhältnisses, in dem die Existenzbedingungen dargeboten sind? Die erstere Art der Fragestellung war für mich während der Arbeit die nächstliegende, für die Darstellung meiner Resultate halte ich die letztere für angemessener.

Es ist noch ein Punkt kurz zu erwähnen. Vorhin schon wurde darauf hingewiesen, dass die *Hymenophyllaceen* gegenüber dem direkten Einfluss der äusseren Umstände ein relativ hohes Mass von Bildsamkeit

besitzen. In ein und demselben Rasen finden wir z. B. oft die Blätter einer Art different ausgebildet, je nachdem sie von ihren Nachbarblättern überdeckt und beschattet oder der Belichtung frei ausgesetzt sind. Es fragt sich, ob aus solchen durch den direkten Einfluss der Umstände erzeugten Veränderungen Anpassungserscheinungen resultiren können. Diese Frage muss auf Grund der Erfahrungen in anderen Pflanzenfamilien bejaht werden. Lässt man Samen von *Ranunculus sceleratus* unter Wasser keimen, so entwickelt die Keimpflanze zunächst Schwimmblätter, welche offenbar für die Ausübung ihrer Funktionen unter den vorhandenen Umständen geeigneter sind als die normal sich bildenden Laubblätter. — Ist *Lythrum salicaria* gezwungen, in einem flachen Wasser zu wachsen, so entwickelt es an seinem submersen Stengelteilen anstatt des Korkes ein von Schenk als Aërenchym bezeichnetes Gewebe, das den Gasaustausch an den unter Wasser befindlichen Theilen der Pflanze erleichtert. Das sind bekannte Beispiele, welche beweisen, dass die Reaction des Pflanzenkörpers auf die direkte Einwirkung der äusseren Verhältnisse zu zweckmässigen Abänderungen des normalen Baues führen kann. So werden wir auch bei den *Hymenophyllaceen* vermuthen dürfen, dass manche als Anpassung zu bezeichnende Erscheinung nicht zu den erblichen Eigenschaften der Pflanzen gehört. Es treten z. B. bisweilen auf den Blattunterseiten gewisser Species, wenn dieselben dem Substrat angeschmiegt wachsen, reichlich braune Haarwurzeln auf, welche die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen in die Zellen des Blattes vermitteln und zugleich als Haftorgane dienen. An andern Exemplaren derselben Arten fehlen diese Haarwurzeln auf den Blättern, oder sie sind doch nur spärlich vorhanden. So leicht wie in diesem Falle lassen sich die Verhältnisse meistens nicht übersehen, besonders weil die Formen oft derart verändert sind, dass die Identität derselben mit der normal gebauten nicht wie hier ohne weiteres einleuchtet. Um klar in jedem Falle zu entscheiden, welche Eigenschaften erblich sind, und welche innerhalb des Variationsbezirkes der Species liegen, müsste man langandauernde Culturversuche machen oder Gelegenheit haben, die *Hymenophyllaceen* in ihrer Heimat eingehend zu studiren.

II. Orientirung über die biologischen Verhältnisse der Hymenophyllaceen.

Die Lebensweise und die Gestaltung der Gewächse stehen, wie wir gesehen haben, in Beziehung zu dem Verhältniss, in welchem Licht und Wärme, Athemluft, Feuchtigkeit und Nährstoffe ihnen zugänglich sind. Versuchen wir nun, aus den spärlichen Angaben der Herbarien und aus der Litteratur uns die Verhältnisse klar zu machen, welche an den Standorten der *Hymenophyllaceen* vorliegen.

Die Mehrzahl der *Hymenophyllaceen* lebt im dichten Urwalde der Tropen und der subtropischen Gebiete. Nur wenige Formen vermögen in andern Zonen zu existiren. Wie etwa die europäischen Arten dürfen wir diese wohl unbedenklich als Ueberbleibsel aus einer früheren Epoche ansehen, in welcher andere klimatische Bedingungen und eine wesentlich andere Zusammensetzung der Flora den *Hymenophyllaceen* auch in höheren Breiten günstigere Existenzbedingungen gewährten. Die Belichtung des niedern Pflanzenwuchses im Urwalde ist nur schwach. Selten kann ein Sonnenstrahl durch das dichte Blätterdach der Waldriesen hindurch seinen Weg finden zu den Farnen, welche am Boden oder epiphytisch auf überwachsenen Stämmen und auf Felsblöcken sich angesiedelt haben. Die *Hymenophyllaceen* sind also typische Schattenpflanzen, denen infolge ihres eigenartigen Baues das schwache, diffuse Licht des geschlossenen Hochwaldes zur Assimilation genügt. Hinsichtlich der Zufuhr von Kohlensäure und Athemluft sind am Standort der *Hymenophyllaceen* keine auffälligen Verhältnisse geboten. Die zarten Blattflächen und ebenso auch die Sprosse und Wurzeln stehen jederzeit mit atmosphärischer Luft in Berührung. Eigenartig ist dagegen das Verhältniss, in welchem Wasser und Nährstoffe den *Hymenophyllaceen* an ihrem Standorte zur Verfügung stehen.

Wenn wir uns die meteorologischen Verhältnisse des Urwaldes der Tropen und des subtropischen Gebietes vergegenwärtigen, so werden wir erkennen, dass es in demselben den Pflanzen im allgemeinen an Feuchtigkeit nicht gebrechen kann. An jedem Morgen trieft infolge der ausgiebigen Thaubildung der Urwald der Gebirge von Feuchtigkeit, auch wenn es nicht geregnet hat. Diese Wasserzufuhr wird den im Waldboden wurzelnden Gewächsen für den Lauf des Tages genügen, zumal da in der Wasserdampf-gesättigten Atmosphäre die Verdunstung verhältnissmässig langsam vor sich geht. Die *Hymenophyllaceen* haben aber den meisten übrigen Pflanzen des Urwaldes gegenüber ein besonders gesteigertes Wasserbedürfniss. Sie besitzen zum Theil überhaupt keine Wurzeln; aber auch an vielen bewurzelten Formen erkennt man, dass die Zellen des Blattes auf eine direkte Wasseraufnahme von aussen her angewiesen sind. Dadurch wird eine Benetzung der Blattfläche zur Lebensbedingung. So paradox es auch klingen mag, von den Wasserpflanzen des festen Landes zu reden, die *Hymenophyllaceen* sind meist im eigentlichen Sinne solche Wasserpflanzen. Diejenigen unter ihnen, welche im dichten Moosrasen kriechend nur kleine Blattflächen entwickeln, werden wohl infolge dieser Lebensweise auch für die regen- und thaufreie Zeit des Tages von hinreichender Feuchtigkeit umgeben sein. Die epiphytischen Formen aber sind von dem wassergesättigten Waldboden abgeschnitten und nur der direkten Benetzung durch den herabtropfenden Thau oder Regen ausgesetzt. Es müssen bei diesen Formen also Einrichtungen vorhanden sein,

welche denselben einen reichlichen Wassergenuss auch nach dem Aufhören der Thaubildung sichern. Wir werden später im Laufe der Untersuchung einige solche Vorrichtungen kennen lernen. Dass dieselben aber auch nur functioniren in der wasserdampferfüllten Luft des geschlossenen Urwaldes und unter den Benetzungsvorgängen, welche an diesen Standort gebunden sind, das wird gezeigt durch eine Thatsache, welche Goebel in seinen pflanzenbiologischen Schilderungen erwähnt. In der Nähe von Tjibodas auf Java war der Urwald an einer Stelle angeschlagen und dadurch dem Licht und der Luft freier Eingang verschafft worden. Die Folge war, dass eine weite Strecke waldeinwärts alle *Hymenophyllaceen* vertrockneten und zugrunde gingen. Auch wo sonst mitten im Urwalde einer der Waldriesen vor Altersschwäche zusammengebrochen ist, sodass in dem sonst undurchdringlichen Laubdach eine Lücke entsteht, kann man dieselbe Beobachtung machen. Die Mehrzahl der *Hymenophyllaceen* des Urwaldes kann an der freien Luft nicht existiren, in kürzester Frist gehen die Pflanzen durch Vertrocknen zugrunde, eine Erfahrung, welche uns lehrt, wie empfindlich diese Gebilde gegen Wassermangel sind und wie wichtig also für sie die Vorrichtungen sein müssen, durch welche ihnen unter gewöhnlichen Umständen ein hinreichender Wasservorrath gesichert ist.

Die wenigen *Hymenophyllaceen*, welche ausserhalb des Urwaldes zu leben im Stande sind, werden zum Theil gegen Wassermangel nicht ganz so empfindlich sein. *Hymenophyllum Tunbridgense* z. B. ist eine fast über den ganzen Erdball verbreitete Species, es kommt in Schottland ebensowohl vor als am Kap der guten Hoffnung, in Brasilien und in Neuseeland. Janczewski und Rostafinski, welche das Farnkraut in der Umgebung von Cherbourg fanden, schreiben von demselben ¹⁾: »L. *Hymenophyllum tunbridgense* croît dans les fentes des rochers et sur leur surface verticale, et exige une humidité constante; c'est pourquoi il choisit le côté du Nord et l'indique toujours d'une manière aussi précise qu'une aiguille magnetique«. Seit in der Umgebung von Cherbourg der Wald abgeschlagen wurde, ist *Hymenophyllum Tunbridgense* dort nicht mehr gefunden worden. Wir sehen, dass immerhin auch bei dieser Art ein geringer Unterschied in der Feuchtigkeit des Standortes die Existenz der Pflanzen beeinträchtigt. Dennoch wird wohl der relativ geringe Anspruch dieser Form an die Wasserversorgung als der hauptsächlichste Faktor anzusehen sein, welcher es ihr gestattete aus einer früheren Periode, in welcher der Urwald und die *Hymenophyllaceen* weiter verbreitet waren, an Orten zurückzubleiben, welche für die Mehrzahl der *Hymenophyllaceen* die Bedingungen für eine gedeihliche Entwicklung nicht mehr boten.

1) a. a. O.

In anderen Fällen dürften lokale Standortverhältnisse das Vorkommen von *Hymenophyllaceen* ausserhalb des Urwaldes erklären. Es giebt in den Vereinigten Staaten von Nordamerika ausser dem lebenszähnen *Trichomanes radicans*, welches ähnlich wie *Hymenophyllum Tunbridgense* fast über die ganze Erde verbreitet ist, soweit mir bekannt geworden ¹⁾, nur noch eine einzige *Hymenophyllacee*, das *Trichomanes Petersii* A. Gray, welches an einem einzigen Standorte im Berglande von Alabama gefunden worden ist. Ueber den Standort dieser Pflanze wird in Hookers *Icones plantarum* ²⁾ folgendes angegeben: »found only on the face of an insulate sandstone rock, within the reach of the spray of a waterfall«. Es fehlt also dem kleinem Farne nicht an den rechten Existenzbedingungen, feuchter Luft und ständiger Benetzung. Aehnliche Beispiele zum Beleg meiner Ansicht dürften sich noch hin und wieder finden.

Wenn wir nun noch einmal unsere Betrachtung kurz überblicken, so zeigt sich deutlich, welche eigenartigen biologischen Verhältnisse bei den *Hymenophyllaceen* herrschen. Den Schattenpflanzen, Epiphyten, Wasserpflanzen, allen drei Kategorien müssen wir die Mehrzahl der hierhergehörigen Formen gleichzeitig unterordnen, und es ist deshalb von vorne herein zu erwarten, dass der Aufbau und die Entwicklung der *Hymenophyllaceen* in vielen Beziehungen von dem Schema abweichen werden, das wir aus den gewöhnlichen Vorkommnissen im Pflanzenreiche abstrahirt und als das normale anzusehen uns gewöhnt haben.

Wir haben bisher bei der Betrachtung der biologischen Verhältnisse der *Hymenophyllaceen* nur die vegetative Generation berücksichtigt; über die Lebensweise der Prothallien ist wenig hinzuzufügen. Dieselben stehen an Umfang hinter den Polypodiaceen-Prothallien zurück. Sie wachsen am Boden oder häufiger an der Rinde der Bäume, oft kriechen sie zwischen Moos oder zwischen den Haarwurzeln der ungeschlechtlichen Pflanzen umher, so dass ihnen wohl stets eine genügende Feuchtigkeit zur Verfügung steht. Das Licht dringt freilich zu ihren Standorten wohl bisweilen noch spärlicher als zu den Blättern der vegetativen Pflanzen. Es ist indes bei ihnen keine sehr ausgiebige Production von Baustoffen erforderlich, da sie sehr langsam wachsen, wie aus einigen Culturversuchen Goebels hervorgeht. In seiner oben citirten Arbeit über die Keimung einiger Farne erwähnt Goebel, dass aus Sporen von *Trichomanes maximum* und *Trichomanes diffusum*, welche er in Java aussäete, Prothallien hervorgingen, die nach achtmonatlichem Wachsthum noch nicht bis zur Bildung von Geschlechtsorganen vorgeschritten waren. Nach einer gütigen Mittheilung des genannten Autors kann ich hinzufügen, dass aus

1) vergl. auch Baker, On the geographical distribution of Ferns in Transact. of the Linnean Soc. 1867. Vol. XXVI. p. 305.

2) vol. 10. pl. 986.

Sporen erzeugene Prothallien von *Trichomanes radicans* auch nach drei vollen Jahren ungestörten Wachstums noch keine Antheridien und Archegonien gebildet haben.

Grössere flächenförmige Ausbreitungen, welche einer ausgiebigeren Assimilation dienen könnten, sind bei den Prothallien der *Hymenophyllaceen* nicht vorhanden; eine schmale, bandartige Verbreiterung des ursprünglichen Zellfadens oder seitliche, schmale, blattähnliche Anhängsel bei den *Trichomanes*-arten, ein kleiner in bandartige Stränge zerschlitzter Thallus als Fortsetzung des anfänglichen Keimfadens bei *Hymenophylleen* sind es, welche vorwiegend die vegetativen Functionen dieser Prothallien zu erfüllen haben.

Entsprechend der langsamen Entwicklung haben die *Hymenophyllaceen*-Prothallien eine lange Lebensdauer, ausserdem sind dieselben mit Vorrichtungen zu vegetativer Vermehrung ausgerüstet.

Das Gesagte mag zur vorläufigen Orientirung über die biologischen Verhältnisse der *Hymenophyllaceen* genügen.

III. Die geschlechtliche Generation.

Für eine Untersuchung über den Bau und die Entwicklung der Prothallien bei den *Hymenophyllaceen* ist brauchbares Untersuchungsmaterial nur sehr schwierig zu beschaffen. Wegen ihrer Kleinheit sind die Prothallien in ihrer Heimat nur bei der sorgfältigsten Nachsuche aufzufinden; die Aussaat der Sporen aber ergiebt, wie oben erwähnt wurde, selbst nach Jahren noch kein verwendbares Resultat. Mettenius und Prantl haben für ihre Untersuchungen ausser den durch Aussaaten erlangten sterilen Prothallien ebenso wie Taschner nur getrocknetes Material vor sich gehabt, wie es sich gelegentlich in grösseren Rasen der Herbar-exemplare vorfindet. Janczewski und Rostafinski fanden in der Nähe von Cherbourg in Rasen von *Trichomanes Tunbridgense* lebende Prothallien, so dass sie für diese Form wenigstens eine naturgetreue Beschreibung liefern konnten. Goebel konnte bei seinem Aufenthalt in den Tropen ein reichliches Material von Prothallien verschiedener *Trichomanes*- und *Hymenophyllum*-arten sammeln und für seine Untersuchungen verwenden. Bowers Untersuchungsmaterial lieferten lebende Räschen von Prothallien, welche sich in den Culturräumen der *Hymenophyllaceen* in Kew angesiedelt hatten. Da alle diese Untersuchungen sich aus leicht ersichtlichen Gründen nur auf wenige Arten der so formenreichen Familien erstrecken konnten, so ist unsere Kenntniss über die Prothallien der *Hymenophyllaceen* noch sehr lückenhaft zu nennen. Mir stand für meine Arbeit ausser gelegentlich in Herbariumrasen aufgefundenen, keimenden Sporen und sterilen Prothallien durch die Güte des Herrn Professor Goebel auch das von demselben in Java gesammelte und ein aus Kew stammendes Alkoholmaterial zur Verfügung. Ausserdem fand ich an einem

Rindenstücke mit *Hymenophyllum caudiculatum*, welches Herr Alfred Viereck auf dem Spitzkopf bei Blumenau in Brasilien gesammelt hatte, sehr schön ausgebildete Prothallien mit Geschlechtsorganen. Das Material genügte vollkommen, um mir die Formverhältnisse der geschlechtlichen Generation bei den *Hymenophyllaceen* bekannt zu machen und die bisherigen Arbeiten anderer Autoren zu illustriren, nicht aber um die Kenntnisse von den *Hymenophyllaceen*-Prothallien in irgendwie erheblicher Weise über den gegenwärtigen Standpunkt hinauszuführen. Wenn ich trotzdem einen Abschnitt über die geschlechtliche Generation der *Hymenophyllaceen* meiner Arbeit einfüge, so geschieht das, um derselben eine gewisse Vollständigkeit und Abgeschlossenheit zu geben, und weil ich glaube, dass auch bloss eine übersichtliche Zusammenfassung des bisher bekannten immerhin den Werth hat, den Leser auf die noch schwebenden Fragen aufmerksam zu machen und zu erneuten Untersuchungen anzuregen.

Die Sporen der *Hymenophyllaceen* sind denen der übrigen Farne ähnlich. Sie enthalten ausser den wesentlichen Plasmabestandtheilen auch Chlorophyll. Mit dem letzteren Umstande wird es zusammenhängen, dass bei den Sporen der *Hymenophyllaceen* das Austrocknen den Verlust der Keimfähigkeit zur Folge hat. Sie sind nur entwicklungsfähig, wenn sie nach der Reife direct in die für die Keimung günstigen Verhältnisse gelangen, d. h. wenn Wärme und Feuchtigkeit in zureichendem Masse vorhanden sind, welche beide unter den normalen Umständen an den Standorten der ungeschlechtlichen Pflanze nicht fehlen werden. Dass übrigens die Keimung der Sporen gleich nach der Reife ohne längere Ruhepause erfolgt, lässt sich auch daraus schliessen, dass bei den *Hymenophyllaceen*-Exemplaren der Herbarien vielfach im Innern der Indusien oder gar noch innerhalb der Sporangien keimende Sporen gefunden werden, welche bereits die ersten Zelltheilungen erfahren haben.

Im Allgemeinen ist der Vorgang bei der Keimung der Sporen von *Trichomanes* der folgende. Die ergrünte Spore dehnt sich unter Wasseraufnahme stark aus, indem sie drei seitliche Vorwölbungen bildet. Dadurch wird das Exosporium längs der drei Scheitellanten gesprengt, und die Vorwölbungen treten aus den entstandenen Spalten hervor. Wenn dieselben eine gewisse Grösse erreicht haben, treten die ersten Theilungswände auf. Diese stehen entweder so, dass sie im Mittelpunkt der Spore zusammentreffen und das ganze Gebilde in drei Zellen zertheilen, deren jede eine der Vorwölbungen als Spitze hat; oder aber die Zellwände, drei an der Zahl, trennen die Vorwölbungen von der Zelle ab, so dass jetzt eine centrale und drei peripherische Zellen vorhanden sind.

Mettenius glaubte, dass das erstere Verhalten nur den Sporen von *Hymenophyllum*, das letztere denen von *Trichomanes* ausschliesslich zukomme. Diese Ansicht findet sich auch bei Prantl wieder. Goebel hat indes nachgewiesen, dass dieselbe auf einem Irrthum beruht. Da auch

sonst bei der Keimung Abweichungen vorkommen können, indem etwa die Ausbildung einer Wand unterbleibt oder verzögert wird, so ist es fraglich, ob überhaupt die oben beschriebenen Keimungsvorgänge innerhalb der einzelnen Arten constant sind, ja ob überhaupt die tripolare Entwicklung als ein charakteristisches Merkmal der *Hymenophyllaceen*-spore anzusehen ist. Für *Trichomanes maximum* wenigstens constatirt Goebel, dass in allen von ihm untersuchten Fällen die bei der Keimung sich etwas verlängernde Spore durch eine einzige Wand getheilt wird. Später sprossen dann aus der Sporenzelle Zellreihen als Seitenzweige hervor. Dieses Verhalten giebt dem genannten Forscher Veranlassung, die Ansicht auszusprechen, dass auch die gewöhnliche Dreitheilung respective die Abgrenzung dreier peripherischer Zellen bei den Sporen nichts anderes ist als eine frühzeitig eintretende regelmässige Verzweigung des Prothalliumfadens, wie sie, freilich nicht regelmässig, auch bei *Polypodium sinnosum*, *Vittaria parvula* und *Platyserium* vorkommt. Vielleicht kann zur Stütze dieser Ansicht noch die Beobachtung von Mettenius herangezogen werden, dass bei der Dreitheilung der Sporen die Wände nicht gleichzeitig, sondern nach einander auftreten.

Verfolgen wir nun die Keimung der Sporen von *Trichomanes* weiter, so sehen wir, dass aus den von der Sporenzelle abgegrenzten Zellen, beziehungsweise aus den drei Theilzellen je ein Zellfaden hervorgeht, der durch Quertheilung seiner Scheitelzelle in die Länge wächst. Gewöhnlich wird einer von den Aesten des dreistrahligem Prothalliums bedeutend gefördert, während die beiden andern im Wachsthum zurückbleiben; der eine von ihnen pflegt sein Wachsthum nach Bildung eines kurzen Zellfadens damit abzuschliessen, dass seine Endzelle zum Rhizoid wird d. h. zu einer schmalen, cylindrischen, bisweilen mehrarmig zertheilten Zelle mit charakteristisch braungefärbter Wand. Ganz gleiche Rhizoiden können auch als Seitenäste aus jeder Zelle des Prothalliumfadens, selbst noch aus der ursprünglichen Sporenzelle hervorsprossen. Verzweigung pflegt überhaupt bei den Fäden sehr reichlich aufzutreten. Sie entsteht in der Weise, dass in der Mitte oder mehr am vordern Ende der einzelnen Zellen des Fadens eine Ausstülpung gebildet wird, welche heranwächst und dann durch eine Zellwand von der Mutterzelle abgegrenzt wird. Bisweilen kommt es vor, dass aus einer Fadenzelle mehrere Seitenzweige hervorgehen. Im allgemeinen entstehen die seitlichen Auszweigungen an den Fäden in fortschreitender Reihenfolge. Indes kommt es vor, dass weiter rückwärts eine Zelle des Prothalliumfadens tonnenförmig anschwillt und neue Auszweigungen hervorbringt.

Die als Seitenzweige aus den Hauptfäden der Prothallien hervorgehenden Gebilde sind nun entweder gleichwerthige Zellreihen, welche durch Quertheilung ihrer Scheitelzelle in die Länge wachsen und sich ebenfalls verzweigen, oder aber sie stellen Rhizoiden dar, die einer weiteren

Entwicklung normal nicht fähig sind. Die Stellung der Rhizoiden, sowie der Umstand, dass bisweilen ein Zellfaden an seinem Ende in ein Rhizoid übergeht, lassen zur Genüge erkennen, dass zwischen ihnen und den übrigen Zellen des Prothalliums ein morphologischer Unterschied nicht besteht.

In den einfachsten Fällen, wie sie durch Goebels Arbeit für *Trichomanes diffusum*, durch Bower für *Trichomanes pyxidiferum* bekannt geworden sind, bleibt die vegetative Ausbildung der Prothallien auf die Production reichverzweigter Fäden beschränkt. Auch die Ausbildung der männlichen Geschlechtsorgane geht in der einfachsten Weise vor sich; die Antheridien entstehen als Seitenäste aus einer Fadenzelle. Erst wenn diese Prothallien sich zur Entwicklung weiblicher Geschlechtsorgane anschicken, tritt eine Complication des Aufbaues dadurch ein, dass an dem Prothalliumfaden ein Zellkörper gebildet wird, welcher die Archegonien trägt. Dieser als Archegoniophor bezeichnete Zellkörper, welcher meist nur aus wenigen Zellen besteht, geht entweder durch Auftreten verschieden gerichteter Theilungswände aus einer Zelle des Prothalliumfadens hervor, oder er bildet sich als seitliche Auszweigung an dem Faden.

Was nun die Form der Geschlechtsorgane bei *Trichomanes* anbetrifft, so ist dieselbe im Wesentlichen von der bei den übrigen Farnen gefundenen wenig verschieden. Die Antheridien sitzen als kugelförmige Köpfchen auf einer flachen Stielzelle. Die Aussenwand des Köpfchens wird von einer Schicht flacher, tafelförmiger Zellen gebildet. Innerhalb derselben liegt ein kugelförmiger Complex von Spermatozoiden-Mutterzellen, welche denen der übrigen Farne gleichen. Die Spermatozoiden gehen der Hauptsache nach aus der Kernsubstanz der Mutterzellen hervor. Ihr Austritt aus dem Antheridium erfolgt, wie Bower bei *Trichomanes pyxidiferum* beobachtete, durch einen Riss nahe dem Scheitel in der Antheridienwand. Die Archegonien stehen meist zu mehreren auf dem sie tragenden Zellpolster. Der Bauchtheil ist in das Polster eingesenkt. Der kurz cylindrische Hals besteht aus vier kurzen Zellreihen. Eine Bauchkanalzelle und eine Halskanalzelle sind vorhanden. Die Oeffnung des Archegonienhalses zum Zweck der Befruchtung erfolgt in der gewöhnlichen Weise.

Ueber die Zellfolge bei der Entstehung der Antheridien bei *Trichomanes* liegen nur wenige Beobachtungen vor, nach denen es scheint, als ob die Reihenfolge des Auftretens der Theilungswände hier überhaupt nicht constant ist. Reichlicheres Untersuchungsmaterial wird vielleicht später ein anderes Resultat herbeiführen. Die Wachsthumsvorgänge bei der Entwicklung der Archegonien verlaufen ähnlich wie diejenigen, welche für die übrigen Farne bekannt geworden sind. Der Vorgang der Befruchtung, sowie die erste Entwicklung des Embryo, sind bis jetzt weder bei den bisher geschilderten Prothallien, noch überhaupt bei einer Species der *Hymenophyllaceen* beobachtet worden.

Wie schon eingangs erwähnt wurde, sind durch die bisherigen Untersuchungen Prothallien erst von wenigen *Trichomanes*-arten bekannt und beschrieben worden, wir müssen es aus diesem Grunde dahin gestellt sein lassen, ob die soeben besprochenen einfachen Formen überhaupt den einfachsten Typus der *Hymenophyllaceen*-prothallien bezeichnen, ob nicht bei andern Arten die geschlechtliche Generation überhaupt jeder Ausbildung eines Zellkörpers entbehrt, so dass die weiblichen in gleicher Weise wie die männlichen Geschlechtsorgane einfach den Zellfäden als Seitenäste aufsitzen. Goebel setzt aus Gründen der Abstammungslehre einen solchen einfachen Typus voraus, womit freilich nicht gesagt ist, dass derselbe auch thatsächlich noch bei einer der jetztlebenden Arten vorhanden sein muss. Jedenfalls kommt die von Bower beobachtete und abgebildete Prothallienform, bei welcher der als Arche-goniophor bezeichnete Zellkörper durch Zelltheilung aus einer einzigen, äusserlich unveränderten Fadenzelle hervorgeht, dem von Goebel postulirten einfachsten *Hymenophyllaceen*-prothallium sehr nahe, wodurch die von diesem Autor ausgesprochene Ansicht eine erhöhte Bedeutung gewinnt.

Bei höher entwickelten Formen von *Trichomanes* erfahren die Prothallien eine Vergrößerung der assimilirenden Fläche. Im einfachsten Falle geschieht das, indem ein Faden in einem Theil seines Verlaufes durch Längstheilung seiner Zellen bandartig umgestaltet wird. In anderen Fällen sprossen aus den Fäden seitlich schmale, blattähnliche Zellflächen von lineal-lanzettlichem Umriss hervor, oder der ursprüngliche Zellfaden geht an seiner Spitze in eine spatelförmige Zellfläche über (Fig. 12). Auch diese letzteren seitlich oder terminal gestellten Flächen bekunden ihren Ursprung aus einem Zellfaden dadurch, dass sie an ihrer Spitze wieder in eine Zellreihe übergehen können. Das Wachsthum dieser Flächen wird, soweit bekannt, nicht durch eine Scheitelzelle vermittelt, sondern es geht durch häufige Theilungen in der meristematischen Region des vorderen Endes vor sich. Aus den Randzellen dieser Flächen sprossen Seitenäste und Rhizoiden hervor. Bemerkenswerth ist es, dass auch die Zellen in der Fläche neuen Zellfäden den Ursprung geben können, wie ich an einigen Prothallien von *Trichomanes holopterum* sicher beobachten konnte. Dieses Verhalten ist insofern von Bedeutung, als es eine Annäherung an dasjenige der Prothallien höherer Farne darstellt, bei denen stets Rhizoiden und Geschlechtsorgane auf der Fläche entspringen. Da Mettenius die erwähnte Thatsache für die von ihm beobachteten *Trichomanes*-Prothallien bestimmt in Abrede nimmt, so ist wohl anzunehmen, dass sie zu den selteneren Vorkommnissen gehört, vielleicht war sie bei dem mir vorliegenden Material durch Verletzung des Scheitels der Zellflächen veranlasst.

Hinsichtlich der Stellung der Geschlechtsorgane kommen bei den mit flächenförmigen Ausbreitungen versehenen *Trichomanes*-prothallien einige

Verschiedenheiten vor. Die Antheridien stehen als seitliche Aeste an den Fäden oder an dem Rande der Zellflächen. Als Träger der Archegonien ist immer ein Zellkörper vorhanden. Derselbe entsteht entweder an den Fäden als seitliche Auszweigung, oder aber er geht aus einer dem Rande unmittelbar benachbarten Partie der Zellflächen hervor, indem in derselben Theilungswände parallel zur Oberfläche auftreten. Auf dem so entstandenen Archegoniophor stehen die Archegonien, wie Mettenius angiebt, sowohl auf der oberen als auch auf der unteren Seite. Die Form der Antheridien und Archegonien stimmt mit der vorhin für die einfachen Fadenprothallien geschilderten überein.

Eigenthümlich ist bei den Prothallien der *Trichomanes*arten die Bildung von Brutknospen, welche hier sehr häufig zu sein scheinen (Fig. 11 u. 13). Die Endzelle eines Fadens erzeugt als Sprossungen eine Anzahl kleiner flaschenförmiger Trägerzellen, an deren vorderem Ende eine reich mit Protoplasmainhalt versehene Zelle von Kugelform abgeschnürt wird. Diese Kugelzelle theilt sich dann zunächst durch eine Wand in eine rechte und eine linke Hälfte, welche sich etwas seitlich strecken und noch mehrmals gleichmässig durch gleichgerichtete Wände getheilt werden, so dass eine dem Stiel quer aufsitzende, halbmondförmige Zellreihe entsteht. Dieselbe entwickelt sich nach der Abtrennung von der Stielzelle weiter, indem sie Rhizoiden bildet und zu einem neuen Prothalliumfaden auswächst.

Es mag hier noch kurz auf einige abnorme Vorkommnisse hingewiesen werden, welche Bower an den Prothallien von *Trichomanes pyxidiferum* und *Trichomanes alatum* beobachtet hat. Er fand, dass bei diesen Arten Prothallien auch ohne Sporenkeimung aus der ungeschlechtlichen Farnpflanze hervorgehen können, indem entweder eine Sporangienanlage oder ein Zellcomplex des Receptaculum oder gar eine Zelle des Blattrandes oder aus der Nähe des Blattnerven vegetativ zum Prothallium auswächst (Fig. 13). Dieser Aposporie, welche ja auch bei andern Farnen, verschiedenen Varietäten von *Athyrium Filix femina*, *Polystichum angulare* und anderen vorkommt, steht bei denselben *Trichomanes*arten die Apogamie zur Seite, eine Erscheinung, welche darin besteht, dass aus den Prothallien ohne Befruchtungsvorgang, ja ohne Bildung geschlechtlicher Organe durch vegetative Sprossung eine normale Farnpflanze hervorgehen kann. In Gardeners' Chronicle 1886 p. 372 wird ein Exemplar von *Trichomanes Petersii* erwähnt und abgebildet, bei welchem aus der Basis des freien Theiles des Receptaculum ein kurzes Rhizom mit drei kleinen Wedeln hervorgewachsen ist. Wahrscheinlich handelt es sich in diesem Falle auch um Aposporie und Apogamie.

Die Keimung der Sporen von *Hymenophyllum* geht im Anfang in ähnlicher Weise vor sich, wie sie soeben für die *Trichomanes*arten beschrieben worden ist. Von den drei durch die ersten Theilungen erzeugten Zellen wachsen in der Regel zweie nur zu kurzen Fäden aus, welche mit

einem Rhizoid abschliessen. Die dritte aber bildet zunächst einen kürzeren oder längeren Zellfaden, welcher endlich in eine Zellfläche übergeht. Die Zellfläche besitzt hier von Anfang an eine zweischneidige Scheitelzelle, welche indess nicht dauernd functionirt. Ihre Thätigkeit wird später durch Randzellwachsthum ersetzt. Indem an dem Scheitelende einer Prothalliumfläche die mittlere Partie des meristematischen Gewebes in den Ruhestand übergeht, während die seitlichen Zellcomplexe ihr Wachsthum fortsetzen, kommt eine Verzweigung zustande, welche als Gabelung der ursprünglichen Fläche aufgefasst werden kann. Ausserdem treten, wie Goebel gezeigt hat, namentlich an Prothallien, deren Scheitelregion verletzt worden ist, Adventivsprosse auf. Im erwachsenen Zustande stellen die Prothallien der *Hymenophyllum* einen bandförmigen wiederholt verzweigten Thallus dar, dessen Randzellen vielfach zu Rhizoiden ausgewachsen sind. Die Rhizoiden sowohl als ihre in dem Rande der Zellflächen gelegenen Tragzellen haben braungefärbte Wände.

Während nach Bower die von ihm untersuchten *Trichomanes*-Prothallien wahrscheinlich diöcisch sind, kommen bei den genauer bekannt gewordenen *Hymenophyllum*-Prothallien beiderlei Geschlechtsorgane auf derselben Pflanze oft nahe nebeneinander vor. Die Antheridien entstehen hier entweder auch als seitliche Auszweigungen an dem Rande oder nahe demselben auf der Unterseite der Prothallien. Bei *Hymenophyllum Tunbridgense* finden sie sich nach Janczewski's Angabe über die ganze untere Fläche zerstreut vor. Die Archegonien sind stets dem Rande genähert auf einem Zellpolster inserirt. Ihre Anlage erfolgt wohl ohne Ausnahme von einem vom Scheitelrande der Prothalliumfläche abgezweigten meristematischen Gewebe aus, welches auch nach der Ausbildung der ersten Archegonien noch weiter wachsen und sich sogar etwas verzweigen kann. Die Archegonien stehen auf der Unterseite der Prothallien, so dass hier hinsichtlich der Stellung der Geschlechtsorgane einige Uebereinstimmung mit den übrigen Farnen herrscht. Form und Entwicklung der Geschlechtsorgane bieten, soweit bekannt, auch hier nichts Auffälliges dar¹⁾.

Wie bei *Trichomanes*, so findet auch bei *Hymenophyllum*, wie Goebel an den von ihm untersuchten Arten constatirt hat, eine ausgiebige vegetative Vermehrung der Prothallien durch Brutknospen statt. Dieselben entspringen aus einer Zelle am Rande des bandartigen Prothalliums und entwickeln sich noch an dem Mutterspross zu einer kleinen Zellfläche, welche eine zweischneidige Scheitelzelle besitzt. Ausserdem tritt eine Vermehrung der Prothallien auch in der Weise ein, dass die Sprosse wie bei thallösen Lebermoosen von hinten her allmählich absterben, so dass die seitlichen Verzweigungen nach und nach isolirt werden und selbständig weiter wachsen.

1) Zur Entwicklung der Spermatozoen vergl. Carnoy, Biologie cellulaire. Lierre 1884 p. 227.

Die Anatomie der Prothallien bietet bei den *Hymenophyllaceen* nichts Auffälliges dar. Die Wände, welche die einzelnen Zellen sowohl der Zellfäden als auch der Flächen von einander trennen, sind getüpfelt, so dass trotz der relativen Stärke der Wände ein Stoffverkehr leicht stattfinden kann. Der Zellinhalt besteht aus reichlichem Protoplasma mit grossem Zellkern und Chlorophyllkörnern.

Mit wenigen Worten möge noch die Pilzinfektion bei den Rhizoiden der Prothallien erwähnt werden, deren Vorkommen Goebel eingehender untersucht hat. Bei der Unzulänglichkeit des Materials und der Schwierigkeit der Beobachtung gelang es indess nicht, Aufschluss über die biologische Bedeutung dieser Erscheinung zu gewinnen.

Der bedeutungsvollste Erfolg, welchen die Untersuchungen der *Hymenophyllaceen*-Prothallien bisher gehabt haben, liegt offenbar in den Resultaten der Arbeit Goebels ausgesprochen, welche klar und übersichtlich den phylogenetischen Zusammenhang zwischen den Moosen und den Gefässkryptogamen vor Augen führen und damit die Lücke überbrücken, welche vorher zwischen diesen Formenkreisen in der Entwicklungsreihe der Archegoniaten bestand.

IV. Die ungeschlechtliche Generation.

a. Orientirung über Morphologie und Anatomie.

Die ungeschlechtliche Generation der *Hymenophyllaceen* zeigt auch bei den einfachsten Formen hinsichtlich ihres morphologischen Aufbaues immer den ausgesprochenen Charakter einer Gefässpflanze und weicht in keinem wesentlichen Merkmal von dem Typus ab, der aus der Betrachtung der übrigen Farnfamilien abgeleitet werden kann. Thallöse Formen, wie Beijerinck¹⁾ sie gesehen haben will, sind mir ebenso wenig vorgekommen wie irgend einem andern Botaniker, der sich mit dieser Familie beschäftigt hat. Die Gesetzmässigkeit in der morphologischen Ausbildung eines beblätterten Sprosses ist innerhalb derselben überall so bestimmt ausgesprochen, dass das Vorkommen thallusähnlicher Formen absolut ausgeschlossen erscheint. Als Beijerinck die jedem Einsichtigen absurd erscheinende Behauptung in die Welt setzte, hatte er wenigstens die Pflicht das Paradoxon in eingehender Untersuchung durch unzweifelhafte That-sachen zu belegen. Da das bisher nirgends geschehen ist, so muss Beijerinck es sich gefallen lassen, seine Mittheilung als eine unüberlegte, durchaus unwissenschaftliche Aeusserung betrachtet zu sehen.

Wie schon erwähnt, besitzen alle *Hymenophyllaceen* eine typische Sprossachse, welche Blätter erzeugt und sich regelmässig verzweigt in der Weise, dass zu jedem Blatt ein Seitenspross gehört. Diese regelmässig auftretenden Seitensprosse stehen nicht immer in der Achsel ihres Trag-

1) Wurzelknospen und Nebenwurzeln p. 132.

blattes, sondern, wie es ja auch für die Davallien bekannt ist, neben demselben oder etwas auf den Blattstielgrund hinauf gerückt. Ausserdem finden sich bei einigen *Hymenophyllaceen* blattbürtige Knospen. Bei *Trichomanes pinnatum* und einer Anzahl nahestehender Formen werden seitlich an der verlängerten Rhachis mancher Blätter Knospen entwickelt, welche in dem Stellungsverhältniss der Blättfiedern angeordnet sind, nur mit dem Unterschiede, dass ihre Insertionspunkte durch die Streckung der Blattspindel weit auseinandergerückt sind. Aehnliche Bildungen kommen auch in andern Farnfamilien vor. Ein besonders schönes Beispiel bietet *Adiantum caudatum*. Die Mittelrippe der zierlichen Wedel wächst lang aus. Die äusserste Spitze drängt sich in eine Ritze des Felsen oder der Mauer oder in die Unebenheiten der Rinde des bewohnten Baumes hinein und bildet eine Knospe, aus welcher eine neue Pflanze hervorgeht. Die Abbildung, welche Hooker²⁾ von dem *Adiantum caudatum* giebt, lässt eben erst die Anlage der Knospe an der Spitze der Rhachis erkennen. Besser zu übersehen ist das Verhältniss in der Abbildung Kerner's³⁾. Eine andere Art blattständiger Knospen treten bei *Trichomanes diffusum*, *Trichomanes proliferum* u. a. m. auf. Dort entspringen auf der Oberseite der Blätter aus der Mittelrippe Knospen, welche an ihrer kurzbleibenden Achse meist nur ein einziges Blatt entwickeln, das in gleicher Weise proliferiren kann. Prantl nimmt an, dass das erste und meist einzige Blatt der Knospe dem Mutterblatte gegenübersteht. Ich konnte an Alkoholmaterial von *Trichomanes diffusum* die Entwicklung dieser Knospen untersuchen. Die Stellung ist dort eine andere. Das Blatt der Knospe entspringt an der nach der Spitze des Mutterblattes hin gewendeten Seite der rudimentären Achse, so dass die Blattspreiten etagenartig übereinander stehen, wie etwa die Jahressprosse von *Hypnum splendens*. Die Knospen werden bei der Entwicklung des Blattes gleich am Vegetationspunkt angelegt. Wirkliche Adventivsprosse, d. h. solche, welche nachträglich aus Dauergewebe hervorgehen, fehlen gänzlich.

Neben einer Anzahl wurzelloser Formen finden wir unter den *Hymenophyllaceen* solche mit Adventivwurzeln, deren Stellung an der Achse keiner festen Regel zu folgen scheint. Hinsichtlich der Stellung der sonstigen seitlichen Organe sind zwei Fälle zu unterscheiden. Entweder ist die Sprossachse dorsiventral gebaut. Die Blätter und mit ihnen die Seitensprosse entspringen seitlich an derselben je in zwei Zeilen, welche meist durch langgestreckte Internodien unterbrochen sind. Im andern Falle ist der Spross radiär beblättert und verzweigt und besitzt gestauchte Internodien. Die Form und Grösse der Blätter ist innerhalb der Familie ausserordentlich wechselnd. Neben vollständig einfachen kommen mehr-

2) Exotic flora II 104.

3) Pflanzenleben II p. 38. *Asplenium Edgeworthii*.

fach gefiederte, fein zerschlitzte Blätter vor, neben zierlichen, von wenigen Millimetern Ausdehnung solche, deren Länge fast einen halben Meter beträgt. Entsprechend diesen Verhältnissen bietet auch die Nervatur der Blätter eine grosse Abwechselung. Ausser dem vollständig einfachen Mittelnerven der kleinsten Formen finden wir wiederholt dichotomisch verzweigte und reich gefiederte Blattnerven, sowie alle Uebergänge zwischen diesen Ausbildungsformen. Bei den Arten, deren Blätter eine mehrfach gefiederte Nervatur besitzen, hat man eine anadrome und eine katadrome Anordnung der Nerven unterschieden und für die Systematik nutzbar gemacht. Als anadrom werden nach Mettenius Vorgang die Nerven bezeichnet, wenn auf den Fiedern erster Ordnung der erste Seitenast und folglich alle ungeraden auf der der Blattspitze zugekehrten Seite stehen. Sind hingegen die ungeraden Fiedern zweiter Ordnung nach der Blattbasis zu gerichtet, so wird die Anordnung der Nerven als katadrom bezeichnet.

Bei einigen *Hymenophyllaceen* sind die sterilen und fertilen Blätter in ihrem Aufbau verschieden. *Trichomanes Spruceanum* z. B., welches Hooker¹⁾ abbildet, hat doppelt fiederspaltige Blätter. Die sterilen sind kurz gestielt. Die fertilen Blätter besitzen dagegen einen sehr langen Stiel. Der Umriss der Blattfläche ist bei den sterilen Blättern breit eirund, bei den fertilen länglich. Interessant ist die Heterophyllie bei *Trichomanes pinnatum* und den verwandten Arten. An Exemplaren von *Trichomanes pinnatum* ist bei einigen Blättern, wie bereits erwähnt, die Rhachis an der Spitze sehr verlängert und erzeugt Knospen. Die Fiedern solcher Blätter tragen wenige oder gar keine Sori. Sehr reichlich finden sich dagegen die Sori an Blättern, welche nicht proliferiren, sondern mit einem Endblättchen abschliessen. Die Zahl der Fiedern an diesen fertilen Blättern ist meist geringer als bei den proliferirenden, sie schwankt, ebenso wie auch die Länge des Endblättchens, innerhalb ziemlich weiter Grenzen. *Trichomanes pennatum* zeigt sehr ähnliches Verhalten. Bei einem Exemplar des Leipziger Herbariums besitzt ein fertiles Blatt nur zwei Paare seitlicher Fiederblättchen, das Endblättchen dagegen nimmt etwa zwei Drittheile von der Gesamtlänge der Blattfläche ein. Bei *Trichomanes Vittaria* hat das fertile Blatt überhaupt keine Seitenfiedern mehr, es besteht aus einem bandartigen Parenchymstreifen, welcher von einer starken Mittelrippe und zahlreichen parallelen Seitennerven durchzogen ist. Am Ende der letzteren stehen die Sori. *Trichomanes spicatum* und *botryoides* haben gar kein Parenchym an den fertilen Blättern, die Sori stehen auf kurzen Stielchen in zwei gegenüberstehenden Zeilen an der Rhachis. Den Uebergang zwischen *Trichomanes Vittaria* und den zuletzt genannten Formen bildet *Trichomanes elegans*, dessen fertile Blätter zwischen den die Sori

1) Cent. of ferns 81.

tragenden Seitennerven noch ein schwaches Blattparenchym entwickeln. Die sterilen Blätter aller erwähnten Formen sind einfach gefiedert und zeigen mit einander im Bau grosse Uebereinstimmung. Diese Formenreihe ist geeignet, den Uebergang von isomorpher Blattbildung zur Heterophyllie in klarer Weise zu illustriren.

Die Sori finden sich bei den *Hymenophyllaceen* von einem Indusium eingehüllt an einem die Fortsetzung eines Blattnerven bildenden Receptaculum. Die Form der Indusien ist becher- oder schlauchförmig bei der Gattung *Trichomanes*, bei *Hymenophyllum* besteht das Indusium im allgemeinen aus zwei rundlich schalenförmigen, zusammengeneigten Klappen. Die Sporangien, deren Ring, wie aus der Systematik bekannt ist, wagrecht oder schief liegt, entstehen an dem Receptaculum in basipetaler Reihenfolge.

Der Stamm der *Hymenophyllaceen* — ich nehme immer *Loxsonia* aus, welches seinem ganzen Aufbaue nach eine besondere Stellung einzunehmen scheint und von den Systematikern neuerdings auch von den *Hymenophyllaceen* getrennt wird — besitzt ein centrales, collateral oder concentrisch gebautes Gefässbündel. Dasselbe ist umgeben von einer Endodermis, deren Radialwände auf Schnitten deutlich die für dieses Gewebe charakteristische Wellung erkennen lassen. Die daran grenzenden Zellen der Rinde sind mehr oder weniger sclerenchymatisch ausgebildet, ihre verdickten Wände sind braungefärbt und getüpfelt. Nach aussen hin wird diese Sclerenchymische Scheide von einer oder mehreren Schichten zartwandiger weitleumiger Zellen überkleidet, deren äusserste die Epidermis darstellt, während die sonst noch vorhandenen als Aussenrinde bezeichnet werden. Eigenthümlich ist in dem Stamm der meisten *Trichomanes*-arten das Vorkommen flach tafelförmiger Zellen, welche einen ihrer Innenwand anliegenden Kieselkörper enthalten. Gewöhnlich sind diese Zellen dem Sclerenchym nach aussen in Längsreihen aufgelagert, sie kommen aber auch bei einzelnen Arten unabhängig vom Sclerenchym vor. Mettenius, der zuerst auf dieselben aufmerksam machte, bezeichnet sie als Deckzellen oder Stegmata. Ihre Function und ihre biologische Bedeutung ist völlig unbekannt ¹⁾.

Die bei einer grossen Anzahl von *Hymenophyllaceen* vorkommenden Adventivwurzeln besitzen einen centralen Bündelstrang mit Endodermis. Die Angabe Russows ²⁾, dass der Strang der Wurzel bei *Hymenophyllum* stets diarch sei, während bei *Trichomanes* immer andere Zahlenverhältnisse obwalten, ist schon von Prantl widerlegt worden. Die Rinde der Wurzeln besteht aus zwei Theilen, einer stark verdickten, sclerenchymatischen Innenrinde und einer wenigschichtigen Aussenrinde aus dünn-

1) Vergl. indes Kohl, Kalksalze etc. p. 297.

2) Vergleichende Untersuchungen p. 95 Anm. 2.

wandigen Parenchymzellen. Deckzellen sind in der Wurzel bisher nicht beobachtet worden.

Der Bau des Blattstiels und der Blattnerven ist demjenigen des Stammes entsprechend. Das Parenchym der Blätter ist meistens einschichtig, in selteneren Fällen treten zwei bis vier Schichten auf. Die Wände zwischen den Zellen des Blattparenchyms sind meist stark verdickt und von zahlreichen Tüpfeln durchsetzt. Auf den freien Aussenflächen besonders in der Nähe des Blattrandes ist in vielen Fällen eine deutliche Faltung der Zellmembran zu erkennen, mit welcher gleichzeitig Tüpfelung der Aussenwände aufzutreten pflegt. Nach aussen sind die Zellwände des Blattparenchyms durch eine meist ausserordentlich zarte Cuticula überkleidet. Die Indusien bestehen in ihrem oberen Theile fast immer nur aus einer Zellschicht, deren Zellen denen der Blattfläche ähnlich sind, nur ist in manchen Fällen der obere Rand von ausserordentlich stark verdickten Zellen gebildet. Im untern Theil des Indusium treten gewöhnlich Sclerenchymzellen auf. Zu beiden Seiten, wo das Indusium mit dem Blattparenchym sich zusammensetzt, verläuft je ein dünnes Gefässbündel, welches sich von dem Bündel des den Sorus tragenden Nerven abzweigt. Das Receptaculum, welches die Fortsetzung dieses Nerven bildet, ist gleichfalls von einem Bündel durchzogen.

Von den vielgestaltigen Haargebilden, welche sich bei den *Hymenophyllaceen* finden, seien hier vorläufig als die häufigsten nur die folgenden erwähnt. Bei den wurzellosen Formen und auch bei einer Anzahl bewurzelter ist der Stamm dicht mit langen, braunen Haarwurzeln überkleidet. In der Nähe der Sprossvegetationsscheitel finden sich meist eigenartige Schleimhaare, welche von den Autoren als Paleae bezeichnet werden. Dieselben sind gewöhnlich etwas schief oder völlig seitlich inserirt. Die Blattfläche vieler Formen ist dicht mit Sternhaaren überkleidet. Am Blattrande mancher *Trichomanes*arten stehen Gruppen stark verdickter Dornhaare. Eine eingehendere Schilderung dieser Gebilde wird in einem späteren Abschnitt der Abhandlung gegeben werden.

Wir können hiermit die allgemeine Betrachtung abschliessen und uns speciellen Untersuchungen zuwenden.

b. Festigung und Schutzeinrichtungen.

Zu den einfachsten und allgemeinsten Bedingungen, welche die äusseren Umstände von den Gewächsen fordern, gehört offenbar der Besitz einer hinreichenden Festigkeit, um den Druck der eigenen Schwere zu ertragen und um mechanischen Einwirkungen von aussen her und den Angriffen parasitischer Organismen widerstehen zu können. Wir finden dementsprechend auch überall im Pflanzenreiche Einrichtungen verbreitet, welche die mechanische Festigkeit sowohl der einzelnen Zelle als auch des gesamten Zellenverbandes bewirken. Bei den höheren Pflanzen ist meistens

eine Arbeitstheilung unter den Geweben eingetreten. Eine besondere Gewebeart, die Epidermis, umkleidet die Pflanze und übernimmt den Schutz der einzelnen Zellen; eine andere Gewebeart, das mechanische System, giebt dem Pflanzenkörper die nöthige Festigkeit. Bei den einfachen histologischen Verhältnissen, wie sie bei den *Hymenophyllaceen* vorliegen, ist eine so weitgehende Arbeitstheilung nicht zu erwarten. Freilich, ein mechanisches System ist, wie wir sehen werden, auch hier vorhanden, aber ein eigenes epidermales Gewebe zum Schutz der einzelnen Zellen findet sich meistens nicht. Bei den zarten einschichtigen Blättern ist das selbstverständlich, aber auch bei den Formen, welche ein mehrschichtiges Blattparenchym besitzen, *Trichomanes reniforme*, *Hildebrandtii*, *membranaceum*, *Hymenophyllum scabrum* u. a. m. ist eine als Schutzorgan ausgebildete Epidermis nicht vorhanden. Am Stamme der *Hymenophyllaceen* findet sich freilich als äusserste Zellschicht ein different ausgebildetes Gewebe, dem wir wegen seiner Lage den Namen Epidermis nicht versagen können. Dasselbe wird in vielen Fällen aus ziemlich zartwandigen Zellen gebildet, welche schon deshalb nicht als Schutz für das darunter liegende Gewebe angesehen werden können, weil das letztere aus stark verdickten Sclerenchymzellen besteht, die eines Schutzes weit weniger bedürfen, als die Epidermiszellen selber. In anderen Fällen freilich, wie bei *Hymenophyllum caudiculatum* und *cruentum* und bei den meisten Adventivwurzeln der *Hymenophyllum*- und *Trichomanes*arten giebt diese Epidermis in der That eine schützende Hülle ab für die darunter liegenden wenigen Schichten eines grosszelligen, zartwandigen Rindenparenchyms. - Die Zellen der Epidermis sind hier kleiner und besitzen stärkere Wände, als das zu schützende Rindengewebe.

Aus der allgemeinen anatomischen Betrachtung, welche wir vorhin bei den *Hymenophyllaceen* vorgenommen haben, wird erinnerlich sein, dass der Stamm und die Wurzel eine feste sclerenchymatische Rinde besitzen, wodurch im Allgemeinen ein Schutz für die im Innern dieser Organe gelegenen Zellgruppen gegeben ist. Es sind also hauptsächlich die Zellen des Blattparenchyms, für welche besondere Vorrichtungen zur Erreichung einer genügenden Festigkeit vorhanden sein müssen. Vor allen Dingen bedürfen die am meisten exponirten Zellen des Blattrandes eines Schutzes. Bei vielen *Trichomanes*arten, z. B. *Trichomanes lanceum* und einer grossen Zahl der zu der *Hemiphlebiengruppe* gehörigen Formen finden wir den Rand mit eigenthümlichen, starkverdickten Dornhaaren besetzt, welche einzeln oder zu Gruppen vereinigt zwischen den Endigungen der Blattnerven stehen (Figg. 2, 7, 18, 22). Diese Haare sind an ihrer Basis stark gekrümmt, so dass sie nicht von der Blattfläche abstehen. Sind die Haare einzeln gestellt, so entspringen sie in der Ebene der Blattfläche aus einer Randzelle und laufen gegen die Blattspitze hin gerichtet vollständig mit dem Rande parallel. In den zweizähligen Gruppen ist das eine Haar

gegen die Blattspitze, das andere gegen die Basis hin dem Blattrande angeschmiegt (Fig. 7). Sind noch mehr Haare in den Gruppen vorhanden, so sind einige derselben stets dem Blattrande angeschmiegt, während die übrigen sich dicht über die ihrer Basis benachbarte Partie des Blattes herneigen (Fig. 18). Besonders im Jugendzustande der Blätter, in welchem ein Schutz des noch zarten, unentwickelten Parenchyms sehr nöthig ist, stehen diese Schutzhaare, welche sich sehr frühzeitig entwickeln, so genähert, dass der ganze Blattrand und, wo mehrzählige Gruppen vorhanden sind, auch der grösste Theil der Blattfläche schützend überdeckt wird.

Als eine phylogenetisch mit diesen Gruppenhaaren des Blattrandes zusammenhängende Erscheinung müssen wir die eigenthümlichen eingerollten Schuppen am Blattrande von *Trichomanes membranaceum* auffassen, welche wie jene ausser anderer später zu besprechender Function sicher auch dem mechanischen Schutze des Blattrandes dienen (Fig. 24). Sie sind, wie die Gruppenhaare stets, zwischen den freien Enden zweier Blattnerven inserirt. Ueber die Bedeutung dieser Schuppen ist man lange Zeit im Unklaren gewesen. Nach Hooker ¹⁾ sind dieselben small, peltate, umbilicated, pale brown, sessile, membranaceous scales, which appear to be either abortive involucres, or themselves young fructifications, and corresponding with the membranaceous lips of the involucres. Presl ²⁾ schreibt über sie: »Cuiam scopo haec organa marginalia e duabus squamis constructa ... inserviunt aut inservire possunt, plane ignoro. Jam in juvenilibus speciminibus soros nondum gerentibus fere in toto ambitu obveniunt, sed semper hucusque vacua visa sunt. Anne cum gemmis comparari possunt? In Hymenophyllacearum ordine unicum exemplum haecce organa sunt et ad indumentum, sicuti ad pilos, paleas etc. numerari non possunt«. Im Jahre 1845 hat K. Müller ³⁾ eine genauere Untersuchung der Morphologie und der Entwicklungsgeschichte dieser Organe vorgenommen, aus welcher wenigstens mit Sicherheit hervorgeht, dass dieselben weder jugendliche oder reducirte Indusien noch auch Brutknospen sind. Müller kam zu dem Resultat, dass diese Schuppen eine Lamellenbildung darstellen. Mettenius weist nun darauf hin, dass auch diese Ansicht nicht zu billigen sei, da die Schuppen niemals auf den Blattnerven stehen, wo doch nach sonstigen Erfahrungen die Lamellenbildungen vorwiegend aufzutreten pflegen. Er denkt sich die Schuppen in der Weise entstanden, dass alle Strahlen einer mehrzähligen Haargruppe, wie sie etwa bei *Trichomanes muscoides* sich findet, zu einer continuirlichen Schicht verbunden seien. Die Haare der Gruppen sind aber einzellig, während bei den Schuppen von *Trichomanes membranaceum* in radialer Richtung mehrere Zellen aufeinanderfolgen; auch würde bei der Ver-

1) Exotic flora vol. I 76. Vergleiche auch Martius, Ic. plant. crypt. Bras. p. 103.

2) *Hymenophyllaceen* p. 12.

3) Bot. Zeitg. III p. 577.

einigung aller Strahlen einer vielzähligen Gruppe zunächst nur ein schildförmiges Gebilde entstehen, dessen halbkreisförmige Hälften über die Blattflächen hergeschlagen wären. Es hat indes wenig Werth den Einzelheiten der Entstehung nachzuforschen. Die Aehnlichkeit in der Insertion dieser Gebilde und der Haargruppen der dem *Trichomanes membranaceum* nahe verwandten Formen, sowie die Uebereinstimmung hinsichtlich der frühzeitigen Entwicklung geben uns Anlass, die Schuppen als eine Modification der Haargruppen anzusehen. Die Dicke der Zellwände in den Schuppen berechtigt uns ihnen die Function von Schutzorganen zuzuschreiben.

Es sei hier noch erwähnt, dass am Blattrande einiger *Hymenophyllaceen* eigenthümliche kurze Haare vorhanden sind, welche aus einer cylindrischen Stielzelle und einer keulenförmig angeschwollenen Endzelle bestehen. Vermuthlich liegen hier secernirende Organe vor, welche durch reichliche Schleimabsonderung ebenfalls einen Schutz für die Randzellen abgeben könnten. Ganz gleiche Haare kommen übrigens auch auf den Nerven der Blattunterseite sehr vieler *Hymenophyllum*- und *Trichomanes*arten vor (Fig. 6). Es ist das vielleicht nur der Ausdruck der Thatsache, dass die über die Blattfläche hervorragenden Parenchymzellen, welche die Nerven überkleiden, gleichfalls eines erhöhten Schutzes bedürfen. Ob die Keulenhaare etwa nur im jugendlichen Zustande des Blattes functioniren, das lässt sich selbstverständlich an dem Herbar- und Alcoholmaterial nicht entscheiden.

Bei der Mehrzahl der *Hymenophyllaceen* sind besondere Schutzvorrichtungen, wie die eben beschriebenen, am Blattrande nicht vorhanden. Die Zellen des Blattparenchyms selber aber zeigen einen Bau, welcher eine gewisse Festigkeit bedingt, ohne im übrigen die vegetativen Functionen wesentlich zu beeinträchtigen. Es finden sich nämlich an den Aussenwänden dieser Zellen Membranfaltungen vor, die für die Erhöhung der Festigkeit der Wand eine ähnliche Bedeutung haben müssen, wie die Wellung der Zinkblechplatten, welche gegenwärtig in der Architektur eine so ausgedehnte Anwendung finden. Mettenius, welcher genauer als irgend ein anderer Forscher die Structur der Zellwände bei den *Hymenophyllaceen* untersucht hat, giebt über diese Erscheinung eine Reihe beobachteter Einzelheiten an, welche indes für unsere Betrachtung keine weitere Bedeutung haben. Das Wesentliche ist in allen Fällen, dass die Zellwand eine Festigung erfährt, ohne dass ihre Durchlässigkeit für Licht, Luft und Wasser allzusehr herabgesetzt wird.

In ähnlicher Weise, wie es soeben für die Zellen des Blattrandes geschildert worden ist, wird auch vielfach den Zellen der Blattfläche durch Wellung der Wände eine höhere Festigkeit verliehen, wie ebenfalls Mettenius in seiner eingehenden Weise zuerst geschildert hat. Wir finden allerdings hier nicht auf den Aussenwänden die Wandfalten, sondern auf den Seitenwänden, welche die einzelnen Zellen trennen. Es

wird dadurch ein innigerer Verband der Zellen unter einander hergestellt. Die gefalteten Seitenwände bilden gewissermassen ein festes Maschenwerk, zwischen welchem die zartgebliebenen Aussenwände ausgespannt sind. In vielen Fällen tritt zugleich mit der Wandfaltung oder unabhängig von derselben in den Blattzellen eine Wandverdickung auf. Bisweilen erstreckt sich dieselbe gleichmässig über die ganze Fläche der Seitenwände, indem nur eine Anzahl eng umschriebener Wandstellen als Tüpfel unverdickt bleiben, häufiger aber ist sie eine partielle. Die Wandverdickungen treten dann als kräftige Leisten in den Kanten der Zellen auf, oder sie bilden einzelne senkrecht zur Blattfläche gestellte Balken in der Mitte der Seitenwände in ähnlicher Weise, wie es bei manchen Lebermoosen sich findet und neuerdings noch für die Blattzellen der *Colura ornata* von Goebel¹⁾ erwähnt worden ist. In einigen Fällen, wie z. B. Mettenius für *Trichomanes millefolium* angiebt, sind diese balkenförmigen Verdickungen der Seitenwände nur in einzelnen Zellkomplexen über die ganze Blattfläche zerstreut, gewöhnlich aber finden sie sich, wo sie überhaupt vorkommen, in jeder Zelle und sind auf den Wänden so vertheilt, dass die Verdickungen in benachbarten Zellen einander genau entsprechen. Als ein Beispiel besonderer Ausbildung möge bemerkt werden, dass bei einigen Arten eine Kieseleinlagerung in die verdickten Membranstellen vorkommt.

Wir sahen, dass die Wandverdickungen, welche die Festigung des Blattparenchyms bewirken, immer fast ausschliesslich auf die Seitenwände der Zellen beschränkt sind. Nach aussen hin ist der Zellinhalt von einer dünnen Membran überspannt, so dass der Lichtzutritt, der Gasaustausch und die direkte Wasseraufnahme in die Zelle durch diese Vorrichtungen nicht beeinträchtigt werden. Wenn in dieser Weise eine hinreichende Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Einwirkungen auf die einzelnen Zellen zustande kommt, ist damit ein Schutz gegen die Infection seitens parasitischer Organismen noch nicht gegeben. Es sind zwar in allen darauf hin geprüften Fällen die Zellen von einer zarten Cuticula überkleidet, dieselbe ist indes nicht immer im Stande das Eindringen von Pilzhypen in die Zellen zu verhindern. Viele *Hymenophyllaceen* werden, da die Oberfläche ihrer Blätter infolge der eigenartigen Lebensweise, immer feucht ist, von epiphytischen Gewächsen bewohnt. Zarte Lebermoose, Algen und Pilze überziehen häufig die Blattfläche mit einer zusammenhängenden Kruste. Es ist unter den gegebenen Umständen kein Wunder, dass auch parasitische Pilze sehr leicht auf den Blättern zur Keimung kommen und, da die zarte Aussenwand ihrem Eindringen keinen grossen Widerstand entgegensetzt, auch in das Innere der Blattzellen ge-

1) Goebel, Morphologische und biologische Studien. Annales du Jardin Bot. de Buitenzorg Vol. IX.

langen. Sehr häufig, besonders bei den kleinblättrigen Arten, habe ich Pilzhypen in dem Blattgewebe gefunden. Manchmal waren die inficirten Zellen abgestorben und von ihren gesund gebliebenen Nachbarinnen durch gebräunte Wände geschieden. Es ist mir nicht gelungen zu ermitteln, ob die Bräunung der Wände mit einer eingreifenden Substanzveränderung etwa mit einer Verkorkung zusammenhing, indes darf das wohl als wahrscheinlich hingestellt werden. In einigen Fällen fand ich das ganze Blatt von Pilzfäden durchzogen. Ich habe nicht Gelegenheit genommen, die Verwandtschaft der hier vorkommenden Pilze festzustellen. In der Litteratur fand ich nur selten Notizen über diesen Gegenstand; so wurden z. B. *Sphaerella Trichomanes* Cooke, *Sphaerulina assurgens* Cooke und *Cyphella filicola* Cooke als hierher gehörig bezeichnet. Sicher sind verschiedene Formenkreise oft in demselben Blatt vertreten. Mehr noch als die Zellen des Blattparenchyms sind die Haarwurzeln und die Epidermis des Stammes und der Adventivwurzeln der Pilzinfektion ausgesetzt. Man braucht in diesen Organen nirgends lange nach Parasiten zu suchen. Einzelne Epidermiszellen fand ich bei einigen *Trichomanes*-arten wohl in Folge der Pilzinfektion kugelförmig aufgetrieben. Goebel schreibt, dass die Rhizoiden der *Hymenophyllaceen*-prothallien von Pilzen bewohnt werden, ohne dass den Wirthen daraus ein ersichtlicher Nachtheil entsteht. Dasselbe mag wohl in manchen Fällen für die Haarwurzeln der geschlechtlichen Pflanzen gelten. Ob ein symbiotisches Verhältniss vorliegt, wie es bei den Mycorrhizen höherer Pflanzen angenommen wird, das ist hier ebenso wenig zu entscheiden als bei den Prothallien.

Das mechanische System ist bei den *Hymenophyllaceen* meist gut entwickelt. In dem Stamm wie in den Wurzeln stellt dasselbe einen Hohlcyylinder von starkverdickten Sclerenchymzellen dar, welcher der Oberfläche mehr oder weniger nahe gerückt ist (Fig. 3). In den Blättern bildet gewöhnlich eine Sclerenchymschicht beiderseits den Beleg der Gefässbündelstränge (Fig. 8). Ausserdem kommen auch im Anschluss an diese echten Blattnerven Sclerenchymstränge im Blatt einiger *Trichomanes*-arten vor, welche von keinem Gefässbündel begleitet sind und aus diesem Grunde als Scheinnerven bezeichnet werden (Fig. 4).

Prantl hat alle *Trichomanes*-formen, bei denen Scheinnerven auftreten, zu der Gattung *Hemiphlebium* vereinigt. Ob das vom entwicklungsgeschichtlichen Standpunkt aus richtig ist, erscheint mir nicht sicher. Die Scheinnerven sind offenbar nichts anderes als durch Rückbildung auf den Sclerenchymstrang reducirte wirkliche Blattnerven. Das geht schon daraus hervor, dass sie in dem morphologischen Aufbau des Blattes in vielen Fällen die Stelle echter Nerven vertreten. Es kommt auch vor, dass ein echter Nerv in seinem weiteren Verlauf nach dem Blattrande zu in einen Scheinnerven übergeht. Die Rückbildung, welche zur Entstehung der Scheinnerven geführt hat, kann nun ganz gut in verschiedenen Ent-

wicklungsreihen vor sich gegangen sein, so dass ein Theil dieser Formen phylogenetisch zu einer anderen Gruppe gehören würde als der andere. Bevor indes über diese Frage durch eine neue systematische Untersuchung Licht verbreitet wird, können wir Prantls Gattung als Gruppe in dem Genus *Trichomanes* gelten lassen.

Die *Hemiphlebiengruppe* enthält die kleinsten und zierlichsten Farnpflanzen, welche überhaupt bekannt sind. Hinsichtlich der systematischen Bezeichnung der hierher gehörigen Formen herrscht in der Litteratur wie in den Herbarien ein wirres Durcheinander. Ich werde im Folgenden hin und wieder Gelegenheit haben, Formen aus diesem Kreise zu citiren. Um mich dem Leser verständlich machen zu können, lasse ich hier eine kleine Tabelle folgen, aus welcher für jede hierher gehörige Form der von mir für dieselbe gebrauchte Name leicht ersehen werden kann. Es sind von mir in mehreren Fällen unter einem Namen Formen vereinigt, welche bisher als eigene Species galten. Besonders ist das in solchen Fällen geschehen, in denen die Speciesunterschiede mir als innerhalb der Species variable Eigenschaften erschienen. Die Auffindung einer kleinen unbestimmten Form war mir Veranlassung, vorzugsweise die *Hemiphlebien* mit Dornhaaren am Blattrande in systematischer Beziehung genau zu untersuchen. Material für diese Untersuchung war hinreichend vorhanden. Ich habe alle in der Litteratur genannten hierher gehörigen Formen meist in mehreren gut bestimmten Exemplaren prüfen können, mit alleiniger Ausnahme von *Trichomanes Robinsoni* Baker, welches deshalb in der Tabelle in Parenthesi aufgeführt ist.

Gen. *Trichomanes*.

Scheinnerven vorhanden.

§ *Hemiphlebium*.

A. Blattrand mit Gruppen von Dornhaaren oder mit Schuppen besetzt.

I. Mittelrippe deutlich das Blatt bis zur Spitze durchziehend.

a) Dornhaare am Blattrande nur zu 1—3 in einer Gruppe.

1) Indusium deutlich zweilippig. Lippen fast so breit als lang.

α) Blatt ganzrandig.

Trichomanes microphyllum n. sp.

β) Blatt tief ausgebuchtet oder gespalten.

aa) Blatt im Umriss rundlich, fiederspaltig, die Lappen rundlich ausgebuchtet.

Trichomanes muscoides.

[bb) Blatt im Umriss länglich, fiederförmig, buchtig gelappt, eichenblattähnlich.

Trichomanes Robinsoni Baker.]

(2) Indusium schwach zweilippig. Lippen schmal.

Blatt einfach ganzrandig oder schwach buchtig ausgeschweift.

Trichomanes Petersii A. Gr.

b) Dornhaare am Blattrande bis zu 10 in einer Gruppe.

- 1) Nervatur fast fächerförmig, die Seitennerven gehen unter sehr spitzem Winkel vom Hauptnerven aus. Blatt einfach, ganzrandig oder unregelmässig gelappt.

Trichomanes pusillum.

- 2) Nervatur deutlich fiederförmig, Blätter regelmässig zertheilt.

Trichomanes Krausii.

II. Mittelrippe nicht deutlich hervortretend, Nervatur fächerförmig.

- a) Blattrand mit vielzähligen Haargruppen besetzt.

Trichomanes punctatum.

- b) Blattrand mit Spiralschuppen besetzt.

Trichomanes membranaceum L.

B. Blattrand kahl.

I. Blattrand nicht von einem Nerven umsäumt.

- a) Blätter alle oder zum Theil schildförmig.

- 1) Blattparenchym einschichtig.

Trichomanes peltatum.

- 2) Blattparenchym mehrschichtig.

Trichomanes Hildebrandtii.

- b) Blätter nicht schildförmig.

[*Trichomanes sublimbatum.*]

[*Tr. Kapplerianum* Sturm.]

[*Tr. Henzaianum* Parish.]

[*Tr. Godmani* Hook.]

[*Tr. Motleyi* V. d. B.]

II. Blatt mit Randnerven.

- a) Blätter fast sitzend, an der Basis keilförmig verschmälert. Mittelnerv bis in die Blattspitze deutlich.

Trichomanes Hookeri.

- b) Blätter ziemlich lang gestielt, fächerförmig.

Trichomanes cuspidatum.

Die einfachste von allen in der Tabelle genannten Formen ist die zuerst aufgeführte, eine neue Species, deren Beschreibung hier folgen möge.

Trichomanes microphyllum Ghgn. (Fig. 2). Stamm kriechend, behaart, dorsiventral zweizeilig beblättert; Blätter gestielt, einfach, oval bis lanzettlich, durchschnittlich 7 mm lang und 2½ mm breit, ganzrandig oder schwach ausgeschweift, der Rand mit zweizähligen Dornhaargruppen und mit einzelnen kleinen Drüsenhaaren besetzt; Nervatur des Blattes fiederförmig, Scheinnerven zahlreich, nur die Mittelrippe enthält ein Gefässbündel; stets nur ein einziger Sorus an der Spitze des Blattes, Indusium cylindrisch, an der Basis verschmälert, der Rand breit zweilippig, Lippen mit starkverdickten Zellen gesäumt. Receptaculum verlängert. Heimat Comoren, Insel St. Johanna.

Ich fand diese durch die Einfachheit aller Verhältnisse ausgezeichnete Species in einem grösseren Rasen von *Trichomanes cuspidatum* des Marburger Herbariums, welcher im Jahre 1875 von Hildebrandt an dem angegebenen Standort am Boden im Waldesschatten gesammelt worden war.

Ausser den geschilderten Scheinnerven kommen in den Blättern der *Hemiphlebien* und hin und wieder auch bei anderen Species noch ähnliche Gebilde vor, welche Prantl als Streifen bezeichnet. Dieselben unterscheiden sich von den Scheinnerven wesentlich nur durch ihre Lage im Blattparenchym, nach welcher sie nicht als zur Architektur des Blattes gehörig bezeichnet werden können. In selteneren Fällen bestehen die Streifen nur aus Deckzellen oder auch bloss aus rechteckigen Parenchymzellen, welche zu kurzen Reihen verbunden sind. Die Streifen sind entweder regellos in der Blattfläche vertheilt, oder sie umsäumen den Rand des Blattes, bisweilen im Anschluss an die regelmässige Nervatur. Ich halte auch die Streifen für rückgebildete Nerven, wenn wir auch ihre Beziehung zu dem vereinfachten Blattbau nicht mehr erkennen können. Ob die im Parenchym zerstreuten, einzelnen Streifen für die Festigung des Blattes eine nennenswerthe Bedeutung besitzen, ist wohl in Zweifel zu ziehen. Meistens sind gerade diejenigen Blätter, in denen die Streifen am häufigsten auftreten, so klein, dass an ihre Biegungsfestigkeit nur sehr geringe Ansprüche gestellt werden können. Diese Streifen sind eben verkümmernde Organe. Die Streifen des Blattrandes hingegen müssen für das Blatt entschieden einen Vortheil bieten, da sie dasselbe vor dem Einreissen schützen.

Wir finden bei den *Hymenophyllaceen* noch andere Bauverhältnisse des Blattrandes, welche den Blättern einen gleichen Nutzen gewähren. So sind z. B. bei *Hymenophyllum Neesii*, welches Mettenius abbildet, und bei andern Arten die Zellreihen in der Nähe des Blattrandes mit auffallend stark verdickten Wänden versehen. Ein exquisites Beispiel für diese Form der Wandverstärkung bietet eine kleine *Hymenophyllacee*, welche im Münchener Herbar als *Hymenophyllum Cheesemani* Baker bestimmt ist ¹⁾. Der zierliche Farn hat am Rande der kleinen, meist dichotomisch getheilten Blätter einen breiten Saum von parenchymatischen Zellen, deren Wände stark verdickt und dunkelbraun gefärbt sind. In regelmässigen Abständen entspringen aus diesem Saum Haare, welche je eine Reihe ebensolcher Zellen darstellen und welche dem Blattrande dicht angeschmiegt sind. Die Wände der braunen Zellen sind getüpfelt. Die Zellen der Blattfläche haben hier abweichend von allen sonst beobachteten Fällen zarte, unverdickte Wände. Wären diese Zellen, wie es bei den übrigen *Hymenophyllaceen* der Fall ist, auf ihre eigene Festigkeit ange-

1) Vergl. Just Jahresber. 1876 p. 344 Nr. 24 und Hooker's Icones plantarum Vol. XVII Pl. 1614 *Hym. Armstrongii*.

wiesen, so würde die Blattfläche wohl nicht ausgebreitet bleiben, sondern sich zusammenfallen und bei der geringsten Inanspruchnahme ihrer Festigkeit zerreißen. Der starke Saum von Randzellen hält aber das zarte Gewebe wie in einem festen Rahmen glatt ausgespannt und schützt es vor Zerstörung. Bei einer Reihe von Formen werden die Zellen des Blattrandes durch eine Wand parallel zur Blattfläche getheilt, so dass ein festerer Saum entsteht. Diese Erscheinung tritt gewöhnlich in den Winkeln zwischen den einzelnen Fiederabschnitten am ersten und ausgeprägtesten auf, es ist diese Stelle des Blattrandes dem Einreißen besonders leicht ausgesetzt. Einen analogen Fall ungleichmässiger Ausbildung der verschiedenen Randstellen finden wir bei *Trichomanes Krausii*, bei welchem die in den Winkeln stehenden Gruppen von Dornhaaren sechs- bis zehnzählig sind, während im Uebrigen meist nur zwei oder drei Strahlen in einer Gruppe stehen. Bei *Trichomanes reniformis*, dessen Blatt aus vier Zellschichten gebildet wird, ist der Rand von einem Polster von Zellen eingenommen, welche etwas gestreckt sind und stark verdickte Wände haben. Ganz ähnliche Schutzeinrichtungen finden wir in vielen andern Pflanzenfamilien, bei den zarten Blättern der Moose, der Selaginellen, z. B. *Selaginella apodum*, *S. cuspidatum*, ferner bei *Adiantum tenerum* u. a. m.

Die Indusien müssen wir als Schutzorgane der Sori ansehen. Bei den *Hymenophyllaceen* mit einschichtigem Blattparenchym ist der Indusienrand gleichfalls einschichtig. Im unteren Theil pflegt in den Indusien bei *Trichomanes* ein von Parenchym beiderseits überkleideter Sclerenchymmantel aufzutreten. Am weitesten hinaufreichend fand ich denselben bei *Trichomanes microphyllum* und bei verwandten kleinsten Formen. Dort war ausserdem der Saum der Indusienlippen von parenchymatischen Zellen gebildet, deren Innenwände ganz enorm stark verdickt waren (Fig. 3a).

Es fiel mir auf, dass bei den getrockneten Exemplaren in den Herbarien die zweilippigen Indusien überall weitgeöffnet waren. Entsprechend meiner Auffassung, dass das Indusium ein Schutzorgan des Sorus ist, vermuthete ich vielmehr, dass die Lippen im normalen Zustande den Sporangienstand dicht umhüllen. Um einen Aufschluss über die natürliche Stellung der Indusienlippen zu bekommen, behandelte ich ein fertiles Blatt von *Trichomanes microphyllum* mit wenig erwärmter Kalilauge. Der Erfolg war, dass sich die Lippen des Indusium, welche anfangs völlig zurückgeschlagen gewesen waren, allmählich streckten und oben fast zusammenschlossen. Als ich das Blatt darauf auswusch und in Alcohol legte, trat infolge der Wasserentziehung alsbald wieder eine Rückwärtskrümmung der Lippen ein. Das Spiel liess sich noch einige Male wiederholen. Es scheint danach, als ob die Lippen des Indusium hier ähnlich wie das Peristom der Mooskapsel hygroskopisch seien¹⁾. Selbstverständlich lässt sich ein sicherer Schluss auf diesen Versuch nicht basiren.

1) Vergl. hierzu auch Hooker Ic. pl. Vol. XVII Pl 1619 fig. 3 u. 4.

Der Vegetationspunkt des Sprosses ist bei den *Hymenophyllaceen* auffallend wenig geschützt. Bei den radiär gebauten Formen, deren Internodien gestaucht sind, ist er natürlich von der Blattrosette eingehüllt und von jungen Blattanlagen überragt. Bei den dorsiventralen Arten aber, besonders bei den wurzellosen, bei welchen die Blattanlagen erst ziemlich weit vom Vegetationspunkt ein kräftiges Wachsthum entwickeln, liegt der Stammscheitel ohne Hülle frei. Es bilden sich hier unmittelbar hinter dem wachsenden Scheitel eigenartige Drüsenhaare aus, welche sich über den Vegetationspunkt herneigen und wohl durch Schleimabsonderung aus ihren keulenförmigen Endzellen einen Schutz für denselben bilden (Fig. 14). Bei *Trichomanes peltatum*, *Trichomanes Hildebrandtii* und andern mehr bestehen diese Drüsenhaare aus längeren Zellreihen. In anderen Fällen sind sie einzellig oder es ist ausser der keulenförmigen Endzelle nur eine einzige Stielzelle vorhanden, welche wie z. B. bei *Trichomanes pusillum* mit körnigen Wandverdickungen versehen und etwas schief angeheftet ist. Bei andern Arten endlich ist die Befestigungsstelle des Stieles ganz auf die Längsseite des Haares, wohl gar auf die zweite oder dritte Zelle der Reihe verschoben. Diese letzteren Formen gleichen in ihrem Jugendstadium den vorhin geschilderten; das an der schief befestigten Stielzelle über die Insertionsstelle vorgezogene Ende wächst dann später lang aus und theilt sich durch eine oder zwei Querwände. Die schildförmige Befestigung dieser Haare ist der Grund gewesen, weshalb die älteren Autoren dieselben als Paleae bezeichnet haben. Wir finden sie, freilich nicht so zahlreich, auch an der jungen Blattanlage. An älteren Theilen sind die Paleae gewöhnlich nicht mehr vorhanden. Haarähnliche Paleae sind auch bei einigen *Polypodiaceen* vorhanden, welche Kuhn¹⁾ zu der Gruppe *Chaetopterides* vereinigt hat. In den meisten Farnfamilien sind die jungen, in Wachsthum begriffenen Blätter und Blattabschnitte, deren Gewebe noch zart und empfindlich ist, durch Einrollung vor Verletzung geschützt. Unter den *Hymenophyllaceen* besitzen viele Formen gleichfalls diese Schutzvorrichtung, andern aber fehlt sie (Fig. 16 u. 22). Die schildförmigen Blätter von *Trichomanes Hildebrandtii* und *peltatum* breiten sich an ihrem ganzen Umfange fortwachsend von Anfang an flächenförmig aus (Fig. 1). Bei den *Hemiphlebiën* sind die Blätter gleichfalls nicht eingerollt; sie zeigen zunächst vorwiegendes Längenwachsthum. Die Lamina ist z. B. bei *Trichomanes Petersii* zuerst nur durch einen sehr schmalen Flügelsaum zu beiden Seiten der Mittelrippe angedeutet, so dass die Blattanlage von einem jungen Seitenspross kaum zu unterscheiden ist. Erst wenn die Mittelrippe nahezu ihre definitive Länge erreicht hat, beginnt das Flächenwachsthum und die Anlage der Nerven höherer Ordnung. Gerade im Gegensatz dazu steht das Verhalten der jungen Blätter bei *Hymeno-*

1) V. d. Deckens Reisen III. Bd. 3. Abth. 1879 p. 7.

phyllum caudiculatum (Fig. 22). Die Spitze ist hier stark eingerollt und entwickelt sich sehr langsam. Die Blattfläche, das Parenchym zu beiden Seiten des Nerven, wird sehr früh ausgebildet, so dass alle Theile bis dicht unter die fortwachsenden Spitzen schon vollständig ausgewachsen sind. Das Blatt kann frühzeitig seine assimilatorische Thätigkeit beginnen und, wenn ihm genügende Feuchtigkeit und Nährstoffe zur Verfügung stehen, die zu seiner weiteren Entwicklung nöthigen Baustoffe selber produciren. Es wird dadurch von der Energie der Stoffzufuhr vom Stamme her im gewissen Grade unabhängig. Die wechselnde Grösse der Blätter und das Auswachsen einzelner Blattzipfel zu schwanzförmigen Bändern mögen mit diesem Umstande in Zusammenhang stehen.

c. Aufnahme und Leitung von Stoffen.

Wir haben manche *Hymenophyllaceen* ihrer Lebensweise nach als Wasserpflanzen (im weiteren Sinne) bezeichnet. Dieselben bethätigen diesen Character auch in ihrem anatomischen Bau. Wir finden bei ihnen Einrichtungen, welche die directe Wasseraufnahme in die Zellen des Blattes ermöglichen. Sehr wesentlich ist es, dass die Blattoberflächen leicht benetzbar sind. Bei den meisten Gewächsen nehmen die Blattflächen das Wasser nicht so leicht an; ja auf den Blättern der Palmen, der Ficusarten, der Aralien und Nelumbien, um aus der Menge einige Beispiele anzuführen, bleibt das Wasser in rundlichen Tropfen auf den Blättern liegen wie Quecksilber auf einer Glasplatte und wird durch die geringste Bewegung abgeschüttelt. Die Blätter der *Hymenophyllaceen* aber, soweit ich dieselben im lebenden Zustande gesehen habe, nehmen das Wasser sehr leicht an und haben deshalb unter richtigen Culturbedingungen immer eine feuchte Oberfläche. Lässt man ein Blatt von *Trichomanes peltatum* an seiner Oberfläche trocken werden und legt alsdann mit einem Glasstab einen Wassertropfen auf dieselbe, so wird der Tropfen leicht angenommen und breitet sich über eine grössere Fläche aus.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, dass die Zellen des Blattparenchyms zur Festigung ihres Gewebes hauptsächlich nur auf den Seitenwänden Wandverdickungen besitzen. Die Aussenwände bleiben zart und durchlässig. Ausserdem treten sowohl an den Zellen des Blattrandes als auch an denjenigen der Fläche Tüpfel auf, d. h. dünnere Membranstellen, welche die osmotischen Vorgänge erleichtern. Zellen, welche eine grosse mechanische Leistung auszurichten haben, sind bei den *Hymenophyllaceen*, wie wir in einigen Fällen gesehen haben, äusserst stark durch Wandverdickungen befestigt. Immer aber finden wir in diesen Zellen eine Communication mit der umgebenden Feuchtigkeit durch dünn gebliebene Wandstellen vermittelt. So sind die Indusienlippen mancher Arten am Rande von Zellen eingefasst, welche durch breite Verdickungsschichten auf den Innenwänden ganz ausserordentlich, fast steinzellenartig

verstärkt sind. Alle Aussenwände aber, die obere und untere und ebenso die den Rand bildende, sind unverdickt geblieben (Fig. 3 a). Ein zweiter ganz charakteristischer Fall liegt in den Dornhaaren vor, welche wir als Schutzvorrichtung am Blattrande einer Anzahl von *Hemiphlebien* kennen gelernt haben. Die Dornhaare sind an der dem Blattrande zugekehrten Seite meist so stark verdickt, dass die Innengrenze der Verdickungsschicht über die Mittellinie des Haares hinausgeht (Fig. 7). Die entgegengesetzte Wandseite des Haares bleibt zart. Bei den schneckenförmig gerollten Schuppen am Blattrande von *Trichomanes membranaceum* ist die Wandverdickung in den verschiedenen Zellreihen verschieden stark. Die Zellen, welche den Rand der Schuppe bilden, sind an ihrem vordern Ende wenig verstärkt. Diejenigen aber, welche zunächst um den Insertionspunkt der Schuppen gruppiert sind, haben ringsum stark verdickte Wände, also abweichend von den bisher betrachteten Fällen sind hier auch die Aussenwände mit starken Verdickungsschichten belegt. Trotzdem sind diese Zellen nicht von der Wasserzufuhr von aussen her abgeschnitten. Bei aufmerksamer Betrachtung der Zellen von der Fläche her, natürlich unter Anwendung einer hinreichend starken Vergrösserung, finden wir auf denselben gewöhnlich eine Längsreihe von Kreisen mit röthlich erscheinendem Mittelpunkt, welche der Flächenansicht von gehöften Tüpfeln täuschend ähnlich sehen (Fig. 9). Der Querschnitt lehrt, dass hier in der That Tüpfel die Verdickungsschichten durchbrechen, deren Kanal ringsum von einer Zone stärkster Wandverdickung umgeben ist (Fig. 10). In einigen Fällen liess der Querschnitt an der Tüpfelendung einen schmalen Spalt zwischen der Zellwand und den Verdickungsschichten erkennen, so dass es schien, als ob der Tüpfelkanal in einen linsenförmigen Hohlraum mündete. In anderen Fällen war ein solcher Hohlraum nicht vorhanden.

Es giebt, wie schon Mettenius eingehend nachgewiesen hat, eine ganze Reihe von völlig wurzellosen *Trichomanes*arten. Hierzu gehören alle *Hemiphlebien* ausser dem *Trichomanes muscoides*, welches nach Mettenius' Angaben in sehr seltenen Fällen Adventivwurzeln bildet. Auch *Trichomanes membranaceum*, welches bisweilen für bewurzelt gehalten wird ¹⁾, scheint mir wurzellos zu sein. Die wurzelähnlichen Organe am Stamm dieser Art sind Sprosse, die sich ihrerseits regelmässig diametral zweizeilig verzweigen. Obgleich die Blätter an diesen wurzelähnlichen Sprossen vollständig unterdrückt sind, lässt doch die Regelmässigkeit der Verzweigung, welche sich derjenigen der Hauptachse vollkommen anschliesst, schon auf die Sprossnatur dieser Organe schliessen. Ausserdem sind die Vegetationsscheitel nicht von einer Wurzelhaube bedeckt, sondern von einzelligen Paleae umhüllt. Solche wurzelähnlichen Sprosse kommen

1) Vergl. Russow, Vergleichende Untersuchungen betr. die Histologie der Leitbündelcryptogamen. Mém. de l'Acad. d. Sc. st. Petersbourg. VII. Série Tome XIX. Nr. 1. 1872. p. 95.

in verschiedenem Grade der Ausbildung bei einer ganzen Reihe von Formen vor. *Trichomanes membranaceum* stellt einen extremen Fall dar, da hier die Blätter an den umgebildeten Sprossen gänzlich fehlen. In anderen Fällen, z. B. bei *Trichomanes peltatum* und *Krausii* sind Blatt-rudimente noch deutlich nachweisbar. Es wäre denkbar, dass diese Blatt-rudimente entwicklungsfähig bleiben und, falls der umgebildete Spross durch das Absterben älterer Theile isolirt wird, zu Blättern auswachsen.

Ueber die physiologische Bedeutung der wurzelähnlichen Sprosse kann wohl kein Zweifel bestehen. Sie kriechen nach allen Richtungen im Substrat oder auf demselben hin, befestigen die Pflanze und führen derselben Nährstoffe zu, welche in Lösung von ihren Haarwurzeln aus der Umgebung aufgenommen werden. Gewöhnlich trägt an den wurzelähnlichen Sprossen jede Epidermiszelle eine Haarwurzel. Diese Gebilde kommen in reichlicher Masse bei allen Formen vor, welche keine echten Wurzeln besitzen. Sie überkleiden nicht bloss die Sprossachse, sondern auch die Blattstiele (Fig. 2 u. 21), ja sie kommen oft, z. B. bei *Trichomanes Hildebrandtii* (Fig. 5) regelmässig, auch auf der Blattunterseite vor, wenn dieselbe dem Substrat genähert ist. Uebrigens sind die Haarwurzeln nicht auf die wurzellosen *Hymenophyllaceen* beschränkt, sie finden sich auch am Stamm und Blattstiel mancher bewurzelten Form, nur den radiär gebauten Arten scheinen sie zu fehlen, man müsste denn wie Prantl die auf den Wurzeln stehenden Wurzelhaare mit diesen Gebilden in einen Begriff zusammenfassen. Prantl will, »um den unlogischen Namen Haarwurzeln für die *Rhizinen* des Stammes auszumerzen«, die hier auftretenden Haarwurzeln und Wurzelhaare, ferner die ähnlichen Gebilde an den Prothallien und bei Thallophyten alle mit dem Gesamtnamen *Rhizinen* bezeichnen. Soll etwa damit ausgedrückt sein, dass diese Dinge morphologisch gleichwerthig sind? Ich muss gestehen, dass mir der Name Haarwurzel für die braunen Haare, welche auf der Oberfläche des Stammes stehen, wenigstens nicht unlogischer erscheint als der Name *Rhizinen*. Wer die Sache kennt, wird sich bei jedem Namen das richtige vorstellen, wer sie nicht kennt, dem wird durch das Wort *Rhizinen* auch nicht mehr geholfen sein als durch das Wort Haarwurzeln.

Da die Blattzellen der *Hymenophyllaceen* zur directen Wasseraufnahme eingerichtet sind, so könnte es scheinen, als ob durch diese Einrichtung eine Wasserleitung innerhalb der Pflanzen überflüssig wird. In der That bei den einfachsten wurzellosen Formen sind die Gefässbündel so reducirt, dass eine irgendwie ausgiebige, für die ganze Pflanze genügende Wasserleitung in denselben nicht wohl angenommen werden kann. Ich will hier zum Belege die einfachsten Fälle, welche mir vorgekommen sind, etwas näher schildern.

Trichomanes microphyllum besitzt einen fadendünnen Stamm mit dem denkbar einfachsten Gefässbündel (Fig. 3). Wir finden auf dem Querschnitt

nur eine einzige, sehr enge Tracheide, welche von vier bis fünf Cambiformzellen umgeben ist. Eine im Querschnitt aus etwa fünf oder sechs Zellen bestehende Endodermis mit gewellten Radialwänden grenzt das Bündel gegen die Stammrinde ab. Die Zellen der letzteren sind in der Nähe des Bündels ziemlich dünnwandig, nehmen aber nach aussen hin schnell an Wandstärke und an prosenchymatischer Zuspitzung zu. Im Blattstiel und in der Mittelrippe des Blattes sind die Gefässbündel ebenso einfach wie im Stamm. Die seitlichen Nerven des Blattes enthalten überhaupt kein Bündel, sind also Scheinnerven. *Trichomanes pusillum*, eine nahestehende Form, besitzt fast gleich einfache Bündel in Stamm und Blatt, nur sind vielleicht die Tracheiden ein wenig länger und infolge dessen an ihren zugespitzten Enden weiter neben einander geschoben, so dass man auf dem Querschnitt häufiger zwei Tracheiden trifft. Uebrigens sind im Blatt von *Trichomanes pusillum* auch einige der seitlichen Nerven mit Bündeln ausgestattet. Damit steht jedenfalls in Zusammenhang, dass wir hier häufiger an einem Blatt mehrere Sori treffen, während bei *Trichomanes microphyllum* constant nur ein einziger an jedem Blatt vorhanden ist. Die Stammbündel der beiden soeben beschriebenen Arten sind die einfachsten, welche ich überhaupt gesehen habe, höchstens finden sich wohl in den Blattnerven höherer Ordnung bei einigen nahestehenden Arten gleiche Verhältnisse wieder (Fig. 5 u. 8). Im Uebrigen besitzen alle hierher gehörigen Formen in ihren Stammbündeln auch Phloënzellen mit verdickten stark lichtbrechenden Wänden. Gewöhnlich ist bei den *Hemiphlebien* die Zahl derselben gering. Sie liegen nur auf der dorsalen, vom Substrat abgekehrten Seite der einen oder der wenigen Tracheiden, welche der Querschnitt aufweist, so dass wir diese Bündel als collateral bezeichnen müssen. Alle *Hemiphlebien*, deren Blattrand mit Dornhaaren besetzt ist, zeigen gleiche Einfachheit des Stammbündels; selbst bei *Trichomanes Krausii*, das oft ziemlich starke Blätter entwickelt, kommt das Stammbündel nicht wesentlich über das geschilderte Stadium hinaus. Von den *Hemiphlebien* ohne Dornhaare zeigt *Trichomanes peltatum* gleichfalls nur einen einfachen Tracheidenstrang, die übrigen Formen *Trichomanes cuspidatum*, *Hookeri* etc. haben meist mehrere Tracheiden neben einander in ihrem Stammbündel. Dasselbe ist auch bei *Trichomanes membranaceum* der Fall. *Trichomanes Hildebrandtii* endlich, das meines Erachtens zu den *Hemiphlebien* gestellt werden muss, bildet hinsichtlich des Baues seines Stammbündels einen Uebergang zu den complicirter gebauten Formen. Sein Bündel ist noch ausgeprägt collateral. Die Zahl der Tracheiden beträgt auf dem Querschnitt etwa 10, die Bastzellen liegen zu einem Streifen vereinigt, welcher im Querschnitt halbmondförmig um die Gruppe der Tracheiden herumgreift. Zwischen den beiden Hauptelementen des Bündels und um dieselben liegen zahlreiche Cambiformzellen. Die Schutzscheide ist deutlich ausgeprägt. Indem nun bei höher ausgebildeten

Formen der Phloemstreifen des Bündels die Tracheidengruppe vollständig umschliesst, entstehen die concentrischen Bündel, die in verschiedener Stärke bei der Mehrzahl der *Hymenophyllaceen* vorhanden sind.

So haben wir denn gesehen, dass alle *Hymenophyllaceen* auch die allereinfachsten Arten Leitbündel besitzen. Es wird also auch eine Stoffleitung in den Pflanzen vor sich gehen. Versuchen wir darüber Aufschluss zu erlangen, welche Bedeutung diese Leitung für das Leben der Pflanzen hat. Dass es sich nicht um eine Zufuhr von Wasser und Nährstoffen in das assimilirende Gewebe handelt, zeigt sich bei den *Hemiphlebien* ganz deutlich. Dort sind gerade diejenigen Nerven, welche sich von dem Hauptnerven abzweigend in dem Blattparenchym vertheilen, denen also eine Versorgung dieser Zellen obliegen müsste, verkümmert und durch den Verlust des Leitbündels für diese Function untauglich geworden. Aus der näheren Betrachtung der Verhältnisse bei den *Hemiphlebien* können wir ausser dieser negativen Erkenntniss aber auch einen Aufschluss über die Function gewinnen, welche hier die Gefässbündel haben. Wir sehen nämlich, dass in keinem Falle ein Sorus an einem Scheinnerven gebildet wird. Stets führt ein Leitbündel zu der Ursprungsstelle desselben hin. Durch das umhüllende Indusium ist das Receptaculum an der directen Wasseraufnahme verhindert. Da in demselben fortgesetzt Wachstums- und Entwicklungsvorgänge stattfinden, so ist in ihm offenbar ein gesteigertes Wasserbedürfniss vorhanden, welches durch die Zuleitung aus den benachbarten Zellen des Indusiums vielleicht nicht hinreichend befriedigt wird. Es ist also wohl möglich, dass das Receptaculum das für die physiologischen Processe in seinen Zellen nöthige Wasser wenigstens theilweise durch das Gefässbündel bezieht. Wichtiger ist es indess wohl noch, dass durch das Bündel die für das Wachstum erforderlichen Baustoffe, welche durch die Assimilation in dem Blattparenchym erzeugt worden sind, dem Entstehungsorte der Sori zugeführt werden, da ja hier eine Production der Baustoffe aus anorganischen Substanzen nicht stattfinden kann. Es giebt noch andere Theile an der Pflanze, welche die zu ihrem Aufbau nöthigen Stoffe nicht selbst erzeugen oder aus ihrer nächsten Umgebung beziehen können. Das sind die Sprossscheitel und die Blätter in ihren ersten Jugendstadien. Auch für sie wird das Gefässbündel als Zufuhrweg für Assimilationsproducte eine hohe Bedeutung haben. Das hier gesagte gilt nicht nur für die *Hemiphlebien*, die Receptacula, die Sprossscheitel und die jungen Blattanlagen werden in jedem Falle auf die Stoffzufuhr durch die Gefässbündel angewiesen sein.

Wie gelangen nun die Assimilationsproducte in die Leitbündel hinein? Das Bündel des Stammes und des Blattstiels ist ringsum von einer sclerenchymatisch ausgebildeten Rindenschicht eingehüllt. In den Blattnerven dagegen wird das Bündel meist nur oben und unten von einem Sclerenchymstreifen bedeckt, während seitlich zwischen den Zellen des Blattparenchyms und dem Bündel eine Stoffleitung leicht erfolgen kann (Fig. 8).

Bei *Hymenophyllum scabrum* greifen die sclerenchymatischen Bündelbelege seitlich um das Bündel herum. Sie schliessen aber nicht zu einem continuirlichen Cylinder zusammen, sondern lassen beiderseits einen schmalen Spalt für parenchymatische Zellen frei. Es bleibt also auch hier ein Weg für den Stoffverkehr zwischen Blattparenchym und Gefässbündel offen. Ein ähnliches Verhalten zeigen sehr viele der grösseren Formen. Wo aber wie bei *Hymenophyllum Malingii* (Fig. 25) die Leitbahnen des Blattes ringsherum von stark verdickten Elementen eingeschlossen sind, dort wird durch zahlreiche weite Poren in den verdickten Zellwänden der Uebertritt von Stoffen aus dem assimilirenden Gewebe in die Gefässbündel ermöglicht.

In den chlorophyllhaltigen Blattzellen sind die Wände, wo eine irgendwie bedeutende Wandverdickung auftritt, von zahlreichen Tüpfeln durchsetzt. Dass diese Tüpfel nicht lediglich einen Stoffaustausch zwischen den nächstliegenden Zellen, sondern eine Wanderung der Stoffe in einer bestimmten Richtung vermitteln, lässt sich auch daraus ersehen, dass dieselben bei einer Anzahl von Formen, z. B. *Trichomanes microphyllum*, *pusillum*, *punctatum* u. a. m. nach den verschiedenen Richtungen hin verschieden zahlreich sind. Die Wände, welche zu der Richtung vom Blattrande nach dem Nerven hin senkrecht stehen, sind auffallend viel reichlicher getüpfelt als diejenigen, welche parallel zu dieser Richtung verlaufen. Oft sind ausserdem die Blattzellen in dieser Stromrichtung etwas gestreckt und in regelmässigen Reihen angeordnet. Als exquisites Beispiel für dieses Verhalten kann das Blatt von *Hymenophyllum Smithii* angeführt werden (Fig. 23).

Wenn wir kurz noch einmal die geschilderten Verhältnisse überblicken, so kommen wir zu dem Resultat, dass bei den *Hymenophyllaceen* eine Saftströmung in der Richtung vom Blattrande gegen den Blattnerv hin und durch die Leitbahnen zu den im Wachsthum begriffenen Theilen der Pflanze, zu den Sprossscheiteln, den Blattanlagen und den Entwicklungsstellen der Sporangien stattfindet. Bei den kleinen Formen mit stark reducirten und sehr einfachen Bündeln mag dieser Strom der einzige oder doch der überwiegende sein. Sie leben meist im Moose kriechend oder dem Substrat etwa der Oberfläche eines bewachsenen Baumstammes angeschmiegt. Das Wasser, welches die Blätter dieser kleinen Pflänzchen hier benetzt und von ihnen aufgesaugt wird, enthält sicher Nährstoffe in ausreichender Menge in Lösung, so dass eine Zufuhr anorganischer Stoffe aus dem Substrat durch Vermittelung des Sprosses kaum erforderlich sein dürfte. Anders ist das bei den Arten, welche grössere vom Substrat sich erhebende Blätter ausbilden. Dort steht dem Blattparenchym nur Regen- oder Thauwasser zur direkten Aufnahme zur Verfügung, es müssen also vom Substrat her Nährstoffe in das assimilirende Gewebe geleitet werden. Wir finden daher bei solchen Formen stärkere Gefässbündel mit gut entwickelten Tracheiden vor. Die Aufnahme der Stoffe aus dem Boden erfolgt durch die Adventivwurzeln und wo diese fehlen in erster Linie durch die Haarwurzeln des auf oder in dem Substrat hinkriechenden

Sprosses. Es ist leicht zu ersehen, weshalb es keine radiär gebauten *Hymenophyllaceen* ohne Wurzeln giebt. Der gedrungene Stamm erhebt sich vom Substrat, könnte also auch bei reichlichster Bekleidung mit Haarwurzeln nicht die Aufnahme von anorganischen Substanzen aus dem Boden vermitteln.

d. Belichtung und Durchlüftung.

Der Belichtung sind die im Urwalde unter dem dichten undurchdringlichen Laubdache wachsenden *Hymenophyllaceen* nur in schwachem Grade ausgesetzt. In den meist einschichtigen Blättern ist das Chlorophyll direct dem diffusen Licht des Waldesschattens zugänglich. Die Chlorophyllkörner sind meistens gross und soweit es nach der Beschaffenheit des Untersuchungsmaterials geschlossen werden kann, den Aussenwänden angelagert. Diese Wände sind gewöhnlich etwas uhrglasartig nach aussen gewölbt. Oft erreicht die Vorwölbung eine beträchtliche Höhe. Bei mehreren Arten, *Trichomanes auriculatum*, *Hymenophyllum Karstenianum*, *speciosum*, *plumosum* und *Malingii* constatirt Mettenius eine papillenförmige Ausstülpung der äusseren Wände des Blattparenchyms, welche über die Seitenwände der Zellen ebenso hoch oder höher hinaufragt als die Höhe dieser Wände beträgt. Es kommt so eine starke Flächenvergrösserung in den Zellen zustande, welche die Ausbildung möglichst vieler Chlorophyllkörner in den Zellen gestattet. *Hymenophyllum Malingii* ist eine sehr eigenthümliche Form. Dieselbe bildet gar keine Blattfläche aus. Die Assimilation ist einfach auf die parenchymatischen Zellen beschränkt, welche die fiederförmig verzweigten Blattnerven überkleiden. Jede dieser Zellen ist zu einer langen cylindrischen Papille ausgewachsen (Fig. 25), deren Wand dicht mit Chlorophyllkörnern belegt ist. Die Papillen auf der stärker beleuchteten Blattoberseite sind etwas länger als diejenigen der Unterseite.

Die Formen, deren Blattfläche aus mehreren Zelllagen besteht, führen das Chlorophyll fast ausschliesslich in den Zellen der äussersten Schichten. Bei *Trichomanes reniformis* enthalten sowohl die Zellen der Blattoberseite als diejenigen der Unterseite die Chlorophyllkörner; ebenso ist es bei *Hymenophyllum dilatatum* und *scabrum*. Die Blätter sind, sei es durch die Länge des Blattstiels, sei es durch die aufrechte Stellung, so gerichtet, dass das Licht beide Seiten derselben treffen kann. *Trichomanes Hildebrandtii* hingegen, dessen Blätter ebenfalls aus mehreren Zellschichten zusammengesetzt sind (Fig. 5), besitzen Chlorophyllkörner nur in der äussersten Zellschicht der Blattoberseite. Dieser Umstand steht mit dem Wuchs der interessanten Form im engsten Zusammenhang. Da in der Litteratur nur spärlich Angaben über *Trichomanes Hildebrandtii* vorhanden zu sein scheinen ¹⁾, — mir ist keine einzige zu Gesicht gekommen, — so will

1) In Just. Jahresbericht ist angegeben A. Braun, Die von J. M. Hildebrandt auf der Comoreninsel Johanna gesammelten Gefässkryptogamen.

ich diese Form, soweit es das Material erlaubt, hier etwas eingehender beschreiben.

Trichomanes Hildebrandtii Kuhn (Fig. 1) ist im Jahre 1875 von Hildebrandt auf St. Johanna, einer Insel der Comorengruppe gesammelt worden, wo es im schattigen Walde an Baumstämmen bei 600 bis 800 Meter Meereshöhe vorkommt. Durch gütige Mittheilung des Herrn Rektor Rensch in Berlin, welcher seiner Zeit die von Hildebrandt gesammelten Pflanzen vertheilt hat, erfuhr ich, dass unter den damals erbeuteten Exemplaren nur zwei fructificirende vorhanden gewesen sind, von denen das eine in das Berliner Herbarium, das andere in Privatbesitz überging. Das Exemplar des Berliner Herbariums scheint verloren gegangen zu sein, wenigstens wurde mir von dort auf meine Anfrage mitgetheilt, dass *Trichomanes Hildebrandtii* Kuhn nicht vorhanden sei. Das in Privatbesitz befindliche Exemplar war mir nicht zugänglich. Ich bin also bei meiner Beschreibung auf die sterilen Exemplare des Marburger Herbariums angewiesen. Die interessante Art besitzt einen kriechenden Stamm, welcher vom Rücken nach der Bauchseite etwas zusammengedrückt ist, sein Querschnitt ist also nicht kreisförmig, sondern oval. — Abflachung der Achsen kommt auch sonst im Pflanzenreiche häufig vor, z. B. bei den Phyllocladien mancher Stammsucculenten. In derselben Weise wie bei *Trichomanes Hildebrandtii* findet sie sich bei *Pothos celatocaulis*¹⁾, einer tropischen Aroidee, welche seit einigen Jahren in europäischen Gärten cultivirt wird. Die Pflanze wächst gleich dem *Trichomanes* der Oberfläche eines Baumstammes dicht angeschmiegt. Der Spross wird von den breiten, starren Blättern völlig überdeckt. Interessant ist auch die Abflachung des Stammes bei *Polypodium Schomburghianum*, welches Goebel²⁾ in seinen Pflanzenbiologischen Schilderungen erwähnt. Der Stamm ist hier vielmals breiter als dick und flachrinnenförmig der Oberfläche des Baumstammes angeschmiegt. Er schützt die zarten Würzelchen der Unterseite und ist auch wohl imstande, Nährstoffe und Feuchtigkeit festzuhalten. —

Adventivwurzeln fehlen dem *Trichomanes Hildebrandtii*, wenigstens an allen Stücken des Marburger Herbariums. Die Unterseite des Stammes ist dicht mit Haarwurzeln bedeckt. Die Blätter stehen scheinbar in einer Linie auf dem Rücken des Stammes. Dass es sich indes auch hier um eine dorsiventral zweizeilige Beblätterung handelt, deren Zeilen nur sehr genähers sind, schliesse ich aus der Stellung der Seitensprosse. Dieselben entspringen je einer neben jedem Blatte abwechselnd rechts und links, so dass sie in zwei gegenüberstehenden Zeilen auf den Flanken des Hauptsprosses stehen. Die Blätter sind ungestielt und schildförmig. Die Nerven verlaufen von der Anheftungsstelle des Blattes aus radial zur Peripherie

1) Flore des serres. 1880. p. 133.

2) a. a. O. p. 228.

und gabeln sich wiederholt. Auf der Unterseite der Nerven stehen zahlreiche Haarwurzeln (Fig. 5). Die Blätter sind der Rinde des von der Pflanze bewohnten Baumes dicht angeschmiegt. Sie sind in der Jugend völlig kreisrund, ihre Anheftungsstelle liegt genau in der Mitte der Fläche. Sobald sie mit den benachbarten Blättern in Berührung kommen, treten Unregelmässigkeiten ein, die für uns ein besonderes Interesse haben. Ueberall nämlich, wo ein Blatt von einem andern überdeckt wird, stellt es bald das Wachsthum ein, auch das überdeckende Blatt wird an der betreffenden Stelle in der Weiterentwicklung gehemmt. An den Stellen, wo der Blattrand nicht mit den Nachbarblättern zusammentrifft, wächst er gleichmässig aus, so dass statt der Kreisform eine unregelmässig lappige Gestalt des Blattes zustande kommt. Wir haben hier offenbar einen Fall vor uns, in welchem die Form eines pflanzlichen Organes durch äussere Umstände direct beeinflusst wird, und dieser Einfluss lässt sich hier ziemlich leicht übersehen. Die von einem andern Blatt überdeckten Theile des Blattrandes sind ungenügend beleuchtet, so dass in ihren Zellen die Production von Baustoffen beeinträchtigt wird. An dem überdeckenden Blatte aber ist die betreffende Stelle gleichfalls nicht imstande, ihr Wachsthum weiter zu führen, weil sie durch das überdeckte Blatt von dem Substrat abgeschnitten ist. Das obere Blatt bildet an der Berührungsstelle gar keine Haarwurzeln auf seinen Nerven aus. Von den Blättern, welche mir vorlagen, mass das grösste in der Richtung quer zum Spross über 9 cm, während seine Ausdehnung in der Richtung des Stammes beiderseits durch die Nachbarblätter sehr beeinträchtigt war.

Hinsichtlich des anatomischen Baues von *Trichomanes Hildebrandtii* ist schon bei anderer Gelegenheit erwähnt worden, dass das Bündel des Stammes collateral ist. Die Blattnerven sind sehr einfach gebaut, sie zeigen auf dem Querschnitt oft nur eine Tracheide. Ein Beleg von Sclerenchym ist nur auf der Oberseite vorhanden (Fig. 5). Da die Blätter mit ihrer Unterseite dem Substrate angeschmiegt sind, so ist eine mechanische Schutzvorrichtung für das Bündel oder zur Erhöhung der Biegefestigkeit des Blattes an dieser Seite nicht erforderlich. Eine Zahl der letzten Gabelzweige der Nervatur besteht bei den Exemplaren des Marburger Herbariums aus Scheinnerven. Da nirgends Sori vorhanden, die Blätter also wohl auch noch nicht ausgewachsen sind, so wäre denkbar, dass die Ausbildung eines Bündels noch nachträglich auch in diesen Gabelästen auftreten könnte. Indes ist das nach Form und Grösse der unter den Sclerenchymsträngen der Scheinnerven liegenden Zellen nicht anzunehmen. Ich habe daher kein Bedenken getragen, das *Trichomanes Hildebrandtii* als zur Gruppe der *Hemiphlebien* gehörig zu bezeichnen, mit dessen Mitgliedern es auch sonst einige Uebereinstimmung zeigt. Erwähnenswerth ist noch das Vorkommen der Stegmata bei dem *Trichomanes Hildebrandtii*. Dieselben liegen sowohl oberhalb der Bündel als

Deckzellen der Sclerenchymstränge, als auch an der Blattunterseite, wo kein Sclerenchym vorhanden ist. Deckzellen kommen unabhängig vom Sclerenchym auch sonst noch bei den *Hymenophyllaceen* vor, z. B. bei *Trichomanes elegans*, *Trichomanes diversifrons*, wo Reihen von Deckzellen in dem Blattparenchym als Scheinnerven auftreten.

Kohl nimmt an, dass die Function der Deckzellen in der Regulirung des Wasserverkehrs zwischen den Bastzellen und den Intercellularräumen bestehe. Da bei den *Hymenophyllaceen* meistens keine Intercellularräume, bisweilen auch nicht einmal Sclerenchymzellen in der Nähe der Stegmata liegen, so kann die von Kohl ausgesprochene Ansicht hier keine Geltung haben.

Trichomanes Hildebrandtii gehört zu den epiphytischen Formen. Die epiphytische Lebensweise, welche bei den *Hymenophyllaceen* ausserordentlich häufig gefunden wird, ist für die Pflanzen hinsichtlich der Beleuchtungsverhältnisse des Urwaldes offenbar von Vortheil. Die Pflanzen werden durch dieselbe der Lichtquelle näher gerückt und können ihre assimilirenden Flächen besser dem Lichte darbieten. Die flach schildförmige Ausbildung der Blätter muss dabei für *Trichomanes Hildebrandtii* von besonderem Vortheil sein.

Es ist mir zweifelhaft, ob nicht in der Litteratur bisweilen *Trichomanes Hildebrandtii* mit *Tr. peltatum* verwechselt worden ist, oder ob nicht gar eine dritte nahestehende Species existirt. So findet sich z. B. bei Moseley¹⁾ in seinem Bericht über die Flora der Admiralitätsinseln folgende Stelle: »On one of these tree trunks I found also a very curious fern, *Trichomanes peltatum*. The fronds of the fern are orbicular in form and adhere in rows (as connected by the slender rhizome) to the bark. They are pressed absolutely flat against the bark, so as to look like an adhering crust, and have all the appearance of a Riccia or some such form, for which, indeed, I took them when I gathered the specimens by cutting off flakes of the bark. Diese Schilderung passt viel besser zu *Trichomanes Hildebrandtii* als zu dem kleinen zierlichen *Trichomanes peltatum*, dessen Blätter, wenn schildförmig, meist etwas trichterartig sind, so dass krause Räschen entstehen, für welche ich die Bezeichnung pressed absolutely flat against the bark ebenso ungeeignet finde als den Vergleich mit einer Riccia. Die Entwicklung der schildförmigen Blätter bei *Trichomanes Hildebrandtii* habe ich nicht verfolgen können, bei *Trichomanes peltatum* verläuft dieselbe ähnlich wie sie für die Blätter höherer Pflanzen von Goebel²⁾ geschildert worden ist. Uebrigens sind bei dieser Species nicht alle Blätter schildförmig ausgebildet und bei den schildförmigen liegt die Anheftungsstelle des sehr kurzen Blattstiels sehr häufig dem Rande der

1) Challenger Expedition. Linn. Journ. — Botany, Vol. XV p. 79.

2) Entwicklungsgeschichte p. 234.

Blattfläche mehr oder weniger genähert. Die Ansicht Fourniers¹⁾, dass die nicht schildförmigen Blätter von *Trichomanes peltatum* Jugendstadien seien, ist schon von Luerssen²⁾ richtig gestellt worden. Ich sah ganz nahe hinter dem Stammscheitel junge Blätter schildförmig ausgebildet, während weiter rückwärts marginal befestigte Blätter mit schildförmigen gemischt standen. Die Ausbildung der einzelnen seitlichen Organe ist überhaupt bei *Trichomanes peltatum* eine sehr ungleichmässige. Ein Sprossstück, welches ich untersuchte (Fig. 26), besass an der Hauptachse sechs Blätter. Das älteste (Bl. 1) war fast ausgewachsen, von stattlicher Grösse und schildförmig. Die Befestigungsstelle des Stieles war dem vorderen Rande sehr genähert. Neben dem Blatt entsprang ein kurzer Seitenspross, der nahe an der Spitze ein noch unentwickeltes Blatt trug. Das nächstjüngere Blatt des Hauptsprosses (Bl. 2) war ganz in der Ausbildung zurückgeblieben und kaum noch als Höckerchen mit keilförmiger Scheitelzelle zu erkennen. Neben dem Höckerchen entsprang ein Seitenspross mit zwei Blättern, von denen das jüngere schildförmige und central befestigte das ältere an Grösse vielmals übertraf. Das dritte Blatt (Bl. 3) des Hauptsprosses war sehr kurz gestielt und besass eine schildförmige Lamina, deren Durchmesser einen halben Millimeter noch nicht erreichte. Ein Seitenspross war hier wie bei den folgenden Blättern noch nicht entwickelt. Das nächste Blatt (Bl. 4) hatte die verhältnissmässig stattliche Grösse von fast $\frac{1}{2}$ cm. Darauf folgte wieder ein höckerförmiges Rudiment (Bl. 5) und endlich als jüngstes Blatt (Bl. 6) eine Anlage mit $1\frac{1}{2}$ mm langem Stiel und noch schwach entwickelter, schief schildförmiger Lamina. Auch in der Maximalgrösse der Blätter scheint *Trichomanes peltatum*, vorausgesetzt dass nicht verschiedene Species vorliegen, sehr zu variiren. Baker³⁾ giebt an, dass die Blätter $\frac{1}{2}$ bis $1\frac{1}{2}$ Zoll Durchmesser haben. Die Specimina, welche ich gesehen habe, besaßen fertile, also ausgewachsene Blätter, deren grösste Ausdehnung höchstens 1 cm betrug, d. i. noch nicht einen halben Zoll, und Luerssen⁴⁾ erwähnt einen ganzen Rasen von *Trichomanes peltatum*, welcher nur $1\frac{1}{2}$ cm mass.

Das Blatt von *Trichomanes peltatum* ist zart und durchscheinend, eine Eigenschaft, welche sehr vielen Blättern bei den *Hymenophyllaceen* zukommt, und welche für die Durchleuchtung des Blattes sicher von hoher Bedeutung ist. Die durchscheinenden Blätter sind ein Merkmal, welches die *Hymenophyllaceen* mit manchen echten Wasserpflanzen gemeinschaftlich besitzen, z. B. *Elodea* und *Potamogeton*. Da die Oberfläche des Wassers einen grossen Theil der auffallenden Lichtstrahlen reflectirt, so erhalten die submersen Pflanzen nur ein abgeschwächtes Licht, ihre

1) Filices Novae-Caledoniae. An. sci. nat. 5 série XVIII. p. 253.

2) Bot. Centralbl. XI p. 28.

3) Linn. Soc. Journ. bot. Vol. IX.

4) a. a. O.

Belichtungsverhältnisse sind also im Allgemeinen denen der *Hymenophyllaceen* im Urwalde ähnlich. H. Schenk¹⁾ nimmt sogar an, dass auch den Wasserpflanzen nur diffuses Licht zur Verfügung steht. Diese Ansicht ist indes wohl nur zutreffend für stark verunreinigtes Wasser, wie es etwa in einem Sumpfe vorkommt, oder für Tümpel, deren Oberfläche dicht mit Lemna und anderen Schwimmpflanzen bedeckt ist. Im klaren Wasser werfen die Gegenstände bei Sonnenschein einen scharfen Schatten. Eine weitere Aehnlichkeit im Bau der *Hymenophyllaceen* und der Wasserpflanzen ist die sehr häufig auftretende, weitgehende Zertheilung der Blattfläche in zarte Zipfel. Durch dieselbe wird die Gesamtaussenfläche der Blattzellen wesentlich vergrößert. Diese Einrichtung hat bei den *Hymenophyllaceen* für die Assimilation eine ähnliche Bedeutung, wie das papillenartige Auswachsen der Blattzellen, welches oben erwähnt worden ist.

Haben wir im Vorstehenden hin und wieder auf die Uebereinstimmung in der Structur der *Hymenophyllaceen* und der echten Wasserpflanzen hinweisen können, so dürfen wir jetzt nicht vergessen, auf einen scharfen Unterschied zwischen denselben aufmerksam zu machen. Die submersen Gewächse sind von der directen Berührung mit der atmosphärischen Luft abgeschnitten, wir finden daher bei ihnen besondere Einrichtungen, welche zu diesem Umstande in Beziehung stehen. Dahin gehört als gewöhnlichster Fall die Ausbildung weiter Intercellularräume. Die in der Luft wachsenden *Hymenophyllaceen* besitzen dagegen nur sehr enge oder zum Theil überhaupt keine Intercellularräume, auch in mehrschichtigen Blättern schliessen die Zellen überall lückenlos zusammen. Wo in dickeren Sprossen und Wurzeln enge Intercellularen vorhanden sind, da treten dieselben doch nicht mit der atmosphärischen Luft durch Spaltöffnungen oder Lenticellen in Verbindung, sie bilden also offenbar kein Durchlüftungssystem. Anders ist das bei dem den *Hymenophyllaceen* nahe stehenden *Loxsonia*. Dasselbe besitzt in seinen Blättern Spaltöffnungen und ein zusammenhängendes System von Zwischenzellräumen. Das Material, welches ich von *Loxsonia* besass, konnte ich nicht verwenden, um die eigenartigen Bauverhältnisse dieser in mancher Hinsicht interessanten Form zu studiren; ich muss diese Aufgabe verschieben, bis sich eine günstigere Gelegenheit bietet.

e. Wasserversorgung.

Die Verhältnisse der Wasserversorgung sind im Urwalde im Allgemeinen sehr günstig. Durch das wechselnde Spiel der meteorologischen Erscheinungen wird allnächtlich eine gründliche Durchfeuchtung des ganzen Waldes herbeigeführt. Die dem Waldboden durch den herabtropfenden Nachthau zugeführte Nässe reicht für den Bedarf der im

1) Biologie der Wassergewächse. Bonn 1886.

Boden wurzelnden Pflanzen aus. Bei den Epiphyten, welche durch ihre Lebensweise von dem Waldboden abgeschnitten sind, finden wir Einrichtungen, welche in anderer Weise eine hinreichende Wasserversorgung vermitteln. Goebel hat in seinen Pflanzenbiologischen Schilderungen für eine ganze Reihe von epiphytischen Gewächsen aus den verschiedensten Familien solche Einrichtungen beschrieben. Wir werden sehen, dass deren ähnliche auch bei den epiphytischen *Hymenophyllaceen* vorhanden sind. Es handelt sich dabei in der Mehrzahl der Fälle darum, dass das Wasser des Thaues oder Regens von den Pflanzen durch irgendwelche besondere Baueinrichtungen aufgesammelt und festgehalten wird.

Die einfachsten Vorrichtungen dieser Art finden wir in der Haarbekleidung der Organe. Schon der dichte Filz von Haarwurzeln, welcher bei den Arten ohne Adventivwurzeln und auch bei vielen bewurzelten Formen den Spross und die Blattstiele überzieht, ist im Stande eine ziemliche Menge Wassers festzuhalten (Fig. 2 u. 21). Ich fand in dem Haarwurzelfilz bei *Tr. Krausii*, *punctatum*, *muscoides* und vielen andern häufig eine ganze Flora von Diatomeen und Süßwasseralgen angesiedelt, ein Beweis, dass in demselben während des Lebens der Pflanze dauernd Wasser vorhanden gewesen sein muss. Auch die Gruppen von stark verdickten Dornhaaren, mit welchen, wie früher geschildert wurde, der Blattrand bei einer Anzahl von *Hemiphlebien* besetzt ist, werden gemäss ihrem Bau und ihrer Anordnung als Wasserfangeinrichtung dienen, welche besonders dem jungen Blatte wesentliche Vortheile gewährt (Fig. 18). Am letzteren sind die Haargruppen einander so nahe gerückt, dass sie seitlich übereinander greifen und so ein festes maschiges Gitterwerk dicht über der Blattfläche bilden, zwischen welchen eine hinreichende Wassermenge fest gehalten werden kann. Die Schuppen am Blattrande von *Trichomanes membranaceum* schliessen zwischen ihren Windungen schmale Spalten ein, in denen der Blattrand liegt (Fig. 24). Er wird dadurch nicht nur gegen mechanische Angriffe geschützt, sondern auch mit Wasser versorgt. Bei der Benetzung wird nämlich das Wasser capillar in die schmalen Spalten hineingezogen und vor Verdunstung geschützt lange festgehalten werden, so dass die Zellen des Blattrandes immer von Feuchtigkeit umhüllt sind.

Eine dichte Bekleidung mit sternförmigen Haaren finden wir auf den Blättern sehr vieler *Hymenophyllen* vor. Als Beispiele seien *Hymenophyllum Sieberi*, *speciosum*, *Raddianum*, *hirsutum* genannt. Bei anderen Arten sind diese Haarbildungen auf den Blattrand und die Nerven beschränkt, z. B. bei *Hymenophyllum Lyallii*, *ciliatum*, *subtilissimum*. Die Strahlzellen der Sternhaare sind parallel zur Blattfläche an einer Stielzelle befestigt und bilden dicht gestellt, indem sie seitlich über einander greifen, einen filzigen Ueberzug, unter welchem das die Blätter benetzende Wasser gesammelt und wenn nicht am Verdunsten, so doch am Abtropfen verhindert wird. In manchen Fällen kommen die Sternhaare in Verbindung

mit andern Wasserfangeinrichtungen vor. Ich führe als Beispiel *Hymenophyllum Malingii* an. Wir haben früher gesehen, dass die Parenchymzellen dieser Art lang papillenförmig auswachsen. Die schmalen Spalten zwischen den einzelnen Papillen saugen, da die Oberfläche im lebenden Zustande jedenfalls leicht benetzbar ist, Wasser an und halten dasselbe vermöge der Capillarität fest. Die Sternhaare sind nun so gestellt, dass ihre Strahlen gerade dicht oberhalb der Papillenkuppen ausgebreitet sind (Fig. 25). Offenbar wird dadurch die Fähigkeit des Blattes, Wasser längere Zeit festzuhalten, noch vermehrt. Aehnliche Verhältnisse finden sich, wenn auch nicht so charakteristisch ausgeprägt, ferner bei *Hymenophyllum speciosum* und *Karstenianum*. Bei *Hymenophyllum Fusugasugense* und einigen verwandten Formen kommen mit den Sternhaaren zugleich Lamellen auf den Blättern vor, deren Vorhandensein mir gleichfalls mit der Wasserversorgung zusammenzuhängen scheint. Die Lamellen sind flügelartige Auswüchse des die Blattnerven bedeckenden Gewebes, welche in der Textur dem Blattparenchym gleichen. Hinsichtlich der Zahl und Stellung der Lamellen kommen einige Verschiedenheiten vor. Karsten¹⁾ unterscheidet danach die ihm bekannten hierher gehörenden Formen in folgender Weise:

A. *Segmentis liberis*.

H(ymenophyllum) Fusugasugense Krst. parenchymate laevi, nervis utrinque alatis.

H. tomentosum Knz. parenchymate laevi, nervis supra alatis.

H. plumosum Klf. parenchymate papilloso.

B. *Segmentis adnatis*.

H. lobato-alatum Kl. nervis subtus alatis.

H. pyramidatum Desv. foliis lineari-lanceolatis, nervis utrinque alatis.

H. sericeum Sw. foliis elongato-oblongis, basi angustatis, nervis utrinque alatis, indusiis longissime ciliatis.

H. Cubense Sturm, foliis elongata-oblongis, basi angustatis, nervis utrinque alatis, indusiis breviter ciliatis.

Ausser den in dieser Tabelle genannten Arten sind mir noch zwei bekannt geworden, bei denen sich eine Lamellenbildung findet: *Hymenophyllum dipteroneurum* A. Braun und *Trichomanes Martiusii*, welches letzteres in den Herbarien manchmal mit *Trichomanes crispum* L. verwechselt wird. Alle diese Formen, — wohl auch *Hymenophyllum dipteroneurum*, dessen Standort unbekannt ist —, haben in ihrer Lebensweise das Gemeinsame, dass sie lange, schmale, gefiederte Blätter ausbilden, welche von Felsen oder Baumästen herabhängen. Das von oben an dem Blattstiel herabrieselnde Wasser wird nun zwischen den Lamellen aufgefangen werden und sich in den von ihnen gebildeten schmalen Rinnen

1) Flora Columbiae t. II. p. 108. Vergl. auch Sturm in Bot. Zeitg. 1859 p. 297.

längs der Nerven des Blattes vertheilen. Die Spalten zwischen den Lamellen sind wenigstens in der Tiefe so schmal, dass sie capillar wirken müssen. Bei *Hymenophyllum dipteroneurum* schien es mir, als ob die Lamellen sich je nach der Menge des aufgefangenen Wassers an einander legen oder von einander entfernen können. Um diese Erscheinung sicher constatiren zu können, müsste man lebendes Material besitzen. Uebrigens bedeutet die Lamellenbildung zugleich auch eine Vermehrung des assimilirenden Gewebes; als solche werden wohl lediglich die lokalen, hautartigen Auswüchse der Blattfläche aufzufassen sein, welche entfernt von den Nerven, z. B. bei *Hymenophyllum cristatum*, *Jamesonii* u. a. m. auftreten. Die Lamellen finden sich gut entwickelt meist nur an älteren Blättern oder doch an den älteren Theilen der Blätter. Die jungen noch im Wachsthum begriffenen Blatttheile sind stark eingerollt und dicht mit Haaren überkleidet. Die Haare entwickeln sich sehr früh; da sie auf den jugendlichen Partien der Blätter noch dicht zusammengedrängt stehen, so sind sie wohl geeignet, diesen Theilen einen ausreichenden Wasservorrath zu sichern. Ueberhaupt kann man an den Blattanlagen der *Hymenophyllaceen* ganz allgemein constatiren, dass die Haarbildungen sehr früh auftreten und sich schnell entwickeln. Gewöhnlich findet man die Blattprimordien in einen dichten pinselförmigen Schopf langer Haare versteckt, so dass eine stete Benetzung des jungen Organes dadurch völlig gesichert erscheint (Fig. 17).

Nicht immer spielen Haargebilde bei der Wasserspeicherung der *Hymenophyllaceen* eine Rolle. Die Blätter von *Trichomanes Hildebrandtii* sind der Rinde eines Baumes flach angepresst. Die Blattnerven springen auf der Unterseite etwas vor, so dass der Umriss des Blattquerschnittes an der Unterseite bogenförmig ausgeschweift ist (Fig. 5). Das Parenchym zwischen den einzelnen Nervensträngen liegt der Baumrinde also nicht unmittelbar an; es sind kleine flache Längsspalten zwischen der Rinde und dem Blatt vorhanden, in denen das eingedrungene Thau- oder Regenwasser capillar festgehalten wird. Bei dieser Form tritt vielleicht noch eine andere wasserspeichernde Einrichtung in Function. Wir haben gesehen, dass das Chlorophyll nur in der oberen Zelllage des mehrschichtigen Blattes enthalten ist. Die nach unten hin gelegenen Schichten bestehen aus weiten Zellen mit geringem Plasmahalt, deren Wände von Tüpfelkanälen durchbrochen sind. Es ist wohl möglich, dass diese Zellen Wasser und Nährstoffe aufspeichern, und dass bei eintretender Trockenheit die assimilirenden Zellen eine Zeit lang von hier aus versorgt werden können. Bei *Trichomanes reniforme* und bei *Hymenophyllum dilatatum* und *scabrum* sind zwischen den chlorophyllhaltigen Zellschichten der Ober- und Unterseite des Blattes ebenfalls solche grosslumigen Zellen vorhanden, welche den Eindruck eines Wassergewebes machen. Wir hätten also hier eine Speicherung der Feuchtigkeit im Innern des Blattes. Bei vielen *Hymeno-*

phyllaceen, z. B. *Trichomanes lucens*, *apiifolium*, *cellulosum*, *longisetum trichoideum*, *Pluma*; *Hymenophyllum crispatum*, *Zollingeri* u. a. m. finden wir die Blattfläche in feine Zipfel zertheilt. Auch diese Einrichtung kann zum Wasserfang dienen. Sieht man ein durch den Sprühregen eines Springbrunnens feucht erhaltenes Cultur-Exemplar von *Trichomanes radicans* darauf hin an, so findet sich, dass zwischen den übereinander greifenden Zipfeln des Blattes Wassertropfen festgehalten werden, welche auch nicht verschwinden, wenn der benetzende Sprühregen zeitweilig unterbrochen wird. Ein besonders deutliches Beispiel für die wassersammelnde Function zerschlitzter Blätter bietet *Trichomanes sibthorpioides* Bory dar. Bei einem aufgeweichten Exemplar ist die vielzerschlitzte Blattfläche, welche ausgebreitet nierenförmigen Umriss hat, tutenförmig aufgerollt, wobei die einzelnen Zipfel seitlich etwas übereinander geschoben sind (Fig. 19). In der Trockenheit dagegen sind alle Zipfel des Blattes zu einem dichten Pinsel zusammen gedrängt (Fig. 20). Das Spiel dieser Wasserfangvorrichtung wird bei der lebenden Pflanze etwa folgenderweise verlaufen. Wird das eintrocknende, pinselförmig zusammengedrückte Blatt durch Thau oder Regen benetzt, so saugt es das Wasser in die Hohlräume zwischen den Zipfeln ein. Es dehnt sich allmählich aus, bis es die tutenförmige Gestalt wieder erlangt hat. Schwindet das Wasser durch Verbrauch und Verdunstung, so rücken die Blattzipfel allmählich wieder zusammen und halten die Feuchtigkeit bis zum letzten Rest eng umschlossen, indem die Transpiration durch die Oberflächenverringerung auf ein Minimum herabgesetzt wird.

Die Eigenthümlichkeit zwischen den feinzertheilten Blattzipfeln Wasser zu speichern, ist nicht auf die *Hymenophyllaceen* beschränkt. Goebel ¹⁾ erwähnt in seiner Arbeit über epiphytische Farne und Muscineen ein Lebermoos *Trichocolea*. Bei demselben ist das Stämmchen von einem durch die Blattzipfel gebildeten System capillarer Hohlräume umgeben. Unter den Farnen können ausserdem als hierher gehörig einige *Todea*-arten genannt werden. *Todea superba* z. B. besitzt im Grossen und Ganzen denselben anatomischen Blattbau, wie etwa *Hymenophyllum dilatatum*. Es sind nur wenige Zellschichten vorhanden, Spaltöffnungen fehlen. Die Zartheit der Zellaussenwände, sowie der Umstand, dass die Pflanze nur im feuchten Raum und bei steter Benetzung gedeiht, machen es wahrscheinlich, dass hier ebenfalls das Wasser direct von den Zellen der Blätter aufgenommen wird. Die Blattfläche ist vielfach zertheilt und kraus. Die Wirksamkeit dieser Einrichtung für die Wasserspeicherung ist so bedeutend, dass jedes Blatt etwa sein eigenes Gewicht an Wasser äusserlich festzuhalten vermag.

Bei einer Anzahl stattlicher *Hymenophyllen* mit zertheilten Blättern ist das Blattparenchym stark gekräuselt, so dass zwischen den umgefalteten

1) Morphol. u. biologische Studien I. Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg. Vol. VII.

Randpartien und der mittleren Blattfläche schmale Hohlräume gebildet werden, in denen in Folge der Capillarität Feuchtigkeit festgehalten wird (Fig. 15). Beispiele für diese Erscheinung bieten ausser anderen *Hymenophyllum amoenum*, *flexuosum*, *fimbriatum*, *undulatum*, *imbricatum*, *crispum*, *quadrifidum*. Im jugendlichen Zustande der Blätter entstehen bei diesen Formen durch die Kräuselung der Blattfläche an der eingerollten Spitze eine Anzahl von Falten und Oehrchen, welche oftmals, z. B. bei *Hymenophyllum dichotomum* (Fig. 16), mit den Wassersäcken einiger Lebermoose der Form nach grosse Aehnlichkeit haben.

Die formenreiche Familie der *Hymenophyllaceen* bietet gewiss noch viele interessante biologische Erscheinungen dar, deren Erkennung und Untersuchung das Material nicht zuliess. Vielleicht erlaubt mir ein Besuch in der Heimat der *Hymenophyllaceen* früher oder später, manche in den vorstehenden Blättern ausgesprochene Vermuthung zu bestätigen oder zu berichtigen, auf manche offen gebliebene Frage die richtige Antwort zu finden.

Schluss.

Die *Hymenophyllaceen* sind von älteren Systematikern wohl als einen Uebergang von den Moosen zu den Farnen vermittelnde Familie angesehen worden. Van den Bosch trennt sie als *Bryopterides* ganz von den eigentlichen Farnen ab. Presl erkennt zwar an, dass dieselben in ihrem Bau mit den echten Farnen die grösste Analogie zeigen, indes kommt auch er zu dem Schluss, dass sie wegen ihrer morphologischen und anatomischen Eigenthümlichkeiten »von den *Filicaceen* ziemlich weit entfernt sind, und als ein Verbindungsglied mit den Moosen und Lebermoosen angesehen werden müssen«. Mettenius räumt, wie vor ihm schon Linné, Swartz und Willdenow den *Hymenophyllaceen* die niedrigste Stufe unter den Farnen ein ¹⁾. Auch Prantl vertritt die gleiche Anschauung. Er hält die *Hymenophyllaceen* für diejenige Entwicklungsreihe, »welche unter den vom Urtypus der Farne ausstrahlenden Reihen den verhältnissmässig niedrigsten Höhepunkt der Entwicklung erreicht hat«. Sehen wir uns nun einmal die *Hymenophyllaceen* daraufhin an, was uns berechtigen könnte, dieselben als dem Urtypus der Farnreihe wesentlich näherstehend zu betrachten als die übrigen Familien der Farne.

Ich habe schon früher Gelegenheit genommen zu betonen, dass die *Hymenophyllaceen* überall, auch in ihren einfachsten Formen, den Character typischer Gefässpflanzen zeigen. Dieser Character spricht sich selbstverständlich nicht allein in dem Vorhandensein von Gefässbündeln aus, sondern auch der morphologische Aufbau zeigt in allen wesentlichen Punkten die-

1) Aehnlich verfährt Trevisan, welcher die *Hymenophyllaceen* als *Bryoflicales* ans Ende der Farnreihe stellt. Bull. de la soc. royale de bot. Belgique tom. XVI p. 4.

selben Verhältnisse, wie bei den übrigen Gefäßpflanzen. Wir finden einen regelmässig beblätterten und verzweigten Spross, hoch entwickelte Blätter mit einer in bestimmter Gesetzmässigkeit vertheilten Nervatur, Sporangien, welche bis auf das rein äusserliche Merkmal der Orientirung des Annulus denen der übrigen Farne gleichen. Einzig könnte das Fehlen der Wurzeln bei gewissen *Trichomanes*-arten als eine Abweichung der morphologischen Ausbildung aufzufassen sein. Wir wissen indes nicht, ob die hierher gehörigen Formen wirklich in jedem Entwicklungsstadium wurzellos sind. Keimpflanzen der als wurzellos bezeichneten Species sind bisher nicht beobachtet worden. Bei den übrigen Arten wird, soweit Beobachtungen vorliegen, bei der Keimung eine Wurzel ausgebildet. Für *Hymenophyllum Tunbridgense* haben Janzewski und Rostafinski das Vorhandensein einer Keimwurzel am Embryo constatirt. Dieselbe geht freilich bald zu Grunde. Goebel giebt an, dass alle von ihm beobachteten Keimlinge von *Hymenophyllaceen* eine Keimwurzel besaßen. An einer Keimpflanze von *Trichomanes alatum*, welche ich zu beobachten Gelegenheit fand, war ebenfalls eine deutliche Keimwurzel ausgebildet (Fig. 17). Ich habe Ursache zu der Vermuthung, dass auch diejenigen *Trichomanes*-arten, bei welchen normal keine Adventivwurzeln auftreten, eine Keimwurzel entwickeln: Wenn aber auch wirklich gar keine Wurzel angelegt würde, so könnten wir daraus noch keineswegs den Schluss ziehen, dass diese wurzellosen Formen dem Urtypus der Entwicklungsreihe näher stehen. Wir finden den gänzlichen Mangel der Wurzeln z. B. auch in einer hochentwickelten Familie der Samenpflanzen wieder. Wie Goebel¹⁾ nachgewiesen hat, bilden die *Utricularien* weder bei der Keimung noch in der späteren Entwicklung Wurzeln aus.

Es zeigt sich also, dass uns die Morphologie nicht zu der Folgerung zwingt, dass diese Familie gegenüber den anderen Farnen eine grössere Ursprünglichkeit besitzt. Noch weniger können die anatomischen Eigenthümlichkeiten der Familie einen solchen Schluss bedingen. Die Einfachheit des Blattparenchyms, den Mangel einer Epidermis, theilen die *Hymenophyllaceen* mit einigen Formen aus anderen Familien, z. B. mit *Todea superba* und *pellucida*. Das zarte Blatt von *Selaginella cuspidata* kann insofern zum Vergleiche herangezogen werden, als dasselbe nur in der Nähe der Mittelrippe Spaltöffnungen besitzt, während die dem Rande genäherten Partien in ihrem Baue dem Blattgewebe der *Hymenophyllaceen* sehr ähnlich sind. Die gleichen Verhältnisse finden sich auch bei *Lycopodium linifolium* L., welches wie die *Hymenophyllaceen* epiphytisch in schattigen Wäldern Westindiens lebt. Auch *Adiantum delicatulum* möge hier erwähnt werden. Nach der Abbildung, welche Martius²⁾ giebt,

1) Morphologische und biologische Studien. Ann. du Jard. Bot. de Buitenzorg. Vol. IX.

2) Icon. plant. crypt. Bras. p. 103.

scheint es, als ob nur bestimmt umgrenzte Blatttheile dieser Pflanze mit einer Spaltöffnungen führenden Epidermis versehen sind, während andere mit ihnen abwechselnde Partien ganz den Bau der *Hymenophyllaceen*-blätter besitzen. Leider fehlte es mir an Material, um das *Adiantum* hinsichtlich des erwähnten Verhältnisses genauer untersuchen zu können. Endlich sei noch darauf hingewiesen, dass auch eine ganze Anzahl von Wasserpflanzen aus höheren Familien, *Potamogeton*, *Elodea* u. a. m. in dem Mangel einer Epidermis im physiologischen Sinne mit den *Hymenophyllaceen* übereinstimmen. Dasselbe ist auch bezüglich der Einfachheit in der Ausbildung der Gefässbündel der Fall.

Man könnte zu der Ansicht gelangen, dass freilich wohl die Einfachheiten im Bau der *Hymenophyllaceen*, der Mangel der Wurzeln bei manchen Formen, das ausnahmslose Fehlen einer Epidermis mit Spaltöffnungen u. a. m. bei höherstehenden Pflanzen Analoga finden; während aber hier solche Structureigenthümlichkeiten vereinzelt als Rückbildungen auftreten, seien dieselben bei den *Hymenophyllaceen* ursprünglich. Mit einiger Phantasie liesse sich dieser Gedanke anschaulich erörtern. Wir finden bei den einfachsten Formen statt der Wurzeln wurzelähnliche Sprosse, welche an ihrer äussersten Spitze von haarähnlichen Paleae überwölbt und in ihrer ganzen Ausdehnung von Haarwurzeln bedeckt sind. Denken wir uns, dass die Entstehung der Paleae durch die fortschreitende Entwicklung aus den Scheitelsegmenten in die Scheitelzelle selbst verlegt werde, so sehen wir aus dem ursprünglichen wurzelähnlichen Spross eine echte Wurzel mit Haube und Wurzelhaaren hervorgehen; der Umstand, dass das Stützblatt der wurzelähnlichen Sprosse bei einigen Formen unterdrückt wird, lässt uns auch vermuthen, wie die an die Blattstellung gebundene, regelmässige Anordnung dieser Gebilde in die von der Blattstellung unabhängige Anordnung der Adventivwurzeln übergegangen sein mag. — Es ist wohl möglich, dass die Umbildung der Sprosse zu Wurzeln im Laufe der phylogenetischen Entwicklung einmal in ähnlicher Weise vor sich gegangen ist. Wurzelähnliche Sprosse finden sich auch bei *Haplomitrium Hookeri*, bei *Sendtnera Sauteriana*, ferner bei *Psilotum* u. a. m. — Innerhalb der Familie der *Hymenophyllaceen* in ihrem gegenwärtigen Bestande haben wir aber diesen Umwandlungsprocess nicht zu suchen. Schon der Umstand, dass von manchen in jeder andern Beziehung verwandtschaftlich sehr nahe stehenden Arten die einen wurzellos, die andern mit typischen Wurzeln versehen sind, lässt die Annahme gewagt erscheinen, dass ein so auffälliger Unterschied in dem Grade der morphologischen Differenzirung vorliegen sollte. Einen strikten Beweis gegen diese Annahme liefert eine von Mettenius mitgetheilte Thatsache. Die Hemiphlebien sind alle ohne Adventivwurzeln, nur bei dem im übrigen von den nächstverwandten Species nicht wesentlich verschiedenen *Trichomanes muscoides* fand Mettenius unter hunderten von untersuchten

Exemplaren eine wirkliche Adventivwurzel. Wenn man nicht annehmen will, dass der phylogenetische Uebergang von den wurzellosen zu den bewurzelten Formen sich unvermittelt und sprungweise vollzogen habe, so kann das gelegentliche Auftreten einer echten Wurzel bei dem *Trichomanes muscoides* nur angesehen werden als ein Wiederauftreten einer in früherer Epoche erworbenen Eigenschaft, welche durch den eigentümlichen Entwicklungsgang, den die Art eingeschlagen hat, zurückgedrängt worden war. Es folgt daraus, dass *Trichomanes muscoides* und die ihm nahestehenden Hemiphlebien von einer bewurzelten Stammform abzuleiten sind. Insofern es sich hier um das Aufgeben complicirterer Structurverhältnisse und um eine Rückkehr zu einfacherem Bau handelt, können wir diese Formen und mit ihnen alle wurzellosen Arten der Familie als Rückbildungen auffassen. Für die meisten wurzellosen Formen wird diese Annahme noch durch eine andere Thatsache bestätigt, nämlich durch das Vorkommen der Scheinnerven. Wie in einem früheren Abschnitt gezeigt wurde, existiren zwischen den allereinfachsten Formen der Scheinnerven und den echten Blattnerven alle Uebergänge. Manche in ihrem Basaltheil vollständige Blattnerven gehen nach der Spitze zu allmählich in Scheinnerven über, indem das Gefässbündel nach kurzem Verlaufe aufhört, so dass nur der Sclerenchymbeleg mit seinen Deckzellen und endlich in einigen Fällen gar nur die letzteren allein jederseits von einer Parenchymschicht überkleidet den Nervenstrang fortsetzen. Neben den mit dem Hauptnerven des Blattes in unmittelbarer Berührung stehenden Scheinnerven finden sich solche, die nur durch eine oder wenige Parenchymzellen von dem Verbinde mit der Mittelrippe abgeschnitten sind, und so fort alle Uebergänge bis zu den ganz abgesondert im Blattparenchym zerstreuten kurzen Streifen, welche bisweilen nur aus einer einzigen Sclerenchymzelle mit oder ohne Deckzellen gebildet werden. Diese Streifen für in Entstehung begriffene Blattnerven zu erklären, dürfte wohl niemandem in den Sinn kommen schon aus dem einen Grunde nicht, weil sie mit der vorhandenen Nervatur des Blattes nicht im Zusammenhang stehen. Wir haben also hier in der Rückbildung begriffene Organe vor uns, welche bekunden, dass die einfachsten *Hymenophyllaceen* von complicirter gebauten Formen abstammend zur Vereinfachung des morphologischen Baues fortgeschritten sind, was so wohl in der Unterdrückung der Wurzelbildung als in der Vereinfachung der Blattform und der Reduction der Leitbündel zum Ausdruck kommt.

Wie steht es nun mit dem allen *Hymenophyllaceen* eigenthümlichen Mangel der Spaltöffnungen. Dürfen wir vielleicht dieses Merkmal als eine ursprüngliche Eigenschaft ansehen, dürfen wir annehmen, dass die *Hymenophyllaceen* auf einer so niedern Stufe der Entwicklung stehen, dass es bei ihnen überhaupt noch nicht zur Ausbildung einer Epidermis mit Spaltöffnungen gekommen ist. Die Möglichkeit der Annahme, dass

auch die anatomische Einfachheit des Blattbaues durch Rückbildung entstanden sei, ist schon oben durch den Hinweis auf spaltöffnungslose Blütenpflanzen dargethan worden. Die Annahme gewinnt an Wahrscheinlichkeit dadurch, dass *Loxsoma*, dessen nahe Verwandtschaft mit den *Hymenophyllaceen* durch die Anlage der Sori und die Form der Sporangien hinreichend dokumentirt ist, wohlentwickelte Spaltöffnungen besitzt. Wir brauchen uns indes nicht damit aufzuhalten, den bündigen Machweis zu liefern, es genügt für uns, gezeigt zu haben, dass gerade die einfachsten Formen in der Familie, die *Hemiphlebien* und ihre nächsten Verwandten, sicher in einem vom Complicirten zum Einfacheren fortschreitenden Entwicklungsgange sich befinden. Die neueren Bestrebungen, die Anatomie der Systematik dienstbar zu machen, haben überdies gezeigt, wie inconstant anatomische Merkmale sind, und wie wenig dieselben bei der Beurtheilung des phylogenetischen Entwicklungsstadiums und der Stellung einer Pflanze im System ins Gewicht fallen können gegenüber den aus der Morphologie und Entwicklungsgeschichte entnommenen Merkmalen. Die letzteren aber, der regelmässige Aufbau der Sprosse, die Art der Sorusbildung, die Entwicklung und Form der Sporangien, die Sporenbildung und ferner das Vorhandensein einer Wurzelanlage beim Embryo in allen beobachteten Fällen weisen mit Bestimmtheit darauf hin, dass die *Hymenophyllaceen* den *Polypodiaceen* wenigstens ebenso nahe stehen als irgend eine andere Familie der homosporen Leptosporangiaten, und uns in ihrem Bau keinerlei Anhaltspunkte bieten, welche den Gang der Differenzirung von der Moosfrucht zur einfachsten Farnpflanze anzudeuten gestatten. Die rein äusserliche Aehnlichkeit, welche Prantl zwischen dem *Hymenophyllaceen*-Sorus und der *Anthoceros*-Kapsel findet, die entfernte Uebereinstimmung, welche etwa zwischen dem Indusienrande von *Trichomanes hispidulum* und dem Peristom gewisser Laubmoose besteht, dürfte den mitgetheilten Thatfachen gegenüber wohl kaum irgendwelche Bedeutung behalten; jedenfalls trägt sie nicht zur Erklärung des Entwicklungsganges bei.

Wollen wir uns über den Gang der Differenzirung eine Vorstellung machen, so können wir uns dabei nur auf Analogieschlüsse stützen. Die Erfahrungen haben gelehrt, dass die Variation der Arten, aus welcher ja die phylogenetische Fortentwicklung resultirt, aus innern, uns unbekannten Ursachen in bestimmten Richtungen fortschreitet. In der Formenreihe der Algen sehen wir vom Einfachen zum Höherentwickelten fortschreitend auf stielrunde Formen flächenartig verbreiterte folgen. Eine allmählich auftretende regelmässige Gliederung des Thallus leitet hinüber zu der Differenzirung in Achse und seitliche Organe. Ebenso sehen wir bei den Lebermoosen auf die unregelmässig thallosen Formen regelmässigere folgen, welche uns durch die Uebergangsformen der *Blasia*, *Fossombronia*, *Androcryphia*, *Petalophyllum* zu den foliosen Arten führen. Bei den

Laubmoosen finden wir statt des dichotomischen monopodialen Aufbau der Sprosse, zugleich sehen wir auch in dem anatomischen Bau des Sprosses Wandlungen sich vollziehen, welche auf die Entwicklung von Leitbündeln hindeuten. Aehnlich wie in diesen Formenreihen wird auch bei den Farnen der Uebergang von thallöser Urform zu der Höhe der gegenwärtigen Entwicklung sich vollzogen haben. Das ist alles, was wir darüber sagen können. Die Einzelheiten dieser Entwicklung mit mehr oder minder reicher Phantasie zu construiren, kann nicht die Aufgabe der exacten Wissenschaft sein.

Figurenerklärung.

Tafel XIV.

- Fig. 1. *Trichomanes Hildebrandtii* Kuhn. Habitusbild in natürl. Grösse.
 Fig. 2. *Trichomanes microphyllum* Ghgn. Habitusbild vergrössert.
 Fig. 3. » » Stammquerschnitt.
 Fig. 3a. » » Zellcomplex vom Rande des Indusium.

Tafel XV.

- Fig. 4. *Trichomanes membranaceum* L. Blattquerschnitt.
 Fig. 5. *Trichomanes Hildebrandtii* Kuhn. Blattquerschnitt.
 Fig. 6. *Trichomanes microphyllum* Ghgn. Drüsenhaar von der Blattunterseite.
 Fig. 7. » » Dornhaargruppe am Blattrande.
 Fig. 8. *Trichomanes membranaceum* L. Querschnitt des Blattnerven.
 Fig. 9. » » Zellcomplex von einer Schuppe des Blattrandes.
 Fig. 10. » » Querschnitt einer Zelle der Schuppe.
 Fig. 11. *Trichomanes alatum* Sw. Brutknospenbildung an der Spitze eines Prothalliumfadens.
 Fig. 12. *Trichomanes holopterum* Kze. Prothallium ohne Geschlechtsorgane.
 Fig. 13. *Trichomanes alatum* Sw. Theil eines Blattes, aus dessen Rand ein Prothallium hervorsprosst (Aposporie).

Tafel XVI.

- Fig. 14. *Trichomanes peltatum* Bak. Sprossscheitel.
 Fig. 15. *Hymenophyllum flexuosum* All. Cunn. Theil des Blattes schwach vergrössert.
 Fig. 16. *Trichomanes dichotomum* Kze. Junges Blatt.
 Fig. 17. *Trichomanes alatum* Sw. Keimpflanze. Pr = Prothallium, W = Wurzel, Bl = Blatt.
 Fig. 18. *Trichomanes punctatum*. Junges Blatt.
 Fig. 19. *Trichomanes sibthorpioides* Bory. Befeuchtetes Blatt.
 Fig. 20. Dasselbe im trocknen Zustande.

Tafel XVII.

- Fig. 21. *Trichomanes Petersii* A. Gray. Bl. 1 und 2 Blätter des Hauptsprosses. Ax. 1 und 2 die zugehörigen Seitensprosse.
 Fig. 22. *Hymenophyllum caudiculatum* Mart. a, b, c jugendliche Entwicklungsstadien des Blattes.
 Fig. 23. *Hymenophyllum Smithii*. Blattabschnitt.
 Fig. 24. *Trichomanes membranaceum* L. Schuppe vom Blattrande.
 Fig. 25. *Hymenophyllum Malingii*. Blattquerschnitt. St. = Sternhaar.
 Fig. 26. *Trichomanes peltatum*. Bl. 1—6 Blätter des Hauptsprosses.

Die Moose von vier Kilimandscharo-Expeditionen.

Von
Dr. Karl Müller Hal.

Es sind erst vier Jahre her, seitdem wir von der Mooswelt des berühmten afrikanischen Schneeberges eine leichte Vorstellung haben. Denn im Jahre 1886 veröffentlichte William Mitten in Hurstpierpoint 38 Arten, welche der ehemalige in Uganda so grausam ermordete Bischof von Mombasa, Hannington, auf dem Berge selbst gesammelt hatte. Zwei Jahre später aber gab uns auch ein deutscher Reisender, Dr. Hans Meyer-Leipzig, Gelegenheit, eine Sammlung von Moosen zu untersuchen, die er daselbst eigenhändig zusammen gebracht hatte. Diese Sammlung war um so wichtiger, als sie namentlich die höheren und höchsten Lagen des Berges betraf, während Hannington sich auf die unterste Waldzone hatte beschränken müssen. Sie ergab zugleich 25 neue Arten und erweiterte unsere Kenntnis der betreffenden Mooswelt also nicht unbedeutend. Dieser glückliche Erfolg bestimmte den eifrigen Reisenden, bei seiner zweiten Besteigung des Berges im Jahre 1888 den Moosen abermals seine Aufmerksamkeit zuzuwenden, und zwar mit nicht geringerem Erfolge. Nicht nur übertrifft diese zweite Sammlung die erste um ein Beträchtliches, sondern sie zeigt uns die fragliche Welt auch in einem ganz neuen Gepräge, da die auf einer anderen Seite des Berges gesammelten Moose wieder ganz andere Arten sind, unsere bryologische Einsicht folglich höchst bedeutend erweitern. Dazu kam noch ein zweiter glücklicher Umstand, der nämlich, dass der ungarische Graf Teleki eine ganz ähnliche Expedition auf den Kilima-Ndscharo im Jahre 1887 veranstaltete und einen Begleiter hatte, der sich ebenfalls der Moose annahm: den österreichischen Schiffs-Lieutnant L. v. Höhnel. Auch dieser eifrige Mann hat mir seine Sammlung zugehen lassen, und so bin ich in der sehr glücklichen Lage, mit Zustimmung von Dr. Hans Meyer das von Jenem Gesammelte mit dem des Letzteren vereinigen zu können. In Folge dessen haben wir an neuen Arten nicht weniger als 44 erhalten, von denen 33 durch Hans Meyer, 11 durch L. Höhnel entdeckt wurden. Da jedoch die erste Meyersche Sammlung bereits 25 neue Arten einbrachte, so erhöht sich die Zahl der von diesem Reisenden entdeckten Moos-Arten auf 69 neue. Bischof Hannington's Sammlung hatte aber 38 Arten ergeben, von denen ich nur 27 als mir unbekannt und sicher einreihen darf. So erhöht sich die Zahl der vom Kilima-Ndscharo bis jetzt bekannten Moose auf die immerhin schon bedeutende Zahl von 94 Arten. Eine Zahl, welche uns in den Stand setzt, das Moosbild des Schneeberges in geographischer Beziehung einigermaßen gestalten zu können.

Im Ganzen kann man wohl sagen, dass die unterste Zone als die des Urwaldes einen völlig tropischen Charakter an sich hat, welcher

etwa bis 3000 m reicht. Hier kehren dieselben Typen wieder, die man auch in anderen Tropenländern als Begleiter des Urwaldes kennt: Rhizogonium, Syrrhopodon, Rhacopilum, Hookeria, Daltonia, Cryphaea, Prionodon, Calypothecium, Papillaria, Orthostichella, Trachypus, Erythrodontium, Distichia, Microthamnium, Fabronia und Erpodium. Nur inklinirt diese tropische Mooswelt z. Th. nach Madagaskar, z. Th. nach dem subtropischen Kaplande, ohne jedoch im Allgemeinen mit diesen Floren-Gebieten zusammen zu fallen. Ueber 3000 Meter beginnt eine unendliche Grasfläche, und wie sie höher steigt, um so mehr nimmt der tropische Charakter ab, der einer gemässigten oder arktischen Zone zu. In letzterer Beziehung treten dann Typen hervor, wie sie unsere eigenen Gebirge charakterisiren: Andreaea, Distichium, Polytrichum, Campylopus, Scopella, Rhodobryum, Eubryum, Argyrobryum, Senodictyum, Sclerodictyum, Philonotis, Eubartramia, Syntrichia, Anoetangium, Hedwigia, Ulozygodon, Eugrimmia und Brachythecium. In der Mitte zwischen diesen beiden extremen Zonen steht eine vermittelnde mit folgenden Typen: Leucoloma, Leptostomopsis, Philonotula, Plicatella, Leptodontium, Braunia und Pterogonium, welche z. Th. an die höheren Gebirge der Maskarenen erinnern. Es folgt hieraus, dass der Kilimandscharo wider alles Erwarten nur solche Moos-Typen besitzt, welche man in den betreffenden Höhenlagen nach Analogie anderer Länder erwarten durfte; nur dass fast sämtliche Arten eigenthümliche oder solche sind, die mit anderen Arten verwandter Länder korrespondiren. Ich kenne jedoch eine Ausnahme von diesem Gesetze, und selbige ist allerdings sehr bemerkenswerth: Erpodiopsis. Sie allein, welche eine eigene Familie, Gattung und Art vertritt, kommt dem Kilimandscharo bis jetzt als eigenthümlich zu und deutet darauf hin, dass bei dem wahrscheinlichen grossen Reichthume des Berges an Laubmoosen noch mancher andere neue Typus zur Erscheinung gelangen könnte. Hiervon aber abgesehen, unterliegt der Berg dem allgemeinen geographischen Gesetze, dass seine Mooswelt mit zunehmender Höhe immer nördlicher wird.

Um jedoch den Raum dieser Abhandlung nicht über Gebühr auszu-dehnen, unterlasse ich eine Aufzählung der bisher bekannten Kilimandscharo-Moose mit näherem Eingehen auf dieselben und führe hier nur ihre Namen auf, um ein Gesamtbild in systematischer Reihenfolge zu entwerfen, wie folgt.

I. Musci cleistocarpici.

Trib. **Erpodiopsidae.**

1. Erpodiopsis Kilimandscharica C. Müll.

II. Musci schistocarpici.

Trib. **Andreaeaceae.**

2. Andreaea firma m., 3 A. striata m.

III. Musci stegocarpici.**a. Musci acrocarpici.**Tribus **Fissidenteeae.**

- 4.
- Fissidens caloglottis*
- m., 5.
- F. undifolius*
- m.

Tribus **Distichiaceae.**

- 6.
- Distichium Kilimandscharicum*
- m.

Tribus **Funariaceae.**

- 7.
- Funaria (Eufunaria) Kilimandscharica*
- m.

Tribus **Pilniaceae.**

- 8.
- Mnium Kilimandscharicum*
- m.

- 9.
- Rhizogonium spiniforme*
- Brid. nach Mitten.

Tribus **Polytrichaceae.**

- 10.
- Eupolytrichum nano-globulus*
- m., 11.
- E. pungens*
- m., 12.
- E. Höhneli*
- n. sp.

Tribus **Dicranaceae.**

- 13.
- Leucoloma dichotomum*
- Brid. nach Mitten, 14.
- L. drepanocladium*
- n. sp.

- 15.
- Campylopus procerus*
- n. sp., 16.
- C. Höhneli*
- n. sp., 17.
- C. Joannis Meyeri*
- m., 19.
- C. acrocaulos*
- m., 20.
- C. leucochlorus*
- .

- 21.
- Scopella acanthoneura*
- n. sp.

Tribus **Bryceaeae.**

- 22.
- Rhodobryum minutirosatum*
- m., 23.
- Rh. rosulatum*
- n. sp., 24.
- Rh. spathulosifolium*
- n. sp.

- 25.
- Leptostomopsis Meruensis*
- n. sp.

- 26.
- Eubryum bicolor*
- n. sp., 27.
- E. nano-torquescens*
- n. sp., 28.
- E. inclusum*
- n. sp.

- 29.
- Brachymenium capitatum*
- Mitt. fide Mitten.

- 30.
- Argyrobryum ellipsifolium*
- n. sp., 31.
- A. argentisetum*
- n. sp.

- 32.
- Senodictyum afro-crudum*
- n. sp.

- 33.
- Apalodictyum minutirete*
- m.

- 33.
- Sclerodictyum compressulum*
- m.

Tribus **Bartramiaceae.**

- 35.
- Philonotis tricolor*
- n. sp.

- 36.
- Philonotula gemmascens*
- n. sp.

- 37.
- Eubartramia strictula*
- m.

- 38.
- Plicatella Kilimandscharica*
- m., 39.
- Pl. subgnaphalea*
- n. sp.

Tribus **Calymperaceae.**

- 40.
- Orthotheca aspera*
- Mitt., nach demselben.

Tribus **Pottiaceae.**

- 41.
- Syntrichia Meruensis*
- n. sp.

- 42.
- Senophyllum pygmaeum*
- m.

- 43.
- Leptodontium Joannis Meyeri*
- , 44.
- L. pumilum*
- n. sp., 45.
- L. repens*
- n. sp., 46.
- L. radicosum*
- Mitt., nach Mitten.

Tribus **Zygodontaeae.**

47. *Anoctangium viridatum* n. sp., 48. *A. pusillum* Mitt., 49. *A. paucidentatum* m.

50. *Ulozygodon Kilimandscharicus* n. sp.

51. *Stenomitrium erosum* Mitt.

Tribus **Orthotrichaceae.**

52. *Euorthotrichum serrifolium* n. sp., 53. *E. undulatifolium* m.

Tribus **Grimmiaceae.**

54. *Eugrimmia immergens* n. sp., 55. *E. calyculata* m., 56. *E. obtusolinealis* n. sp., 57. *E. argyrotricha* n. sp., 58. *E. campylotricha* m.

Tribus **Brauniaceae.**

59. *Hedwigia Joannis Meyeri* m.

60. *Hedwigidium teres* m.

61. *Braunia Schimperiana* Bryol-Eur.

b. **Musci pleurocarpici.**Tribus **Erpodiaceae.**

62. *Erpodium Joannis Meyeri* n. p.

Tribus **Hypopterygiaceae.**

63. *Rhacopilum Africanum* Mitt.

Tribus **Hookeriaceae.**

64. *Callicostella versicolor* Mitt.

Tribus **Mniodelphaceae.**

65. *Daltonia patula* Mitt.

Tribus **Cryphaeaceae.**

66. *Cryphaca Welwitschii* Mitt., nach demselben, 67. *Cr. scariosa* n. sp.

Tribus **Neckeraceae.**

68. *Porotrichum subpennaeforme* n. sp., 69. *E. ruficaule* n. sp., 70. *P. pterops* Rehm., nach Mitten.

71. *Distichia platyantha* n. sp.

72. *Pilotrichella chlorothrix* n. sp.

73. *Orthostichella imbricatula* m., 74. *O. tenellula* n. sp., 75. *O. profusicaulis* n. sp..

76. *Eriocladium cymatocheilos* n. sp.

77. *Papillaria serpentina* n. sp., 78. *P. breviculifolia* n. sp.

79. *Prionodon Rehmanni* Mitt., nach demselben.

80. *Calypothecium Africanum* Mitt.; nach demselben.

81. *Trachypus serrulatus* P. B. nach Mitten.

82. *Leptodon Smithii* Mohr.

83. *Pterogonium Kilimandscharicum* n. sp.

84. *Entodon (Erythrodontium) rotundifolius* n. sp.

Tribus **Hypnaceae.**

85. *Anomodon devolutus* Mitt., nach demselben.
86. *Microthamnium glabrifolium* n. sp.
87. *Cupressina Höhneli* n. sp.
88. *Hyocomiella bartramiophila* n. sp.
89. *Brachythecium gloriosum* n. sp., 90. *B. nigro-viride* n. sp.
91. *Tamariscella loricalycina* n. sp.
92. *Trismegistia trichocolea* n. sp.
93. *Helicodontium subcompressum* n. sp.
94. *Rigodium toxarion* Mitt., nach demselben.

Hiermit ist das Moosbild des Kilima-Ndscharo's geliefert. Die Sammlung Höhnel's aber dehnt sich auch auf die Region des Kenias aus und zeigt, wie selbige in Leikipia, namentlich am Fusse der Settima-Kette, welche der Engländer Thomson die Aberdare-Kette nannte, die Moos-Flora mit jener des Kilima-Ndscharo's verbindet. In Folge dieses innigen Zusammenhanges mochte ich diese Moose nicht von denen des Kilima-Ndscharo's trennen und habe auch sie hier mit beschrieben. Es sind folgende:

1. *Fissidens lineari-limbatus* n. sp.,
2. *Rhodobryum Keniae* n. sp.,
3. *Eubartrama Leikipiae* n. sp.,
4. *Syntrichia Leikipiae* n. sp.,
5. *Eutrichostomum Leikipiae* n. sp.,
6. *Euorthotrichum Leikipiae* n. sp.,
7. *Macrocoma liliputana* n. sp.,
8. *Braunia entodonticarpa* n. sp.,
9. *Lasia flagellacea* n. sp.,
10. *Fabronia Leikipiae* n. sp.,
11. *Calyptothecium Höhneli* n. sp.,
12. *Rhystophyllum Höhneliana* n. sp.,
13. *Orthostichella sericea* n. sp., 14. *O. curvifrons* n. sp., 15. *O. capillicaulis* n. sp.,
16. *Papillaria filifunalis* n. sp.,
17. *Euanomodon filivagus* n. sp.,
18. *Herpetineuron Leikipiae* n. sp.,
19. *Cupressina Höhneli* n. sp.,
20. *Leptodon Smithii* Mohr.

Mithin hat also der Reisende das Verdienst, auf der berühmten und gefährlichen Expedition des Grafen Teleki nicht weniger als 30 neue Moos-Arten entdeckt zu haben. Das Geheimniss beruht darin, dass auch die dortigen Moose sehr unter einander wachsen und folglich in kleinen Rasen oft mehrere Arten ergaben. Ich habe darum bei jeder Art den Namen des Sammlers ausdrücklich angegeben, um das Verdienst eines jeden der beiden Männer hervorzuheben.

1. *Erpodiopsis Kilimandscharica* n. gen. et sp.; cespites habitu Philonotulae depressi viridissimi incani teneri; caulis erpodiaceus brevissimus simplex basi solum innovando ramulis brevioribus caractere pleurocarpico prostrato tener et tenellus, e protothallo confervoides breviter articulato hyalino-viridi glaberrimo egrediens flexuosus flaccidus; folia minuta siccitate laxè imbricata parum torta madore valde patula plus minus remota in summitate surculi in gemmulam minutissimam congesta tenera, e basi ad axin pro plantula crassiusculum mollem pallide rubrum parum decurrente in laminam vesiculoso-ovatam pilo reflexiusculo basi latiusculo minutissime denticulato acutato hyalino coronatam producta, margine erecto ubique integerrima, cochleariformi-concava tenera mollia enervia, e cellulis majusculis laxè prosenchymaticis longiusculis pellucidis sed utriculo primordiali vel chlorophyllo parietali repletis eleganter reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, 1800 bis 3000 m in planitie graminosa superiore: Dr. Hans Meyer 1889.

Ein ganz merkwürdiges Moos, welches leider keine Frucht besass, aber seine Stellung wohl sicher dadurch ankündigt, dass der einfache Stengel aus einem Protonema hervorgeht, wie es nur kleistokarpische Moose aus der Familie der Ephemeraceae sonst zu erzeugen pflegen. Ist diese Annahme, wie ich nicht zweifle, richtig, so haben wir es auch mit einer neuen kleistokarpischen Gattung zu thun, welche zugleich eine eigene Familie begründet. Denn ich kenne kein zweites Moos, das mit diesem dem Typus nach zusammenfiele. Die zunächst stehende Gattung würde *Gigaspermum* Ldbg. sein, allein selbige ist ein stegokarpisches Moos, das überdies gar nicht solche Stengel bildet, sondern sein Frucht-Aestchen aus einem kriechenden Stämmchen treibt, wenn es auch sonst in seinen Blättern mit *Erpodiopsis* verglichen werden könnte, als beide ein Blatt haar bilden, das wie *Argyrobrya* sich schon mit hyaliner Basis auf die Blattspitze aufsetzt. Ich habe darum das Moos auch *Erpodiopsis* genannt, weil es in der Tracht einigermaßen an die Tricherpodia mit seinem einfachen Stengelchen erinnert. Unter den kleistokarpischen Moosen könnte es nur mit *Lorentziella* verglichen werden, aber diese erzeugt ebenfalls keine pleurokarpischen Stengel, wie überhaupt bisher kein kleistokarpisches Moos mit solchem bekannt ist. In Folge dessen bleibt nichts Anderes übrig, als eine kleistokarpische Familie der *Erpodiopsidae* anzunehmen. Dann würde die Charakteristik folgendermassen lauten:

Erpodiopsidae: Musci cleistocarpici, surculo pleurocarpico perenni, protothallo confervoides praedito simplici e protonema egrediente, foliis laxè prosenchymatice reticulatis cochleariformi-ovatis pilo hyalino terminatis.

Diese Charakteristik würde, da eben die Frucht noch unbekannt ist, bis heute auch die der Gattung sein. Jedenfalls erscheint das Moos als

eine der merkwürdigsten bryologischen Eroberungen unserer Tage überhaupt und speziell aus Afrika, so winzig es auch sonst vorliegt.

2. *Distichium Kilimandscharicum* n. sp.; cespites dilatati molles viridissimi maxime intertexti; caulis elatus subuncialis tenuis simplex tener flexuosus; folia caulina siccitate crispatisima, madore valde patula, aetate caulem elegantissime pinnatum sistencia, flexuosa filiformia, e basi elongata vaginata angustissime albide marginata (leucolomata), e cellulis minutissimis occultis in membranam luteam veluti conflatis areolata, in filum refractum flexuosum valde attenuatum summitate aspera solum nervo omnino fere occupatum protracta integerrima. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *Distichii capillacii* proximi, sed folia crispatisima multo mollius areolata summitate papillosa. Fructus adhuc ignotus characteres alios verosimiliter dabit.

3. *Fissidens lineari-limbatus* n. sp.; cespites pusilli sordide virides; caulis humilis rarius divisus gracilis apice incurvatus; folia caulina siccitate crispata firma rigida, madore apice incurva patula oblongo-lanceolata; lamina vera ultra medium lanceolato-excurrens subappressa; lamina dorsalis angustissime decurrens; lamina apicalis nervo flavo tenui in mucronem brevissimum excedente acutata; omnes laminae coriaceae limbo quam maxime angusto lineari circumductae, e cellulis minutissimis obscuris viridibus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione occid. montis Kenia, inter *Trichostomum Leikipiae* m. vicens: L. Höhnelt in Exped. Telekiana 1887.

Inter omnes Fissidentes foliis coriaceis minutissime obscure areolatis plerumque crispatis species hucusque prima foliis omnino limbatis.

4. *Funaria* (Eufunaria) *Kilimandscharica* n. sp.; monoica; Funariae hygrometricae simillima; folia crispatisima, e basi angustata laxius reticulata elongate spathulato-ovata obtusiuscula vel vix acuminulata integra vel apicem versus indistincte denticulata, nervo pertenui rubente excurrente vel ante apicem evanido percurta, e cellulis mediis eleganter reticulata; theca in pedunculo pallide flavido tenui flexuoso parvula, collo curvulo et operculo majusculo; peristomii dentes externi robusti lati maxime applanati sed margine longe pectinati rubri, interni longi angustissimi cuspidati integerrimi.

Patria. Marango, in regione graminosa superiore (1500—3000 m) montis Kilima-Ndscharo: Dr. H. Meyer.

A. *F. hygrometrica* foliis obtusiusculis crispatisimis multo angustioribus jam primo visu differt.

5. *Polytrichum* (*Eupolytrichum*) *Höhnelti* n. sp.; cespites circa 5-unciales laxissime cohaerentes rufescentes; caulis elongatus gracilis simplex

flexuosus rigidus firmus in basin longiusculam nudiusculam filiformem excurrentes; folia caulina siccitate horridissima secunda falcata veluti crispata, madore juniperoideo-patula recurva lineali-angusta rufescentia, e basi elongato-vaginata in laminam raptim fere reflexulam anguste lanceolato-acuminatam robustam obscuram crassam superne dentibus acutis rufescentibus remotis serratam attenuata, nervo latissimo laminae folii partem maximam occupante superne dorso remote aculeolato apice crasso ubique serrato percursa; cellulae vaginae membranaceae ad nervum elongatae angustae aureo-coloratae firmae, ad marginem membranam scariosam albidam sistentes conflatae; calyptra brevis parva basi et apice veluti truncata, pilis capillaribus appressis vel parum patulis articulatis intricatis tomentosula. Cactera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, sine loco speciali: L. Höhncl in Exped. Telekiana 1887.

Species distinctissima spectabilis elegantissima, foliis secundis ad Eupolytricha secundifolia accedens, characteribus supra illustratis primo visu distinguenda, habitu peculiari.

6. *Dicranum (Campylopus) procerum* n. sp.; dioicum, cespites altissimi circa 4—5-pollicares laxo cohaerentes radiculosi virides splendentes; caulis strictiusculus, foliis inferioribus brunnescentibus horridis, inferne simplex, apice in ramulos circa 4 breviusculos caudatos attenuatus, foliis viridibus laxo confertis fasciculatim dispositis divisus; folia caulina viridia magna madore valde patula, e basi longe decurrente cellulis alaribus permultis magnis laxis albescentibus marcescentibus alam latam sistentibus ornata in laminam semi-convolutam lanceolato-acuminatam producta, nervo latissimo laxiuscule reticulato dorso glaberrimo in cuspidem longissimam flexuosam summitate serrulatam eandem omnino occupante percursa, e cellulis ellipticis densis minusculis membranam firmam coriaceam sistentibus arcolata. Cactera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *Campylopodis altissimi* C. Müll. ex Antioquia Andium, sed caule stricto apice fasciculatim diviso jam primo visu distinctum.

Eine höchst merkwürdige Art, welche ich auf dem berühmtesten Schneeberge Afrika's niemals gesucht haben würde. Es gibt unter den Campylopus-Arten eine Abtheilung, welche ich als Campylopodes exaltati zusammenfasse, und selbige Arten, von denen ich bisher 13 kannte, zeigen eine so grosse Aehnlichkeit mit jenen Dicranum-Arten, zu welchen unter anderen *D. majus* gehört, dass nur die breite, fast das ganze Blatt einnehmende, flache und locker gewebte Rippe die Campylopus-Natur nachweist, sobald man keine Früchte vor sich hat. Jene 13 Arten aber bewohnen nur das tropische Amerika, wo sie von den Gebirgen Westindiens und Brasiliens bis zu den höchsten Höhen der Anden in den Ver. Staaten

von Kolumbien aufsteigen. Um so wunderbarer ist aber, den herrlichen Typus nun auch auf dem Kilima-Ndscharo kennen zu lernen. In solcher Höhe und unter dem unwirthlichen Klima des Berges hätte man ihn sicherlich nicht erwartet.

7. *Dicranum (Campylopus) Höhneli* n. sp.; cespites latissimi bipollicares laxissime cohaerentes rigidissimi inferne parce tomentosuli ferruginei superne lutei nitidi; caulis gracilis altiusculus teretiusculus apice capituliformi-nodosus, e coma innovationes 1—2 julaceas curvulas acutatas luteas firmas exmittens; folia dense imbricata madore patula, e basi latiuscula lanceolata in pilum elongatum basi planum strictum valde serrulatum robustum protracta, nervo lato in cavitate lato-caniculata excurrente ferrugineo percursa, lamina extra nervum latiuscula e cellulis ellipticis incrassatis basi longis angustis atque cellulis alaribus pluribus parenchymaticis maculam intensam purpurascentem planam sistentibus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, sine loco speciali, sed copiosissime: L. Höhnel in Exped. Telekiana forsan in altitudine 3000—4000 m 1887 legit.

E speciosis Campylopodum proliferorum, inter illas species montis nivalis nominati altissima.

8. *Dicranum (Leucoloma) drepanocladium* n. sp.; cespites dilatati pallide virides densiusculi firmiusculi subdepressi; caulis breviusculus simplex vel ramulis brevissimis paucis veluti pinnatus, apice in comam brevem convolutam falcata excurrente; folia caulina laxè disposita erecta vel patentia inferne tumidula, e basi decurrente cellulis alaribus majusculis robustis crasso-articulatis aureis densis vel albidis marcescentibus alam magnam planiusculam sistentibus ornatâ in laminam plus minus convolutam lato-lanceolata acuminatam ad acuminis apicem latiusculam irregulariter breviter dentatam canaliculatam producta, ad marginem erectum limbo angustissimo albido circumducta, nervo tenuissimo dorso glabro pallido excurrente percursa, e cellulis perangustis longiusculis veluti in membranam glaberrimam luteo-viridem conflatis ad parietes haud interruptis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marengo, 1800—3000 m in planitie graminosa superiore: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *Dicrani scoparii*, sed quoad typum jam longe recedens.

So sehr auch das schöne Moos an unser *Dicranum scoparium* erinnert, kann doch in keiner Weise von einer Verwandtschaft gesprochen werden. Am meisten drückt sich eine solche mit australischen Arten aus, z. B. *D. confine* Hpe., obgleich auch dieses wieder beträchtlich abweicht. Da die Art jedoch einen limbus albidus an ihren Blättern hat, so muss sie ohnfehlbar zu *Leucoloma* gehören, wenn auch dieser limbus noch so

schmal ist. In Folge dessen findet die Pflanze ihre beste Stelle innerhalb jener Abtheilung, welche ich *Oncophoroloma* genannt habe, die also die Tracht des *D. scoparium* mit *Leucoloma* verbindet und in Australien recht ausgezeichnete Mitglieder hat, obschon sie auch Südafrika in *D. nitidulum* n. sp. vom Tafelberge und selbst Madagaskar in *D. pycnoloma* n. sp. besitzt.

9. *Dicranum (Scopella) acanthoneuron* n. sp.; cespites robustissimi luteo-virentes, tomento caulis fuscati; caulis breviusculus parum divisus flexuosus crassus firmus rigidus apice in comam brevem paulisper falcatam prostratus; folia caulina horrida secunda vel strictiuscula brevia lanceolata breviter acuminata firma convolutaceo-concava ad marginem superiorem grosse serrata, nervo tenui pallido striatulo dorso superiore veluti parallelo diviso et utrinque grossiuscule serrato percursa, e cellulis robustis longis in membranam luteam conflatis ad parietes interruptis grosse areolata, cellulis alaribus multis laminam majusculam planiusculam decurrentem sistentibus grossis aureis vel fuscatis aetate marcescentibus albidis ornata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, in planitie graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Quoad habitum *Dicran. scoparium* in memoriam redigens, sed costa superne veluti divisa igitur carinam sistente et utrinque serrata jam diversum.

10. *Bryum (Rhodobryum) rosulatum* n. sp.; cespites humillimi basi tomentosuli densiusculi firmiusculi; caulis pusillus rosulis minutis nodiformibus, junioribus aeruginoso-viridibus, senioribus brunnescentibus simplicibus innovantibus; folia in rosulam minutam dense congesta madore aperto-patula, e basi elongata perangusta spathulato-ovata, nervo basi tenui apicem versus sensim tenuissimo in aristam strictam brevem tenuissimam acutissimam producto exarata, carinato-concava, limbo tenuissimo apice folii denticulato circumducta, e cellulis teneris chlorophyllosis parvis basin versus sensim longioribus laxioribus reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, in planitie graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Br. minuto-rosulatum mihi ejusdem montis foliis lato-limbatis recurvo-acuminatis jam differt.

11. *Bryum (Rhodobryum) spathulosifolium* n. sp.; cespites humiles viridissimi inferne tomentosuli; caulis pro robustitate plantae pusillus subsimplex; folia caulina in rosulam subtortam madore planissimam congesta, e basi elongata perangusta in laminam spathulato-ovatam producta, acumine brevi reflexiusculo acutato terminata, margine infero late revoluta supero plana, limbo pro folii magnitudine angusto circumducta, superne dentibus brevibus tenuibus teneris serrulata, e cellulis pro folio

minusculis mollibus chlorophyllo omnino repletis basin versus longioribus laxioribus reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marengo, in planitie graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Bryum roseum Mitt. in Journ. of. Linn. Soc. 1886. p. 307. *A. Bryo Keniae* humililate caulis, parvitate et mollitie et teneritate omnium partium, praesertim foliis elongate anguste spathulatis prima inspectione distinguitur. *Br. Keniae* surculo robustissimo alto ca. quinquies proliferante, foliis firmis magnis ad basin breviter lato-spathulatis raptim recedit. *Br. roseum* Europaeum foliis lato et brevi-spathulatis nec limbatis aliisque characteribus facile distinguitur.

Es ist mir unverständlich, wie Mitten das Kilimandscharo-Moos zu der europäischen Art bringen konnte; um so mehr, als derselbe sogar auch *Br. integrifolium* Rehm. von Natal, *Br. giganteum* Hook. aus Indien und *Br. grandifolium* Tayl. aus Süd-Amerika dazu stellte. Bei derartigen Anschauungen hört schliesslich alle Geographie der Moose auf und kann nur verwirrend wirken.

12. *Bryum (Rhodobryum) Keniae* n. sp.; ex habitu *Bryi rosei*, sed multo robustius atque rosellam multo majorem sistens pluries proliferans, folia majora robustiora magis serrata latiuscule flavide limbata, dentibus inaequalibus majusculis et minoribus flavidis ornata, e cellulis multo majoribus utriculo primordiali minus evoluto instructis densioribus reticulata, nervo flavido breviter excedente acute pungentia. Caetera ignota.

Patria. Africa orientalis, monte Kenia et in ejusdem vicinia in territorio Leikipia ad basin tract. montium Aberdare: L. Höhnelt 1887.

13. *Bryum (Leptostomopsis) Meruense* n. sp.; dioicum; cespites pusilli sordide flavidi inferne ferrugineo-tomentosi compacti; caulis fertilis inter ramulos plures breves tenues intermedius minutus; folia caulina minuta imbricata humore paulisper patula, e basi longiore oblongata in laminam ovato-acuminatam semi-complicatam ideoque asymmetricam subintegerrimam angustissime limbata profundè carinatam producta, e cellulis ubique teneris pellucidis laxis inanibus eleganter reticulata, nervo tenui rubente in aristam tenuem flexuosam vix denticulatam acutatam apice diaphanam excedente percursa; perichaetia similia laxius reticulata; theca in pedunculo breviusculo rigido flexuoso horizontalis vel fere nutans, e collo longiusculo vesiculoso-ovalis ochraeca microstoma, operculo impresso brevi conico, annulo latiusculo multiplici; peristomii dentes externi robustuli breviter cuspidati rubiginosi dense trabeculati, interni externis dense adhaerentes breviores valde carinati vix hiantes, ciliis rudimentariis.

Patria. Africa orientalis Kilimandscharica, monte Meru: L. Höhnelt 1887 legit.

Ab omnibus congeneribus ramulis valde tenuibus, foliis minutis ubique laxe reticulatis aliisque characteribus differt.

14. *Bryum (Eubryum) bicolor* n. sp.; dioicum; cespites biunciales dense conferti turgidi, inferne radiculosi nigricantes superne pallide lutei; caulis altiusculus subteres crassiusculus veluti squamatus, solitarius i. e. ramulis perpaucis innovando ortis appressis pergracilibus brevibus; folia caulina squamato-imbricata madore patula albescenti-lutea vix nitentia firmiuscula, e basi brevi angustiore subspathulato-ovata in acumen longiusculum producta carinato-concava, ubique limbo angustissimo vix revoluta integerrimo circumducta, nervo validiusculo strictiusculo inferne purpurascente superno luteo in aristam pungentem robustiusculam plus minus elongatam percurta, e cellulis majusculis firmiusculis inanibus luteis laxiusculis basi purpurascentibus laxioribus reticulata; perichaetia similia vel longius acuminata atque aristata; theca in pedunculo stramineo inferne rubente unciali apice curvulo vix inclinata cylindracea basi tumidula medio subcoarctata lutea gracilis parva, operculo minuto conico luteo, annulo persistente; peristomium duplex: dentes externi anguste lineali-lanceolati breves dense articulati haud cristati pallidi linea longitudinali desituti, interni multo angustiores veluti filiformes, ciliolis rudimentariis.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m, cum *Bartramia tricolore* consociatum: Dr. Hans Meyer 1889 lg. Species palustris.

Ex habitu ad *Br. Schleicheri* aliquantulum accedens, sed ab omnibus congeneribus Bryorum bimorum caule subtereti, foliis stramineo-lutei atque theca parva cylindracea conico-operculata toto coelo differt et species elegantissima.

15. *Bryum (Eubryum) nano-torquescens* n. sp.; cespites perpusilli rufi laxe cohaerentes; caulis nanus tomentosulus, coma rosulata minuta innovationes breves graciles plures exmittente terminatus; folia leniter circa axin torquescentia minuta rufa, madore patula setosa, e basi pro foliolo latiuscula oblongo-acuminata flaccida plus minus complicata integerrima, margine erecto sinuato-undulata, inaequaliter concava tenera pellucida, limbo quam maxime angusto circumducta, nervo tenui pro foliolo autem validiusculo rufulo vel flavo in aristam longiusculam acutatam flexuosam tenuem protracto exarata, carinato-concava, e cellulis teneris laxiusculis ubique reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Dschagga (Marango), 1300 m: Dr. Hans Meyer 1889. Inter alios muscos viget.

Humilitate atque teneritate partium omnium ab omnibus congenerum torquescentium jam distat. *Bryum erythrotropis* mihi terrae Niam-Niam et *Br. pottiaefolium* mihi terrae inter Atbara et mare erythraeum ex habitu atque foliis pellucidis proximae species sunt.

16. *Bryum (Eubryum) inclusum* n. sp.; planta pusilla solitarie inter *Argyrobryi* cespitem compactum inclusa viridissima simplex, sed innovando sursum crescens et ramulos brevissimos erectos exmittens; folia caulina in axi rubro pro plantula crassiusculo densiusculè imbricata parva, e basi angustiore latiuscule ovata in acumen attenuata subcochleariformi-concava, margine parum revoluta pallide marginata integerrima ad summitatem solum minutissime denticulata, nervo validiusculo luteo-virente flexuoso in aristam brevem albide pungentem excedente percursa, e cellulis basi multo laxioribus majusculis laminam teneriorem albido-rubentem sistentibus ad apicem versus minoribus densioribus firmioribus plus minus viridibus utriculo primordiali destitutis reticulata; perichaetia similia sed angustiora margine lato-revoluta; theca in pedunculo pro plantula longiusculo flexuoso aureo pendula parva, e collo brevi perfecte ovalis vel globosula glaberrima ochracea, operculo conico brevi, annulo persistente latiusculo madore raptim dissoluto; peristomium duplex parvum: dentes externi anguste lanceolato-subulati inferne dense articulati aurantiaci ad subulam hyalini, interni ut videtur imperfecti.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4500 m: Dr. Hans Meyer 1889. In cespitibus *Argyrobryi ellipsifolii* n. sp. viget.

Habitus peculiaris ad *Brya* gemmiformia spectans caule gemmaceo-folioso, plantam tenellam pulchellam sistens; inter *Brya* alpina species disponenda, ex habitu *Bryo gemmiparo* D. Not. aliquantulum similis.

17. *Bryum (Argyrobryum) ellipsifolium* n. sp.; cespites dilatati compacti madorem facile sugentes argentei; caules circa pollicares paralleloadhaerentes teretes tenues simplices vel ultra medium in ramulos 2—3 similes appressos divisi humore flexuosi flaccidi; folia caulina in axi rubro pro plantula crasso appressa minuta, inferiora perfecte ellipsoidea summitate obtusata et perfecte cochleariformi-concava, margine erecta integerrima, superiora vix obtusato-acuminata, omnia nervo mediano tenui planissimo striatulo diaphano dissoluto notata, e cellulis parvis pellucidis inanibus membranam nitidulam tenuem sistentibus apice folii grossiuscule ellipticis membranam argenteam scariosam sistentibus reticulata, Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndsaharo, alt. 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Characteribus supra descriptis, praesertim foliolis perfecte ellipticis, nervo tenerrimo e cellulis elongatis paucis composito diaphano atque caulibus parallelis perfecte teretibus cespitem compactum radiculosum sistentibus facile distinguendum.

Es hilft Herrn Mitten nichts, wenn er, wie es scheint, in seiner Abhandlung über die Kilimandscharo- und andere afrikanische Moose (Journ. of the Linn. Soc. 1886, p. 307), die von mir von *Br. argenteum* L. getrennten Moose wieder zu diesen zu bringen geneigt ist. Die Unter-

schiede sind da für Jeden, welcher sehen will und sehen kann, und was sich noch unterscheiden lässt, ist doch jedenfalls etwas Selbständiges. Es wäre auch sonderbar genug, wenn es in der ganzen Welt nur ein *Argyrobryum* gäbe, während sich alles Uebrige in der Pflanzenwelt nach Klima und Höhen-Verhältnissen richtet. Meines Erachtens ist in der That unter den *Argyrobryum*-Arten eine derartige Verschiedenheit vorhanden, dass man sie sogar in verschiedene Gruppen bringen könnte. Zwei derselben drängen sich dem Beobachter ganz von selbst auf, je nachdem die Blätter eine Kreisform beschreiben oder je nachdem sie in eine Spitze auslaufen. Die erste Form haben wir in der soeben beschriebenen Art vor uns, die zweite zeigt der Kilimandscharo ebenfalls, nämlich in *Bryum argentisetum* n. sp.

18. *Bryum (Argyrobryum) argentisetum* n. sp.; cespites humiles planiusculi veluti argenteo-lanati; caulis brevissimus simplex vel ramulo maxime brevi divisus dense foliosus; folia parva siccitate et humore densissime in comam gemmiformem congesta, e basi angustiore latiuscule ovata in pilum hyalinum parce denticulatum plus minus refractum cuspidata, margine basilari parum revoluta superiore erecta, nervo tenui calloso basi rubro medium versus flavido supra medium hyalino atque in pilum flexuosum excurrente dorso basilari saepius in fila brevissima hyalina plura diviso veluti aculeolato percursa, e cellulis basi quadratis rubentibus demum elongatis flavido-viridibus apice argenteis membranam scariosam sistentibus reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *Bryo squarripilo* mihi insulae S. Thomé simillimum, sed multo minus.

19. *Bryum (Senodictyum) afro-crudum* n. sp.; caulis pusillus tenerimus ruber simplex flexuosus basi rubro-radiculosus, demum foliis minutissimis distantibus angustissime lanceolato-acuminatis pallidissimis apice minutissime denticulatis ornatus; folia caetera in comam parvam congesta viridissima splendentia, e basi angustiore longiuscule ovato-acuminata, acumine plerumque semitorto serrulato saepius recurvato vel undulato terminata, margine plano, nervo pro foliolo validiusculo pallido flexuoso ante apicem evanido percursa, e cellulis angustis elongatis chlorophyllosis mollibus areolata, profundius carinata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m cum *Distichio Kilimandscharico*: Dr. Hans Meyer lg. 1889.

Ex habitu *Bryi crudi*, sed omnibus partibus minus, tenerius atque elegantius.

20. *Bartramia (Philonotis) tricolor* n. sp.; bi-vel tri-uncialis compacte cespitosa; cespites inferne nigricantes, demum tomento fusci, deni-

que lutei; caulis elongatus solitarius vel ramis parallelis rectis flexuosis divisus subteres; folia caulina in axi rubro crasso firmo fragili dense imbricata vix secundula apicibus patulis, madore similia nec recurva, firma lutea, e basi late rotundato-ovata in acumen longiusculum parum recurvum attenuata, margine ubique fere anguste revoluta, nervo validiusculo luteo flexuoso in aristam elongatam serrulatam producto percursa, e cellulis majusculis inanibus firmis basi laxioribus areolata, papillis ubique asperrima. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m cum *Bryo bicolori*: Dr. Hans Meyer lg. 1889.

Species palustris robustiuscula ex affinitate *Philonotis fontanae*, sed modo crescendi compacto, colore triplice et foliis siccitate atque madore erecto-imbricatis longe aristatis tuberculoso-papillosis longe distans. E speciebus elegantissimis!

21. *Bartramia (Philonotula) gemmascens* n. sp.; perpusilla cespitem tenerum humillimum glauco-viridem sistens; caulis perbrevis simplex sed ex tomento rufo vel ex axillis foliorum gemmas rufo-stipitatas minutas exmittens; folia imbricata vel remotiora erecta madore patula minuta lanceolato-acuminata, nervo pro folio validiusculo virente in acumine acuto brevi evanido exarata, carinato-concava, margine erecta superne minutissime serrulata, e cellulis minutis sed laxiusculis virenti-pellucidis reticulata, parce et minutissime papillosa; folia gemmarum minutissima angustissime ligulata glabriuscula. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, Marango, in planitie graminosa superiore inter 1800—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

E pygmaeis; gemmulis minutis stipitatis foliisque minutis minutissime superne serrulatis jam prima scrutatione facile distinguitur.

22. *Bartramia (Eubartramia) Leikipiae* n. sp.; cespites unciales laxo cohaerentes lurido-virentes rigidi; caulis simplex vel supra medium in ramulos breves plures subappressos divisus caudiformis flexuosus et plus minus curvulus; folia caulina patulo-erecta stricta, apice surculi in comam parvam dicranoideam densam congesta, madore magis patula, e basi parum latiore in laminam angustam demum elongata cuspidatam flexuosulam attenuata, margine e basi usque ad cuspidem serrulatam latiuscule revoluta, inferne integerrima sed papillis aspera, nervo crassiusculo lurido strictiusculo in cuspidem exeunte et eandem omnino occupante percursa, e cellulis basi laxiusculis anguste rectangularibus pellucidioribus laevioribus apicem versus minoribus incrassatis aspero-papillosis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette, Novbri 1887: L. Höhnelt in Exped. Telekiana.

Ex habitu *Bartramiae strictae*, sed caulibus caudiformibus flexuosis comosis raptim discernenda. Variat caule angustiore brunneo-flavo.

23. *Bartramia (Plicatella) subgnaphalea* n. sp.; dioica; caulis elatus gracilis fusco-tomentosus, ramulis brevibus viridibus varie brevibus teneris distantibus indistincte pinnatus; folia caulina stipitis summi robustiusculi recurva summo apice stellatim disposita penicillum minutum strictum sistencia, ramea patentissima, apice caulis minus stellata atque penicillata, omnia e basi brevissima vaginata 4-plicata in laminam plus minus recurvatam longiusculam anguste lanceolato-acuminatam serrulato-denticulatam attenuata, margine inferiore parum revoluta, nervo tenui viridi in aristulam protracto percursa, e cellulis densis angustissimis linearibus apicem versus magis quadratis tenuiter papillois areolata; theca in pedunculo perbrevis rubro pendula majuscula globoso-ovalis, siccitate parte superiore angustata plicatula.

Patria. Africa or. trop., mte. Kilima-Ndscharo inter 3000—4800 m cum *Campylopode procero* consociata: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *B. gnaphaleae* Borbonicae, sed foliis ut in *B. gigantea* apice stipitis stellatim et penicillate dispositis raptim discernenda species.

24. *Barbula (Syntrichia) Meruensis* n. sp.; cespites breves rigidiusculi rubiginosi; caulis pusillus basi tomentosus simplex, foliis inferioribus minutis, inferne gracilior, superne densiuscule foliosus; folia caulina parvula inordinatim spiraliter imbricata, humore parum recurvo-squamosa, e basi brevi pallide rubiginosa cellulis laxis majusculis marginem versus sensim multo minoribus reticulata spathulato-ovalia, paulisper involutacea, margine vix revoluta vel erecta, e cellulis pro folio parvulis hexagonis ob papillas asperulis areolata, nervo crassiusculo pulchre purpureo dorso glaberrimo in mucronem brevissimum tenuem acutum excedente percursa; caetera ignota.

Patria. Africa Kilimandscharica, monte Meru, cum *Bryo Meruensi* C. Müll. consociata: L. Höhnelt.

Ex habitu *Barbulae laevipilae* similis, sed foliis brevissime mucronatis jam diversa et pulchra species, cujus affines africanae plures sunt.

25. *Barbula (Syntrichia) Leikipiae* n. sp.; *Barbulae Meruensi* ex habitu simillima pusilla, sed folia e basi pallida cellulis laxis magis longioribus quam latioribus pallide virentibus reticulata margine parum revoluta spathulata latiuscule rotundato-ovalia planiuscula nec involutacea, e cellulis majoribus hexagonis crassis asperulis areolata carnosula, nervo crasso purpurascente dorso glabro in mucronem crassiorem excedente percursa. Caetera ignota.

Patria. Africa orientalis tropica, Leikipia regione montis Keniae, inter alios muscos: L. Höhnelt 1887.

26. *Trichostomum (Leptodontium) pumilum* n. sp.; caulis humilis subsimplex flexuosulus teretiusculus; folia caulina subspiraliter circa axin contorta madore raptim reflexa viridissima, e basi semiamplexicauli bre-

vissime vaginacea aurea lato-oblonga in acumen longiusculum reflexum producta, margine basilari ad latus alterum vix vel angustius ad latus alterum late plicato-revoluta superne usque ad acumen serrulatum anguste revoluta, profunde complicato-concava, nervo in acumine acutato robustiusculo evanido dorso papilloso flavido exarata, e cellulis minutis angulate rotundatis obscure viridibus papillosis basin versus pallidioribus angustissime linearibus rectangularibus glabris areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 1500—3000 m alt., sum *Polytricho nano-globulo* mihi consociatum: L. Höhnelt.

Foliis siccitate circa axin dense imbricatis atque surculum subteretem sistentibus jam distinctum.

27. *Trichostomum (Leptodontium) repens* n. sp.; caulis primarius repens surculos pumilos graciles flexuosos simplices pallide luteos exmittens; folia caulina siccitate basi amplexicaulia apicibus reflexo-patulis tortuosis, madore raptim reflexa patentissima longiuscula, e basi semiamplexicauli vaginacea lata aurea in laminam late oblongam et sensim in acumen reflexum latum longiusculum remote runcinatule serrulatum brevissime acutatum attenuata, margine e basi usque ad acumen latiuscule revoluta, profunde complicato-concava tenerrime indistincte papillosa, nervo flavo in acumine evanido exarata, e cellulis grossis in membranam flavidam angulate rotundate conflatis basin versus pallide aureis quam maxime linearibus punctulatulis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 5000—9000 ped. altitudinis: L. Höhnelt inter alios muscos 1887 in Exped. Telekiana.

28. *Trichostomum (Eutrichostomum) Leikipiae* n. sp.; cespites lati humiles sordide lutei robusti firmi laxissime cohaerentes, caulis breviusculus parce divisus; folia caulina robusta incurvo-involuta nec crispata nec torta, e basi brevior vaginacea pallidius lutea in laminam longiorem latiusculam lanceolatam breviter acuminata, margine integerrimo parum undulato involutacea basi ad alam uncam latiuscule revoluta, nervo valido luteo in mucronem robustum pungentem acutum excedente exarata, e cellulis minutissimis obscuris rotundis basin versus distinctioribus flavidis basi parum majoribus sed latiusculis pellucidis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione occidentali montis Kenia: L. Höhnelt 1887 in Exped. Telekiana.

Ex foliis sordide luteis firmis subcircinnatim incurvatis facile distinguendum.

29. *Zygodon (Anoetangium) viridatus* n. sp.; cespites tenelli laxi cohaerentes aeruginoso-virides teneri pusilli; caulis humilis tener flexuosus simpliciusculus vel apice parce divisus; folia caulina valde crispata madore patula vel patentia remotiuscula angustissime linearia, e basi brevissima semi-amplexicauli angusta in laminam breviusculam lineari-acuminatam

flexuosam producta, margine ubique fere angustissime revoluta summitate parce minute denticulata, nervo pro foliolo latiusculo carinato pallide virente excurrente percursa, profunde canaliculata, e cellulis minutis ubique distinctis rotundatis pallide virescentibus basi magis quadratis parum majoribus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Foliis minutis acutatis margine angustissime revolutis summitate denticulatis facile discernenda species. *Anoectangium paucidentatum* ejusdem montis colore rubiginoso cellulisque obscuris basi laxis pellucidis jam toto coelo differt.

30. *Zyyodon (Ulozygodon) Kilimandscharicus* n. sp.; cespites $\frac{1}{3}$ -pollicares mollissimi viridissimi inferne fuscati radiculosi laxo cohaerentes; caulis tener dichotome in ramos appressos erectos parce divisus; folia caulina valde crispata madore erecto-patula elongata, e basi angustiore longe lineari-attenuata acutato-acuminata profunde canaliculata plus minus complicata valde flexuosa, margine erecto a basi fere usque ad acumen remote sinuate minutissime denticulata, nervo pro folio angusto latiusculo in acumine evanido flavido percursa, e cellulis ubique mollibus valde et amoene chlorophyllosis ad basin folii angustissime rectangularibus laxioribus apicem versus minoribus rotundatis distinctis areolata glabra. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Characteribus illustratis a *Z. cyathicarpo* atque *Z. curvipede* foliis denticulatis affini facile distinguitur. An *Oncophorus* (*Rhabdoweisia*) *cyathicarpus* Mitt. in Journ. of Linn. Soc. 1886?

31. *Orthotrichum (Euorthotrichum) serrifolium* n. sp.; cespites dilatati aurei firmi laxissime cohaerentes; caulis semiuncialis apice ramulis brevissimis crassiusculis pluribus appressis divisus apice foliis recurvis stellatus; folia caulina siccitate dense conferta vel horrida majuscula robustiuscula, madore difficile recurva, e basi angustiore hic inde aureo-colorata in laminam lato-ovatum demum lanceolato-acuminatam attenuata, margine usque ad acumen serrulatum lato-revoluta, carinato-concava, nervo fuscescente in cuspidem brevem tenuem acuto-pungentem excurrente percursa, e cellulis majusculis robustulis angulato-quadratis tenuiter papillois obscuriusculis virentibus basin versus pallidioribus vel flavidis elongatis angustis laxiusculis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, in sylva primaeva inter 1500—3000 m arboricola: Dr. Hans Meyer 1889.

Cespitibus dilatatis aureis, caule apice stellatim folioso folisque robustis pungentibus serratis prima inspectione distinguendum. Species e robustioribus.

32. *Orthotrichum* (*Euorthotrichum*) *Leikipiae* n. sp.; monoicum; caulis humilis basi nudiusculus densiuscule foliosus simplex vel apice breviter ramulosus; folia imbricata robustiuscula, madore recurviuscula, e basi parum decurrente angustiuscule lanceolata acuminata complicato-concava, margine ubique latiuscule revoluta integerrima, profundius carinata recurva, nervo crassiusculo in mucronem robustum pungentem apice parce denticulatum excedente percursa, e cellulis basi longiusculis angustis mollibus laevibus laxiusculis apicem versus parvis rotundis tenuiter papillois areolata; perichaetia similia; theca in pedunculo brevi erecta ovalis laevis (haud plicata); peristomium (tantum rudimentarie observatum) duplex, internum e dentibus longiusculis latiusculis compositum.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette, inter alios muscos: L. Höhncl in Exped. Telekiana 1887.

Ob folia robuste pungentia atque fructum leiothecium exsertum facile distinguenda species. Specimina solum tria observavi. Innovando theca lateralis fit.

33. *Macromitrium* (*Macrocoma*) *liliputanum* n. sp.; caulis longe repens, ramificationibus profusis pluries divisus tenuiter filiformibus fuscescentibus julaceo-teretibus; folia caulina dense imbricata, madore juniperoideo-patentissima, minuta, e basi amplexicauli minute ventricosa in laminam brevem angustissime lineali-lanceolatam integerrimam profunde canaliculatam inferne margine revolutam producta, nervo ferrugineo pro foliolo crassiusculo ante acumen planiusculum evanido percursa, e cellulis minutissimis rotundis veluti punctiformibus obscuris membranam ferrugineam sistentibus areolata; perichaetia vix majora erecta minuta ovalis, operculo conico recto. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette, Novbr. 1887: L. Höhncl in Exped. Telekiana.

Macromitrio Dregei simillimum, sed partibus omnibus multo minoribus, foliis minutissimis lineali-lanceolatis facile ab eodem distinguenda species tenella.

34. *Grimmia* (*Engrimmia*) *immergens* n. sp.; cespites usque ad innovationes recentes teretes virides curvulas madore erectas breves firmiusculas in terra immersae; folia caulina dense imbricata parva madore patula, e basi angustiore anguste oblongo-acuminata in pilum hyalinum brevem subdenticulatum protracta, margine integerrima erecta vel hic inde anguste revoluta, curvula profunde canaliculato-concava, nervo pro foliolo lato percursa, e cellulis viridissimis infima basi folii quadratis apicem versus rotundis minutis ubique mollibus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ob cespites immersos, innovationes juveniles solum exsertas breves teretes viridissimas foliaque minuta molliter areolata facile cognoscenda.

35. *Grimmia (Eugrimmia) calyculata* C. Müll. in Coll. Meyeriana I.; dioica; cespites magni cupulato-pulvinati canescentes laxè cohaerentes facile dilabentes; caulis ca. uncialis flexuosus inferne nigricans superne flavo-viridis, ex innovationibus brevissimis veluti articulos sistentibus compositus, caeterum valde divisus flabellatus; folia caulina erecto-conferta madore laxè patula erecta subappressa, e basi angustiore angustè lanceolato-acuminata in pilum strictum longiusculum crassiusculum hyalinum teretem acutatum indistinctè denticulatum protracta, margine ad latus unicum plus minus revoluta, profunde canaliculata, nervo canaliculam dorso latiuscule dilatatam percurrente, e cellulis in membranam flavidam conflatis basi longioribus apicem versus sensim minoribus rotundatis areolata; perichaetia multa majora latiora longiora in cylindrum patulum parum exsertum congesta subplicata pulchre flavido-membranacea longius et crassius pilosa; theca in pedunculo brevi stricto sed saepius subcurvulo erectè exserta, e basi crassiore oblonga ore angustata ochracea lato-annulata, operculo longiuscule rostrato stricto, calyptra profundius divisa campanulata hiantè glabra; peristomii dentes pro operculi longitudine breviusculi angustè lanceolati subulati rubri inferne dense articulati fissiles; sporae maxime minutae.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Caulis masculus foliis brevioribus, floribus masculis in summitate omnium innovationum minute gemmaceis fuscis. Habitus plantae *Grimmiae ovatae*.

Ich habe diese neue schöne Art noch einmal beschrieben, da sie mir nun erst in vollständigen Exemplaren vorliegt und sie dadurch einen etwas anderen Anblick gewährt, als in dem winzigen Exemplare, das ich zuerst vor mir hatte.

36. *Grimmia (Eugrimmia) obtuso-linealis* n. sp.; majusculè pulvinata firma obscuro-viridis sordida; caules laxè cohaerentes breviusculi, inferne nigricantes apice solum flavo-virentes, in ramulos robustulos parallelos parce divisi; folia caulina dense imbricata madore erecto-patula parva, e basi angustiore angustè oblonga flavida in laminam valde linealem obtusatam obscuram carnosulam apice pro more uncinatulam cucullatulam sensim attenuata, margine ubique erecta integerrima concava, nervo tenui in laminam superiorem omnino evanescente indistincto percursa, e cellulis ad basin folii solum flavidam distinctis rectangularibus incrassatis apicem versus carnosum minutis rotundis valde obscuris areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Species distinctissima, ob folia in collum angustum carnosum obtusatum facile distinguenda, habitu dryptodontoideo.

37. *Grimmia* (*Eugrimmia*) *argyrotricha* n. sp.; cespites nani densiuscule pulvinati murino-canescens e surculis teneris parallelis extricabilibus compositi; caulis humilis in ramulos appressos aequilongos fasciculatim divisus; folia caulina perminuta imbricata madore patula, inferiora e basi angustiore perangusto-oblonga flavida in laminam obscuriorem angustiore attenuata obtusula stricta vel flexuosa vel introrsum curvula, suprema in pilum teretem minute denticulatum flexuosum vel strictum vel subrecurvum longitudinem folii subsuperantem protracta, margine erecta integerrima, nervo pro foliolo lato excurrente percursa, e cellulis ad basin folii membranam flavido-virentem sistentibus minutis quadratis apicem versus minoribus rotundatis magis incrassatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1880.

Ex habitu *Gr. Donianam* vel affines in memoriam redigens, sed foliis minutis inferne obtusatis superne solum longe hyalino-pilosis raptim cognoscenda nana species.

38. *Braunia* (*Eubraunia*) *entodonticarpa* n. sp.; cespites maxime intertexti brunneo-virides firmi; caulis gracilis teres breviusculus, flagellis brevioribus pluribus attenuatis praeditus; folia caulina dense conferta madore patentissima parva, e basi vix decurrente rotundato-ovalia in acumen breve acutiusculum indistincte denticulatum obliquum producta integerrima, margine ubique usque ad acumen angustatim revoluta, cucullato-concava, enervia, e cellulis minutis rotundis ad alam basilarem multo majoribus incrassato-parenchymaticis coloratis areolata; perichaetia e basi pluries angulate plicata cellulis longioribus angustis pallidis areolata in laminam ovatam recte et longius acuminatam margine anguste revolutam ut in caulinis areolatam producta; theca in pedunculo breviusculo rubente stricto erecta parva anguste cylindrica rubra, operculo parvo oblique rostellato.

Patria. Africa or. tropica, Leikipia in occid. montis Kenia: L. Höhnelt in Exped. Telekiana 1887.

Omnium specierum brevissima atque gracillima, theca entodontoidea angustissime cylindrica prima inspectione diversa.

39. *Braunia* (*Eubraunia*) *Schimperiana* Bryol. Eur.; cespites latissimi ca. bipollicares sordide luridi valde intricati sed laxe cohaerentes rigidi; caulis subgracilis teres ascendens, ramulis brevibus curvulis julaceo-teretibus vel in flagellum breve excurrentibus inaequaliter divisus; folia caulina dense imbricata madore sensim sensimque apice parum patula, e basi angustiore aurica enervi latiuscule ovata, acumine breviusculo lato

robusto acutiusculo terminata, margine e basi usque ad acumen late revoluta integerrima, e cellulis ellipticis parvulis densis basi longioribus areolata tenuiter papillosa, cochleariformi-concava; folia ramorum flagellaceorum inferiora in cuspidem plus minus elongatam planam apice hyalinam asperulam attenuata, superiora juniora angustissima multo minora in cuspidem longissimam flaccidam valde flexuosam vel loricatam vel reflexam pilo longo capillari albo terminatam protracta, e cellulis longioribus veluti conflatis sublaevibus areolata; perichaetia in cylindrum dense convoluta pallide lurida, e basi convoluto-vaginata longiuscula acuminata acutata, e cellulis longiuscule ellipticis densis areolata; theca in pedunculo medio rubro spiraliter torto erecta majuscula rufa cylindracea ore angustata.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 5000—6000 ped. alt., ubi L. Höhnelt in Exped. Telekiana legit 1887.

Ich kann dieses Moos nicht von dem abessinischen trennen, obgleich es in mancher leichten Beziehung etwas abweicht, und habe deshalb auch eine eingehendere Beschreibung gegeben.

40. *Erpodium (Tricherpodium) Joannis Meyeri* n. sp.; monoicum; caespites dilatati profusi planissimi e viridi canescentes; caulis angustissimus subplanus brevissime dichotome ramulosus, ob folia albido-pilosa setosus, madore distichaceus amoene viridis surculum parvum infima basi nudum elegantem frondiformem sistens; folia caulina parva patentia laxe imbricata anguste ligulato-elliptica cochleariformi-concava, margine integerrimo erecta, enervia, pilo elongato folii longitudinem aequante hyalino flexuoso-stricto acutato divisurali-striatulo coronata, e cellulis grossiuscule hexagonis ob papillam unicam truncatam grosse unipunctatis mollibus teneris chlorophyllosis areolata; ramulus fertilis ascendens brevissimus flavus, foliis perichaetialibus multo longioribus majoribus flavo-virentibus e basi anguste lanceolata in pilum basi latam multo robustiorem attenuatis, superne laevibus laxioribus reticulatis; theca immersa anguste cylindrica, operculo conico recto, annulo latissimo persistens, calyptra operculum solum obtegente basi in lacinias plures elegantes basi obtusatas profunde fissa plicata, ad plicas angustissime alata rugulosa.

Patria. Africa or. trop., Uguceno in regione meridionali montis Kilima-Ndscharo, 1800 m, in truncis arborum: Dr. Hans Meyer 1889.

E descriptione *Mitteni Erpodio Hanningtoni* Mitt. ex regione lac. Victoria-Nyanza proximum, sed icone ejusdem valde remotum, multo robustius. Flores masculi in basi surculi infra ramulum fertilem seriatim dispositi multi minutissime gemmacei ovaes. Species elegantula.

41. *Cryphaea scariosa* n. sp.; caulis uncialis valde flexuosus crassiuscule foliosus, ramulis tenuibus attenuatis brevioribus vel longioribus flexuosis remotis inaequaliter pinnatus luteus; folia densiuscule imbricata madore patula lutea nitidula, e basi decurrente latiuscula late ovata concava, in acumen longiusculum robustiusculum acutatum summitate in-

distincte denticulatum producta, margine e basi extrema usque ad acumen et ultra late revoluta integerrima, nervo tenuiusculo luteo in acumine evanido leniter carinato exarata, e cellulis luteis indistincte ellipticis in membranam veluti scariosam firmam conflatis, ad alas multo minoribus quadratulis incrassatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, 5000—6000 ped. alt., inter *Brauniam Schimperianam*: L. Höhn el 1887 in Exped. Telekiana.

Ob areolationem folii magis scariosam ab omnibus congeneribus subrecedens, sed distincta species.

42. *Lasia flagellacea* n. sp.; monoica; cespites valde intricati laxissime cohaerentes lurido-sordidi; caulis filiformis repens surculos multos singulos remotos cryphaeoides exmittens; surculus uncialis in ramulos perpaucos breves vel longiores flagellaceo-attenuatos superne divisus, siccitate teretiusculus madore raptim patentifolius turgescens; folia caulina dense imbricata, humore subito patenti-patula, e basi angustiore cordata latiuscule ovata breviter lato-acuminata brevissime acutata concava, margine infero latiuscule revoluta, integerrima, nervo pallido superne saepius brevissime furcato ad acumen evanido percursa, e cellulis cryphaeoides grossiuscule ellipticis (vel inferne magis rotundis) densis pallide luridis areolata facile fragilia; perichaetialia in cylindrum nitidum angustissimum acutum longiusculum convoluta, e basi convolutacco-lanceolata in acumen elongatum protracta, nervo mediano indistincto plerumque furcato, cellulis elongatis pallidissimis laxioribus; theca in pedunculo rubro parum curvulo emersa cylindraceo-ovalis ore angustior, rufa; calyptra parce pilosa; peristomium (imperfectum) e dentibus externis angustis linealibus rufis articulatis compositum.

Patria. Africa or. trop., Settima-montes (Aberdare-Kette) in occidente montis Kenia, 8. Novembri 1887: L. Höhn el. Inter cespitem *Leptodontis Smithii* viget.

Ex habitu *Lasiae Ohioensi* (Sulliv.) similis, sed ab eadem atque congeneribus plurimis surculo paucirameo jam differt.

43. *Fabronia Leikipiae* n. sp.; monoica pusilla tenerrima pallide viridis; folia caulina madore patenti-patula remota ovato-acuminata in pilum breviusculum inferne cellulosum superne unicellulare capillare albidum acutissimum protracta integerrima, nervo tenuissimo vix distincto mediano tenerrime notata, e cellulis majusculis pellucidis viridulis reticulata; perichaetialia minuta in gemmulam minutam congesta enervia multo teneriora brevius pilifera; theca in pedunculo pro plantula longiusculo flavido erecta minuta urceolato-ovalis macrostoma. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette, inter alios muscos: L. Höhn el in Exped. Telekiana 1887.

Ich habe von diesem niedlichen Moose zwar nur ein einziges Exemplar unter anderen Moosen von Leikipia aufgefunden, mochte es aber trotz seiner Unvollständigkeit nicht übergehen, um wenigstens das Dasein des Fabronia-Typus in jenen Gegenden fest zu stellen. Es hat sonst nichts Bemerkenswerthes an sich, als die ganzrandigen fast rippenlosen Blätter, lässt sich aber hierdurch gut unterscheiden, da Arten mit solchen Blättern selten sind. Doch ist ein Gewicht darauf zu legen, dass die Blätter nicht dicht über einander liegen, wie das bei Fabronia meist der Fall ist, sondern unter dem Mikroskope ohne Präparation einzeln leicht betrachtet werden können. Die vorliegende Art zeigt uns, dass der Typus vom Süden Afrika's bis nach Abessinien hin und ebenso in Zentral-Afrika heimisch ist; denn sie füllt gerade die Lücke aus, welche zwischen dem Kilimandscharo, wo der Typus ebenfalls zu Hause ist, und Abessinien stattfand.

44. *Porotrichum subpennaeforme* n. sp.; caulis ultrapollicaris tenellus in ramificationes multas inaequales breviores vel longiores sed angustissimas attenuatas curvulas apice surculi fasciculatim dispositas squalido-virides divisus; folia erecto-imbricata parva madore patula, e basi ob alas parvas valde impressas angustissime in laminam oblongatam late acuminatam ad acumen breve grossiuscule serratam producta, planiusculo concava, margine erecta infra apicem integerrima, nervo tenuissimo saepius furcato dorso leniter carinato glabro flavidulo infra acumen evanido exarata, e cellulis ellipticis incrassatis basin versus longioribus omnibus in membranam luteo-viridem firmam veluti conflatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo in sylva primaeva inter 1500—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Porotrichum pennaeforme Mitt. Capense in Journ. of Linn. Soc. 1886 p. 315 huc pertinere videtur, sed haecce species multo robustior atque altior folia habet basi lata nec impressa angustissima. Fructus praeterea characteres alios distinguendos certe dabit.

45. *Porotrichum ruficaule* n. sp.; cespites depressi planiusculi squalidorufuli valde intricati ob stolones multos veluti maxime setosi; caulis 1—2-pollicaris tener in ramificationes permultas teneras divisus; ramus angustus in apicem stolonaceum flexuosum capillarem protractus, ramulis paucis iterum saepius stolonaceis vix pinnatus; folia parva laxè imbricata vel distichacea rufo-lutea oblonga in acumen latiusculum breve acutum producta, margine basilari anguste revoluta demum erecta atque ad acumen grossiuscule serrata, caviuscula, nervo unico tenui luteo ante acumen evanido dorso leniter carinato notata, e cellulis rotundis vel ellipticis incrassatis basin versus longioribus angustis omnibus in membranam scariosam conflatis areolata, cellulis alaribus paucis impressis brunneis parvis basi ornata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, sine loco speciali: L. Höhnelt 1887 in Exped. Telekiana.

Ex habitu *Porotricho setoso-flagellaceo* mihi Hb. ex Antioquia Novae Granatae simillimum, sed colore rufulo-luteo jam ab hacce specie Americana distinctum. Species hujus formationis prima Africana et stolonibus ditissimis memorabilis. Folia stolonum capillarium sensim minuta remotissima in caule rubro crassiusculo angustissime lineari-acuminata apice subdenticulata nervosa. Flores masculi pro tenuitate surculi majusculi rufo-lutei, foliis similibus stolonis.

46. *Distichia platyantha* n. sp.; monoica; procera cespites elatos molles turgescences pallidos sistens, ramis brevioribus vel longioribus pinnata; folia caulina laxè imbricata majuscula, e basi parum auriculata late ovata in laminam latiusculam oblongatam late et breviter acuminatam indistincte denticulatam producta, inferne paululo margine complicata, nervis binis vel in unam costam coalitis usque ad medium protractis planis pallidis, e cellulis densis pallidissimis angustissimis longiusculis in membranam veluti conflatis areolata, undulata, ramea planiora magis acuminata; perich. calycem magnum pallidum turgescens sistens, e basi parum convoluta oblongata in cuspidem longissimam strictiusculam denique filiformem protracta enervia laevia, e cellulis multo longioribus laxioribus areolata pallidissima; theca sessilis pro planta parva ovalis vel globulosa coriacea, operculo robustulo e basi conica in rostrum breve erectum productum; peristomium duplex: dentes externi lineali-lanceolati albide articulati paulisper rugulosi eleganter curvati integri nec divisi sed linea longitudinali indistincta notati; interni: membrana brevissima vix in dentes brevissimos exiens; calyptra campanulata pro operculo longe coriacea, in stylum elongatum protracta, basi vix semel divisa, superne subtuberculosa.

Patria. Kilima-Ndscharo, ubi inter alt. 5000—9000 ped. vegetationem massaliter effirmat: L. Höhnelt in Exped. Telekiana. 1887.

Musci pro regione sua characteristicus habitu robusto, colore pallido partium omnium vegetationis atque calycibus magnis turgidis pallidis prima fronte cognoscendus.

47. *Neckera (Calypothecium) Höhnelti* n. sp.; procerrima vegetationem laxissimam pallide virentem turgidam sistens subgracilis flexuosa, ramis caudiformibus patentibus vel recurvis curvatis distantibus pinnata, rigida fragilis; folia caulina laxè imbricata majuscula firma, e basi late rotundata subauriculata fuscata laxius reticulata oblongo-acuminata integerrima ad apicem angustatum obliquum brevem convoluta enervia, e cellulis angustis longiusculis membranam firmam flavo-virentem sistens areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. tropica, Leikipia regionis montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette: L. Höhnelt in Exped. Telekiana.

Caule longissimo, ramis gracilioribus caudiformibus pinnato firmo fragili jam primo visu discernenda species peculiaris.

48. *Neckera (Rhystophyllum) Höhneliana* n. sp.; monoica; habitus *Neckerae pennatae* vel *N. undulatifoliae* Mitt.; statura humilis irregulariter pinnata; folia caulina valde et regulariter horizontaliter undulata, undulis laminam totam transverse occupantibus praedita, e basi asymmetrica nervis binis brevissimis pallidissimis notata ad latus unum erecta vix complicata ad latus alterum rotundata in laminam subanguste ligulatam apice parum acuminato plerumque reflexo cucullato terminatam producta, superne denticulata, pallidissima, e cellulis linearibus densiusculis arcolata; perichaetia in cylindrum patulum congesta, e basi lato vaginata laxius reticulata enervi in laminam elongatam latiuscule cuspidatam integerriam ob cellulas laxiusculas striatulo-reticulatam strictiusculam summitate subdenticulatam attenuata, extima minora obtusata, omnia caeterum e cellulis angustis arcolata; theca immersa ovalis laxe reticulata leptodermis breviter pedicellata exannulata, operculo oblique rostellato; peristomium duplex elongatum pallidissimum: dentes externi angustissimi linea longitudinali fissiles ad marginem articulorum vix nodosiusculi, interni illis aequilongi capillares vix nodosiusculi in membrana brevissima positi.

Patria. Africa or. trop., Leikipia, ad pedem der Aberdare-Kette in occidente montis Kenia: L. Höhnel Novbr. 1887.

Species foliis maxime undulatis, undulis totam laminam occupantibus ornatis, igitur varie concavis saepius cucullatis, perichaetialibus extimis obtusatis atque peristomii fabrica facile distinguenda. Calyptram non vidi, sed operculum oblique rostellatum dimidiam indicat.

49. *Pilotrichella chlorothrix* n. sp.; caulis pendulus elongatus filiformis valde flexuosus, ramis remotis brevibus patentibus vel reflexis flexuosis singulis vel binis oppositis distantibus pinnatus sordide brunnescens, in apicem stoloniformem viridissimum nitidum longiusculum filiformem flexuosum brevissime cuspidatum simplicem protractus; folia dense imbricata ramos et ramulos julaceos attenuatos sistencia, inferiora late rotundate ovata plus minus breviter subito acuminata, usque ad acumen cochleariformi-concava, margine erecto integerrima, indistincte carinata, basi alis parvis impressis ornata, superiora angustiora viridia longius flexuose cuspidata, suprema in acumen piliforme semitortum flexuosum producta, omnia nervis binis indistinctis brevissimis notata et e cellulis angustissime linearibus ad alas basilares parenchymaticis incrassatis arcolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in sylva primaeva montis Kilima-Ndscharo, 1500—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Habitus *Pilotrichellae biformis* Hpe. Madagassae, sed multo tenerior.

50. *Orthostichella sericea* n. sp.; caulis breviusculus in ramificationem

ditissimam elongatam capillarem sericeo-pallidam inaequalem fragilem ascendens; rami primarii elongati flexuosi rigidi capillares, ramulis patentissimis capillaribus vel reflexis strictiusculis vel flexuosis valde remotis simplicibus vel hic inde iterum brevissime ramosulis teretibus pinnati; folia distincte orthostichacea dense imbricata pro tenuitate surculi majuscula, e basi ob auriculas rotundatas vix circinnatas latiuscula in laminam oblongam⁴ vix panduraeformi-excavatam demum ovatam et subito, fere longiuscule stricte cuspidatam producta, margine erecto integerrima apert-concava apice plus minus convolutacea, nervis binis brevissimis indistinctis notata, e cellulis angustissime linearibus pallidissimis areolata Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione occidentalis montis Kilima-Ndscharo, ad pedem der Aberdare-Kette: L. Höhnelt in Exped. Telekiana 1887.

Habitus peculiaris, ramificationibus elongatis capillaribus sericeo-pallidis foliisque majusculis vix panduraeformibus oblongo-acuminatis longiuscule cuspidatis distinctus.

51. *Orthostichella curvifrons* n. sp.; cespites lati valde intricati firmi squalido-lutei; caulis breviusculus $\frac{1}{2}$ -pollicaris frondiformis i. e. apice in ramos plures iterum ramulosos curvatos divisus tenellus, ramulis brevibus subteretibus valde inaequalibus breviter attenuatis; folia caulis primarii dense appressa majora, ramea indistincte orthostichacea imbricata, e basi latiuscula alis rotundatis latioribus subcircinnatis ornata in laminam angustiore demum oblongo-ovatam acumine pro folio longiusculo acuto cuspidatam producta panduraeformia, margine erecto integerrima apice folii convolutacea apert-concava, nervis binis brevissimis indistinctis, e cellulis angustissime linearibus membranam scariosam sistentibus ad alas majoribus incrassatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione meridionali montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette: L. Höhnelt Novembri 1887 in Exped. Telekiana.

Orthostichellae panduraeformi Africae Capensis similis, sed statura humili raptim toto coelo diversa.

52. *Orthostichella capillicaulis* n. sp.; cespites lati valde intricati squalido-virides molles; caulis tener 2—3-pollicaris flexuosus vage ramosus in ramos capillares elongatos brevissime pinnatos apice simplices i. e. exramulosus protractus; folia caulina minuta imbricata indistincte orthostichacea saepius delapsa et ramum defoliatum sistentia, anguste panduraeformi-ovata basi vix latiora apice brevissima mucronata, alis basilaribus nec circinnatis parum evolutis ornata, nitida, apert-concava apice vix involutacea, nervis binis obsoletissimis vix notata, margine erecto integerrima, e cellulis angustissime linearibus membranam scariosam sistentibus pallidissimis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette: L. Höhncl legit Novembri 1887 in Exped. Telekiana.

Ab *O. tenellula* simili foliis multo minoribus imbricatis diverse formatis jam longe recedens.

53. *Orthostichella tenellula* n. sp.; cespites lati valde intertexti molles squalido-lutei; caulis 4—5 pollicaris elongatus tener flexuosus subflaccidus frondem perangustam sistens, ramulis brevissimis teneris patentibus vel reflexis curvulis remotis distantipinnatus, apice breviter profusus simplex vel vix brevissime ramulosus; folia caulina indistincte orthostichacea minuta patentia nec imbricata, anguste panduraeformi-ovata, basi latius auriculata brevissime binervia, aperto-concava apice parum involutacea, margine erecto integerrima, in acumen pro foliolo longiusculum strictum acutum protracta, e cellulis angustissimis pallidissimis membranam scariosam sistentibus, ad alas basilares vix circinnatas minutis incrassatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in sylva primaeva montis Kilima-Ndscharo: L. Höhncl in Exped. Telekiana 1887.

Ex teneritate partium omnium atque foliis patentibus nunquam imbricatis facile distinguenda species, cujus folia ad apicem ramulorum tenerorum saepius delapsa. *Orthostichellae capillicauli* proxima.

54. *Orthostichella profusicaulis* n. sp.; cespites latissimi valde intertexti laxissime cohaerentes pallide flavidi firmi; caulis longe profusus ca. 4-pollicaris plerumque in ramos longiusculos pluries divisus, ramulis remotis fere $\frac{1}{2}$ -pollicaribus vel multo longioribus inaequalibus teretiusculis patentibus vel valde patulis distantipinnatus, in ramos principales longiusculos strictiusculos vel rarius curvulos simplices i. e. vix brevissime ramulosos protractus; folia caulina indistincte orthostichaceo-disposita vesiculoso-turgescencia nitida, e basi alis latiusculis subcircinnatis latiuscula in laminam primum angustiore demum panduraeformi-ovatam latiore rotundatam in acumen breve robustiusculum mucroniformem acutum excurrentem producta, aperto-concava vel cochleariformia apice solum parum involutacea, margine erecta integerrima, e cellulis pallidissimis angustissimis ad alas basilares paucis incrassatis minusculis aureis areolata, indistincte binervia. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Ugueno, in regione meridionali montis Kilima-Ndscharo, 1500 m altitudinis: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu frondiformi ad *Orth. ampullaceam* Hpe. Comorensem accedens, sed haecce species colore virescente foliisque crenulatis jam recedit. Omnes species *Orthostichellae* caulibus profuso-frondiformibus tribulum proprium formant.

55. *Eriocladium cymatocheilos* n. sp.; caulis longiusculus ca. 6-pollicaris valde flexuosus flaccidissimus mollis subdistichaceo-foliosus in ramulos latiusculos paucos remotos valde inaequales coma brevissima gemmacea pallidissime flavida pro more curvula coronatos divisus; folia caulina pallide flavida nitida membranacea actate brunnescentia vel brunneo-purpurascentia siccitate et humore laxa patula vel patentia, e basi ob alas impressas complicatas angustiore amplexicauli in laminam latiusculam oblongatam sensim longissime acuminatam demum capillari-cuspidatam flexuosam protracta, margine superiore sinuato-undulata, ubique fere minutissime indistincte denticulata, parum convolutacea sed carinato-concava plerumque aperta, nervo tenuissimo supra medium capillari-evanido notata, e cellulis longiusculis angustissimis pallidis minutissime punctato-papillosis in membranam scariosulam veluti conflatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Ugueno, in regione meridionali montis Kilimandscharo, in sylva primaeva inter *Orthostichellam profusicaulem*, 1500 m alt.: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *Eriocladio lanosulo* C. Müll. Comorensi aliquantulum simile, sed characteribus explicatis plerumque foliis sinuato-undulatis remotissimum.

56. *Papillaria serpentina* n. sp.; caulis primarius repens capillaris, secundarius capillaris elongatus 4—5 pollicaris maxime serpentino-flexuosus, ramulis tenuissimis brevibus valde flexuosis solitariis remotis valde inaequaliter pinnatus; folia dense imbricata caules et ramulos teretes sistencia madore patula, pro tenuitate axis majuscula, e basi semiamplexicauli plicata ob alas latiusculas semirevolutas in auriculas decurrentes angustas transeuntes auriculata in laminam ovato-lanceolatam longiusculam producta, in acumen elongatum basi latiusculum apice acute cuspidatum denique fere capillare protracta, nervo flavido-pallido dorso in acumine evanido exarata, carinato-concava, margine basi anguste revoluta superne erecta integerrima, e cellulis fuscatis minutis rotundis obscuris basin versus pallidiorem longioribus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, in sylva primaeva: L. Höhnelt 1887 in Exped. Telekiana.

Tenuitate partium omnium axis capillaris maxime intertexto-flexuosi atque auriculis folii liberis saepe decurrentibus facillime cognoscenda, a *Papillaria Africana* characteribus designatis certe distincta.

57. *Papillaria filifunalis* n. sp.; cespites lati laxa cohaerentes rigidissimi fuscati valde intricati; caulis singulus elongatus valde flexuosus pendulus filiformis, ramulis brevibus patentibus vel patulis flexuosis capillaribus vix attenuatis teretibus remotis pinnatus; folia caulina dense imbricata humore patula breviter, e basi pallida ovata lanceolato-acuminata integerrima stricta, margine basali latiuscule revoluta apicem versus erecta

carinato-concava ante acumen cucullata, nervo tenui pallido supra medium evanido notata, e cellulis minutis rotundatis distinctis obscure virentibus basi parum majoribus pallidis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or trop., Leikipia, Settima- (Aberdare-) Kette, Novbr. 1887: L. Höhnelt in Exped. Telekiana.

Papillariae Africanae C. Müll. proxima et simillima, sed haecce species foliis longe filiformi-capillari-attenuatis jam differt.

58. *Papillaria breviculifolia* n. sp.; profusa ca. 6-pollicaris vage ramosa firma rigida obscuro-viridis sordida; caulis singulus elongatus, ramulis brevibus teretiusculis e basi usque ad apicem aequalibus simplicibus vel ramulo brevissimo iterum divisus curvulis distantibus maxime patulis pinnatus; folia caulina dense imbricata, madore rigido-patula brevissima viridissima, e basi lata pallida alam alteram planam latiusculam alteram complicatam latiuscule auriculatam exmittente hastato-lanceolata obscuro-viridia in cuspidem brevem acuminata, margine erecto integerrima, nervo tenui carinato ante acumen evanido pallido percursa, profunde carinato-concava ante acumen cucullata, leniter plicata, e cellulis basi pallidis incrassatis indistinctis angustis, ad alas rotundatis incrassatis, apicem versus minute rotundatis minutissime papillosis sordide viridibus areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Ugueno, in regione meridionali montis Kilima-Ndscharo, 1500 m: Dr Hans Meyer 1889.

Papillaria Borchgrevinkii Kiaer Madagassa similis ramulis robustioribus, foliis majoribus apice brevi semitortis atque denticulatis raptim recedit.

59. *Pterogonium Kilimandscharicum* n. sp.; cespites laxissimi intertexti pallidissimi rigidi; caulis ultrapollicaris gracilis tenax julaceus flexuosus arcuato-curvatus, ramis permultis capillaribus elongatis flexuosis julaceis valde divisus; folia dense imbricata in caule principali secunda, madore patula nec patenti-juniperoidea, e basi semiamplexicauli alis majusculis subdecurrentibus ornata lato-ovata acumine latiusculo serrulato plus minus longo terminata, margine erecta, planiusculo-concava, nervis binis breviusculis indistinctis notata, e cellulis pallidis incrassatis verticaliter ellipticis ad alas basilares horizontalibus depressis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in monte Kilima-Ndscharo, 5000—6000 ped. alt., inter *Brauniam Schimperianam*: L. Höhnelt in Exped. Telekiana 1887.

Pterogonio Madagasso mihi proximum, sed habitu omnino diversum, foliis multo majoribus madore patulis nec juniperoideo-patentibus, alis multo majoribus decurrentibus. Fructus hucusque ignotus caracteres certe dabit. An *Pt. gracile* Mitt. in Journ. of Linn. Soc. 1886. p. 316? Haecce species toto coelo differt.

60. *Entodon (Erythrodontium) rotundifolius* n. sp.; monoicus; cespites corticoli adnati profusi luteo-virides bicolores; caulis repens rami-

ficationibus ascendentibus breviusculis fasciculatim divisis, ramulis julaceis rigidis viridissimis nitidis curvulis; folia caulina dense imbricata madore parum patula caulem teretem sistencia, e basi lata alis parum decurrentibus ornata in laminam brevem latam rotundatam excurrentia, acumine mucroniformi brevissimo acuto plano coronata, usque ad mucronem cochleariformi-concava, margine erecto integerrima, nervis binis obsoletis brevissimis notata, e cellulis angustis linearibus chlorophyllose coloratis, ad alas latiusculas panduraeformi excavatas permultis hexagonis parenchymaticis multo magis chlorophyllosis areolata; perichaetia pallidissima in cylindrum brevem convoluta, externa minuta madore apice squarrosa breviter acuminata, interna multo majora convolutaceo-lanceolata in cuspidem longiusculam tenuissimam acutatam protracta, e cellulis pallidissimis basi laxioribus superne longissimis pellucidis reticulata; theca in pedunculo brevi rubente torto erecta parva ovalis. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in regione montis Kilima-Ndscharo, Dschagga (Marango), 1300 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Foliis caulinis subpanduraeformi-rotundatis brevissime mucronatis cochleariformi-cucullatis ab omnibus raptim distinguitur. Ex habitu *Pterigynandro Schweinfurthi* simile. An *Pterogonium gracile* Mitt. in Journ. of Linn. Soc. 1886, p. 316?

61. *Anomodon (Euanomodon) filivagus* n. sp.; monoicus; caulis filiformis tener repens valde vage ramosus, ramificationibus atque ramulis capillari-filiformibus julaceis pallescentibus valde flexuosis; folia caulina minuta dense imbricata madore patenti-patula, e basi angustiore cordata perfecta ovata in acumen longiusculum obliquiusculum attenuata, margine ad infimam basin solum parum revoluta integerrima, carinato-concava, nervo tenui pro foliolo validiusculo flavidulo in acumine flexuose evanido exarata, e cellulis pro foliolo majusculis rotundatis pallidis ad alas basilares magis quadratis areolata; perichaetia circa petiolum breviusculum rubentem dense imbricata multo pallidiora majora stricta, e basi latiuscula in acumen longiusculum attenuata; theca minuta cylindracea; peristomium (incomplete tantum scrutatum) dentibus minutis brevibus lanceolato-subulatis inferne densiuscule articulatis. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in regione occidentali montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette, Novbr. 1887: L. Höhnelt inter alios muscos in Exped. Telekiana legit.

Muscus tenellus omnibus partibus minutis teneris pallidis, ex habitu *Anomodonti clavirameo* haud dissimilis, sed theca erecta cylindracea primo adspectu raptim distinguendus.

62. *Anomodon (Herpetineuron) Leikipiae* n. sp.; cespites perhumiles sordide virides vel lutei laxissime cohaerentes; caulis simplex julaceus parvulus plus minus curvulus; folia caulina dense imbricata madore patenti-patula breviora, e basi rotundate cordata lata ovata in acumen

breviusculum robustum latiusculum obliquum producta, carinato-concava integerrima, margine basilari parum revoluta superne erecta, nervo validiusculo luteo apice parum serpentino-flexuoso in acumine evanido exarata, e cellulis minusculis rotundatis ad alas basiles magis quadratas seriatim dispositis areolata luteo-viridia. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in reg. occid. montis Kenia, Westrand der Aberdare-Kette, inter Hepaticas: L. Höhnelt 1887 in Exped. Telekiana.

Herpetineuro clavirameo Capensi similis, sed foliis multo majoribus latioribus jam diversus.

Es gibt unter den Anomodon-Arten eine ganze Gruppe, welche sich dadurch merkwürdig auszeichnet, dass ihre Blattrippe mit ihrem obersten Verlaufe zickzackartig wird; und mit diesem Merkmale hängt stets zusammen, dass die Stengel mehr oder weniger gekrümmt oder fast schneckenartig eingerollt an der Spitze werden. In Folge dessen habe ich mich genöthigt gesehen, diese Arten in einer eigenen Gruppe unter dem Namen Herpetineuron (Schlangen-Rippe) zu vereinigen. Es gehören hierher ausser der beschriebenen und der ihr verwandten Art: *Anomodon rubiginosulus* mihi (A. Toccoae Bryol-Javan.), *A. Zippelii* mihi (Hypnum Zippelii Dz. & Mb.) von Amboina, *A. Toccoae* Sull. & Lesq. aus den südlichen Ver. Staaten, *A. acutifolius* Mitt. aus Tibet, *A. devolutus* Mitt. aus den indischen Gebirgen, *A. serratus* n. sp. aus Japan, *A. Yokohamae* n. sp. ebendaher und *A. Jancirensis* n. sp. (*Papillaria sciuroides* Hpe. und ?*Rhizogonium sciuroides* Hpe. Hb.). Auch vom Kilimandscharo führt Mitten (Journ. of Linn. Soc. 1886. p. 318) einen *A. clavirameus* auf, der höchst wahrscheinlich hierher gehört. Da ich ihn aber von diesem Schneeberge noch nicht sah, so weiss ich nicht, ob er zu der kapischen Art wirklich gehört oder mit der oben beschriebenen zusammenfällt oder eine eigene Art ist.

63. *Hypnum (Microthamnium) glabrifolium* n. sp.; caulis longe vage ramosus, ramulis brevibus curvulis viridissimis plumose foliosis; folia caulina siccitate atque madore patenti-patula, e basi semianplexicauli latiuscule lanceolata elongate acuminata, acumine stricto angustissimo acutato-cuspidato terminata, margine erecto tenerrime denticulata, caviuscula, nervo tenuissimo mediano notata, e cellulis quam maxime anguste linearibus molliculis chlorophyllosis areolata nitido-viridia glabra nec papillosa. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, in sylva primaeva inter 1500—3000 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Foliis siccitate et madore strictis patenti-patulis viridissimis glabris facile a suis congeneribus distinguendum. An *Microthamnium pseudo-reptans* Mitt. in Journ. of Linn. Soc. 1886. p. 316?

64. *Hypnum* (*Cupressina*) *Höhneli* n. sp.; cespites dilatati molles pallescentes turgidiusculi; caulis longe profusus valde flexuosus vage ramosus, ramulis longioribus vel brevioribus attenuatis squalidis curvatis subturgidis vix complanatis inaequaliter pinnatus; folia pallescentia nitida densiuscule imbricata falcata, in summitate ramulorum comam minutam drepanophyllaceam sistencia, madore ramulum teretiusculum turgescentem sistencia veluti squamoso-patula, e basi alis impressis ornata anguste oblongo-acuminata, acumine longiuscule oblique cuspidato vix conspicue denticulato terminata, integerrima margine erecta basi solum anguste revoluta pro more plus minus convolutaceo-concava, nervis binis brevissimis indistinctis notata, e cellulis angustissimis linearibus in membranam maxime pallescentem veluti conflatis et alaribus multis planis parenchymaticis incrassatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., Leikipia in occidente montis Kenia, ad pedem der Aberdare-Kette, Novbr. 1887: L. Höhnel in Exped. Telekiana. — In monte Kilimandscharo viget inter 3000--4800 m in cespitibus *Distichii Kilimandscharici*.

Ex habitu *Hypno cupressiformi* simile, sed characteribus accuratius explicatis diversum.

Es ist seltsam, dass ein Moos, welches wahrscheinlich unter ganz anderen Verhältnissen am Fusse der Aberdare-Kette lebt, noch in so grosser Höhe auf dem Kilima-Ndscharo vorkommt, wo es sich in den Rasen des *Distichium Kilimandscharicum* verbirgt. Doch vollführt unser eigenes *H. cupressiforme* ganz Aehnliches, indem es von den Niederungen bis zu den Alpen hinauf geht. Ich habe wenigstens beide Moose von Leikipia und vom Kilima-Ndscharo nicht von einander unterscheiden können, nur dass letzteres nicht so blasse, sondern grünlichere Blätter entwickelt, weshalb ich es nur als var. alpina von dem ersteren trenne.

65. *Hypnum* (*Hyocomiella*) *bartramiophilum* n. sp.; caulis humilis vix uncialis gracilis flexuosus, inferne tomentosulus fusco-nigricans superne aureo-stramineus; simplex vel supra in ramulos brevissimos plures fasciculatim divisus; folia caulina splendentia parva, siccitate squarrosulopatula madore patula, scarioso-membranacea, e basi lata alis majusculis valde impressis e cellulis alaribus multis laxis pellucidis parenchymaticis reticulatis ornata latiuscule ovato-acuminata, acumine longiusculo acuto-cuspidato terminata, margine ubique integerrimo erecta, striatulo-plicata itaque flaccida, carinato-concava, nervis binis tenuibus brevibus vel in unam costam longiorem conflatis notata, e cellulis angustis linearibus pallidissimis nec in membranam conflatis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000--4800 m cum *Philonoti tricolore* consociatum: Dr. Hans Meyer 1889.

Ein ganz isolirt stehendes winziges Moos, dessen nächste Nähe sich bei *Hyocomium* befindet. Von demselben ist es jedoch schon durch die

olia integerrima, sowie durch die cellulae alares, welche einen relativ grossen eingepressten Flügel bilden, sogleich unterschieden. In diesen Unterschieden liegt auch zugleich der Charakter der neuen Sektion. In mancher Beziehung neigt sie zu *Campylium*, weicht aber durch die grossen eingedrückten Blattflügel und deren grosse Zellen sogleich ab.

66. *Hypnum (Brachythecium) gloriosum* n. sp.; cespites lati deplati robusti aureo-virides bicolores splendiduli molles; caulis primarius surculos plagiothecioideos plures ramosulos exmittens; surculi unciales flexuosi flaccidi caudiformes in comam brevissimam pallide luteam gemmaceam attenuati virides inferne pallide ferruginei latiusculi; folia caulina densiuscule conferta, siccitate parum madore magis patula, ramum subteretem sistencia, e basi cordata late ovata in acumen breviusculum apice perangustum et semitortum attenuata, usque ad acumen concava integerrima margine vix revoluta, nervo tenui pallide virente supra medium evanido notata, e cellulis pellucidis elongatis angustis mollibus parum chlorophyllosis infima basi ad alas angulares parenchymaticis hexagonis laxiusculis paucis reticulata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu atque robustitate *Brachythecio glareoso* simile, sed surculis plagiothecioideo-caudiformibus pulchre flavo-virentibus splendentibus primo visu distinctum. Species pulcherrima!

67. *Hypnum (Brachythecium) nigro-viride* n. sp.; cespites lati nigro-virides laxo intertexti firmissculi; caulis vaganti-ramosus ramulis brevibus subteretibus divisus, inferne nigricans ad ramulos juniores viridissimus; folia caulina densiuscule imbricata madore erecto-patula parvula, e basi cordata ad alas impressa anguste ovato-acuminata, acumine brevi stricto terminata, firmisscula basi integerrima apicem versus minuta denticulata margine infimo parum revoluta, nervo e basi crassiore tenuissime supra medium evanido percusa, e cellulis angustissimis linearibus valde chlorophyllosis ad alas basilares parenchymaticis parvis laxis fuscidulis areolata. Caetera ignota.

Patria. Africa or trop., monte Kilima-Ndscharo, inter 3000—4800 m: Dr. Hans Meyer 1889.

Ex habitu *Brachythecio rutabulo* simile, sed foliis minoribus diverse formatis toto coelo distans.

68. *Hypnum (Tamariscella) toricalycinum* n. sp.; robustum longe repens valde ramosum, ramulis remotissime bipinnatis flavo-rufis; paraphylla solum in axi primario tomentum pallide viride sistencia tenera valde intricata, rarius in axi secundario, deficientia in ramulis; folia caulina squamaeformi-imbricata, e basi carinate cochleariformi-concava late rotundate ovata distincte plicata in acumen latiusculum breviusculum re-

curvulum margine ob papillas pseudo-denticulatum producta, e margine basilari usque ad medium folii late revoluta, nervo tenui luteo ad acumen evanido exarata, ubique papilloso-aspera; ramulina multo minora vesiculoso-concava, e basi latiuscula ovalia brevissime acuminata, margine ubique erecta, valde papilloso-aspera, nervo evanido flavido tenui notata, nec carinato-concava; perich. e basi vaginante in laminam loriformem longiusculam angustam acutato-cuspidatam planam protracta, papillosa fuscata. Caetera ignota.

Patria. Africa or. trop., in sylva primaeva montis Kilima-Ndscharo inter alios muscos: L. Höhnelt 1887.

Forsan *Thuidium tamariscinum* Mitt. in Journ. of Linn. Soc. 1886. p. 318, sed haecce species foliis perichaetialibus ciliato-fimbriatis jam differt.

Litteratur.

Dr. W. Burck, Eenige bedenkingen tegen de theorie van Weismann aangaande de beteekenis der sexueele voortplanting in verband met de wet van Knight-Darvin. Overgedrukt uit het Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel XLIX, Aflevering 4.

Weismann führt im Anschluss an seine Lehre von der Continuität des Keimplasmas die Variabilität der Species darauf zurück, dass bei der aus der Kreuzung zweier Individuen resultirenden Fortpflanzung das Keimplasma der zweiten Generation eine Vereinigung der beiden elterlichen Keimplasmen darstellt, welche je ihre besonderen Vererbungstendenzen besassen. Nachkommen einer ohne Kreuzung zu Stande kommenden Fortpflanzung können immer nur dieselben erblichen Eigenschaften haben, wie ihre Vorfahren. Bei den immerfort sich verändernden Lebensumständen und äussern Einflüssen, denen die Art ausgesetzt ist, muss das Vermögen, innerhalb weiter Grenzen zu variiren und sich den Umständen anzupassen, für die Erhaltung der Art unentbehrlich sein. Da nun nach Weismann's Ansicht die Fortpflanzung ohne Kreuzung dieses Vermögen ausschliesst, so folgt, dass alle Pflanzen und Thiere, welche sich ohne Kreuzung fortpflanzen, auf dem Wege sind auszusterben; nur Kreuzbefruchtung kann die Erhaltung der Art sichern. Burck greift diesen Satz an. Er weist zunächst darauf hin, dass eine grosse Anzahl von Pflanzen sich ohne Kreuzung verschiedener Individuen fortpflanzt, und zwar handelt es sich dabei zumeist nicht um Parthenogenesis oder Apogamie, sondern um Selbstbestäubung. Nach dem Hinweis auf das häufige Vorkommen cleistogamer Blüthen schildert der Verfasser eine Anzahl von Blüthenformen, deren Einrichtungen eine Fremdbestäubung unmöglich machen. Bei *Myrmecodia tuberosa*, bei einigen Arten von *Unona*, *Artabotrys* u. s. w. bleiben die Blumenkronen vollständig geschlossen, wie bei den cleistogamen Blüthen, von denen sie nur durch Grösse, Farbe und Wohlgeruch sich unterscheiden. Selbstbestäubung ist hier die ausnahmslose Regel. Wegen der lebhaften Färbung der Blüthen und der bei ihnen noch vorhandenen reichlichen Honigabsonderung nimmt Burck an, dass dieselben ursprünglich auf Insectenbestäubung eingerichtet waren, ebenso wie die

meisten cleistogamen Blüten, die ja zum Theil gerade in solchen Familien auftreten, deren Blüten übrigens in hervorragender Weise dem Insectenbesuch angepasst sind. — Eigenthümlich berührt zwischen den Resultaten exacter Forschung die phantasievolle Personificirung der Natur, welche der Verfasser an verschiedenen Stellen seiner Arbeit eingeflochten hat; so findet sich auf Seite 521 der folgende Passus: »De eenige mogelijke verklaring is in mine oogen: dat de bloemen van *Myrmecodia*, *Artabotrys*, *Goniiothalamus*, *Unona*, *Cyathocalyx*, *Mitrella* voorheen waren ingericht voor bevruchting door tusschenkomst van insecten; dat de natuur echter in den loop der tijden haar plan heeft gewijzigd; dat bijkomende omstandigheden, waarmede de natuur in den beginne geen rekening heeft kunnen houden haar hebben gedwongen van haar oorspronkelijk plan af te wijken.« — Die Blüten von *Myrmecodia* etc. sind nach Burck's Ansicht auf dem Wege cleistogam zu werden, und die gegenwärtig cleistogamen Blüten unter den Leguminosen, Violaceen etc. haben sich in früherer Epoche einmal in demselben Stadium befunden. Wenn aber die Pflanzen mit geschlossenen Blüten im Stande sind, sich schrittweise weiter zu verändern, so ist der Beweis geliefert, dass auch die Fortpflanzung ohne Kreuzung der Individuen zur Variation der erblichen Eigenschaften führen kann. Den Nachweis der Variirbarkeit von Pflanzen mit Selbstbefruchtung erbringt der Verfasser an dem Beispiel von *Artabotrys*. Alle Arten dieser Gattung besitzen geschlossene Blüten, welche Fremdbestäubung ausschliessen. Dass die Verwandlung der offenen Blüten in geschlossene sich in jeder Species besonders vollzogen habe, ist nicht wohl möglich; vielmehr müssen alle diese Arten von einer gemeinsamen Urform mit geschlossenen Blüten ausgegangen sein. Die Trennung der *Artabotrys*-form in wohl unterschiedene Species hat sich also erst vollzogen, nachdem durch das Geschlossenbleiben der Blüten die Fortpflanzung durch Kreuzung vollkommen unmöglich gemacht worden war. Der Verfasser führt dann weiter aus, dass in sehr vielen Fällen der Insectenbesuch überhaupt nicht die Fremdbestäubung, sondern nur die Selbstbestäubung der Pflanzenindividuen vermittelt. Als Beispiel dafür, dass oft die in der Natur vorliegenden Verhältnisse von den unter dem Einfluss des Knight-Darwin'schen Gesetzes stehenden Beobachtern falsch gedeutet worden seien, bringt er den Nachweis, dass der Insectenbesuch bei den *Aristolochia*-Arten nur Selbstbestäubung vermitteln kann. Andere Beispiele regelmässiger Selbstbestäubung bieten *Coffea bengalensis*, *Morina elegans*, *Erophila verna* u. a. m.

Die kurzen Andeutungen mögen genügen, den Leser auf die interessante Abhandlung sowie auf die damit in Zusammenhang stehende ausführlichere Arbeit desselben Autors in den *Annales du Jardin botanique de Buitenzorg* aufmerksam zu machen.

Ghgn.

Dr. F. Höck, Nährpflanzen Mitteleuropas, ihre Heimat, Einführung in das Gebiet und Verbreitung innerhalb desselben. Stuttgart, Verlag von J. Engelhorn, 1890.

Der Verfasser hat sein Buch in erster Linie für den Geographen bestimmt und die Umgrenzung und Gliederung des Stoffes danach bemessen. Er theilt die Nährpflanzen in Getreidepflanzen, Obstpflanzen und Gemüsepflanzen und behandelt im ersten Abschnitt seiner Arbeit die Heimat und Geschichte, im zweiten die Verbreitung der Nährpflanzen Mitteleuropas mit Rücksicht auf das Klima. In gedrängter Kürze wird das dem Verfasser zugängliche, reichhaltige Litteraturmaterial über den Gegenstand verarbeitet. Nicht nur für den Geographen, sondern auch für den Botaniker erhält das Buch durch die zahlreichen Litteraturangaben einen bleibenden Werth; es ist ein mit Sorgfalt und Mühe zusammengetragenes, kleines Nachschlagewerk, an dem

der Botaniker nur bedauern kann, dass sich sein Inhalt nicht über ein weiteres Gebiet erstreckt. Für den wissenschaftlichen Gebrauch, zur schnellen Orientirung über einen Gegenstand ist die vom Verfasser beliebte Bündigkeit des Stils entschieden praktisch. — Man vergleiche nur den Absatz über den Weinstock auf Seite 27; auf kaum einer halben Textseite wird uns das Wichtigste über den Ursprung und die Geschichte der Rebe nebst 9 darauf bezüglichen Litteraturnachweisen mitgetheilt. — Für eine zusammenhängende Lectüre dürfte die Schreibweise weniger geeignet sein, zumal da die häufige Unterbrechung der Zeilen durch die Litteraturangaben das Lesen erschwert. Wegen seines reichen Inhaltes von allgemeinem Interesse verdient das Büchlein trotzdem, auch im Laienpublicum einen grösseren Leserkreis zu finden.
Ghgn.

Welislaw P. Wojinowic, Beiträge zur Morphologie, Anatomie und Biologie der *Selaginella lepidophylla* Spring. Diss. Breslau 1890.

Selaginella lepidophylla gehört zu denjenigen Pflanzen, welche ohne Schaden lange Perioden der Trockenheit überstehen können. Sie wächst im Gebirge des tropischen und subtropischen Amerikas auf steinigten Felsabhängen und befindet sich während der längsten Zeit des Jahres im trockenen Zustande; die Zweige sind nach aufwärts eingekrümmt, so dass die Pflanze einem festen Knäuel gleicht, alle Theile sind trocken, braun und brüchig. Geht an dem Standorte ein Platzregen nieder, so saugt die Pflanze schnell Wasser an, breitet ihre Zweige flach rosettenförmig aus und vegetirt, bis der Verbrauch und die Verdunstung des aufgenommenen Wassers die Lebensthätigkeit meist schon nach Verlauf weniger Stunden wiederum zum Stillstand bringt. Der Verfasser hat die Morphologie und Anatomie der Pflanze untersucht und sucht daraus Anhaltspunkte zur Erklärung der merkwürdigen biologischen Verhältnisse zu gewinnen. Hinsichtlich der Morphologie ist die eigenartige Sprossverkettung bei *Sel. lepidophylla* bemerkenswerth. Die sympodiale Hauptachse des Pflänzchens bildet eine korkzieherartige Spirale, das ganze Sprosssystem stellt eine schraubelähnliche Dichotomie dar, bei welcher stets der linke Gabelast eines der homodromen Glieder des Sympodiums bildet, der rechte aber zum Seitenzweig wird. Das Einrollen der Zweige bei eintretender Dürre ist ein rein mechanischer Vorgang, welcher auf ungleichmässiger Zusammenziehung der antagonistischen Sprossseiten bei dem Wasserverlust beruht. In den äussersten Zweigen, welche im zusammengerollten Zustand die jüngeren Pflanzentheile einhüllen, sind die Zellwände intensiv roth gefärbt durch einen eigenthümlichen Farbstoff, der nach des Verfassers Anschauungs- und Ausdrucksweise die »Aufgabe« haben soll, die zarteren Organe vor zu starker Insolation zu schützen. Die Widerstandsfähigkeit der Zellen gegen das Austrocknen erklärt der Verfasser durch das Vorhandensein einer verhältnissmässig grossen Menge eines fetten Oeles in den Zellen der älteren Sprosse und Blätter. Bedenklich erscheint mir dabei der Umstand, dass die normal wasserreichsten Organe, die jüngeren Pflanzentheile, denen bei andern Gewächsen das Austrocknen zuerst verhängnissvoll zu werden pflegt, fast kein Oel enthalten.

Das Verständniss der anatomischen Angaben des Textes ist durch die beigegebenen zahlreichen Figuren erleichtert. Hinsichtlich der nach Photographien hergestellten Tafel 1 kann man freilich mit gutem Recht genau dasselbe behaupten, was der Verfasser auf pag. 4 von der Arbeit eines älteren Autors sagt: »Seinem Aufsätze ist eine Tafel beigegeben, welche in einer, wegen mangelhafter Technik der Ausführung allerdings nur unvollkommenen Weise, die Pflanze in zusammengerolltem und ausgebreitetem Zustande darstellt«.
Ghgn.

Erwiderung auf die Besprechung von Glaser's Taschenwörterbuch für Botaniker, 2. Aufl. 1890,

im 4. Heft der »Flora oder allgemeine botanische Zeitung«, 1890.

Der Herr Recensent meines Taschenwörterbuchs hat mich durch Andeutung wirklicher Verstösse in demselben nur zu Dank verpflichtet, wenn er es meines Dafürhaltens vermöge Besserwissens mit einigem zu genau nimmt und dem Verfasser gegenüber zu weit zu gehen scheint, indem er sagt, »leider hat der Verf. ohne hinreichende Sachkenntniss, Verständniss und Sorgfalt alles Mögliche zusammengestellt«. Dass dieses »alles Mögliche« nach den Urtheilen einer weniger scharfen Kritik eine »Fülle von Belehrungen« — über Wortbedeutung, Accentuirung und Orthographie der Worte, über die Systemstellung der Genera, deren deutsche, französische und englische Benennung, mit Angabe ihrer wichtigsten Arten und des Vaterlands, über technisch-mercantile und pharmazeutische Producte, über das zum Verständniss lateinisch geschriebener Descriptionstexte Erforderliche, lateinische Druckorte der Schriften, lateinisch-geographische Adjectiva u. s. f. in einer möglichst umfassenden alphabetischen Uebersicht die wichtigsten Cultur-, Zier- und exotischen Gewächshauspflanzen, sowie der ganzen heimischen Flora — in gedrängter, handlicher, zum Nachschlagen berechneter Form (also in nuce) bietet, unterlässt der Hr. Recensent anzuerkennen. Er hat für das Buch nur Tadel, indem er einige Fehler herausgreift, und zuerst an der kurzen Worterklärung von *adulterinus* »unächt, auch: verschwägert« Anstoss nimmt. Abgesehen von der zweifelhaften Ethymologie von *adulter*, hat der Verf. aber seinen Zusatz »auch verschwägert« nicht etwa aus der Luft gegriffen. In Mössler-Reichenbach's Handbuch der Gewächskunde (Altona 1834, 3. A., III, S. 1242) ist vielmehr zu lesen: *Pelargonium adulterinum* »Verschwägerter Kranichschnabel«. Dann tadelt der Hr. Recensent *apocarp* »sondersamig (nämlich Carpell)«, da es ausführlicher doch etwa heissen musste: »Fruchtblatt zu einem besonderen (abgesonderten) Samenfach umgebogen, wie z. B. bei Ranunculaceen etc., im Gegensatz zu *syncarp*«. — Der Verfasser bemerkt in einer besonderen Anmerkung des Taschenwörterbuchs (S. 486 der 2. Aufl.), dass »nähere Erklärung terminologischer Ausdrücke die Lehrbücher vermitteln, während das Taschenwörterbuch nur Wortübersetzung mit blosser Andeutung des Sinnes der Worte gibt«, und dabei muss er allen Vorwürfen wegen ungenauer, unzureichender oder gar unrichtiger Erklärung seiner terminologischen Wörter stehen bleiben, also z. B. auch bei der Uebersetzung von *dorsiventral* u. dgl. Wurde ihm bei der 1. Auflage des Taschenbuchs von anderer Seite gar die Verdeutschung des Wortes *Flora* bemängelt!

Dass *Carlodovica* irrig zu den eigentlichen Palmen statt *Cylantheen*, *Batis* den *Taxaceen* oder *Ephedreen* statt *Urticaceen* (in einem andern *Batis* = *Crithm* zu den *Umbelliferen*) gezählt ist, wie wohl noch manches andere verfehlt sein kann, muss ich natürlich zugeben, und dergleichen muss später geändert werden. Dass *Blasia* (nämlich *B. pusilla*) mit »kleines Aftermoos« bezeichnet ist, beanstandet der Hr. Rec., obgleich die Bezeichnung der *Jungermanniaceen*, einer moosigen Form der Lebermoose, als »Aftermoose« gar nicht ungewöhnlich ist. — Dass ferner bemerkt wurde, es fehle in dem Buche noch gar mancher Name, wie *Anhalonium*, *Leuchtenbergia* etc., ist gleichfalls richtig; der Verf. kann sogar hinzusetzen, dass in seinem ursprünglichen Concepte noch Hunderte von Namen enthalten sind, von denen er keinen Gebrauch machte, da es sich nicht um absolute Vollständigkeit, sondern nur um die Auswahl des ihm nothwendigst dünkenden handelte.

Wenn der Hr. Recensent in dem litterarischen Theil des Wörterbuchs Mängel, Lücken und Unrichtigkeiten bemerkte, so hat schon in der »Natur« der bewährte

Botaniker Dr. K. Müller bei Besprechung der 1. Auflage des Buchs eine drossfallsige Aeusserung mit dem Zusatz gemacht, dass Vollständigkeit in dieser Beziehung schwierig und einem Taschenbuch nicht wohl zuzumuthen sei. Dass z. B. von dem Ableben von Schleiden, de Bary, Röper, Schimper u. a. nichts angegeben ist, dass unter den Autoren über Cacteen Engelman fehlt, derselbe aber auch über Schizomyceten geschrieben haben solle ¹⁾, die beiden Schimper nicht gehörig unterschieden sind — nun, derartige kleine Mängel und Verstösse, die dem Späherauge eines scharfen, besser unterrichteten Kritikers nicht zu entgehen pflegen, mögen noch mehr vorhanden sein, ohne dass sie — das wird auch der Hr. Rec. zugeben — der Verdienstlichkeit eines im Ganzen dem praktischen Bedürfnisse entgegenkommenden Taschenbuchs sehr wesentlichen Abbruch thun. Unter Tausenden nützlicher und richtiger Wortbelehrungen dürfen ein oder etliche Dutzend Ungenauigkeiten, selbst Irrthümer mit unterlaufen, ohne dass den Verfasser darum der Vorwurf ungenügender Sachkenntniss trifft oder herabsetzt, da dergleichen auch dem grössten Autor zu passiren pflegt.

Wenn der Hr. Rec. es endlich rügt, dass die 2. Auflage die erste einfach bis S 485 (nämlich als Stereotypausgabe) wiedergibt, so hätte auch im andern Fall die Wiederkehr derselben Wörter in derselben alphabetischen Reihenfolge nicht vermieden werden können. Und in dem Nachtrage der 2. Ausgabe (S. 486—516) wird jeder Leser finden, dass offenbare Fehler der 1. Ausgabe (unter Bezeichnung der Seiten derselben) wirklich »verbessert« worden sind. — Schon bei der 1. Auflage standen einer nur tadelnden Kritik Dutzende von beifälligen seitens gleichfalls competenten Kritiker gegenüber, und so dürfte es auch bei dieser zweiten wieder sein. Trotzdem der Verfasser kein akademischer Docent der Botanik ist, hat er als Pädagog doch, wie bisher kein Berufsbotaniker, das Sitzfleisch gehabt, sein Nachschlagebuch für Lehrende und Lernende mit Mühe und »mit wahrem Bienenfleiss« zusammenzustellen, von dem es im Wolf'schen »Manuskript« (Lpz. 1884. Nr. 5) nach dem Wortlaut des begutachtenden Fachmannes heisst: »Ein ganz vorzügliches, von allen vorhandenen ähnlichen völlig unabhängiges und im praktischen Gebrauch sie übertreffendes Buch«.

Dr. L. Glaser.

1) Gern bemerke ich, dass die letztere Angabe von Engelman mit dem Zusatz Bot. Z. 1882, aus irgend einer mir nicht mehr erinnerlichen Quelle geschöpft ist und ich mich gern eines drossfallsigen Irrthums bescheide.


D. E.


Eingegangene Litteratur.


- Ambros, Ueber den Glanz der Sapphirinen. S.-A. aus den Mittheilungen aus der Zoolog. Station zu Neapel. IX. Band, 3. Heft.
- — Cellulose-Reaction bei Arthropoden und Mollusken. S.-A. aus den Mitth. aus der Zoolog. Station zu Neapel. IX. Band, 3. Heft.
- Bohlin, Myxochaete ett nytt slagte bland sötvattensalgerna. Bihang till K. Svenska Vet.-Akad. Handlingar. Band 15. Afd. III. No. 4.
- Borzi, Stadii anamorfici di alcune Alghe verdi. Estratto dal Bullettino della Società botanica italiana nel Nuovo Giornale Bot. Ital., Vol. XXII, No. 3. Luglio 1890.
- Buchenau, Zwei Abschnitte aus der Praxis des botanischen Unterrichts. Bremen 1890.
- Burck, Eenige Bedenkingen tegen de Theorie van Weismann aangaande de Betee-
kenis der sexueele Voortplanting in Verband met de Wet van Knight-Darwin.
Overgedrukt uit de Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel XLIX,
Aflevering 4.

- Briquet, Recherches sur la flore du district Savoisien et du district Jurassique Franco-Suisse. S.-A. aus »Engler's bot. Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie«. Bd. XIII, p. 47—105.
- Cogniaux, A., Cucurbitacearum novum genus et species. S.-A. aus Proc. California Academy of sciences. Scr. 2, 111.
- Cohn, Bericht über die Thätigkeit der bot. Section der Schlesischen Gesellschaft im Jahre 1889.
- Contributions from The U. S. National Herbarium. No. I: Vasey and Rose:
I. List of plants collected by Dr. Edward Palmer in 1888 in Southern California.
II. List of plants collected by Dr. Edward Palmer in 1889 at 1. Lagoon Head.
2. Cedros Island. 3. San Benito Island. 4. Guadalupe Island. 5. Head of the Gulf of California. No. II: Coulter: Upon a collection of plants made by Mr. G. C. Nealley, in the region of the Rio grande, in Texas, from Brazos Santiago to el Paso County.
- Festskrift, udgivet af den Botaniske Forening i Kjöbenhavn 12. April 1890. Indhold-fortegnelse: Joh. Lange, Erindringer fra den botaniske Forenings Historie 1840—90. Bützow, Oversigt over Medlemmerne i den botaniske Forening i Kjöbenhavn fra den 12. April 1840 til den 12. April 1890. Jensen, De danske Sphagnum-Arter. Rostrup, Ustilagineae Daniae. Danmarks Brandsvampe. Mortensen, Tidsvilde Hegn. Poulsen, Om Bulbildannelsen hos *Malaxis paludosa* Sw. Warming, Om Caryophyllaceernes Blomster.
- Fischer, Alfred, Beiträge zur Physiologie der Holzgewächse. S.-A. aus Pringsheim's Jahrbüchern für wissenschaftliche Botanik. Band XXII, Heft 1.
- Fischer, Hugo, Beiträge zur vergleichenden Morphologie der Pollenkörner. Inaugural-Dissertation. Breslau 1890.
- Flahault, L'institut de Botanique à l'Université de Montpellier. 1890.
- Fritsch, Ueber die Gattung *Walleria*. S.-A. aus den Sitzungsberichten der k. k. — — — — — zoolog.-bot. Gesellschaft in Wien. Bd. XL. 4. Juni 1890.
- — Bericht über die floristische Durchforschung von Oesterreich-Ungarn. Salzburg I. Kärnten I. S.-A. aus der »Oesterr. bot. Zeitschrift«, Jahrg. 1890, No. 7.
- Garcke, Ueber einige Arten von *Melochia*. S.-A. aus Engler, Bot. Jahrbücher, XII. Bd., 1. Heft.
- — Ueber einige Arten der Gattung *Anoda*. S.-A. aus »Gartenflora«, 36. Jahrg.
- — Wie viel Arten von *Wissadula* gibt es? S.-A. aus Zeitschrift für Naturwissenschaften. Bd. LXIII. 1890.
- Giesenhagen, Ein Zeichenpult für den Gebrauch am Mikroskop. S.-A. aus der Zeitschrift f. wissensch. Mikroskopie etc. Band VII. 1890.
- Glaser, Botanisches Taschenwörterbuch. II. Auflage. Verlag von T. O. Weigel Nachfolger, Leipzig.
- Gremli, Neue Beiträge zur Flora der Schweiz. V. Heft. Verlag von Ph. Wirz-Christen, Aaran.
- Haberlandt, Zur Kenntniss der Conjugation bei *Spirogyra*. Aus den Sitzungsberichten d. kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien. Mathem.-naturw. Classe. Bd. XCIX. Abth. 1. Juni 1890.
- — Die Kleberschicht des Gras-Endosperms als Diastase ausscheidendes Drüsengewebe S.-A. aus d. Ber. d. Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrg. 1890, Bd. VIII.
- Hansen, Die Dattelpalme. Prometheus Bd. 1, No. 43, 44 u. 45. 1890.
- — Ueber eine Beschädigung von Bäumen.
- Heineck, Beitrag zur Kenntniss des feineren Baues der Fruchtschale der Kompositen. Inaugural-Dissertation. Giessen 1890.
- Höck, Dr. F., Nährpflanzen Mitteleuropas. Forschungen zur deutschen Landes- und Volkskunde. Bd. 5, Heft 1. Verlag von J. Engelhorn, Stuttgart.
- Johnson, Flora of Plymouth Sound and adjacent waters. Preliminary paper, Reprinted from the Journal of the Marine Biological Association, Kew Series. Vol. I, No. 3.
- Jumelle, Le laboratoire de Biologie végétale de Fontainebleau. Paris, Paul Klincksieck.
- Kny, Bau und Entwicklung von *Marchantia polymorpha*. S.-A. aus dem Text der VIII. Abtheilung der »Botanischen Wandtafeln«.
- Kruch, Istologia ed istogenia del fascio conduttore delle foglie di *Isoetes*. S.-A. aus »Malpighia«. Anno IV, Vol. IV.
- — Sulla struttura e lo sviluppo del fusto della *Dahlia imperialis*. Estratto dal Bullettino della Società botanica italiana nel Nuovo Giornale Bot. Ital. Vol. XXII, No. 3. Luglio 1890.

- Lanza, La struttura delle foglie nelle Aloineae ed i suoi rapporti con la Sistematica. Estratto dalla Malpighia. Vol. IV, Fasc. IV. 1890.
- Loesener, Vorstudien zu einer Monographie der Aquifoliaceen. Inaugural-Dissertation. Berlin 1890.
- Moeller, H., Beitrag zur Kenntniss der *Frankia subtilis* Brunchorst. S.-A. aus d. Ber. d. Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrgang 1890, Bd. VIII, Heft 7.
- Nägeli u. Peter, Die Hieracien- Mittel-Europas. II. Bd. III. Heft. München, Verlag v. R. Oldenbourg.
- Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Deel XLIX.
- Oltmanns, Ueber die Cultur und die Lebensbedingungen der Meeresalgen. S.-A. aus der »Rostocker Ztg.« No. 233. 1890.
- Pfeffer, I. Ueber Aufnahme und Ausgabe ungelöster Körper. II. Zur Kenntniss der Plasmahaut und der Vacuolen nebst Bemerkungen über den Aggregatzustand des Protoplasmas und über osmotische Vorgänge. Abhandlungen der math.-phys. Classe der Kgl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Bd. XVI, No. II.
- Potonié, Die botanische (theoretische) Morphologie und Goethe. Naturw. Wochenschrift. V. Band. No. 5. 1890.
- Potter, On the increase in thickness of the stem of the Cucurbitaceae. Extracted from the Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. VII. Pt. I.
- — Additional note on the thickening of the stem in the Cucurbitaceae. Extr. from the Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. Vol. VII. Pt. II.
- Rauwenhoff, La génération sexée des Gleichéniacées. Extrait des Archives Néerlandaises, T. XXIV, p. 157 - 231.
- Reinke, Uebersicht der bisher bekannten Sphacelariaceen. S.-A. aus d. Ber. d. Deutschen Bot. Gesellschaft. Jahrgang 1890, Band VIII, Heft 7.
- Ross, Contribuzioni alla Conoscenza del Periderma. Estratto dal Malpighia, III 10—12 e IV, 1—3.
- Sauvageau, Sur une particularité de structure des plantes aquatiques. S.-A. d. Comptes rendus. Paris 1890.
- — Observations sur la structure des feuilles des plantes aquatiques. S.-A. d. Journal de Botanique 1890.
- Schaar, Die Reservestoffbehälter der Knospen von *Fraxinus excelsior*. S.-A. aus den Sitzungsberichten d. kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien. Mathem.-naturw. Classe. Bd. XCIX. Abth. 1. Mai 1890.
- Scherffel, Zur Frage: »Sind die den Höhlenwänden aufsitzenden Fäden in den Rhizomschuppen von *Lathraea squamaria* L. Secrete oder Bakterien?« Bot. Zeitung No. 27. 1890.
- Schimper, Zur Frage der Assimilation der Mineralsalze durch die grüne Pflanze. S.-A. aus »Flora oder allg. bot. Zeitung«. 1890. Heft 3.
- Schomburgk, Report on the progress and condition of the Botanic Garden during the year 1890. Adelaide, H. F. Leader.
- Suringar, Nieuwe Bijdragen tot Kennis der Melocacti van West-Indië. Overgedrukt uit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde, 3^{de} Reeks, Deel VI. 1889.
- Taubert, Plantae Glaziovianae novae vel minus cognitae. Beiblatt zu den Botanischen Jahrbüchern. Band XII, Heft 1, No. 27.
- Tschirch, Indische Skizzen. III. Naturw. Wochenschrift No. 21. 1890.
- Urban, Der botanische Garten in Berlin. S.-A. aus der Festschrift zum X. internationalen medicinischen Kongress. Berlin 1890.
- — Das botanische Museum. S.-A. aus derselben Festschrift.
- Vries, Hugo de, Ueber abnormale Entstehung secundärer Gewebe. S.-A. aus Pringsheim's Jahrbücher f. wiss. Botanik. Bd. XXII. Heft 1.
- Wojnowic, Beiträge zur Morphologie, Anatomie und Biologie der *Selaginella lepidophylla* Spring. Inaugural-Dissertation. Breslau 1890.
- Würtenberger, Deutscher Gartenbau-Kalender für das Jahr 1891. Verlag von Emil Sömmerner in Baden-Baden.







C Giesenhagen del.

W.A. Meyer lith.

